

TRACTATUS

DE

MATERIA MEDICA

SIVE DE

MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM

Historia, virtute, delectu, & usu;

Auctore STEPHANO-FRANCISCO GEOFFROY,

Doctore Medico Parisiensi &c. &c.

Editio novissima locupletior, aliisque emendatior, Supplemento PARTIS SECUNDÆ SECTIONIS SECUNDÆ Anonymi Professoris nunc primum aucta, ex Gallica in Linguam Latinam eleganter redacta.

TOMUS SECUNDUS.

DE VEGETABILIBUS INDIGENIS.



VENETIIS,
Apud NICOLAUM PEZZANA.

M DCC LVI.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.



MATERIÆ MEDICÆ

PARS SECUNDA.

DE

VEGETABILIBUS INDIGENIS.

SECTIO SECUNDA.

DE PLANTIS INDIGENIS.

Quæ in Usum Medicum veniunt.



Indigenæ Plantæ, seu quæ nostro sub cælo nascuntur, vel hominum saluti, tum restituendæ, tum conservandæ, aliquid conferunt; vel Medicinæ prorsus inutiles sunt; aut saltem earum vires salutare hactenus ignoræ fuerunt. Has silentio prætermittimus; de illis vero hic agemus.

In earum historia, & virtutibus recensendis alphabeticum servabimus ordinem, quo facilius unusquisque plantas, quarum historiam inquireret, reperire possit. Officinalia vulgatiores nomina cæteris denominationibus ex Auctoribus desumptis, præponemus utpote magis cognita. Deinde nomen genericum ex Institutionibus rei herbariæ depromptum, cæteraque synonyma a Clarioribus Botanice scriptoribus assignata, recensebimus. Denominationi plantæ, descriptionem subjungemus, analysim ac virtutes, & utendi rationem, eodem ordine, quem in exoticorum medicamentorum expositione secuti sumus.

At vero stirpium harum cum illis, quæ sub eadem denominatione, a veteribus recensitæ fuerunt, comparationem inutilem censemus, disqui-

rendo nempe, utrum eadem sint, necne. Quandoquidem plantæ ipsis cognitæ, & usitatæ nobis defunt, & difficile est ex parum accuratis earum descriptionibus decernere, utrum eadem sint plantæ quæ apud nos nascuntur, an diversæ? Præterquamquod plurimas plantas veteribus notas, & in Græciæ solo natas, ab iisdem speciebus nostro sub cælo nascentibus, viribus multum discrepare, veritati sit maxime consentaneum. Eandem ob causam de viribus ab antiquis, tum Græcis, tum Arabibus, illis stirpibus attributis, parum solliciti erimus; sed tantum assiduo, & quotidiano usu comprobatas apud nos virtutes, tum salutiferas, tum noxias, quam poterimus diligentissime, pervestigabimus.

ABROTANUM.

A Brotanum vel Abrotonum. Duæ sunt plantæ hujus nominis in officinis usitatæ, Abrotonum mas, & Abrotonum fœmina.

Abrotonum mas *Officinarum*. Abrotonum mas angustifolium majus, *G. B. P.* 136. *Institut. Rei Herbar.* 459. Abrotonum vulgare, *J. B.* 3. 191. Abrotonum mas *Dodon. Pemptad.* 21. vulgo, *Auront male*. Ex radice lignosa, fibris aliquot donata, crebris frutescit sarmentis, tres, quatuorve cubitos altis, duris, fragilibus, medulla alba plenis, subrubentibus, striatis, ramosis: folia per alas nascuntur multa, tenuiter dissecta, sceniculaeis paulo majora, inferiora quidem multifida, superiora uno tantum aut altero segmento divisa, canescentia, odore vehementi, sapore amaro acri: flores secundum ramulos conferti, sublutei, floribus Absynthii similes sunt; stocculosi nempe, sed exigui, compositi ex plurimis stocculis minutissimis, tubulosis, in summitate quinquefariam divisis, quorum singuli singulo insident semini, & omnes squammoso flores calyce comprehendunt. Floribus succedunt semina exigua, oblongiuscula, nuda, pappo carentia, Absynthii similia, sed minora. Ab Absynthio differt sola facie externa, & optime ad ejusdem genus reduci posset. Ratione culturæ, & loci, necnon pro anni tempore multo amarior videtur. In montosis Italiæ & Galliæ provinciis, sponte nascitur. Hic in hortis colitur, ubi avulsis ramulis, alii ex radicibus de novo progerminant. In usum medicum folia, & comæ floridæ veniunt.

Analysi chymica, ex hujus plantæ foliorum ac summitatum recentium & succulentarum lbv. per retortam distillatis, prodierunt, primo phlegmatis limpidi plantæ odore, & sapore imbuti ℥xij. humoris odorati, acidi, & sale alcali aliquantisper turgidi lbij. ℥vj. gr. xij. humoris rufescentis, odoris empyreumatici, tum acidi, tum urinosi, & volatili sale imprægnati ℥ij. ℥i. gr. v. olei tum fluidioris, & essentialis, tum crassioris, & empyreumatici ℥ij. ℥ij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥v ℥ij. quæ igne reverberii tamdiu calcinata, donec nullam amplius flammam ederet, reliquit cinerum ex fusco leucophæorum ℥j. ℥vij. gr. xxxvj. ex quibus lixivio, salis alcali fixi ℥j. ℥ij. extractæ fuerunt. Partium deperditio in distillatione fuit ℥ij. ℥iiij. gr. lv. in calcinatione ℥ij. ℥ij. gr. xxxvj. Ex hac analysi concludendum est, Abrotonum mas ex multo oleo essentiali amaro aromatico, & sale ammoniacali constare.

Ra-

Rarius Abrotano intrinsecus utimur, quod Etmullero mirandum, & dolendum videtur. Revera ejus odor vehemens ac sapor aromaticus, acris, amarus, innuunt, partibus volatilibus tenuibus salino-oleosis donari, quibus fermentativus sanguinis motus augetur, crassiores humores dividuntur, solidarum partium tonus imminutus restituitur, debiliior augetur: quamobrem medici vim calefaciendi, incidendi, aperiendi ipsi tribuerunt. Aëtuosis iisdem particulis putredini resistit, vermes necat, non solum oleo suo essentiali amaro vermibus infenso, sed etiam propter tenues & aëtuosas ejus particulas, quæ nimis glutinosum ventriculi, & intestinorum mucum, in quo vermes nidulantur, dividunt ac resolvunt. Eadem ratione flatus discutit, urinas & menses movet, renum, & uteri obstructions referando. Illud tamen ventriculo insensum esse nonnulli existimant, quod de omnibus ægrotantibus pronuntiari nequit, sed tantum de illis, quorum ventriculi temperies calidior est, seu quorum ventriculus in inflammationem pronus est, præ nimio sanguinis, & spirituum ad hanc partem affluxus. In quamplurimis autem ventriculus ab his acris, & aromaticis medicamentis læditur. Neque adeo fors nostra logenda est, ob parum Abrotani usum, dum frequentior est usus Absinthii quod iisdem viribus donatur, & quidem valentioribus: quapropter a nonnullis ut Ablynthii succedaneum tantummodo proponitur.

Abrotani tamen coma pulverata ad ℥j. cum tantillo Nistri, a S. Pauli in Quadripartito Botanico, iis quibus, ob calculum, urina supprimitur, proponitur & velut specificum commendatur: sed Nitro potissimum hæc virtus fortasse debetur, aut saltem ab illo plurimum augetur. Nonnulli decoctum ejus, pro lorione capitis, contra capillorum defectum aut defluxum laudant. Basim constituit unguenti Bucelii Vratislaviensis, secreti & experti contra capillorum defectum, cujus hæc est descriptio ab Etmullero prolata.

℥. Folior. Abrotan. maris & Capillor. vener. ana m. j. Favæ mellis, Ladani ana ℥j. Myrtillor. ℥j. Semin. Fœnugræc. Lini ana ℥iij. Olei Amygdalar. dulc. vini albi generosi ana ℥iij. Facta infusione per 24. horas, bulliant ad humiditatis consumptionem: postea fiat colatura cum expressione. Cum hoc unguento, crescente Luna, inunctio fieri debet.

Oleum essentialè Abrotani, maris, ex herba florida & exsiccata; cum magna aquæ copia distillatur. Eo membra paralytica illinuntur. Commendatur quoque ad pilorum generationem promovendam, præsertim si cum Ladano & adipe Urino, miscetur.

℥. Olei Abrotani mar. stillatitii ℥℔. Ladani ℥vj. Axungia Uræ ℥ij. Misce, fiat unguentum.

Abrotanum mas usurpatur in unguento Martiato.

Abrotanum fœmina, Santolina, Chamæcyparissus *Officinarum*, Crespolina, *Quorumdam*. Santolina foliis teretibus, *Inst. R. H.* 460. Abrotanum fœmina foliis teretibus *C. B. P.* 136. Chamæcyparissus *J. B.* 3. 136. Polium Theophrasti & Dioscoridis & Arabum, Vermiculatæ, folio, *Column. P.* 1. 4. Abrotanum fœmina, *Lobel. Icon.* 768. vulgo, *petit Cypress* & *Garderohe*.

Geoffroy Tom. II.

A 3

Ex

Ex radice crassa, dura, lignosa, & subinde in brachia fissâ, virgulta cûbito altiora emittit, lignosa, gracilia, tenera lanugine incana & in plures ramos divisa, quos ambiunt tenuia folia, longitudine circiter unciali, minutim denticulata, aut potius tuberculis exiguis onusta, ita ut quatuor fere tubercula in eadem phalange agminatim circumposita conspiciantur, incana omnino, odore medicamentoso & cum quadam suavitate gravi, sapore partim acri, partim amaro aromatico. Singulis ramulis singuli insident flores lutei, perfecti, flosculosi, compositi nempe ex plorimis flosculis tubulosis in summitate quinquifidis, foliis intermediis imbricatis, & calyce communi squamoso quasi hemisphærico comprehensis: singulorum flosculorum calyx seu embryo abit in semen oblongiusculum striatum, fuscum, pappi nequaquam instructum. Majores sunt hujus plantæ flores quam Abrotani maris & Absynthii, quibus ab illis plantis distingui potest, sicut & tota plantæ facie. Sponsæ luxuriat in campestribus Italiæ locis & vinetis. In Gallo Provincia quoque a Garidello observata fuit. Hic in hortis colitur. Folia, summitates floridæ, & semina in usum medicum veniunt.

Analysi chimica, foliorum & summitatum Santolinæ recentium ℥v. præbuerunt phlegmatis limpidi odorem plantæ saporemque referentis ℥xj. ℥ij. humoris limpidi adhuc odorati & acidi ℔ij. ℥xi. ℥ij. gr. xxxvj. humoris rufescentis acidi & subsalsi, qui tum acidi, tum alcali urinosi salis notas præbuit, ℥ix. ℥vj. gr. xxx. salis volatilis urinosi concreti, gr. xl. olei adiposæ crassitudinis ℥iiij. ℥ij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥viij. ℥vj. quæ igne reverberit calcinata cinerum leucophæorum ℥ij. ℥ij. gr. xij. reliquit; ex quibus salis fixi mere alcalini ℥j. gr. viij. lixivio extracta sunt. Partium deperditio in distillatione fuit ℥ij. ℥j. gr. xxxvij. in calcinatione ℥vi. ℥ij. gr. lx. Per hanc analysim patet, Santolinam constare ex sale ammoniacali, & oleo crasso copioso.

Santolinæ eadem quæ Abrotano mari, tribuuntur virtutes. Attamen paulo plus salis volatilis urinosi, majorem olei crassioris quantitatem, minorem vero olei tenuioris seu essentialis suppeditat: unde ad hystericos affectus compescendos, hæc præstare videretur.

Rarioris est usus apud nos in Medicina. Ad ventris lumbricos interimendos, in primis commendatur ejus semen, solum vel saccharo obductum; infantibus comedendum porrigitur, vel herbæ decoctum in lacte aut in aqua conveniente propinatur. Andreas Matthiolus Santolinæ folia sicca & in pulverem trita, dari perquam utiliter ex aqua Matricariæ, semi-drachmæ pondere, asserit, ad sistenda alba sceminarum profluvia, si continuis decem diebus fumantur a jejunis, & deinde interpolatis diebus. Cossus quidam Aquilexiensis Medicus, teste Garidello, Santolinæ foliorum pulveratorum drachmam unam felici cum successu in pleuritide, & peripneumonia exhibere solebat.

Ejus folia inter laneas vestes sparguntur; ad tineas ab illis arcendas. Usurpatur cum Abrotano mare, in unguento Martiato.

ABSINTHIUM.

Absinthii species duæ in officinis usuatæ sunt, scilicet; Absinthium latifolium, seu majus, & Absinthium tenuifolium, seu minus. Absinthium latifolium, Absinthium vulgare, Absinthium majus, *Officinatum*. Absinthium Ponicum, seu Romanum officinarum, seu Dioscoridis C. B. P. 138. *Inst. R. H.* 457. Absinthium vulgare majus J. B. 3. 163. Absinthium latifolium. *Dodon. Pempt.* 23. vulgo, *Absinte*, *Alvine ordinaire*, *grande Absinte*.

Radice est crassiuscula, lignosa & fibrosa, saporis aromatici grati absque amarore, caulibus cubitalibus & bicubitalibus, striatis, firmis, lignosis, medullosis, canescentibus, ramosis & furculosis, in quibus folia plurima alternatim oriuntur, pediculis oblongis, canaliculatis innixa, profunde dissecta iterum atque iterum incisa, candicantia, mollia, intense amara & odoris aromatici vehementis: flores longa serie in tummis ramulis nascuntur, pediculis brevibus, tenuibus, & ex quorundam foliorum alis egressis hærentes ac penduli, globosi, exigui, completi, & flosculosi, seu compositi ex plurimis flosculis tubulosis, brevioribus, in summitate, quinquefariam divisis, luteis, e communi calyce squamulato prodeuntibus, singulis singulo insidentibus embryoni, qui deinde abit in semen nudum, non papposum. A cæteris Absinthii speciebus differt foliis, & laciniis amplioribus, & insigni odore cum amarore conjuncto. Colitur in hortis. Ejus folia, & summitates in primis usurpantur.

Analyti chymica, ex foliorum Absinthii latifolii nondum floridi *℞v.* prodierunt phlegmatis limpidi, plantæ odore & sapore imbuti, quod neque alcali, neque acidi notas præbuit *℞x. ℥vj. gr. xlviii.* cum oleo essentiali permixto: deinde humoris limpidi, odorati, qui debilis acidi & alcali valentioris notas præbuit, *℞ij. ℥xij. ℥vj. gr. lx.* tandem humoris mere alcali, & sale volatili imprægnati, *℞j. ℥v. gr. xlviij.* salis volatilis urinosi concreti *℥v.* olei, tum tenuis, tum crassi *℞j. ℥ij.* Massa nigra in retorta superstes, pendebar *℥vj. ℥ij.* quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum *℞ij. ℥iiij.* ex quibus lixivio, salis fixi mere alcali *℞j.* extracta fuit. Partium jactura in distillatione fuit *℥xiiij. ℥ij. gr. lx.* in calcinatione vero *℞ij. ℥vj.*

Ex Absinthii, latifolii foliorum, & summitatum floribus, & seminibus onustarum *℞v.* prodierunt phlegmatis limpidi odore plantæ saporeque perfusi quod primum subacidi, deinde intense acidi, ac tandem acidi, & alcali urinosi notas præbuit, *℞ij. ℥xi. ℥vj. gr. lx.* cum non mediocri olei essentialis portione: humoris rufescentis empyreumatici, alealini, & sale urinoso turgidi *℞ij. ℥j. gr. xij.* salis volatilis concreti *gr. xxiiij.* olei tum essentialis, & tenuioris tum foetidi & spissioris consistentiæ *℞ij. ℥vj. gran. xvij.* Massa nigra in retorta superstes pendebar *℥vij. ℥vij. gr. xij.* quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum *℞ij. ℥ij. gran. xxxvj.* ex quibus, lixivio salis fixi mere alcali *℞j. ℥ij. gran.*

xlij. prodierunt : jactura in distillatione fuit ꝑv. ꝑij. gran. xvij. calcinatione in fumum , & flammam abierunt ꝑv. ꝑij. gran. xlvij.

His ambabus foliorum , & summitatum Absynthii majoris analysibus inter se comparatis , liquet , folia majori partium tenujum , & volatilium copia turgere quam flores , & semina ; cum triplo major sit partium deperditio in foliorum distillatione , quam in summitatum analysi . Cum unaquæque foliorum libra salis volatilis drachmam unam præbeat , summitates vero vix grana quinque pro singulis libris : eadem folia multo minus acidi salis , & olei exhibuere . Unde concludere possumus , folia sale ammoniacali , & oleo copioso ac tenui donari ; in summitatibus autem salem tartareum cum aminoniacali conjunctum reperiri ; at verisimile est omnem Absynthii energiam pendere potissimum ab ejus oleo essentiali , amaro , & aromatico , quod licet in foliis , & summitatibus , natura idem semper videatur , in foliis tamen ob intimum salium volatilium consortium tenuius sit , magis expansum ac magis volatile .

Absynthium vulgare quasi polychrestum medicamentum prædicatur ; calefacit & exsiccat , ut ajunt , seu portus tenuibus , & actuosius suis particulis salino-oleosis quæ massam sanguineam subeunt , fermentativum sanguinis motum augeat , partium quoque fibras sollicitat ad motum & ad oscillationem ; sic calor in corpore accenditur : restituta vel aucta fibrarum oscillationem , succi inter partium fibras hærentes , & otiosi , si crassiores sint , attenuantur ; si tenaces inciduntur , & canales solitos repelluntur , vel per transpirationem foras expelluntur : sic quoque viscerum functiones debilitatæ restituantur , obstructions referantur ; hinc stomachicum dicitur , hepaticum , splenicum , uterinum , anticachecticum insigne , febrifugum , vulnerarium detergens , bilis succedaneum , & anthelminticum : ventriculum debiliorem roborat ac firmat , ciborumque appetentiam excitat , tum fibras ventriculi laxiores constringendo ac firmando , tum etiam mucaginem spissam ejusdem parietibus in hærentem dissolvendo : eisdem rationibus diarrhæas sistit , superpugationes compefcit , & colicos dolores flatulentos sedat . Viscerum obstructions resolvit quæ pendent , vel a fibrarum laxitate , vel ab humorum spissitudine . Sic ictero , hydropi , chlorosi , cachexiis & febribus medetur . Vermes interimit , tum amaritie summa vermibus infesta , tum mucilaginosos humores , in quibus eorum ovula retinentur , soventur , excluduntur , resolvendo .

Verum cavendum ab illis affectibus , qui a fibrarum rigiditate , crispatura , erethismo , vel convulsiva aut inflammatoria tensione , oriuntur , quos Absynthium non modo non sedat , quin imo augeat , & nonnunquam insanabiles reddit . Sic in ciborum concoctione laxa præ nimio ventriculi ardore adeo intendit , & augeat , ut renes in consensum per nervos trahantur , & ardorem contrahant , quem breviter sequuntur urinarum color intensus , & rutilans , cum crasso , & rubro sedimento , earumdem imminutio , suppressio , hydrops ; si vero renes ob laxiorem texturam illæsi servantur , cæterorum visce-

rum

rūm fibræ paulatim convelluntur, rigescunt, & tabes sensim adducitur. Hinc fit ut maxima pars belluonum, ad prostratum appetitum sollicitandum, aut ciborum nimia copia ingestorum, coctionem perficiendam, quotidie vinum Absynthites, aut tincturas stomachicas & spirituosas ingurgitantium, plerumque ante obitum lente veluti liquefiat, tabefacta vero ante annos moriatur, observante Simone Paulli. Sic etiam muliebribus evacuationibus menstruis, a sanguine nimis æstuoso, vel ab uteri ardore aut inflammatione suppressis, Absynthium ægrotañtem in viscerum inflammationem, & febrem ardentem inducit. Idem de cæteris visceribus præservidis & ad inflammationem pronis dici potest.

Præterea Absynthium sicut amara pleraque, nervis est insensum, ut intelligere est ex animalibus plurimis, tum quadrupedibus, tum volatilibus, tum insectis, quæ ab amaris devoratis, spasms afficiuntur, & convulsa sæpe moriuntur, quod ex Vveperi observationibus satis liquet. Insuper multi ab experientia edocti tradunt, usum Absynthii caput gravare, oculis noxium esse, & appetitum venereum extinguere. Caute igitur in morbis, quorum anceps est & dubia causa, Absynthium & amara medicamenta acria & aromatica sunt usurpanda, ne pro remedio, venenum exhibeatur.

Comæ floridæ & folia exsiccata & pulverata exhiberi possunt a ℥j. ad ℥j. rarius tamen usurpantur. Ex his cum saccharo condita parantur. Flores conditi obstructions valentius referant, folia vero magis adstringunt, inquit Cl. Hoffmannus. Exhibetur a ℥j. ad ℥ss. succus ex foliis expressus, deinde parva coctione purgatus, ab ℥ss. ad ℥ij. nonnunquam propinatur, rarissime tamen ob inenitum amarorem. A quibusdam vis cholagoga illi tribuitur, de qua tamen non plane constat.

Infusum cum aqua, vino, vel cerevisia præparatur, & ad ℥ij. vel ℥vj. propinatur. Aquosum Absynthii infusum a multis, cerevisiæ aut vino Absynthii anteponitur, quia caput minus gravat.

Fit vinum Absynthites extemporaneum, macerando nempe per noctem, comas Absynthii siccatas, in vino. Est autem vinum Absynthites quod ex herba sicca infusa paratur, palato gratius, aut potius minus ingratum, quam quod ex herba recenti. Hoc enim herbaceum & terreum quid resipit. Paratur quoque vindemiarum tempore, vinum Absynthites fermentatum, Absynthit exsiccatis & minutim concisi fasciculum, in dolum conjiciendo & musti lb. aut circiter affundendo & fermentando simul. Vinum Absynthites quocumque modo paratum sit, exhibetur ad ℥ij. iv. vel vj. mane jejuno ventriculo, vel etiam ante, aut post pastum. Ex Absynthio præparari solent in officinis tinctura, seu, ut vocant, essentia Absynthii, aqua distillata, oleum essenziale, extractum & sal fixus.

Tinctura Absynthii fit ex foliis aut summisatibus, cum spiritu vini in amphora vitrea, rite maceratis, donec spiritus intense amarus evadat. Si folia fuerint recentia, tinctura viridis erit; si exsiccata, rufa vel fusca: sumitur ad ℥ss. vel ℥j. pro dosi. Quidam hanc tincturam parant cum spiritu ardente ex ipso Absynthio fermentato extracto, & adhuc præstantiorem tincturam esse existimant.

Aqua Absynthii distillata sic conficitur.

℥i. Foliorum virentium Absynthii nondum floridi, ℥xv. Incidantur & contundantur. Indantur vesicæ aheneæ & affundantur decocti fortis ejusdem plantæ ℥x. aut q. s. digerantur vase clauso per quatrimum; deinde apposito capitello cum refrigeratorio, & adjuncto recipiente, fiat distillatio, ut artis est. Aqua spirituosæ & magis odorata servetur ad usum. Dosis ab ℥j. ad ℥vj.

Spiritus Absynthii urinosus flavescens, a nonnullis plurimum laudatus, sic extrahitur. Absynthium viride cum floribus & seminibus minutim concisum, congeritur in vasculum rite obturatum, ut sponte incalcescat, & nonnihil putrescat. Incipiente putrefactione, antequam sæteat, igne aperto, per retortam terream amplam, distillatur, & sic copiosissimus liquor urinosus obtinetur, per alambicem, igne arenæ, rectificandus. Prodit spiritus urinosus, volatilis, & valde amarus. In scorbuticis affectionibus utiliter exhibetur. Sed idem spiritus salino-oleosus & quidem præstantior, ex spiritu volatili urinoso quocumque, & oleo Absynthii essentiali simul mixtis, & circulatis, ut ajunt, obtineri potest.

Oleum essenziale ex herba florida, seminibus jam turgida & exsiccata extrahitur, distillando nempe plantæ partem unam, cum aquæ limpidæ partibus viginti, ex alambice aheneo, igne forti. Aqua & oleum in recipiens vas promiscue profluunt. Oleum supernatans ab aqua rite separatur. Intus sumptum, iisdem viribus donatur ac Absynthium. Externe gossypio exceptum, & umbilico admotum, intestinorum vermes necat. Dosis a gutt. ij. ad x. Ex eo paratur oleo saccharum Absynthites quod facilius aquosis menstruis admiscetur, quam oleum.

Extractum Absynthii fit ex succo folior. Absynthii expresso, & ad mellaginem aut ad extracti consistentiam, evaporato. Extractum magis adstringit quam Absynthium, aut cæteræ ejus præparaciones. Exhibetur a ℥j. ad ℥ß. aut ℥j.

Sal fixus Absynthii fit ex lixivio cinerum plantæ combustæ, quod rite percolatum, evaporatur ad siccitatem usque. Sic remanet sal rufescens, qui, si non satis purgatus videatur, igne reverberii calcinatur, aqua solvitur; solutio autem percolatur & exhalatur, ita ut sal candidus & purus remaneat. Quidam salem hunc non summe purgatum expectant, sed qualis extrahitur ex cineribus Absynthii in vase clauso calcinati: tunc enim sal ille neque candidus, sed rufescens, neque mere alcalinus, sed salis adhuc remanet, & multo sulphure imprægnatus, ac proinde plantæ virtutibus adhuc imbutus. Sed tunc aut plantam ipsam pulveratam, aut ejus succum, aut extractum, aut salem essentialem, anteposenda censem.

Sali Absynthii fixo virtus febrisfuga tribuitur, & in primis adversus tertianam, a Sim. Paulli commendatur. Dosis a ℥j. a ℥ß. Observandum est salem illum admodum acrem esse, ac proinde, non majori copia exhibendum, nec nisi multo liquore dilutum, ne acrimonia sua gulam, & ventriculum lædat. Ad obstructions removendas utiliter exhibetur. Usitatissimus est apud Medicos Londinenses, & a Riverio, Sidenhamioque, com-

men-

miendatur ad vomitum compescendum, in febribus biliosis, iliaca passione aliisque affectibus.

24. Summitatum Absynthii seccatar. pug. j. Infunde in aquæ servidæ 3vj. Macerentur paululum. Infusum, cum tantillulo Sacchari, calens hauriatur, ad appetitum excitandum, concoctionem adjuvandam, ventriculū & viscera roboranda, menstruas purgationes mulierum promovendas, &c.

24. Absynthii exsiccati & pulverati 3ß. Croci Martis sub rore majali præparati 3ij. Gumm. Ammoniac. 3j. Croci ʒj. Syrup. de Absynthio vel Menthæ q. s. Misce, fiat opiata. Dosis 3ß. bis in die, servatis servandis, ad menses suppressos, cachexiam, icterum, hydropem, obstructions, & quoscunque, id genus, morbos, qui a sanguinis lentore & crassitudine, aut a fibrarum tono nimis laxo pendent.

24. Tincturæ Absynthii ʒij. Spir. carminativ. Sylvii 3ß. Syrup. Menthæ ʒj. Fiat mixtura. Cochlear unum exhibeatur in colicis & flatulentis affectionibus, ciborum inappetentia, aut difficili coctione, ventriculi imbecillitate & frigiditate, alvi profluvio, &c.

24. Vini Absynthitis 3xij. Pulpæ Colocyntidos minutim concisæ 3ß. Macerentur per xxiiij. horas. Fiat colatura. Fit vinum catarrhicum quod phlegma crassum & viscidum, ventriculi & intestinorum parietibus in hærens, dissolvit & vacuat, & mesenterii obstructions resolvit. Exhibeantur ʒiiij. singulis diebus mane, jejuno ventriculo.

24. Salis Absynthii ʒj. succi Limon. ʒj. Aq. Menthæ ʒj. Fiat mixtura, bis, terve, die iteranda. Vel:

24. Sal. Absynth. ʒij. Aq. Puleg. vel Menth. crisp. 3vj. Fat mixtura, cujus cochlear unum in singulis jasculis permiscendum est contra vomitionem.

24. Salis Absynth. & Nitri purificati, ana q. l. Solve in aq. Cichor. q. s. Solutio percolata ad siccitatem evaporetur. Exhibetur adversus tertianam ad 3ß. aut ʒj. in vino, cerevisia, aut alio liquore idoneo, cum tantillulo Sacchari edulcorato, paulo ante paroxysmum, & sudorem provocare solet.

Externe adhibitum, ventriculū & intestina roborat, vermes necat, putredini resistit, tumores resolvit, dolores & inflammationes incipientes discutit. In cataplasmatibus resolventibus recipitur, & in vino aromatico, seu defensivo contra putredinem.

24. Folior. Absynth. virentium partes duas. Axungiz Porcinæ, p. unam. Contundantur simul, & fiat cataplasma collo calide admo- vendum in angina.

24. Folior. Absynth. & Parietar. part. æqual. Contundantur, & calide parti dolenti applicentur sub forma cataplasmati, aut decocto earundem herbarum pars affecta foveatur ad dolores externos sedandos, incipientes inflammationes compescendas, & contusiones resolvendas.

24. Folior. Absynth. & Senecionis, ana M. ij. Flor. Chamæmeli & Melilot. ana M. j. Rad. Ireos & Bryon minutim incisarum, ana ʒij.

- ℥ij. Coquantur ex arte in aq. com. q. s. ad putrilaginem. Cōtundantur in mortar. marmor. & per cribrum pulvis trajiciatur : Cui affund. vini albi ℔ij. Pulver. Absynthii, Cumini, ana ℥j. Quatuor Farinar. resolventium ℥iij. Olei Chamæmeli ℥iij. Coquantur lento igne ad debitam spissitudinem, & fiat cataplasma resolvens.
24. Folior. & summitatum Absynth. majoris, radic. Cucumeris sylvest. ana q. s. Decoquantur in aq. partibus ij. & olei part. iij. Hydrolæo mediocriter calente pars dolens foveatur. Radices & Absynthium contusa in modum linimenti capiti apponantur, ad hemicraniam curandam.
25. Folior. Absynthii majoris, Abrotani, Tanacetii, summitatum Sabinae ana M. j. Radic. Aristoloch. rotund. ℥j. Helleborastri M. β. Pulver. Colocynthis. Aloes ana ℥j. Fiat decoctum in aquæ ℔ij. ad ℔ij. Coletur pro fetu abdominis regioni calide admovendo, ad verminosos affectus.
26. Olei essentialis Absynthii, gutt. viij. Aloes pulverat. ℥j. Fellis bov. q. s. Misce, fiat emplastrum quod super alutam ductum umbilico applicetur. Contra vermes.

In officinis servantur Oleum Absynthii per infusionem paratum ; Syrupus de Absynthio, tum simplex, tum compositus. Præterea Absynthium usurpatur in Pulvere contra rabiem Palmarii, Syrupo cachectico, & Syrupo lienterico, Charas, Confectione Hamech, Pilulis sine quibus, aggregativis, de Rhabbarbo, pro morbo colico, Charas, stomachicis *Ejusdem*, Unguento martiato, Unguento mundificativo de Apio, Emplastro de Meliloro, Balsamo tranquillante Franciscanor. Regior. & Aqua vulneraria.

Absynthium Tenuifolium seu minus seu Ponticum *Officinar.* Absynthium Ponticum, tenuifolium, incanum C. B. P. 128. *Inf.* R. H. 457. Absynthium Ponticum, vulgare, folio inferius albo. J. B. 3. 175. Absynthium tenuifolium *Dodonei Pemptad.* 24. vulgo, *Petite Absynthe*, *Absynthe*, *Pontique*.

Numerosas spargit radices parvas, crebris fibris intertextas, lignosas & sapore aromatico præditas : caules vero ex eadem radice plures erigit eubirales & sesquicubirales, teretes, glabros, virentes, aut ex virore rubescentes, purpurascensive, frequentibus adnatis ab initio ad summum usque ramolos, folia non minus tenuiter incisa quam Abrotani, sed brevioribus, concinnioribusque segmentis, brevi & incana lanugine pubescunt, potissimum inferna parte, odore suavi, sapore subamaro. Flores quales in latifolio Absynthio, sed minores & oblongi, vehementiorem spirant odorem quam folia. Colitur in hortis, ubi, repente sub terris radice, mirum in modum multiplicatur.

Analyti Chymica, Absynthii tenuifolii foliorum & summitatum nondum florum Thv. exhibuerunt phlegmatis limpidi, odorati & sapidi obscure subacidi ℔j. ℥x. ℥iij. gr. xxxvj. cum aliqua olei essentialis portione : humoris limpidi, adhuc odorati & sapidi, manifeste acidi & austeri, cum olei essen-

essentialis tantillulo, ℥xv. ℥j. gr. lxij. humoris rufescentis turbidi, (sale volatili urinoso imprægnati ℥ij. ℥vj. gr. xxxv). olei tum tenuioris & essentialis, tum adiposi ℥iij. ℥j. gr. xv. salis volatilis urinofi, concreti gr. xix. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥vij. ℥j. gr. xxx. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum leucophæorum ℥ij. ℥iij. gr. xv. ex quibus lixivio, salis fixi mere alcali ℥j. ℥v. gr. xvj. prodierunt. Partium jactura in distillatione fuit ℔j. ℥viij. ℥j. gr. xvij. In calcinatione ℥v. ℥v. gr. xv.

Hæc analysis in Absinthio tenuifolio, maximam partium tenuium, tum salinarum, tum sulphurearum copiam nobis commonstrat, tam ratione jacturæ in distillatione, quam ratione olei essentialis & salis volatilis: quod quidem plantæ odore & sapore vehementi confirmatur. Verum ejus oleum essentielle minus amarum est, quam in Absinthio latifolio.

Absinthio minori seu tenuifolio eadem tribuuntur virtutes, quæ in majori dignoscuntur. Minus tamen amarum est & magis aromaticum: unde palato quidem magis gratum, sed tamen idcirco minus efficax censemus. Ejus Conditum a Matthiolo ad aquam intercutim commendatur tanquam expertum remedium, si ejus Conditi ℥ß. quotidie assumatur tribus horis ante cibum: quod de hydropæ qui a nimia fibrarum flacciditate & laxitate pendet, aut a sanguinis vel seri crassitudine & tenacitate, intelligendum.

Eadem ex hoc Absinthio fieri possunt præparationes quæ ex majore fieri solent, sed in officinis minus usitatæ sunt.

A C A N T H U S.

Acanthus sive Branca ursina *Officinarum*. Acanthus sativus vel mollis Vergilii *C. B. P.* 383. *Inst. R. H.* 176. Carduus Acanthus sive Branca ursina *J. B.* 3. 75. Acanthus sativus *Dod. Tempt.* 719. Pœderota, Melamphillum, Marmoraria quorundam, vulgo *Acanthe* ou *Branche Ursine*.

Radibus est crassis, carnosis, hac illac diffusis, foris nigricantibus, intus candidis, & capillitis stipatis. Folia humifusa cubitum æquant, & quandoque superant longitudine, spithamam amplitudine, mollia, obscure virentia, glabra, nitida, sinuosa, & quodammodo crispa. Caulis ad duos cubitos erigitur rectus, firmus, longa serie donatus florum elegantier thyrsi modo dispositorum: singuli autem perfecti sunt, monopetali, anomali, carnei quodammodo coloris: antè trifariam dividuntur, & rictum imitantur, qui labio superiori caret, inferius vero amplum & convexum obtinet; posterius in annulum desinunt, staminibusque donantur labii superioris locum occupantibus, apicesque scoparum æmulus sustinentibus; calycibus foliosis coercentur, viridibus, per extremum laciniatis, nonnihil spinosis, & veluti nucamenta quædam oblonga referentibus; E calyce furgit pistillum posticæ floris parti seu annulo ad instar clavi infixum, quod abit in fructum glandiformem, calyce obvolutum, septo intermedio in loculamenta duo distinctum, in quibus singulis semen unicum continetur subrusum, compressum, duriusculum, duas tresve lineas latum.

Tota

Tota planta succo turget glutinoso & mucilaginoso. In Italia & Sicilia copiose nascitur. Hic in hortis colitur. Multiplicatur autem facile germinibus a matre avulsis, & pinguiori terræ commissis.

Distinguendum autem est inter Brancam ursinam Italorum, quæ est noster Acanthus, & Brancam ursinam Germanorum, quæ est Sphondylium vulgare.

Analysi chymica, ex folior. Acanthi recentium lbv. prodierunt phlegmatis limpidi, odoris & saporis expertis, sale salso aliquantisper & ostense imbuti, quod nempe salis Saturni solutionem turbidam efficit, ℥ix. ℥iij. gr. xxxvj. humoris obscure subacidi, deinde manifeste acidi, tum etiam aliquantisper alcalini, ℥iij. ℥iij. gr. xxiiij. humoris rufescentis empyreumatici, tum leviter acidi, tum alcali urinosi, & multo sale volatili imprægnati ℥i. ℥ij. olei tum fluidi, tum spissioris ℥vj. gr. xxxvj. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥iij. ℥j. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerem subalbidosum ℥i. ℥iij. gran. xij. ex quibus lixivio, fuerunt extracta salis fixi mere alcali ℥iij. gran. lx. Partium jactura in distillatione fuit ℥iij. ℥j. gran. xlvij. in calcinatione ℥i. ℥iij. gran. lx.

Ex hac analysi & lentore glutinosi hujus plantæ succi, concludere licet, eam consistere ex sale Ammoniacali copioso & mediocri olei portione, multo phlegmate dilutis.

Acanthus inter emollientes numeratur herbas quæ sunt Malva, Mercurialis, Parietaria, Beta, & Acanthus. Folia tantum usurpari solent, in clysteribus, fomentis & cataplasmatibus emollientibus, & paregoricis, seu dolorem sedantibus. Dolorem lenit & alvum emollit.

℥i. Folior. Acanth. Malv. Parietar. Mercurial. Betæ, Viol. Attripl. & Senecionis ana M. j. Coquantur in aq. commun. quant. sufficit. In colaturæ ℥ij. dissolve Mellis Nenuphar. ℥iij. Crytall. mineral. ℥j. Fiat enema emolliens.

℥i. Rad. Althææ, Nenuphar. & bulbor. Lilior. albor. ana ℥j. Folior. Acanthi, Malv. Parietar. ana M. j. Flor. Chamæmeli & Meliloti ana P. iij. Coq. in aq. q. s. deinde colentur. Liqueor servetur pro foru emolliente instituendo calide cum luteis quadruplicatis, vel pannis laneis molliuscule dicto liquore imbutis, leviter expressis & mutatis quoties refrigerint.

℥i. Rad. Alth. mundatar. & minutim incisar. ℥iij. Coquantur in aq. comm. quant. suffic. donec insigniter mollescant. Deinde adde folior. Branc. ursin. Malvæ, Parietar. Violar. & Mercurial. ana M. j. Caricar. pingui. n. xij. Coquantur omnia ad putrilaginem usque. Contundantur in mortar. marmor. & per cribrum setac. trajiciantur. Pulpa secreta cum sarinæ Lini & Fenugræci ana ℥ij. Olei Lilior. ℥iij. Coquantur lento igne sæpius agitando ad debitam spissitudinem. Et fiat cataplasma emolliens.

Dodonæus refert Acanthi radices prodesse tabidis sanguinem spuentibus, tum ex alto delapsis, ab ictu aut conatu aliquo supra vires læsis, non minus quam Symplicii majoris radices, quas substantia, lento succo, & qualitatibus proxime referunt. Rarissime tamen in usum medicum veniunt, quoniam Symplicii radices anteponuntur.

• Acaa-

Acanthi folia Veteres ob figuræ venustatem, & elegantiam epistyllis, seu columnarum capitulis insculpere solebant. Vestibus etiam pretiosis figuram *Acanthi* foliorum circumtexebant; unde *Virgilius*:

Et circumtextum croceo velamen Acantho.

ACETOSA seu OXALIS.

Ex pluribus *Acetosæ* speciebus duæ potissimum in usum Medicum, & culinarium veniunt, scilicet *Acetosa vulgaris* vel *pratensis* folio longo, & *Acetosa rotundifolia*.

Acetosa vulgaris, *Acetosa pratensis*, *Oxalis pratensis* *Officinarum*. *Acetosa pratensis*, C. B. P. 114. *Inst. R. H.* 502. *Oxalis vulgaris* folio longo J. B. 2. 989. *Oxalis*, *Dod. Pempt.* 648. *Oseille longue* ou *Vinette*.

Radice est fibrosa, longa, sublutea, amara, & stupida: foliis alternis palmam superantibus acutis, qua pediculo adhærent falcatis, & auritis, atrovirentibus, acidis, & succulentis. Caulis striatus, cubitalis, & ramulosus flores sustinet apetalos, plurimis scilicet constanter staminibus cum apicibus luteis surgentibus ex calice hexaphyllo. *Joannes Ray* observat in hac plantæ specie, nonnullas flores steriles seu incompletos dumtaxat proferre, alias completos. Floribus sterilibus nullum succedit semen: floribus completis seu perfectis pistillum abit in semen triquetrum, spadicum ac nitidum, obvolutum capsula foliacea triangulari, quæ conficitur ex tribus calycis foliis, cæteris tribus marcescentibus. Occurrit vulgo in pratis, & sylvis agri *Parsienfis*, & in hortis, colitur ad usum culinarium.

In usum Medicum veniunt folia, radix, semen, quæ seorsim consideranda sunt. *Analysi chymica*, recentium, & succulentorum *Acetosæ pratensis* foliorum ℥v. per balneum vaporum distillata, præbuerunt humoris limpidi, herbam virentem sapore, & odore referentis, acidi primum obscuri, deinde manifesti, ac tandem intensi ℔ij. ℥j. ℥v. deinde massa exsiccata, per retortam distillata sudat humoris rufescentis empyreumatici, tum acidi, tum alcali urinosi ℥ij. ℥vij. gr. xiiij. cum salis volatilis urinosis granis aliquot: olei spissioris, & adiposæ consistentiæ ℥j. ℥j. gr. lvij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥ij. ℥vj. gr. xxxvj. quæ per decem horas calcinata reliquit cinerum albicantium ℥j. ℥ij. ex quibus lixivio, salis mere alcali fixi ℥ij. gr. xxiiij. extracta fuerunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥vj. ℥ij. gr. xxxvj. in calcinatione ℥ij. ℥ij. gr. xxxvj.

Præterea succus *Acetosæ* saporis est acidi manifesti, & chartam subcæruleam, purpuream efficit. Sal essentialis *Acetosæ* in carbones injectus eodem tere modo ac Nitrum fulminando deflagrat. Si vero cum sale Tartari permisceatur, odorem urinolum exhalar, haud dissimili ratione ac sal Ammoniacus. Adeo ut *Acetosa* videatur constare sale essentiali Ammoniacali, simili salis qui exturgeret ex acido Nitri spiritu, & sale urinoso, olei portione mediocri, & pauca terra, multo phlegmate dilutis.

Ex

Ex recentium Acetosæ pratensis radicum ℥v. balneo vaporoso distillatis; prodierunt phlegmatis limpidi, saporis herbidi subacidi ℥iij. ℥j. jam exsiccatæ radices per retortam distillatæ, præbuerunt humoris empyreumatici rufescentis, tum acidi, tum alcali urinosi ℥vij. ℥ij. gr. liiij. olei (pissioris consistentiæ ℥iij. ℥ij. gr. xvij. Massa nigra in retorta superstes pendeat ℥xij. ℥ij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum ℥iij. ℥j. gr. xlvij. ex quibus salis fixi subfalsi ℥ij. gr. vj. fuerunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥viii. ℥j. in calcinatione ℥ix. gr. xxvij.

Succus radicum cœruleam chartam, purpuream efficit: sed color ille purpureus paulo post evanescit, maculam fulcam relinquendo ob magnam copiam olei conjuncti, quod paulatim super partes ab acido evolutas diffunditur.

Radices majorem olei, & terræ quantitatem continent quam folia; triplum fere: quibus sal essentialis Ammoniacalis, Nitrosus, qualis in foliis deprehenditur, involvitur. Hinc sapor stipticus, & amarus radicis; hinc etiam vis aperiendi aut obstructions viscerum referendi quæ donantur. Contra in foliis in quibus acidum magis explicitum est, & evolutum, vis refrigerandi seu sanguinis, & bilis motum fermentatitium compescendi deprehenditur.

Ex seminum Acetosæ recentium ℥v. prodierunt humoris fere inodori; & insipidi, qui tamen salis alcali notas præbuit ℥vij. ℥vj. humoris nonnihil turbidi, manifeste acidi, & aliquantisper urinosi ℥v. ℥v. humoris rufescentis empyreumatici, tum acidi, tum urinosi, & sale volatili imprægnati ℥vj. ℥vj. gr. xlvij. olei ℥ix. ℥j. Massa nigra in retorta superstes pendeat ℥j. ℥vj. ℥vij. gr. xxxvj. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum leucophæorum ℥iij. ℥vij. gran. lx. ex quibus lixivio, extracta fuerunt salis falsi foliati, & quasi talcosi, ℥j. gr. xvj. Jactura partium in distillatione fuit ℥j. ℥j. ℥v. gran. lx. in calcinatione ℥j. ℥ij. ℥vij. gr. xlvij.

Semina Acetosæ pratensis multo plus salis volatilis, tum acidi, tum urinosi continent, quam folia vel radices. Hæc autem principia non solum in aqueis liquoribus continentur, sed etiam partim avolant in distillatione, (jactura enim partium in seminum analysi longe major est,) partim cum oleosis partibus concresecunt, & irretiunt in capite mortuo vel carbone, cujus massa carbonariam foliorum, & radicem massam longe superat. Olei quantitas non solum triplo major est olei quantitate in radicibus reperta, sed eam multo magis superat: quandoquidem major pars massæ nigre in retorta residuæ ex oleo producitur, ut ex hujus massæ deflagratione satis liquet. Hinc seminis virtus a foliis, & radicibus prorsus diversa est. Constat nempe ex oleo copioso cum salis Ammoniacalis portione non mediocri, a qua cardiaca ejus virtus pendet. Ab oleosis quoque partibus semen obtinet vim humores acres demulcendi, tenuiores inspissandi, æstuantes compescendi, partium fibras molliendi, & flexiliores efficiendi.

Acetosa, & Oxalis rotundifolia seu hortensis *Officinar.* Acetosa rotundifolia hortensis C. B. P. 144. *Inf.* R. H. 503. Oxalis folio rotundiore repens J. B. 2. 990. Acetosa rotundifolia. *Dod. Tempt.* 649. *Oseille ronde:*

Ex radice tenui, repente, saporis adstringentis, caules cubito longiores emit-
tit,

tit, tenues, repentes: foliis vero subinde ludit modo rotundis fere, modo alarum appendicibus donatis, alias sagittæ instar mucronatis, pinnatifide, colore glauco aut pallido, pinguiculis, delicato acore præditis. Flores & semina Acerosæ vulgaris non dissimilia sunt. In hortis ad culinarium usum feritur.

Analyti Chimica, ex Acerosæ rotundifoliæ floridæ 3lv. prodierunt humoris limpidi herbam viridem odore & sapore referentis, tum acidi, tum aliquantisper salis aut urinosi, 3lj. 3vij. 3v. gr. iij. humoris limpidi, intense acidi, austeri, tum etiam urinosi, 3lj. 3xiiij. 3iiij. gr. xxxvj. humoris rufescentis empyreumatici acidi, austeri & sale volatili urinoso imprægnati, 3ij. 3j. gran. xxiiij. olei spissioris & adiposæ consistentiæ, 3j. 3j. gran. lx. Massa nigra in retorta residua pendebat 3ij. 3v. gran. xxiiij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerem, 3vij gran. liij. ex quibus salis fixi mere alcali 3lij. gr. xij. lixivio fuerunt extracta. Partium iactura in distillatione fuit, 3ij. 3v. gr. lvj. in calcinatione, 3ij. 3v. gr. xlij.

Acerosa rotundifolia paulo plus phlegmatis continebat, quam prætensis, minus terræ, plus salis fixi. Cæterum, sicut Acerosa prætensis, sale Ammoniacali nitroso & oleo phlegmate multo dilutis componitur.

Uriusque Acerosæ folia gratissimum embamma seu intinctum nec spernendum præbent: gratiores enim escas reddunt, & cibi appetentiam augent acidulo suo sapore.

Intus sumpta refrigerant, id est, motum sanguinis fermentativum & intestinum, fluiditatemque minuunt, expansionem coercent, sicque caloris sensum præsertim in visceribus temperant, æstuantem cholera reprimunt, tenuiorem inspissant, acriorem emendant, sitim sedant, appetitum excitant, & putredini resistunt: Unde in biliosis febribus, tum simplicibus, tum pestilentibus, vltatissima sunt & utilissima. In iusculis & apozematibus temperatis alterantibus & aperientibus incoquantur. Succus expressus & defœcatus solus vel sorbitionibus immixtus propinatur: & ex eo cum Saccharo cocto syrupus conficitur. Conditum quoque ex foliis præparatur, & aqua distillatur, quæ quidem succo vel decocto multo languidior est, minorumque virium. In febribus intermittentibus biliosis, tertiana & duplici tertiana, succus Acerosæ felici cum successu exhibetur, præsertim verno tempore, ad 3vj. vel 3viij. ineunte paroxysmo, præmissis præmittendis. Iteratur donec æger sanatus fuerit. Cavendum tamen ne pulmo quamdam patiatur læsionem; tunc enim ab hoc remedio abstinendum foret; ne ab acido prava hujus visceris dispositio augeatur. Medicina in scorbutu specifica existimatur. Clarissim. vir, & in praxi medica exercitissimus Doctor Morinus, dum viveret Nosocomii Parisiensis Medicus ordinarius, scorbuticos quamplurimos sanavit, eorum alimenta foliis Acerosæ coctis immiscendo. Thomas Bartholinus *Actis Hafniensibus* 1671. *Observat.* 9. refert: „Groenlandos populos scorbutu misere vexari, sanari vero miscendo Cochleariam & Acerosam simul in iusculis suis avenaceis vel hordeaceis. Has duas plantas copiose simul crescere in hac regione, quasi seorsim sumi non

Geoffroy Tom. II.

B

debe-

„ debeant , ne separatim noceant , quippe una sale volatili oleoso , al-
 „ tera acido turgescit , ex quarum mixtura media qualitas exsurgit :
 „ modum autem eas assumendi hunc esse usitatum , ut carnem recen-
 „ tem cum avenacea vel hordeacea pitana excoquant , ejusque deco-
 „ ctum his herbis scorbuticis condiant , & hujus alimenti medicamen-
 „ tosi usu ita laxari alvum , ac si medicamentum catharticum hauss-
 „ sent . “ Hæc scorbutum curandi methodus a Thoma Sydenham proba-
 „ tur , qui Cochleariæ , cæterarumque plantarum scorbuticarum acrimia suc-
 „ cos , nonnisi Aurantiorum vel Citriorum Malorum succo temperatos
 prescribit .

Radix non acida est , sed amara & adstringens . Obstructiones aperit ,
 urinas ciet , quapropter in decoctis aperientibus usurpatur . Siccata & de-
 cocta rubello colore eleganti aquas tingit .

Semen inter cardiaca medicamenta numeratur : præterea vis adstringen-
 di in alvi profluviiis , & in dysenteria ipsi tribuitur : quæ quidem virtus
 adstrictoria , non tam ab ejus stypticitate pendet , quam ab oleosis ejus
 partibus , quæ humorum acrimoniam demulcent .

24. Rad. Cichor. Bugloss. folior. Cichor. Bugloss. Borraginis . Lactuc.
 Portulac. & Acetosæ. rotund. ana M. ℥. Hordei integr. P. j. Fiat de-
 coctum cum pullo Gallinaceo aut frustulo colli carnis vitulinæ . Fiat
 jusculum refrigerans , mane sumendum .

24. Seri lactis optime depurati ℔j. in quo leviter incoque folior. Aceto-
 sæ M. j. ℥. Fiat colatura , cui adde Syrup. Violat. ℥ij. Dividatur in
 duas doses mane , jejuno ventriculo , sumendas .

24. Hordei integr. pugill. ij. Rad. Acetosæ & Gramin. ana ℥j. Coquan-
 tur in aq. fluviatil. ℔iij. ad ℔iij. Decoctum servetur pro potu diure-
 tico & aperiente .

24. Folior. & rad. Cichor. sylv. Taraxac. Fragar. Borrag. & Bugloss.
 ana M. j. Rad. Acetosæ , Gramin. ana ℥ij. Folior. Agrimon. M. j.
 Coquantur , ut artis est , in aq. comm. ℔ix. in vase terreo vel fer-
 reo . Fiat Apozema , vulgo , *Bouillon rouge* .

24. Amygdalarum dulc. excorticatarum ℥ss. Semin. Acetosæ. Melon. &
 Card. bened. ana ℥ij. Contund. in mortar. marmor. sensim affund.
 aquar. Scabiosæ. Ulmar. & Scorfonner. ana ℥iij. Fiat emulsio , pro
 duabus dosibus , cuique adde Syrup. flaved. Citri, vel Syrup. Caryo-
 phyllor. hortens. ℥ss. Capiat vesperti & mane in febribus malignis &
 variolis , in quibus caloris æstus temperandus , acrimonia humorum
 demulcenda , & diaphoresis juvanda .

Acetosæ folia contusa aut cocta & externe admoda potenter resolvunt ;
 maturant & suppurationem promovent , tenuibus nempe & volatilibus
 suis particulis , tum acidis , tum urinosiis , quæ in tumorem penetrant ,
 humorem commovent & attenuant . Si vero humor ille hujus sit in-
 dolis , ut totus facile attenuari possit , resolvitur & per cutis poros
 dissipatur , aut vasa debita remeat . Si vero crassior sit quam ut resolvi
 possit , assiduo motu agitata ejus moleculæ fermentescunt , rarefunt ,
 & in pus converteuntur : tumor humoris rarefcentia attollitur , ac tandem
 rumpitur .

Riverius observationem proponit de ganglio in genu resoluta , sine sup-
 pura-

puratione, cataplasmate præparato ex foliis Acetosæ sub cinere coctis, & cineribus permixtis, supra tumorem admo-
 24. Folior. Acetosæ q. l. foliis Brassicæ vel charta madida involutor.

Sub cineribus coquantur; cocta cum fermento misceantur, & fiat cataplasma tumori applicandum ad suppurationem promovendam.

24. Oxalid. folia. Coque cum Axungia veteri, & fiat cataplasma, quod phlegmonem brevi ad suppurationem perducit.

24. Oxalid. & Arnogloss. p. æq. Coq. in Oxyemelte, Contund. postea & trajiciantur, addendo cuique libræ Theriac. veter.

38. Fiat cataplasma in carbunculo & malignis inflammationis pustulis.

Acetosæ Conditum usurpatur in Opiata Salomonis.

Semen in Confectione de Hyacinthis, & Pulvere Diamargariti frigidi, Charas, Syrupo Elleborato Quercetani, Diacordio Fracastoris.

ADIANTUM.

Adianti species septem in officinis distinguuntur; scilicet; 1. Adiantum verum seu Capillus Veneris. 2. Adiantum Americanum. 3. Adiantum nigrum. 4. Adiantum album Filicis folio. 5. Adiantum album foliis Rutæ. 6. Adiantum rubrum. 7. Adiantum aureum. Quæ quidem herbæ Capillares quoque nunc dicuntur, licet sub titulo Capillarium in antiquis Pharmacopœis, quatuor tantum ex his comprehendantur, scilicet, Adiantum verum, Adiantum nigrum, Adiantum album folio Rutæ, Adiantum rubrum, quibus quinta adscribitur planta, Ceterac dicta. De Ceterac suo loco: nunc de Adianti speciebus.

Adiantum verum. Capillus Veneris verus. Capillus Veneris Montpelien-
 liensis, Officinarum. Adiantum foliis Coriandri, C. B. P. 355. Infr. R. H. 543. Adiantum sive Capillus Veneris J. B. 3. 751. vulgo, Capillaire de Montpellier.

E radice tenui, transverse imposita, carnosa & fibrosa, oriuntur pediculi palmam superantes, exiles, nigri, nitidi, splendentes, ramosi, folia sustinentes alterna, quatuor aut quinque lineas lata, nonnihil breviora, viridia, cristata, radiatim quasi striata, glabra, profundis quibusdam incisuris Coriandri foliorum inferiorum ritu ferme dissecta, tactu mollia, aliquantisper odorata, & sapore nonnihil adstringente, subamaricante, non ingrato. Floribus carere videtur: sed mense Septembri crenulæ producantur & duplicantur, sibi invicem adhærentes. His in sinubus seu foliorum complicationibus fructus continentur, seu capsulæ membranaceæ sphæricæ admodum exiles, annulo vi elastica donato munitæ, accurate a Cl. Tournefortio observatæ, & in Elementis Botaniciis descriptæ. Annuli contractione capsulæ

aperiuntur, & in his semina minutissima pulvisculi instar contineri microscopii ope deprehenduntur. Nonnulli tamen floribus nomine eas prominentias insignire volunt, dum adhuc virides sunt, & antequam pulvisculum seminale fundant. Alii quoque contendunt capsulas illas non fructus esse, sed flores seu apices floridos, illumque pulverem inibi contentum non semen esse, sed pulvisculum floridum, qualis in florum apicibus contineri solet. Res tempore dilucidabitur. Prior tamen sententia nobis magis verisimilis videtur. Nascitur in puteorum marginibus & rupibus aspergine madentibus Galliæ Narbonensis. Quavis anni tempestate etiam hyeme virescit. Vulgus Narbonense pro certo salubritatis aquarum signo habet Adianti circa puteos & fontes proventum.

Olim omnes herbæ Capillares in Officinis nostris usitatissimæ erant, nunc autem hic rarissime reperiuntur. Aliud Adianti genus ex America affertur, quod ob odoris fragrantiam & saporis gratiam huic anteponitur.

Adiantum Americanum, Adiantum Canadense, Officinarum: Adiantum Americanum *Cornuti 7. Inst. R. H. 543.* Adiantum fruticosum Brasilianum *C. B. P. 355. Prodrom. 15.* vulgo, *Capillaire de Canada.*

Ex Radice pusilla, capillamentis nigris fibrata, cauliculi ad spithamam & nonnunquam ad usum, alterumve cubitum assurgunt, atropurpurei, nitentes, ramosi, & latissime in orbem expansi: quibus utrinque adherent duodecim & nonnunquam viginti folia Adianto vero proxima, parva, oblonga sed obtusa, incisuris superne tantum divisa, inferne integra & costâ qua petiolo insident obducta, odore grato, præsertim dum aqua calida madent, sapore parum acerbo, non injucundo. Flores nulli conspicui sunt. Fructus more Adianti veri adversa folii parte profert. In Brasilia, Virginia, Canada, & aliis Americæ provinciis frequentius nascitur.

Adiantum nigrum, Officinarum: Filicula quæ Adiantum nigrum Officinarum, pinnulis obtrusioribus *Inst. R. H. 542.* Adiantum foliis longioribus pulverulentis, pediculo nigro, *C. B. P. 355.* Adiantum nigrum *J. B. 3, 743.* *Dryopteris nigra Dod. Pempt. 466.* vulgo, *Capillaire commun.*

Radix est transversa & fibris capillaribus nigris minuta saporis acerbissimi cum quadam dulcedine; ex qua pediculi prodeunt spithamei, fissi, nigri, nitidi, ramosi, cum foliis ad Filicem marem accedentibus, sed longe brevioribus, in segmenta crenata, mucronata & oblonga divisa. Floribus caret. Lineolis vero pulverulentis aversa foliorum parte de Filicum more distinguitur, quæ fructus continent seu capsulas rotundas, pulvere seminali aureo turgidas. In opacis ad radices arborum & fruticum & in aggeribus umbrosis, antiquisque muris passim in agro Parisiensi nascitur. Supradictis Capillaribus deficientibus in earum locum sequens nonnunquam substituitur.

Adiantum album Filicis folio, Officinarum: Filicula fontana major, sive Adiantum album folio Filicis *C. B. P. 358. Inst. R. H. 542.* Adiantum album Filicis folio, *J. C. 3. 711.* *Dryopteris candida, Dod. Pempt. 465.* vulgo, *Capillaire blanc.*

Radice est transversa, satis crassa, coloris herbacei, fibris nigricantibus onusta, saporis subdulcis cum majore adstrictione; pediculis spithameis tenuibus, fra-

fragilibus, virescentibus, nigricantibusve inferna parte: ramulis modo binis oppositis, modo alternatim adnatis ad duodecim aut quatuordecim paria, extremo scapo in folium abeunte, longissimis, duas tresve uncias æquantibus foliis alternatim adnatis, oblongis, altius incisfis, adeo ut e pluribus composita videantur; mollibus, teneris, facile marcescentibus, averfa parte punctis primo virentibus, tandem ferrugineis, quæ capsulas seminales continent, aspersi; sapore citra evidentem adstringentem dulci, & pene saturo, cum viscido lentore. Nascitur in locis umbrosis, muris antiquis, rivulorum, & fontium marginibus.

Adiantum album foliis Rutæ, Ruta muraria, Salvia vitæ Officinar. Ruta muraria C. B. P. 356. Inst. R. H. 541. J. B. 3. 753. Dod. Pempt. 470. Adiantum album. Tab. Icon. 796. Salvia vitæ, Adversar. Lobel Icon. 811. Paronichia. Matthioli: Saxifraga seu Empetrum, Fuchsi: Filicula petrea Rutæ facie, Moriss. Oxon.

Radice est capillacea, tenui, nigricante, & subadstringente, e qua erumpunt petioli multi, duas vel tres uncias longi tenues, juxta radicem nigricantes aut atrorubentes, reliqua parte virentes, nonnihil in summo divaricati, folia sustinentes Rutæ hortenensis similia, sed longe tenuiora, duas, tresve lineas longa, paulo angustiora, angulosa & in ambitu crenata, gustu acerba subadstringentia, cum aliqua dulcedine, superne virentia, averfa parte rufescente; aspersa pulvisculo, qui nihil aliud est quam acervulus capsularum sphaericarum Adianti similium. Nascitur in rupibus & parietibus agri Parisiensis.

Adiantum rubrum, Trichomanes, Polytrichum Officinarum: Trichomanes sive Polytrichum Officinarum, C. B. P. 356. Inst. R. H. 539. J. B. 3. 754. Trichomanes Dod. Pempt. 471. Adiantum rubrum Loniceri: vulgo, Polstric.

E Radice capillacea, fibrosa, & nigricante pediculos promit semipalmates aut palmates, atrorubentes, nitidos, teretes, rigidiusculos, fragiles in quibus per conjugationes utrinque vel alternatim oriuntur folia subrotunda, obtusa, viridia, glabra, in quorum averfa parte sacculi eminent squammosi, pleni plurium capsularum membranacearum, globosarum serme, annulo elastica vi donato munitarum, sicut in Capilli Veneris fructibus, quæ annuli contractione rumpuntur seminaque pulverulenta emittunt tenuissima, & fusca. In umbrosis aggeribus, antiquis muris, humentibusque saxorum fissuris agri Parisiensis provenit.

Supra recensitarum Adianti specierum principia non adeo dissimilia sunt: quapropter duarum tantum specierum analysim exponemus, ex quibus de cæteris judicare licebit.

Analysim chymica, ex Adianti nigri foliorum lbv. prodierunt phlogmatis limpidi fere inodori & insipidi, obscuri acidi ℥x. ℥v. gr. xviii. humoris rufescentis, nonnihil empyreumatici, primo subacidi, deinde intense acidi ℥iiij. ℥ij. gr. i. humoris rufi sale volatili urinoso imprægnati ℥iiij. ℥iiij. gr. xlvij. olei pissioris, & adiposæ consistentiæ ℥ij. ℥ij. gr. lxxv. Massa residua in retorta superstes pendebat ℥ix. ℥iiij. gran. xvij. Quæ igne reverberii calcinata reliquæ cinerum ℥ij. ℥ij. gran. x. ex quibus salis fixi mere alcali ℥vij. gr. xxxviii.

Geoffroy Tom. II.

B 3

extra.

extracta fuerunt. Jactura partium in distillatione fuit ℥iij. ℥vj. gran. xv. in calcinatione ℥vij. ℥ij. gran. viij.

Ex Polytrichi folior. ℔v. prodierunt phlegmatis limpidi, insipidi & inodori ℔j. ℥vj. gr. xlij. humoris primo acidi, deinde austeri, limpidi, postea rufescentis aliquantisper empyreumatici & intense acidi ℔ij. ℥viij. gr. xij. humoris rufi empyreumatici tum acidi, tum urinosi & sale volatili imprægnati ℥iij. ℥ij gran. xl. olei spissioris ℥ij. ℥vj. gran. xxxvj. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥vj. ℥vij. gr. lx. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥j. gr. xxxvj. ex quibus salis fixi mere alcali ℥ij. gr. lvj. extracta fuerunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ix. ℥vij. gran. xlvij. in calcinatione ℥v. ℥vj. gran. xxiiij.

Itaque his in plantis multum acidi continetur, sed non mediocri terræ portione implicatum, unde sal exsurgit salus, sali coralliorum haud dissimilis. Insuper inest aliquantulum salis ammoniacalis: ambo oleo copioso involvuntur, & multa aqua diluuntur. Unde compositum exsurgit mucaginosum, salino-terreum & ammoniacale. Sapor eorum subadstringens a sale terreo; subdulcis autem a sulphure quo sales involvuntur. Ab iisdem principiis virtutes pendunt quæ illis plantis tribuuntur, scilicet; humores acres blando suo sulphure demulcendi, sale ammoniacali crassiore incidendi, tenaces resolvendi, sale autem stiptico partes firmandi, roborandi, ac proinde viscerum obstructions referandi.

Plantæ Capillares stomachi cruditates leniunt, singultus ac diarrhæas inde pendentes curant, pituitam viscidam in pectore stagnantem ad expectorationem præparant: tussi contumaci, asthma, difficili respirationi, peripneumoniz ac pleuritidi medentur. In visceribus humores inspissatos inhærentes & obstructions procreantes, abstergunt: icterum sanant, hepatis & mesenterii glandulas obstructas referant: precipue leni amicæ & hujus visceris ægrotantis quasi specifica medicina creduntur. In mensibus non bene fluentibus & in affectionibus renum suas habent laudes. Uno verbo blanda qua donantur adstrictione partium fibras roborando, functiones vegetiores fiunt, humorum circuitus acceleratur, commolitio eorumdem succorum ac fluiditas augetur, excretiones promoventur.

Earum infusum vel decoctum propinatur. Vel seorsim vel promiscue usurpantur. Singularium Capillarium manipulus unus sumitur & levi ebullitione coquitur in libris quatuor aquæ, cum Liquiritizæ frustulo.

Adiantum Monspelienſe a Petro Formio Doctore Medico Monspelienſi in *Libello de Adianto*, quem Gallice conscriptum prælo commisit, anno 1644 tanquam Panacæa & medicamentum universale ad omnium fere corporis partium sanitatem tuendam & morbos debellandos, vel solum sufficiens commendatur. Sed encomiastarum more, in ejus laudes nimis effertur. Ejus virtutes longe remissiores & debiliores esse usus & experientia demonstraverunt.

Inter varias formulas medicamentorum ex eo parandorum, ptisanam, seu Adianti infusum miris laudibus extollit, quo se complures parvulos & infantes exsiccatos & fere consumptos febre lenta ab obstruc-

cio-

tionibus mesenterii orta, pristinae sanitati restituisse affirmat. Sic parari jubet.

℥. Summiratum aut foliorum Adianti adhuc virentium & recens collectorum tres circiter manipulos; infundantur supra cineres calidos per spatium unius noctis, in duabus tribusve sextariis aquae fontanae optimae: tandemque, si placet, leviter ebulliant. Colatura vasi vitreo immixta pro potu ordinario inserviet vel sola, vel cum tantillo vini.

Ex Adiano Americano infusum in Thae modum paratur, palato gratum, in tussi & pectoris affectionibus, cum tantillo sacchari.

Ruta muraria viribus cum Adiano vero convenit. In tussi, asthma, pleuritide, lthero, obstructionibusque lienis prodest. Quin & ad renum vesicaeque dolores valet, urinam & arenulas expellit. Matthioli praeferre eam perhibet ad enterocelos puerorum, continuis quadraginta diebus pulvere exhibito. In scorbuto & cachexia optima est. Ettmullerus refert, Belgicos milites quosdam extreme scorbuto laborantes ex assumpta impura aqua, nullo alio medicamento curari potuisse, quam adhibito hujus plantae decocto.

Polytricho eadem tribuuntur facultates. Tragus asserit illud vel solum, vel cum Ruta muraria, vino aut hydromelire decoctum, & per aliquot dies ex ordine potum, obstructiones jecinoris solvere, morbum regium expellere, pulmonis vitia purgare, spirandi difficultati prodesse, duros lienis tumores emollire, urinam ciere, arenulas expellere, & mulierum menses suppressos promovere.

Omnes Adianti species usurpantur in jusculis, decoctis, & apozematibus aperientibus.

℥. Capilli Vener. Adianti nigri, Polytrici, Rutae murariae & Ceter. ana M. j. Flor. Tussilaginis, pugill. ij. Rad. Althaeae ℥j. Coq. cum aq. limp. ℔ij. ad ℔ij. fiat apozema expectorans.

℥. Herbar. quinq. Capill. ana M. j. Cum frustulo carnis vitulinae, fiat jusculum aperiens.

Plantae Capillares sterilitatem inducere a quibusdam immerito accusantur. Ipsi vis cathartica ab Arabibus tribuitur, sed & acerbis nostrarum plantarum sapor, & experientia contrarium demonstrant.

Extrinssecus admotae quaedam capillorum defluxia curare, cutis nempe poros constringendo, achoras, strumas, & abscessus sanare dicuntur, incidendo, resolvendo, abstergendo, & constringendo.

Ex Adiano Monspelienfi vel Americano praeparatur Syrupus Capillorum Veneris simplex. Idem quoque Syrupus ex Canada asseritur, cum saccharo Acerino confectus, ut jam diximus.

Quinque Capillares usurpantur in Syrupo Capillor. Veneris composito Renodei.

Capillus Veneris usurpatur in Syrupo de Althaea, Jujubino, de Tussilagine composito seu antiasthmatico Charas; de Cichor. composito, antinephritico, Chalybeato aperiente Cathartico ejusdem, & Elethuar. lenitivo.

Adiantum vulgare in Syrupo de Althaea & de Cichor. comp.

Polytrichum in Syrupo de Cichor. comp.

B 4

Adia-



Adiantum aureum, *Polytrichum aureum*, *Officinarum*: *Muscus capitilaceus major*, *pediculo*, & *capitulo crassioribus* *Inst. R. H.* 550. *Polytrichum aureum majus*, *C. B. P.* 356. *Polytrichum Apulei majus quibuldam*, *J. B.* 3. 760. *Adiantum aureum Tabern. Icon.* 797. vulgo, *Perce-mouffe*.

Radice est tenui, longa, fibrata, ex qua cauliculi assurgunt quatuor vel sex uncias longi, ab imo ad medium usque, foliis tenuibus angustioribus, longiusculis, & flavescensibus onusti; a medio ad summum nudi, & læves, quorum summitati innascitur capitulum oblongum, hians, & nutabundum, quod pulvisculum continet, more plurimarum musci specierum, qui a plurimis Botanicis pro semine habetur. In agri Parisiensis sylvis nascitur.

Hæc planta apud nos rarissimi est usus. Apud Germanos, observantē S. Pauli, inter quinque Capillares herbas Officinales sub *Polytrichi* nomine numeratur, cum *Adianto* vero, *Ruta muraria*, *Trichomane*, & *Ceterac*, cum aliis Capillaribus interdum permiscetur aut iisdem substituitur pro tollendo pertinaci muco pulmonibus aut cæteris visceribus impaeto. Cl. Tournefortius in agri Parisiensis plantarum historia eam ut diaphoreticam, & adversus pleuritidem præstantissimam commendat. Ejus decoctum vel aqua spirituoſa distillata usurpatur.

℞. *Adianti aurei*, M. j. Coquatur in aq. comm. ℥j. Exhibeatur per cyathos, tertia quaque hora propinandos in asthma, pleuritide, & pectoris affectionibus.

Sic autem spiritus præparatur. Planta contusa, & aqua limpida irrorata per tres dies maceratur in vase clauso, donec incalescat: macerata distillatur. Aqua distillata novæ plantæ contusæ affunditur, iterum maceratur, & distillatur, quod quinquies iteratur: tandem post sex distillationes spiritus obtinetur subtilis, & sudorificus, qui ad ℥ij. vel ℥iij. propinatur in pleuritide, ad sudorem proliciendum.

AGERATUM.

Ageratum *Officinarum* & *Eupatorium Mesuæ*, *quorundam*: *Parmica lutea suaveolens*, *Inst. R. H.* 497. *Ageratum foliis serratis*, *C. B. P.* 224. *Ageratum plerisque*, herba *Julia* quibusdam, *J. B.* 3. 142. *Balsamita minor*, *Dodonæi* 295. *Eupatorium Mesuæ*, *Tragi* 515. *Menta corymbifera minor*, *Cordi*: *Ageratum* sive *Costus hortorum minor*, *Parkins.*

Ex radice lignosa, minimi digiti crassitudine, varie implexa, & fibrosa, plurima exsurgunt virgulta, cubitalia, & altiora, tenuia, rotunda, ramosa, colore alias rubente, alias ex viridi pallescente, foliis numerosissimis, unciam unam aut alteram longis, angustis, profunde serratis & odoratis, ab imo ad summum stipata. In summis ramulis-corymbi emicant compositi ex floribus radiatis, quorum discus ex plurimis flosculis luteis, corona vero ex semiflosculis ejusdem coloris componitur, embryonibus insidentibus, & calice squammoso comprehensis: embryones autem

autem deinde abeunt in semina exigua, oblonga & pallide lutea. In Gallia Narbonensi circa Monspelium & alibi nascitur. Hic colitur in hortis. Plantae cum foliis & floribus, necnon semina in usum medicum veniunt.

Analysi chymica, Agerati folior. & summitatum floridarum ℥v. præbuerunt phlegmatis limpidi odorati obscure acidi ℔j. ℥viij. gr. xlv. cum olei essentialis alquantulo; humoris intense acidi, austeri & sub sinem obscure alcali urinosi ℔ij. ℥v. ℥iij. gr. lvij. humoris rufescentis empyreumatici, tum acidi intensi, tum alcali urinosi & sale volatili imprægnati ℥ij. ℥vij. gr. lv. olei empyreumatici adiposæ crassitudinis ℥iij. ℥vj. gr. xxij. Massa nigra in retorta superstes pendeat ℥vj. ℥j. gr. xlij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥j. gr. xxj. ex quibus lixivio, salis fixi mere alcali ℥vij. gr. xvij. extracta sunt. Partium deperditio in distillatione fuit ℥v. gr. lxvij. in calcinatione ℥iij. gr. xxj. Per hanc analysim patet Ageratum constare ex sale ammoniacali & oleo, tum tenui, tum crasso conjunctis. Saporis est aromatici, amari, cum quadam adstrictione. Adstrictionis moderatæ ratione, ventriculorum, hepar, & viscera aliquantisper firmat & roborat: ratione tenuium partium, humores attenuat, resolvit, abstergit, atque putredini resistit.

A Schrodero, Hofmanno, & Simone Paulli inter herbas hepaticas recensetur. Illud Etmullerus ad emendandam sanguinis crasim vitiatam in morbis chronicis a viscerum obstructionibus oriundam, utilissimum prædicat. Ex eo infusa vel decocta parantur, necnon etiam epithemata & foras ad viscerum induratum tumores resolvendos. Ad intestinorum vermes necandos præstantissimum censetur. Simon Paulli oleo ex eo distillato felici cum successu utebatur in verminantibus puerulis; quod ad guttas aliquot illis propinabatur, & gossypio exceptum umbilico eorum applicabatur. Ejusdem semen, semini contra vermes subrogari posse asserit, illudque usurpat in pulvis contra lumbricos ipsi familiari compositione, & quo ad vermes cucurbitinos in quodam lanione enecandos felicissime usus fuerat.

℥. C. C. Philos. pp. Rad. Filicis, ana ℥ij. Corallin. Sem. Santon. Sem. Agerati, Tanacetii ana ℥j. Myrrh. select. Lig. Aloes, Flor. Sulphur. ana ℥ss. Sal. Nitri purific. ℥iij. Misce. Fiat l. a. pulvis, cujus ℥j. vel ℥ss. ex aqua Graminis vel Portulacæ, mane, jejuno ventriculo, sumitur.

Agerato vis alvum subducendi tribuitur, de qua tamen omnes non conveniunt.

Externe admodum folia & summitates tumores resolvunt, splenis duritiem emolliunt, vel etiam infessu uteri tumores sanant. Ex Agerati, & Ophioglossi foliis contusis & in oleo Olivarum bulliendo coctis, cum Ceræ, Resinæ & Terebinthinæ tantillo, Gerardus Chirurgus Anglus, Unguentum parat præstantissimum ad vulnera & ulcera sananda.

Usurpatur in Syropo & in Trochiscis de Eupatorio Mesue dictis.

AGNUS.

Agnus, Agnus Castus & Vitex, *Officinarum*. Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis, C. B. P. 475, *Inf.* R. H. 603. Agnus folio

lio non serrato. *J. E.* 1. 205. *Vitex Dod. Pempt.* 774. *Salix amerina*; *Matth.* *Elæagnon Theophrasti*, *Adversar. Lobel. Icon.* 138. *Agnus Castus* in *Officinis inepte dicitur*. *Castus* enim nihil aliud est quam *expositio vocis græcæ dyros*.

Arbuscula est frequentibus brachiata ramis, lentis, flexilibus, frangi conumacibus. *Frondes* adverso ortu pediculis unciam enam aut alteram longis hærent digitati, *Lupini* vel *Cannabis* modo, in quinque fere lacinias seu folia particularia, oblonga, utrinque acuminata, mollia subdivisi, medio horum majore & longiore, coloris subtus cinerei, superius fusci propemodum. *Flores* odorati verticillatim spicato ordine virgularum fastigia circumdant, colore aut purpurei toti, aut purpurei albo intermixto, completi monopetali, irregulares, in sex septemve lacinias inæqualiter divisi quasi bilabii, posterius tubulati. Ex singulo calyce etiam multifido surgit pistillum posticæ floris parti, ad instar clavi, infixum, quod deinde abit in fructum fere sphericum, instar *Piperis*, saporis acris, in quatuor loculamenta divisum, totidemque seminibus særum minutissimis & oblongis. In fluminum ripis asperis, torrentium alveis ac locis paludosis *Italix meridionalium* regionum sponte nascitur. Hic in hortis colitur. Folia, seu summitates in usum medicum veniunt, sicut & fructus seu grana rotunda, pipere minora, colore cinereo nigricante; saporis acris, subadstringentis, exsiccantis.

Analysi chymica ex Agni fructuum recentium *℔ij.* prodierunt phlegmatis limpidi odorati & saporis aromatici, tum acidi, tum alcali urinosi *℥iij.* humoris rufi, odoris & saporis empyreumatici, acidi intensi & alcali urinosi *℥vj.* *℥ij.* gr. *xvij.* olei *℥iij.* gr. *liij.* cujus quarta pars circiter adiposæ crassitudinis erat. *Massa nigra* in retorta superflua pendebat *℥ix.* *℥vij.* quæ per horas viginti igne reverberii in crucibulo calcinata reliquit cinerum spadicæorum *℥j.* *℥iij.* ex quibus lixivio, salis fixi mere alcali *℥iij.* gr. *xij.* extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit *℥vij.* *℥vj.* in calcinatione *℥vij.* *℥iij.* Per hanc analysim liquet, Agni semina partibus tenuibus & volatilibus copiosis donari, quandoquidem dum distillantur, totius fere quarta pars in auras avolat, quam quidem non solum alkaline urinose particule, sed etiam acidæ & oleosæ tenues constituunt. Deinde multum olei continent, quod totius dimidium superat, acidi salis portionem non mediocrem & aliquantulum ammoniacalis salis, pauxillum vero terræ. Sapor & odor partium tenuium abundantiam testantur.

De antivenereis Agni virtutibus ab omni ævo prædicatis plurimæ inter Medicos agitantur controversiæ. Alii eum ad impetus venereos reprimendos & castitatem tuendam utilissimum esse narrant; sive edatur, sive bibatur, sive subternatur, seminis acrimoniam & inde natam in partibus genitalibus tentiginem demulcere, nocturnaque veneris per somnum imaginationes profligare, asserunt. Alii econtra cum *S. Pauli*, nonnullos reperiri scribunt, qui in venerem Viricis usu excitantur. Hoc itaque incerto sub præsidio male tutam esse virtutem quis non censet? Ab omnibus tamen ad hystericos affectus & uterinos furores compescendos in mulieribus, necnon etiam ad hypochondriac-

driacorum virorum spasmodicos insultus sedandos, commendatur, modo illæ affectiones pendeant ab humore viscido, crasso, in visceribus hærente, qui mora sua acrior factus, nervosas partium membranas titillabit. Ille enim humor ab hoc remedio dividetur & demulcebitur. Alioquin si solidæ partes jam inflammationem contraxerint, tunc ab illius usu major fiet inflammatio & morbus ingravesceat. Semen pulveratum usurpatur a ℥ss. ad ℥i. vel Emulsio ex eo sic præparatur.

℥i. Seminis Viticis ℥iij. Contunde in aq. Nenuphar. ℥vj. Fiat emulsio.

Idem semen a Velledio in gonorrhæa commendatur. Foliorum & summitatum infusum vel decoctum menstrua mulierum profluvia promovet & viscerum obstructions tollit, ulcera interna detergit & sanat, potissimum in virga; unde in gonorrhæa utile censetur.

Externe folia & summitates tumores resolvunt, splen induratum emolliunt. Suffitus ex eorum decocto ad uteri tumores a nonnullis præscribitur.

AGRIMONIA.

Agrimonia & Eupatorium *Officinarum*: Agrimonia *Officinarum*, *Inst. R. H.* 301. Agrimonia seu Eupatorium, *J. B.* 2. 398. Eupatorium verum sive Agrimonia, *C. B. P.* 321. Agrimonia sive Eupatorium, *Dod. Pempt.* 28. Eupatorium Grecorum, Agrimonia *Officinarum*, *Lobel. Icon.* 692. Eupatorium vulgare, *Tragi.* 514. vulgo, *Aigremonie*.

Radice est nigricante, crassa, fibrosa, saporis adstringentis, caule bicubitali, hirsuto, ramoso, frondibus palmo longioribus, alternatim nascentibus, compositis ex quatuor fere foliis conjugatis & obscure virentibus, venosis, villosis, hirsutis, oblongis, crenatis, cum intermediis minoribus conjugationibus & extremo impari claudente, sapore subacri, cum quadam adstrictione. Flores longissima serie summos ramulos occupant, suaveolentes, rosacei, lutei, e petalis quinque in orbem positos constantes; calyce echinato & quinquepartito, qui mutatur in fructum subrotundum, echinatum, in superiore parte inferiore vero glabrum, tres lineas longum, unicusculum, raro bicuscularem, cum semine uno vel altero oblongo. Occurrit in satorum & pascuorum marginibus agri Parisiensis. Folia in usum veniunt.

Analysi chymica, foliorum Agrimonie recentium ℥v. præbuerunt phlegmatis limpidi primum occulte acidi, deinde manifeste acidi, ac tandem austeri, ℥iij. ℥iij. ℥iij. gr. xxiiij. humoris rufescentis empyrenmatici, intense acidi & austeri ℥vj. ℥v. gr. lx. humoris subsulci, sale volatili urinoso turgidi, ℥j. ℥ij. olei mellisæ crassitudinis ℥i. ℥v. gr. xxxvj. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥v. ℥v. gr. xxvj. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum rufescentium, ℥j. ℥vj. gran. xx. ex quibus salis fixi mere alcali ℥vij. gr. xxxvj. extracta fuerunt. Partium perditio in distillatione fuit, ℥iij. gr. lx. in calcinatione ℥iij. ℥vij. gr. xvj. Ex hac analysi, & sapore quem folia referant austero subalido, cum acrimonia quadam, & ex quodam tenui rubore quo eorum succus chartam cæruleam leviter tingit, concludere licet, hujus plantæ

tas virtutes referendas esse ad salem Tartaro vitriolato, vel sali Coralliorum similem, cum paucis sale ammoniacali conjuncto, utroque multo sulphure crasso involuto.

Agrimonia adstrictione sua viscerum tōnum laxiorem restituit & firmat; sale essentiali incidente & digerente obstructions resolvit, humores fluidiores efficit: quapropter hepaticas inter plantas recensetur. In cachexiis, hydropes, ictero, mensium suppressione & in febribus chronicis a viscerum obstructionibus, feliciter usurpatur. Insuper vulneraria dicitur, blande enim abstergit, leviter exsiccatur & adstringit, ac dolores demulcet. Speciatim in vulneribus & ulceribus renum, & inde oriundo mictu cruento ab Etmullero commendatur. Foliorum Agrimonie siccatorum pulvis ad ℥j. in vehiculo idoneo exhibitus, a Riverio in urinæ incontinentia proponitur. Ejus decoctum vino factum ab Etmullero commendatur, cujus ℥iij. quarta quaque hora hauriat æger. Vvedelius ejusdem decoctum aqua paratum in mictu cruento & in gonorrhæa præscribit. In apozematibus, jusculis, & potionibus aperientibus & vulnerariis usurpatur ad M. j. pro singulis liquoris libris, vel ejus succus repurgatus, ad ℥iij. vel iij. Utiliter quoque in decoctis adversus lucem veneream paratis permiscetur, teste Simone Paulli qui refert, quemdam in luis venereæ curatione celebrem, eam pro secreto specifico habuisse. A Dolore adversus inaniam utilissima prædicatur, sed Garidellus se hoc remedium sæpius & frustra tentavisse asserit.

℥. Rad. Gramin. Rusc. & Asparagi ana ℥j. Folior. Agrimonie & Cichor. sylvestr. ana M. ij. Summitatum Lupuli, M. j. Bull. in aq. comm. ℥iij. ad ℥iij. Fiat decoctum aperiens.

℥. Rad. Eryngii & Cichor. sylvestr. ana ℥ij. Folior. Agrimon. Scopolendrii, Adianti, Bugloss. & Chæresol. ana M. j. Summ. Absynth. & florum Calendulæ ana, P. ij. Fiat decoctum cum q. s. aq. fluviatil. pro sex dosibus; in qualibet dilue Syrupi de s. Rad. aperientib. ℥j. & Salis Martis River. gr. j. Debitis intervallis exhibeantur ad obstructions resolvendas.

℥. Succi Agrimon. repurgati ℥iij. Tinctur. Martis ℥j. M. cum jusculo vitulino in cachexia.

℥. Folior. Agrimon. M. ij. Flor. Hyperici Pug. iij. Coquantur in aq. comm. ad ℥xv. In colatura dilue Syrup. Heder. terrestr. ℥jss. pro tribus dosibus in mictu cruento.

Externe usurpatur in fomentis, aqua vel vino cocta, vel contusa sub forma cataplasmatum, pro vulneribus atque ulceribus partium externarum recentibus & antiquis mundificandis, sordibus detergendis & carne promovenda & pro sedandis inflammationibus. In gargarismatibus quoque ad anginam & ad faucium, & oris ulcera detergenda, & dolorem leniendum.

℥. Folior. Agrimon. Hyssop. ana M. j. Hordei integr. Pug. j. Fictum ping. n. ij. Fiat decoct. In colatur. ℥j. dissolve Mellis rosacei ℥ij. Fiat gargarisma detergens & resolvens in angina.

Agrimonia in aceto vel vino cocta calide cataplasmatum forma scroto applicata testium inflammationem sedari, Simon Paulli post Joannem Tiengium Medi-

Medicum Amstelodamenſem, teſtatur, quod Cl. Garidellus, in *Plantar. Aquixtienſium hiſtoria* experimentis comprobaviſſe ſcribit.

Agrimoniæ flores Sambuci Hildanus conſociat. Idem S. Pauli commendat decoctum Agrimoniæ, & radicum Helenii ad perniones exulceratos, quo mane, & velperi pedes abluantur. Folia contuſa ad ani procedentiam utiliter uſurpantur. Eadem quoque nonnulli tophis venercis admovent, ad nocturnos artuum dolores mitigandos. Narrant viatores deſatigatos ab iſdem foliis allevari, ſi ex iis pedilavium ſibi parent.

Tragus Agrimoniam ad membra luxata poſt reductionem utiliſſimam aſſerit. Herba recens vel exſiccata cum furſure triticeo, in vappa decoquitur, quoad inſtar pulmenti ſpiſſeſcant, quod calidum imponitur.

Ex tota planta aqua diſtillatur longe imbecillioris virtutis, quam ſuccus vel decoctum. Prodeſt exulcerationibus oris aliſiſque ulcèribus, ſi ex illa colluantur. Eandem aſſidue poram, eſſicaciſſimam contra calculum, Petrum Bembum expertum fuiſſe, referunt. Quin etiam Petrus Foreſtus de quodam ſcribit, cui lapis in veſica erat, cum crebro herbam hanc cum ovis comediſſet, lapidem per fruſta cum lotio tandem expulſum fuiſſe. O! utinam tali lithontiptica virtute doneur.

Uſurpatur in decocto aperiente rubro *D. De Lorme*, in Syrupo hydragogo, Syrupo aperiente cachectico, & Syrupo Martiali aperiente cathartico, *Chazar*; in Pilulis Polychreſtis, ſeu aggregativis, Unguento muſſificativo de Apio, Ung. martiato, & in Aqua vulneraria.

A L C E A.

Alcea vulgaris, *Officinarum*: Alcea vulgaris major, C. B. P. 316. *Inſt. R. H.* 97. Alcea vulgaris, *J. B.* 2. 553. *Dod. Pempt.* 656. Alcea, *Tab. Icon.* 771. vulgo, *Alcèe* ou *Mauve ſouveau*.

Ex radice lignoſa, proluxa, albida, plures emittit caules cubitales aut ſeſquicubitales, teretes, medulloſos, raris, ſed tamen longiuſculis pilis hirtuſos. Folia, quæ e radice exeunt & caulium inferiora cingunt, ſubrotunda, per margines incifa, pediculis longis inſident: quæ in caulibus ſunt alternatim ſita, quo cacumini propiora, eo brevioribus, pediculis ſulta, altius incifa in quinque, ut plurimum lacinias inſigniores, atrovirentia, hirtuta, præcipue averſa parte. Flores ex foliorum aliſ ſingulis ſinguli, in caulis, & ramorum ſummitatibus conſerti, pediculiſ quadrantalibus, hirtutiſ, ſuſtinentur, floribuſ Malvæ ſimiles purpureſcente, carneove colore, nonnumquam etiam albo: quibus ſuccedunt ſemina hirtuta, per maturitatem nigra, Malvaceis ſimilia. Ab Althæa, & Malva foliorum incifuris diſcrepat. In agro Pariſienſi ſponte naſcitur.

Radices & folia in uſum veniunt, raro tamen nec niſi Malvæ, aut Althææ deſectu.

Ejus ſuccus minus lentus & mucoſus eſt, quam Malvæ. Eandem ipſi tribuuntur virtutes, ſed debiliores. Ejus decoctum in alvi torminibus, & epidemics

micis dysenteris plurimum laudatur. In fomentis, & cataplasmatibus emollientibus & resolventibus usurpatur.

ALCHIMILLA.

Alchimilla seu Pes Leonis, *Officinarum*: Alchimilla vulgaris, C. B.P. 319. *Clus. Hist.* 108. *Insb. R. H.* 508. Pes Leonis sive Alchimilla, J. B. 2. L. 17. 598. Alchimilla, *Dod. Pempt.* 140. Leontopodium, *Brunsfelsit*: Stellaria Matthioli, *Lugd.* 1281. Stella herba Italica, *Gesner, Hort: vulgo, Pied de Lion.*

Ex radice minimū digitum crassa, transversa, fibrosa, nigricante, idē adstringente; pelliculi exoriuntur longi, sesquipalmares, hirsuti plurimi, quo singuli folium sustinent unicum, ad Malvam accedens, sed magis durum & crispum, in octo, vel novem angulos obrufos divisum, & veluti complicatum, cum totidem nervis a pediculo ad extremos angulos prodeuntibus, concinne in ambitu crenatum. Ex foliorum medio assurgunt caules aliquot tenues, teretes, hirsuti, ramosi, dodrantales, foliis nonnullis minoribus onusti, in quorum summo flores dense glomerantur apicali, seu plurimis staminibus constantes, cum apicibus flavescenscentibus, calyce monotomo, infundibuliformi, herbacei coloris aut pallidi, in quatuor partes acutas diviso, inter quas totidem minores interpositæ sunt, & pistillo quod abit, deinde in semen unum aut alterum exiguum, flavescens, splendescens, subrotundum, in capsula, quæ calyx floris fuit, reconditum. Delectatur locis herbosis in Alpis, & Pyrenæis, & Gallo-provinciæ montibus. Folia ad usum medicum colliguntur.

Analysi chymica, Alchimillæ foliorum recentium ℥v. per Balneum vaporosum distillatæ præbuerunt phlegmatis limpidi, herbaceo sapore, primum obscure acidi, deinde manifeste acidi ℔ij. ℥x. humoris manifeste acidi, & sub finem aliquantisper austeri ℔ij. ℥i. ℥iiij. gr. xvij. Folia in alambice residua & exsiccata pendebant ℔ij. ℥j. ℥vij. gr. xxxvj. quæ per retortam distillata exhibuerunt humoris rufescentis, tum intense acidi, tum alcali urinosi ℥ij. ℥ij. gr. xvij. olei instar syrupi crassi, ℥i. ℥vj. gr. vj. Massa nigra, in retorta superstes pendebat ℥vij. ℥vj. quæ per quindecim horas igne reverberii calcinata reliquit cinerum leucophæorum ℥iiij. gran. xxxvij. ex quibus lixivio, salis fixi salis ℥ij. gran. lix. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit, ℥vj. ℥v. gran. xxx. scilicet in distillatione per Balneum vaporosum ℥ij. ℥iiij. gr. xvij. in distillatione per retortam ℥ij. ℥i. gran. xij. in calcinatione ℥iiij. ℥v. gr. xxxiiij.

Hæc analysi multum terræ in hac planta demonstrat, acidi multum, & non mediocrem olei quantitatem; unde compositum exurgere videtur ex sale Kali Coralliorum simili, sulphure crasso involuto.

Inter plantas, quæ vulnerariæ dicuntur, recensetur. Equidem hic observandum est, Medicos vulnerarias eas dicere plantas, quæ vulneribus, & ulceribus, tum internis, tum externis medentur: cum autem vulnē-
ra non-

ra nonnumquam hæmorrhagiam conjunctam habent, cum vetustiora in ulcus degenerent, cum circa vulnera inflammationes quandoque superveniant, aut humorum extra vasa stagnantium collectiones, vel etiam obstructions ex humoribus in ipsis vasibus inspissatis, quæ omnia vulnerrum sanationi plurimum obstant, idcirco, prout plantæ hæc vel illa remore valent impedimenta, distinguuntur in diversas classes, quæ ad tres potissimum reduci possunt: scilicet adstringentes, quæ valorem extremam corrugando, aut spissiore efficiendo sanguinem, hæmorrhagias sistunt, & solutarum partium unionem citius promovere: abstergentes, quæ mucosam, & acrem colluviem vulnerum labiis adhærentem dissolvunt: & resolventes, quæ vulnerum inflammationem compescunt, tumores resolvunt, humorum acrimoniam demulcendo, & crispatas fibras laxando.

Alchimilla inter vulnerarias adstringentes numeratur. Adstringendi, & glutinandi virtute donatur. Sanguinem tenuem inspissat. Interne succus ad ℥iij. aut decoctum ad ℥vj. ad vulnera & ulcera interna consolidanda, menses nimis profluentes, & albos mulierum fluores coercendos, dysenteriam sanandam feliciter usurpatur: in hæmophthoe, ulcere pulmonum, mictu cruento, diabete, plurimum conferunt: herniis quoque ejus pulvis ad ℥j. vel ejus ex vino decoctum medentur.

Externe ab iisdem liquoribus vulnera & ulcera felici cum successu laxantur.

Usurpatur in potionibus & decoctis vulnerariis, clysmatibus dysentericis & unguentis vulnerariis.

24. Alchimill. Pervinc. bellidis major. & minor. Millefolii, Pyrol. Bugul. Sanicul. ana ℥j. Vini generosi ℔j. Digerantur simul in vase idoneo, per horas sex. Deinde affunde aq. ferventis ℔iij. Macerentur adhuc simul per aliquot horas, vas identidem agitando. Deinde fiat colatura. Dosis ad ℥vj. Singulis dosibus adde Syrupum de Hedera terrestris ℥j. Mane & sero iteretur in causa ab alto, abscessibus internis.

25. Succor. Alchimillæ, & Plantag. ana ℥iij. Coralli rubr. pp. Antihectici Poterii ana ℔j. Syrupi de Symphyto ℥j. Fiat potio cochleatim fumenda in hæmophthoe.

26. Folior. Alchimill. & Pervinc. exsiccat. & pulveratorum ana ℥j. Rad. Consolidæ major. pulverat. ℥ij. Corall. rubr. Bol. Armeni, & Terræ sigillatæ pp. ana ℔j. Conserv. Rosar. ℥℔. Syrupi Granator. q. l. M. F. Opiata. Dosis ℥ij. mane & sero, vel etiam sæpius in spuro cruento & hæmorrhagiis uterinis.

Nonnullæ, referente Frederico Hofmanno, quibus libata virginitas, solenter norant decocto Alchimillæ in forma infusus, sibi reparare dolosam *ερωσπιαν*, & illibatum mentiri virginitatis florem. Eandem ejus decocto mammas laxas, & flaccidas nimis, linteo decocto ejus intincto, & impoſito firmas ac turgidas efficere tentant.

ALKEKENG I.

Alkekengi, Halicacabum & Solanum vesicarium, *Officinarum*: Alkekengi *Officinarum*, *Infl. R. H.* 151. Solanum vesicarium, *C. B. P.* 166. Solanum Halicacabum vulgare, *J. B.* 3. 609. Solanum vesicarium, *Dod. Pempt.* 454. Saxifraga rubra, & 4. *Brunsfelfsi*: Vesicaria, *Cordi*: vulgo, *Alkekengi*, *Coqueret*, ou *Coquerelle*.

Radicibus geniculatis, tenues fibras spargentibus, repit in vinetis, caulesque proferit cubitales, subrubentes, subhirsutos, & ramosos, ad quorum nodos folia oriuntur bina simul ab eadem caulis parte, pediculis longis appensa, Solani hortensis foliis similia, sed ampliora, per margines non crenata. Ex foliorum alis singulis singuli exeunt flores pediculis semijuncialibus aut uncialibus, tenuibus, hirsuti fulti, monopetali, rotati, pelvi-formes, quinquifidi, albi, cum apicibus concoloribus & calyce campaniformi, qui amplius in folliculum membranaceum, primum herbaceum, deinde pheniceum, pentagonum, in quo continetur fructus Cerasi forma, magnitudine, & colore; mollis, carnosus, saporis primò subacidi, deinde intense amari, seminibus compressis, orbiculatis, & havescentibus turgidis. In agro Parisiensi sponte nascitur. Fructus solus in usum venit.

Analysi chymica, ex Cerasorum Alkekengi maturorum, & recens collectorum lib. per retorram distillatis; prodierunt phlegmatis limpidi fere inodori inspidi, quod tamen salsi obsecuri & postea acidi occulti notas præbuit lib. ℥vj. ℥j. gran. xij. humoris manifeste acidi & nonnihil austeri lib. ℥iv. ℥ij. humoris rufi, empyreumatici, saporis acidi, cum quadam acrimonia; ℥vj. olei ad Syrupi consistentiam accedentis ℥ij. gr. xij. Massa nigra retorta superstes pendebat ℥vij. gr. lx. quæ per 12. horas calcinata igne reverberii reliquit cinerum nigricantium ℥j. ℥v. gran. xxij. ex quibus lixivio, salis fixi, mere alcali ℥j. gr. xxxvj. extracta fuerunt. Partium jactura in distillatione fuit, ℥viij. ℥j. gr. lx. in calcinatione ℥v. ℥ij. gr. xxxvj.

Itaque nullum salem volatilem concretum, nullumque urinosum spiritum ille fructus exhibuit; multum vero salis alcali fixi & salis acidi, cum olei acris mediocri portione, unde compositum exsurgit Oxyfali dia-phoretico Angeli Salæ non prorsus dissimile.

Alkekengi cerasa seu fructus usitatissimi sunt ad urinam promovendam; ejus acrimoniam demulcendam & saburram a renibus & vesica decedendam, forasque protrudendam. Ad regium quoque morbum commendatur. Sumi possunt crudi tres, quatuor, sexve & amplius, aut saccharo conditi, vel vino infusi, vel in oselo lactis, aliove li-
quore conveniente decocti, vel exsiccati, & in pulverem redacti, & in quovis liquore commixti. Eorum decoctum cum radice liquiritiæ in dysuria laudatur. Arnaldus Villanovus, & Cæsalpinus hydro-
pici, & urinæ suppressione laborantibus, vini haustum, in quo fructus aliquot confusi fuerunt, potandum suadent. Quinque vel sex fructus contunduntur in emulsionibus, & ægotanti, dum in balneo sedet,
pro-

propinquantur, ad urinæ suppressionem & in dolore nephritico. Iisdem in affectibus, eorum succus expressus & coctione defœcatus ad ℥j. præscribitur, aut ad extracti spissitudinem extractus, ad ℥ss. Ex eodem succo recens expresso & musto simul fermentatis, vinum diureticum & ad arenulas expellendas præparatur, ad ℥iiij. mane jejuno ventriculo, propinandum.

℥. Semin. quatuor frigidior. major. ana ℥j. Contund. sensim affundendo aliqui. Pariterat. ℥vj. sub finem adde & conterere bacchar. Halicacabi n. v. z℥. Fiat expressio, in qua dissolve Syrup. de s. Rad. aper. ℥j. Fiat emulsiō in urinæ suppressione, propinanda.

℥. Rad. Petrosel. & Asparag. ana ℥ij. Virgæ aureæ, M. ij. Nitri purificati ℥ij. Bull. in aq. comm. ℥xxiv. ad xvij. Fiat colatura, in qua coniunguntur fructus Alkekengi n. xx. Milleped. vivor. n. cc. Affunde vini albi generosi ℥xvii. Hauriat æger, partitis vicibus, tertia quaque hora; ad urinam promovendam, arenulas propellendas & saburram ex renibus & vesica efficaciter abluendam, præmissis præmittendis.

℥. Oculor. Cancror. ℥j. Pulver. Milleped. gr. xij. Extracti Alkekeng. ℥ss. M. F. Bolus in dolore nephritico.

Civis quidam Augustanus, narrante J. Rajo, morbo articulari gravissime laborans, ita ut sæpe per integram semestrem decumberet, cepit cujusdam suasu, singulis lune mutationibus, in ipso illarum puncto, octo fructus Alkekengi comedere, vel contusos e vino bibere: ita expelli sibi per urinam materiam mire frædam, totumque se ab hoc morbo liberum affirmabat.

Suffusus seu fumus, referente eodem post Ettmullerum, ex contuso Halicacabi fructu cum cera mixto, & in laminam ferream ignitam injecto, ore excipitur, quo cætervatim vermes e dentibus cum sputo copioso reje-cti & crudelissimi dolores sopiti observati fuerunt.

Usurpantur in Trochiscis de Alkekengi dictis *Pb. universal. Lemery.* in Syrup. de Cichor. composito & in syrupo antinephritico *Pb. Reg. Charas.*

A L L I A R I A.

Allia, *Officinarium*: Hesperis Altium redolens, *Mariss. Hist. 251. Inf. R. H. 222. Altharia; Matthiol. 843. J. B. 2. 883. vulgo, Alliaire.*

Ar radícula tenui, lignosa, alba, Allium redolente, caules promit cubitales & sesquicubitales, tennes, subhirsutos, teretes, striatos, solidos. Folia primum rotunda Hederæ terrestris modo, sed longe majora; mox nonnullum æumen assequuntur, per ambitum crenata, pallide virescentia, glabra, pediculis longis nixa, sapore & odore Allii mitiore; ad intervalla longiora, in caulibus alternos aut nullo ordine sita. In summitate caulis & ramulorum flores multi, cruciformes, quatuor scilicet petalis constantes, albi, nascuntur: quorum ex calyce surgit pistillum quod deinde abit in fructum seu siliquam membranaceam, teretem, septo intermedio, cui valvæ imbricatæ utrinque adherescunt, in quo loculamenta divisum, seminibusque fortim oblongis, teretibusculis, nigris, inexti numeri quæ veluti nidulantur in scrobiculis.

Geoffroy Tom. II.

C

culis

culis septi intermedii . Tota planta contrita Allium redolet . In dumetis & fossarum aggeribus agri Parisiensis nascitur . Omnes plantæ paries usitatæ sunt .

• Analyti chymica , ex Alliaræ folior. recenter collectorum ℥v. prodierunt phlegmatis limpidi , Allium sapore & odore aliquantisper referentis , subacidi ℥j. ℥iij. ℥ij. humoris rufescentis primum acidi , austeri , deinde empyreumatici , tum intense acidi , tum alcali urinosi ℥ij. ℥iij. gr. lxx. humoris fulci , sale volatili urinoso copioso imprægnato ℥j. ℥ij. salis volatilis urinosi , concreti , gr. xxxvj. olei adiposæ crassioris ℥j. gr. lx. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥iij. ℥ij. quæ rursus reverberii calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥j. gran. vj. ex quibus salis fixi mere alcali ℥vj. gran. l. lixivio extracta sunt . Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥j. gr. l. in calcinatione ℥ij. ℥j. gr. lxxvj.

Alliaria intense amara est , Allium redolet & chartam ceruleam subrubram efficit ; unde & ex analysi concludere possumus sale domæi ammoniaci simili , multo sulphure intricato . Planta recens urinam citreæ dicitur ; sicca veneno adversari , si in vino coquatur . Decoctum ejus asthmaticis plurimum confert . Nonnulli solia in enematis incoquant ad colicos , flatulentos , & nephriticos dolores . Semen tritum , maribusque attractum sternutamenta excitat . Idem contritum & emplastri modo vulvæ admotum mulieres uteri strangulatu oppressas liberat & excitat .

• Externe putredini resistit . Fabricius Hildanus Veris tempore , sub finem scilicet Aprilis vel ineunte Majo , Alliarum colligere solebat , & postquam per diem unum in umbra paululum exsiccata fuerat , minutim incidebat , in mortario contundebat , succumque in prælo exprimebat , quem in ampullis vitreis , superinfuso paululum olei , annum integrum , imo ad tres utque annos reservabat . In ulceribus putridis & sordidis , uti in gangrenis , eo utebatur feliciter , & tanquam præstantissimum remedium prædicavit .

A L L I U M .

Allii species dum in Officinis , seu potius in culinis usitatæ sunt ; scilicet Allium vulgare & Alliopræparatum seu Opioscorodum .

Allium vulgare , *Officinarium* : Allium sativum , *C. B. P.* 73. *Inst. R. H.* 383. Allium vulgare & sativum , *J. B.* 2. 554. Allium *Dod. Pempt.* 682. vulgo , *Ail.*

Huic pro radice bulbus est tenuissimis membranis ex albedo dilute admodum purpurascens velatus , ex pluribus coherentibus nucleis separatum circumvestitis , coagmentatus , sapore peracri , odore gravissimo ; a quo inferius tenues fibræ seu capillamenta dimittuntur . Folis vires oblongis , non fistulosis , ut in cepis , sed gramineis , inter quæ scapus procerus , enodis , concavus , glaber , assurgit , & fastigio capitulum suffragit acuminatum , candida membrana velatum , qua per maturitatem dirupta flores apparent glomeratum congesti , liliacei , ex petalis sex adbidis compositi . Floris uniuscujusque medullium pistillum occupat , quod dein-

deinde abit in fructum subrotundum, Pisi magnitudine, colore foris purpurascens, sed pulpa interiore candida, sapore, & odore bulbi nucleis similem, in tria loculamenta divisum, seminibusque foetum subrotundis, nigricantibus. Hic feritur in hortis. Bulbosa radix in usum venit.

Alliopræsum, Scorodapafum, & Ophioscoridum, *Officinæ*: Allium sativum alterum sive Alliopræsum caulis summo circumvoluto, *C. B. P. 73. Inf. R. H. 383. Scorodaprasum secundum, Clus. Hist. 191. Alii genus, Ophioleodon novum quibusdam, J. B. 2. 559. vulgo, Rocambole.*

Ex bulbo multis nucleis constante, fibrisque numerosis, exalbidis, capillato sessili parte, tunicis cepaceis binis vel ternis, ex albo purpurascens circumvestito, caulis afforgit singularis, minimi digiti crassitudine, sesquicubitalis aut bicubitalis, foliis ut plurimum quinque porraceis, carinatis, donatus, quæ postquam caulem aliquosque involverunt, ab eo abscedentia & reflexa terram spectant, medio inter Porrum & Allium odore. Suprema vero caulis pars nuda, viridis, lævis, in gyrum unum aut alterum spirarum serpentinarum more intorquetur, donec tandem caput erigat vagina involutum albicante, conicula, extra volumina protensa, longa & rostrata, qua dehiscens, bulbuli apparent congesti, initio purpurascens, postea exalbidi, & inter eos flores Allii floribus haud dissimiles. Tota planta gravem Allii odorem spirat. In hortis ad culinarium usum colitur.

Analysi chymica, ex bulborum Allii a pelliculis mundatorum Bv. prodierunt phlegmatis limpidi Allii odorem & saporem apprimè referentis, primum salis & subacidi, deinde subsalis & intense acidi Bij. 3v. 3ij. gr. vj. humoris limpidi, intense acidi, ac tandem austeri Bij. 3v. 3ij. gr. xxiii. humoris limpidi rufescentis tum subacidi, tum alcali urinosi & sale volarili urinoso imprægnati, 3ij. 3j. gr. lxxvj. salis volatilis urinosi concreti gran. xij. olei crassioris ad extracti spissitudinem 3ij. 3ij. gr. xliij. Massa nigra in retorta residua pendebat 3xij. 3j. quæ per novem horas igne reverberii calcinata reliquit cinerum 3j. 3j. gr. vj. ex quibus salis fixi salis 3ij. gr. viij. lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit 3ij. gr. lxxvj. in calcinatione 3xj. 3vii. gr. lxxvi.

Allium itaque constat ex sale ammoniacali cum oleo tum tenui, tum crasso, acri, copioso, sed summæ expansionis capace, conjuncto.

Allium tenuibus ætiosus & acribus partibus donatur, quod non solum odore vehemente, sapore acri & nonnihil caustico & analysi chymica comprobatur, sed etiam variis experimentis demonstratur. Si enim emplastra ex Allio confuso plantis pedum applicentur, oris halitus Allium spirabit. Allium gallinis & altibus cum esca obiectum saporem & odorem suum in eorum carne & ovis prodit. Christoph. Bennerus M. Lond. in *Theatro Tabidorum exercitat.* 29. asserit fonticales ægrorum membris vel incisos vel inustos, in rarioris texture hominibus, Allii intrus sumpti, post tertiam aut quartam a comestione horam, odorem reddere. Costæus observat, Allium non tantum vesicas excitare, sed etiam cutim corrodere.

Allium apud quasdam nationes solitum & palato gratum est alimento-

rum condimentum, licet plurimis execrandum & intolerabile videatur. Sebizius enim, *De Alimentorum facultatibus*, scribit, Allium alimentum præbere paucissimum, idque prævum & acre: fugiendumque esse cholericis & sanguineis. Iis vero qui debiliores sunt stomacho ciborum appetentiam excitat, concoctionem juvat. Milites, Nautæ, & rustici crudas aquas aut corruptas, vel alimentâ prævæ aut difficilis cõctionis, Allio corrigere tentant.

Alexipharmacum præstantissimum a nonnullis habetur, in morbis contagiosis & adversus venena frigida intus sumpta. Quidam Allium ferentes se ab omni contagio immunes fore existimant: alii ægros putridis febribus infestos invisere coacti bulborum particulam unam aut alteram in ore detinere ad contagium præcavendum. A Galeno Theriaca rusticanorum dicitur. Plateus *Tractatu de Febribus*, Allium commendat peste laborantibus, in hydromelite decoctum & ad ʒij. circiter exhibitum, ad sudores & urinas proliciendas. Hungari, inquit Joan. Bockelius de Peste, peste tempore non habent certius remedium quam Allium. Aliæ plures ipsi tribuuntur virtutes, scilicet humorum putredini resistendi, urinas & arenulas propellendi, colicos dolores flatulentos sedandi, lumbricos enecandi. Ad hos affectus a vulgo sæpissime vel in lacte vel in jusculo decoctum hauritur, vel clysteris modo in intestina injicitur, aut umbilico contusum epithematis modo admoveatur. Illud idem Galenus, Schenckius, Zacutus, & Borellus ad ventris tormina & flatus discutientes sæpius comprobatum remedium esse asserunt: tunc aliquot haustus aquæ calentis in qua Allii bulbus minutim sectus maceratus fuit, ægrotantibus utiliter propinantur. Forestus in suis observationibus testatur hydropicorum aquas nonnunquam evacuisse, & adversus scorbutum a Lauembergio commendatur. Asthmæ conducit & expectorationem promovet in thoracis affectionibus catharrois: Dr. Boovles Medicus apud Anglos celeberrimus pro arcano habuit in asthma, Allium conditum sic paratum.

ʒ. Allii bulbor. q. l. Denudatis pelliculis, coque in aq. limp. q. s. in vase clauso ad ténacitūdinem. Exempti bulbi linteo siccantur, & in olla vitæata reconduntur. Tum

ʒ. Decocti supradicti & aceti acerrimi tantumdem & cum Sacchari albi q. s. fiat Syrupus qui bulbis superaffundatur vase probe obturato: ferventur ad usum. Dosis, unus duo vel tres bulbi mane deglutiantur, cum syrupo cochleari uno vel altero, ad asthma humorale.

Allium ipsum dosi admodum exigua sumendum est. Infusum unius bulbi in vini albi ʒvi. vel ʒviii. percolatum propinatur. In lactis vero ʒj. bulbuli duo vel tres contriti decoquantur.

Verum ejus frequentior usus molestus est & noxius. Cum enim aliquantisper causticum sit, ventriculum & viscera inflamat, æsumque in humoribus accendit. Hinc flatus parere nonnulli asserunt, sium excitare observant, capitis dolorem inferre, oculis & sensuum organis nocere. Isbrandus de Diemerbroek, *T. de Peste*; plurimorum Medicorum auctoritate & propria experientia fretus, Allium in morbis pestilentibus non tantum non utile esse, sed noxiam pronuntiat. Fallopius; C. 101. *De Morbo*

Galli-

Gallice, p. 847. notant. Allii & Ceparum usum illis, qui lue venerea laborant valde nocivum esse. Quin, & hæmorrhoidibus laborantes lædere, Pisanellus, *De Esculentor. & Potulentor. facultatibus*, auctor est. Allii succus potus hominem non modo turbat, sed etiam interficit, annotante Spigelio, *Isagege lib. 2. cap. 16.* Crantzius *Hist. Saxon. l. 3. c. 3.* narrat, Arnulphi Imperatoris vitam terminatam fuisse vermiculis in ejus carne ex nimia Allii comestione genitis. Itaque cum vel prævum vel nullum omnino corporis alimentum gignat, illud cum Simone Paulli potius ex culinis eliminemus, quam ut condimenti saltem loco cuique integra valetudine fruendi commendemus.

Externe Allium in mortario cum oleo Olivarum contusum, & in unguentum redactum, tumores frigidos potenter resolvit; puerorum umbilico inunctum vermes interimit: idem cum adipe suillo tritum, & plantis pedum admodum, multum conducit ad pulmonum canales aperiendos, & ab infarctu liberandos in asthma, annotante J. Raio. Ejus succus cum Melle & Butyro permixtus porriginem (*la teigne*) & psoriam sanat. Idem succus ad ambusta plurimum valet. Ad arthriticos dolores sedandos Allii & Sedi majoris partes æquales contundantur in pulvem & parti dolenti applicentur. Allii bulbus detracto cortice in frustula oblonga scissus & in aurem intrusus dentium dolorem compescit: ejus succus cum paucis Theriacis mixtus & in aurem instillatus idem efficit, Tertianæ febris hoc remedio sæpe profligata fuit.

24. Allii contusi ʒi. Fuliginis splendentis ʒi. Piperis longi ʒi. Croci, Camphoræ ana ʒss. Mille. Fiant Epicarpia ante paroxysmum applicanda.

Observandum autem est omnia remedia ex Allio tum externa, tum interna, minime convenire, ubi datur catarrhus tenuis, acris, sputum cruentum, constitutio calida, sanguinis aut præcordiorum æstuatio.

A L N U S.

ALnus, *Officinarum*: Alnus rotundifolia glutinosa, viridis, G. B. P. 428. J. R. H. 587. Alnus vulgaris, J. B. l. 151. Alnus, *Dod. Tempt.* 839. vulgo, *Aulne*.

Arbor est alta ac procera, caudice recto, mediocris crassitudinis, cortice scabro, fragili, nigricante, ligno subrubente, molli, levi, tractabili, ramis valde fragilibus medullosis, cortice testis externe subcinereo, intus subluteo, amaro cum adstrictione, & ingrato: foliis latis, Avellanæ vulgaris, rotundioribus, nervosis, crenatis, viridibus, splendentibus, tactu glutinosi: in ramulorum fastigiis soli seu flores amantissimi dependent multi, primo virentes, deinde rubentes, unciam circiter longi & fragiles antequam se explicaverint, evoluti enim duas uncias superant. Componuntur ex floribus plurimis, glomeratis, axi affixis, quorum singuli plurimis staminibus & calyce quadripartito surgentibus, constant. Steriles sunt; aliis enim in locis fructus nascuntur: conuli sunt magnitudine parvæ Avellanæ, primo virentes, ubi maturefcunt rubentes, & mox hiantes, ex imbricata squammarum compage congesti, e quibus oriuntur filamenta quædam prominula, purpurea

Geoffroy Tom. II.

C 3

parca

purea, bifida, embryonibus insidentia. Embryones autem abeunt in semina exigua, compressa, inæqualia, rubentia, medulla pauca alba repleta, sapore manifesto destituta. Juli & coni sapore adstringente donantur cum aliqua amaritudine. Nascitur in humidioribus, & uliginosis locis agri Parisiensis. Cortex & folia in usum sed raro veniunt.

Sale essentiali tum acido stiptico, tum Ammoniacali oleo & terra involuto donantur. Viribus ad Quercus corticem & folia proxime accedunt. Ex Alni cortice cum ferro detricto & rubiginoso pes aliquot dies aqua macerato, color efficitur niger atramenti similis, quo nonnulli ad tinguendum utuntur. Idem pro atramento scriptorio conficiendo Gallæ vires supplere potest.

Cortex, juli, & fructus adstrictione donantur: eorumque decoctum ad oris & tonsillarum inflammationes ac humores conducit: coque sub nomine, in gargarismatis repercutientibus & resolutivis usurpatur. Cortex contusus incipientibus inflammationibus utiliter imponitur.

Alni folia viridia externe admota tumores discutunt & inflammationes extinguunt. Veteribus vulneribus sæpius imposita ad sanitatem perducere feruntur. Alpium incolæ paralyticos curant, foliis Alni sudorem proliciendo, eo potissimum qui paralytum a causa externa contraxerunt, nempe vel in locis humidis habitando, vel super terram dormiendo. Saccos foliis Alni repletos Solis radiis exponunt vel in furnum calentem immittunt, donec incalescat: eosdem deinde ægotantibus subternunt, & superimponunt, sicque derelinquunt donec sudor copiosus diffluat. Quod pluries reiteratur, donec æger sanatus sit. Eodem remedio rheumatici & ischiadici dolores curantur. Iis qui lue venerea afficiuntur ad dolores venereos restinguendos prorsus inutile est, annotante Tournefortio.

Unicuique notum est Alni lignum, quod extra aquas non diu incorruptum durat, sub ipsis aquis ac in aquis fere ad eternitatem immortale non putrescere & ædificiorum fundamenta ac immania structurarum pondera sustinere.

A L S I N E.

Alſine vulgaris, Morſus Gallinæ, *Officinarum*: Alſine media, C. B. P. 250. *Inf. R. H.* 242. Alſine vulgaris ſive Morſus Gallinæ, J. B. 3. 362. Alſine minor, *Dod. Pempt.* 29. Hippia minor, *Cordi*: Morſus Gallinæ 1. genus, *Tragi*, 385. vulgo, *Morgeline*, & a nonnullis, *Mouron*.

Ex radiculis capillaribus & fibratis, cauliculos plures, humi ſtratos, repentes, tenellos, hirsutos, ſubrubentes, geniculatos, ramoſos emittit, ad quorum nodos folia bina ex adverſo naſcuntur ſubrotunda, acuminata, tres, quatuorve lineas longa, duas, treſve lata, pediculis innixa, ſubhirsuta, virentia. Flores ramulorum extrema occupant, roſacei, plurimis ſcilicet petalis bifidis conſtantes, candidis, ſtriatis & calyce quinquefolio villoſo, ex quo ſurgit piſtillum, quod abit in fructum membranaceum, unicapſularem, conicum, apicē dehikentem, ſeminibusque ſorum minutiffimis, ſubruſis, placentulæ quaſi racematim affixis. In uliginosis locis ad ſepes,

sepes, & vias, itemque in vineis, & hortis, inter olera passim provenit in agro Parisiensi. Usus est herbæ.

Analysi chymica, Alsinæ floridæ lbv. per balneum vaporosum distillatæ præbuerunt phlegmatis saporis, & odoris herbacei subfalsi lbij. ℥v. ℥vij. Planta residua exsiccata pendebat ℥viij. ℥vj. gr. xxxvj. quæ per retortam distillata præbuit humoris rufescentis ℥ij. ℥v. gr. xxxvj. salis volatilis urinosi concreti grana aliquot; olei syrupi ad instar crassi ℥j. ℥iij. gr. ij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥iij. ℥vi. quæ per decem horas igne reverberii in crucibulo calcinata reliquit cinerum nigricantium ℥ij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥j. lixivio extracta fuit. Partium jacketura in distillatione fuit ℥ij. ℥j. gr. lvij. in calcinatione ℥j. ℥vj.

Folia sapore herbido subfalso donantur. Eorum succus chartam cæruleam subrubram efficit: unde liquet plantam sale Ammoniacali Nitrolo donari cum oleo, & terra permixtis, & multo phlegmate dilutis.

Hæc plantæ vis resolvendi, discutiendi, & præterea refrigerandi tribuitur. Ejus decoctum oculorum inflammationes sedat. Eadem ipsi, quæ Portulacæ virtutes a Trago tribuntur. Ad cruentam expuitionem planta minutim secta, & cum ovis permixta, & cocta comeditur. Plurimi eam nutrire asserunt atque restaurare eos, quorum vires morbo diuturno fractæ, phthisim, & marasimum minitantur. Emmanuel Konig M. Basileensis, in epilepsia pnerorum, illam intus sumptam commendat, & externe eorum abdomini admotam in butyro frixam, ad eorum tormina sedanda. Herba contusa hæmorrhoidum dolores sedat cataplasmatibus modo apposita, lac quoque grumofum, mammis admotæ resolvit. Ejus succus desecatus ad ℥j. in juleculo; foliorum in umbra exsiccatorum pulvis ad ℥j. aut eorundem manipulus unus in aquæ lbj. decoctus solent præscribi. Ejus succus vel decoctum vulnera, & ulcera detergit, & sanat. Simon Pauli ejus decoctum adversus scabiem commendat, si addito momento cineris Fagi vel salis manus, & pedes laventur.

Basseribus Canariis cibum temperatum præbet.

A L T H Œ A.

Althæa, Ibsicus, Bismalva, Malvaviscus, *Officinarum*: Althæa Dioscoridis, & Plinii, C. B. Pl. 315. Inv. R. H. 97. Althæa sive Bismalva, J. B. 2. 954. Althæa Ibsicus, *Dod. Pempt.* 655. vulgo, *Guimauve*.

Radicibus est albis, numerosis, digitum crassis, ab uno capite pendentibus, fibrosis, mucagine lenta turgidis. Caules cubitales sunt aut bicubitales, tenues, teretes, villosi, foliis alternis donati, e rotundo acuminatis, canescentibus, molli lanugine pubescentibus, tres uncias circiter longis, sinuosis, serratis, longo pediculo insidentibus. Flores in filiorum alis nascuntur ex albedo nonnihil rubentes, monopetali, in quinque segmenta ad centrum usque divisi, in quo stylus adest pyramidalis, tubulosus, staminibus onustus, in cavitate sua excipiens pistillum quod ab ite in fructum orbicularem, compressum, e pluribus capsulis, annuli in modum dispositis, circa placentam mediam conflatum.

C 4

Capsu-

Capulæ membranaceæ sunt *, tenues, reniformes & semen continent ejusdem formæ. In agro Parisiensi nihil Althæa vulgaris in paludosis & siccis rivulis. Usu sunt radices, folia, flores, semina. Sed radices magis usitatæ.

Analysi chymica, ex foliorum & summitatum Althææ recentium lbv. per retortam distillatis, prodierunt phlegmatis liquidi fere inodori & insipidi, obscure acidi, ℥x. ℥iij. gr. xlvij. humoris limpidi primo manifeste acidi, deinde austeri, tandem empyreumatici lbij. ℥vj. ℥v. gr. liv. humoris empyreumatici, rufi, sale volatili urinoso imprægnati, ℥ij. ℥ij. gr. xlij. salis volatilis urinosi, concreti, gr. lx. olei crassi ac mellei ℥j. ℥vj. gr. xxxvj. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥vj. ℥iij. gr. xlvij. quæ in crucibulo igne reverberii calcinata, reliquit cinerum ℥iij. ℥j. gr. viij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥j. ℥j. gr. viij. lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥iij. in calcinatione ℥iij. ℥iij. gr. xl.

Ex lbv. recentium Althææ radicum; quarum medulla lignosa, funis instar, adempta fuerat, prodierunt phlegmatis limpidi, inodori, insipidi & obscure salis lbj. ℥x. gr. lxiiij. humoris subacidi, subsalis & austeri lbij. ℥vij. gr. xij. humoris empyreumatici, rufescentis, tum acidi, tum alcali, urinosi & austeri ℥iij. ℥ij. gr. xvij. olei adiposæ spissitudinis & aqua gravioris ℥j. ℥v. gr. xvij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥v. ℥vj. gr. lxiiij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥iij. gr. xx. ex quibus salis fixi mere alcali ℥vij. gr. xlij. lixivio extracta fuer. Partium jactura in distillatione fuit ℥iij. gr. xl. in calcinatione ℥iij. ℥ij. gr. xliij.

Folia Althææ succo turgent insipido; glutinoso, qui cœruleæ chartæ colorem nullo modo mutat. Idem mucosus succus in radicibus luxuriat, quo tamen, licet gustu insipido, charta cœrulea subrubro colore perfunditur. Folia & radices perparum urinosi liquoris, analysi chymica, fundunt, plus vero præbent salis alcali fixi, mediocrem acidi liquoris portionem, multo copiosorem salis & austeri quantitatem. Unde concludimus, mucosum hujus plantæ succum & ex terra tenui ac subtili, sale terræ foliatæ tartari simili, oleo copioso intime permixtis, & multo phlegmate dilutis componi. Folia salis volatilis aliquantulum suppeditant, unde nonnihil salis Ammoniacalis continere censemus: radices vero minus urinosi liquoris & paulo plus salis acidi manifesti continent, quandoquidem cœruleam chartæ cœruleæ colorem in rubrum mutant.

Ab illa mucagine lenta & subdulci qua Althæa turget, pendent potissimum illius virtutes, emolliendi nempe, laxandi, discutiendi: dolores leniendi, tumores maturandi, humorum acrimoniam mitigandi & corrigendi. Folia ob aliquam salis Ammoniacalis portionem paulo magis quam radices resolvunt.

Ad quatuor præcipue Althæa utilis esse perhibetur.

1. Ad affectiones renum & vesicæ ab urinæ acrimonia, a calculo aut ab arenulis oriundas, urinæ sales mucosis suis partibus involvendo, abrafum urinariorum viarum mucum quodammodo restituendo, & arenularum descensum exitumque faciliorem efficiendo:

Deco-

Decoctum foliorum & præsertim radicum epotum aut in apozematis, emulsionibus & aliis potionibus ejusdemodi propinatur. In decoctis diureticis quoque utiliter præscribitur ad diureticorum vim & acrimoniam contemperandam.

2. Ad affectus pulmonum, tenuiorum pituitam inspissandam, acrem & salfam demulcendam, asperam arteriam corrugatam illiniendam, exsiccata emolliendam, expectorationem promovendam, in raucedine, tussi, catarrhis, asthma, phthisi, pleuritide. Tuncque radicum decoctum, Syrupus, pastilli seu rotuli & linctus ex ejus mucagine feliciter usurpantur, & nonnumquam cum medicamentis incidentibus & attenuantibus, velut Iride Florentina, floribus Sulphuris, floribus Benzoini & aliis utiliter adhibetur.

3. Ad intestinorum erosiones & dysenterias ejusdem decoctum epotum aut in clysteribus injectum prodest non quidem adstringendo, sed succorum acrium & erodentium acrimoniam retundendo & intestinorum membranas mucosae spoliatas illiniendo: necnon etiam in alvi profluvio cum adstringentibus, Tormetillæ, ex. gratia, Bistortæ, aut similibus radicibus, ad dolores mitigandos apposite quidem Althææ consociatur.

4. Denique ad tumores duros emolliendos & maturandos, dolores sedandos, cataplasmata ex seminibus, foliis, & radicibus præparata; liones quoque & foci ex eorum decoctis utiliter adhibentur, aut cum medicamentis resolventibus ad eorum vim retundendam, ubi inflammatio metuenda est, permiscuntur.

Folia paulo plus resolvunt quam radices, ratione salis Ammoniacalis quem continent.

Radices Althææ acrimonia præditæ esse arguit Georgius Segerus qui in *Ephem. German. an. 9. & 10. Observ. 100.* ex applicatione hujus radicis contusæ & in aqua simplici decoctæ, plurimas pustulas rubicundas & dolorificas membrum adeo exasperavisse, ut undique plane exulceratum apparuerit, observat. Verum perperam radicis acrimoniam pustularum eruptio tribuitur, quæ effectus est humoris acris & caustici e profundo ad summam cutem evehi, tempore nempe cataplasmatum quo humor resolutus fuit & ad perspirationem dispositus. Quinimo S. Paulli observat radicis Althææ mucilaginem aqua Rosarum extractam illiam, eos mitigare dolores, qui arte a sinapismis & vesicatoriis excitantur, si nimis molesti sint.

Dum Althææ radices in præparatis & apozematibus præscribuntur; observandum est, ne majori copia in his injiciantur, nec diutius coquantur, alioquin mucosum & glutinosum nimis fit decoctum, palato ingratum & stomacho grave. Iisdem sub finem coctionis adjiciuntur ad ℥j. pro decocti libris duabus, folia ad M. j. & flores ac semina ad ℥j. aut ℥ij. pro unaquaque libra.

24. Rad. Althææ & Nymphææ ana ℥ij. Coquantur in aquæ comm. ℥iiij. Fiat colatura, in qua dilue Nutri purificati ℥ij. Fiat decoctum per cyathos propinandum in dolore nephritico, ardore, & suppressione urinæ.

24. Glycyrrhizæ rasæ & contusæ ℥j. Rad. Althææ ℥j. Folior. Malvæ M. ij. Passu-

Pastular. exacinar. ꝑvj. Coquantur in aq. fluviatili. q. s. Fiat apozema pectorale.

24. Rad. Althææ ꝑiij. Folior. Althææ, Malvæ, florum Chamæmeli, Meliloti ana M. j. Ficum ping. n. iij. Fiat cataplasma s. a.

24. Radicum Althææ, bulbor. Lilior. ana ꝑiij. Folior. Althææ, Malvæ, Violar. Senec. & Branc. ursin. ana M. ij. Flor. Chamæmeli & Meliloti ana M. j. Semin. Lini & Fœnugræc. ana ꝑj. Radices & folia minutim incisa floribus & seminibus permixta, duobus æqualibus & aptæ amplitudinis sacculis excepta in aq. comm. q. s. vel ꝑx. ad putrilaginem usque decoquantur; sacculique manibus leviter expressi, parti inflammatae ac dolenti alternatim tepide admoveantur, per horam unam aut alteram, illisque remotis oleo. Liliorum vel. unguento. de Althæa pars affecta illinatur.

Ex Althææ radicibus præparantur Mucilago, Syrupus de Althæa simplex, Syrupus de Ibisco compositus, Tabellæ seu Pastilli, & Unguentum.

Mucilago ex radicibus coctis per setaceum extrahitur, ex qua Conditum & Pastilli cum Saccharo conficiunt, in catarrhis, rancedine & in aliis gutturis affectionibus summæ utilitatis. Externe papillarum scissuræ hac mucagine illitæ consolidantur, partes ambustæ sanantur.

Syrupus de Althæa simplex fit ex Althææ radicum & florum infuso cum æquali Sacchari portione ad syrupi consistentiam coctis. In supradictis affectionibus convenit, & apozematibus, portionibus & alii. hujuscemodi, admisceri solet. Alius Syrupus magis compositus in Officinis servatur, cujus descriptio in *Pharmacop. Regia Charas* exarata, cæteris præstantior nobis videtur, tum ad expectorationem promovendam, tum ad ciendas urinas & earum acrimoniam retundendam. Eius dosis ad ꝑj.

Tabellæ sunt quoque simplices vel compositæ, in tussi quacumque frequenter usitatæ, in pectoris affectionibus & præsertim ad pituitæ acrimoniam temperandam. Simples ex pulpa radic. in aqua decoctæ & emollitæ extractæ & cum Saccharo coctæ conficiuntur. Compositarum compositionem in *Pharmacopæa Regia Charas*, videre licet.

Unguentum de Althæa in *Pharmacopæa Regia Charas* descriptum, in quo Terebenthina, semen Fœnugræci, Scillæ laminæ & Galbanum cum Althææ radicibus consociantur, longe magis resolvit, quam simplex radicis pulpa. Usurpatur ad dolores rheumaticos & ilchiadicos sedandos, ad punctorios lateris dolores resolvendos. Tunc etiam spiritus vini Camphoratus huic utiliter admiscetur. It suppressione urinæ, illud unguentum cum oleo Scorpionum mixtum & regioni pubis illitum, tanquam præstantissimum remedium a nonnullis prædicatur.

24. Camphoræ ꝑß. Dissolve in Spiritu vini ꝑj. Solutioni adde Olei Lumbricor. terrestr. ꝑß. Unguenti Althææ ꝑjß. Croci pulver. ꝑj. Fiar linimentum quo dolens latus inungatur in pleuritide.

Præter has præparationes, radices Althææ usurpantur in Unguento Martiato, Emplastro pro fracturis, *Charas*, de Mucaginibus, de Meliloro.

Semi-

Semina usurpantur in Syrupo de Ibisco Fernelii, de Hysopo, *Mesue* : Jujubino, de Prassio, Trochiscis Gordonii, Lohoc fano, & Syrupo anti-nephritico, *Charas*.

A M Y G D A L U S.

A Mygdali species duæ sunt, quarum fructus in pharmaceuticarum Officinarum sicut & mensarum usum veniunt, scilicet Amygdalus sativa & Amygdalus amara.

Amygdalus sativa, *Officinarum* : Amygdalus sativa fructu majori, *C. C. P.* 441. *Inf. R. H.* 627. Amygdalus dulcis, *J. B.* 1. 174. Amygdalus, *Tabern. Icon.* 996. Nux Græca ; *Cordi* : vulgo, *Amandier doux*.

Radix est validis & multifidis, trunco scabro, materie dura & rufescente, foliis Persicæ angustis, acuminatis, crenatis. Flores rosacei e quinque petalis in orbem positos constantur, candicantibus vel leviter purpurascensibus, calyce montomo, quinquifido, cum pistillo abeunte in fructum unciam circiter longum, compressum, pulvinato callo obductum : ejus os perdurum est, acuminatum, & continet nucleum oblongum, album, carnosum, oleosum, & grati saporis, cuticula tenui, rufa, veluti pulvisculo resinoso perspersa, circumvestitum. Hic colitur in hortis : sed in regionibus calidis, præsertim in Gallia Narbonensi feritur in patentissimis, aridis, & arenosis campis. Fructus mensis apponitur & in Officiis pharmaceuticis ad medicamentarium usum reservatur : Amygdala & Amygdalum dicitur.

Alia duæ species sunt quarum fructus ad mensas apponuntur, scilicet Amygdalus sativa fructu minori, *C. B. P.* 441. & *Inf. R. H.* 627. & Amygdalus dulcis, putamine molliore, *C. B. P.* 442. *Inf. R. H.* 627. Hæc a præcedente differt putamine, quod fragile est, & Violæ odorem quodammodo refert : illa vero tantummodo magnitudine.

Analysi chymica, ex Amygdalarum virentium, adhuc immaturarum, quarum nucleus nondum induruit lbv. per retortam distillatis, prodierunt primo phlegmatis limpidi fere inodori, saporis aliquantisper herbacei, subacidi, ℥xv. ℥v. gr. xxxvj. humoris limpidi, manifeste acidi, ac tandem austeri, lbij. ℥viij. ℥vj. humoris sale alcali urinoso imprægnati ℥vj. gr. salis volatilis urinosi, concreti, gr. xxx. olei ℥vij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥ij. ℥v. gr. xxxvj. quæ igne reverberit calcinata reliquit cinerum leucophæorum ℥vj. gr. xlvij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥ij. gr. lxxvij. lixivio extracta fuerunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. gr. liij. in calcinatione ℥ij. ℥vj. gr. lx.

Ex Amygdalarum dulcium bene maturarum lbv. per retortam distillatis, prodierunt phlegmatis limpidi, saporis & odoris expertis, obscure salis & obscure acidi ℥v. ℥ij. gr. ix. humoris limpidi, odoris aliquantisper ingrati & saporis subacidi, obscure austeri, ℥vj. gr. xvij. humoris primum limpidi, rufescentis deinde fusci, sale volatili urinoso imprægnati ℥v. ℥iiij. gr. xvij. olei fluidi lbj. ℥ix. ℥iiij. gr. xxxix. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥xij. ℥vij. gr. lxxij. quæ

igne

igne reverberii per 12. horas calcinata reliquit cinerum, ℥ij. ℥j. gr. lxxvj. ex quibus salis fixi alkali ℥ij. gr. xxj. lixivio extracta sunt. Partium satura in distillatione fuit ℥xij. ℥v. gr. lxxix. in calcinatione ℥xj. ℥v. gr. lxxix.

Oleum per retortam multoties distillatum plurimum humoris aquei acris, tum acidi, tum alkali urinosi, disjicit, aliquantulum capitis mortui nigri in retortæ fundo relinquendo, ita ut totum oleum per iteratas distillationes converti videatur in terram nigram, aquam, & aliquam salis tum acidi, tum alkali urinosi portionem admodum exiguam.

Maturæ igitur Amygdalæ oleo copioso constare videntur, multo phlegmate, mediocri salis acidi, & exigua salis ammoniacalis portione, cum pauca terra subtili. Econtra Amygdalæ immaturæ perparum admodum olei præbent, multum phlegmatis acidi, ita ut oleum nihil aliud esse videatur, quam sal acidus & aqua cum inflammabili principio seu igne elementari certo quodam modo conjunctis & mixtis, ut jam alibi demonstravimus.

Ex Amygdalis contusis oleum limpidum exprimitur & quidem magna copia: Si cum aqua paulatim contundantur in liquorem lacteum convertuntur, sapore dulcem & gratum particulis oleosis & aqueis, mediantibus salibus, intime conjunctis. Lacteus ille liquor veluti lac per tempus aliquantisper acescit, ab acidis affusus nonnihil grumescit, ita ut quædam pars caseosa coagulata separari possit, necnon etiam assidua agitatione nonnihil butyrosæ substantiæ fundit, ac proinde lac tenue merito dici potest.

Amygdalæ diu asservatæ oleosæ sunt & rancidæ, exhalata nimirum humiditate qua oleum adeo divisum erat ut sensibus percipi non posset. At vero per tempus exhalatis aqueis particulis, olei partes salibus onustæ coadunantur & palatum ac nares graviter feriunt.

Amygdalæ dulces recentes corpus nutriunt, non abunde tamen, quidquid econtra nonnulli affirmant; & alimentum crassum suppeditant. Quorundam ventriculum gravant, quorum succus digestivus debilior est. At endendum quoque Amygdalas edendo ut probe dentibus comminuantur, antequam deglutiantur. Si enim sub dentibus non accurate commoventur, adeo densa & compacta est earum substantia ut particulas deplurimas integras rejectas videas. Ad varios, lautosque mensarum usus adhibentur. Saccharo incrustatæ bellaria præbent, varique ex illis scitamenta dulciarii parant, quæ inter gulæ potius irritamenta, quam viæ præsidia annumerantur. Egrotantibus tamen quandoque exhibentur ac humores aciores leniendos, & tenuiores inspissandos, unde tabidis & micilentis escam præbent non infalubrem.

Eligi debent recentes, non rancidæ, extus fulvæ, planæ, non rugosæ, intus albiissimæ, sapore dulces & gratæ. Nam vetustate, ut jam diximus, aqua humiditas absorbitur & evaporatur, adeoque evadunt ex us rugosæ, intus flavescientes oleosæ & acres. Nec illud videtur præmittendum, semper & in omni usu detrahendam esse pelliculam flavam in carni candidæ immediate adhærentem. Fulco enim pulvisculo resinoso & acri configitur, quo comedentium fauces sæpius irritantur & tussis excitatur.

Exhi-

Exhibetur autem sub emulsionum nomine lac seu cremor Amygdalinus, qui sic præparatur.

Somuntur Amygdalæ dulces recentes: Aquæ calenti immerguntur donec pellicula fuerit emollita, quæ detrahitur. Postea in mortario marmoreo probe contunduntur, sensim affundendo decocti Hordei, Seri Lactis, vel liquoris alicujus convenientis ℥i. vel ℥j. pro singulis Amygdalarum drachmis; & colatura fit cum expressione, cui Sacchari cantilum vel Syrupi alicujus q. s. adjicitur ad gratiam huic Cremori majorem conciliandam. Urinas promovere dicitur sicut cætera diuretica quæ improprie frigida dicuntur, quæ quidem serum expellunt per accidens tantum, ut ajunt, vel massam sanguineam inspissando & ejus feri infusionem provocando, vel renum inflammationem sedando, unde illæ partes ad pristina sua munera aptiores fiunt. Eandem ob causam vis anodyna ipsis tribuitur. Emulsionem ex hoc cremore ægrotantibus offeruntur in febribus ardentibus, vigiliis nimis, urinæ ardore, tenam & vesicæ inflammatione, doloribus quibuscunque, diarrhæis, dysenteriiis, hæmorrhagiis. Phthisicis & emaciatis cremor ille utiliter præscribitur, præsertim si tudes colligativi immineant. Lactis enim vires quodammodo adimpler, acris feri sanguinis spicula retundendo & involvendo, pariumque segregationem impediendo: nec iisdem noxis obnoxius est, non enim adeo facile acefcit, nec tor sulphureis particulis donatur, quæ ab humorum æstu accenduntur. Non solum ut medicamentum illi ægrotis proponitur, sed etiam ut alimentum conveniens. Oryza enim vel Hordeum perlarum in hoc Amygdalino cremore decocta idoneum præbent alimentum quod æstuantibus humores facile domare potis est, & ab iisdem vehementer æstuantibus in effervescentiam compelli nequit.

Nonnulli mori auctoritate Avicennæ dicentis, Amygdalas ob suam unctuositatem movere cholera, sibi persuadent non tutum esse cremoris Amygdalini usum febricitantibus & iis, qui stomachum biliosum habent, facile inflammari, caput gravare, nec vulnerato capite ægrotantibus utendum esse. Verum licet unctuositas illa, levissima quidem in Amygdalis negari nequeat, terrestribus particulis irretitur; quapropter nihil quicquam nocuentorum jam dictorum experientia quotidiana omnium fere Medicorum demonstravit: quinimo ex Amygdalino lacte aut emulsionibus ægrotantes fere omnes in febribus acutis & colicis morbis maximum solatium atque levamen accipere, quotidie exploramus.

Ex Amygdalis dulcibus oleum dulce recenter expressum frequenter usurpatur, tum ad humorum acrimoniam demulcendam, tum ad crispas aut induratas partium fibras emolliendas & laxandas, in inflammationibus, urinæ ardore & suppressione, colicis doloribus ac nephriticis, tussi molesta, ad expectorationem promovendam, urinas pellendas, alvum subducendum, dolores compescendos, ita ut a plurimis Panacea merito habeatur. Est sane medicamentum *versiflorum*, ad multa efficax, blandum & gratum: sed recenter expressum esse oportet. Exhibeatur ad ℥j. ℥iij. vel ℥viij. & pro necessitate reiteratur tertia vel quarta quaque hora. Pulmoni & pectori utilissimum est. Recens expressum Syrupum alicui bechico ut Althææ, Capillor. Vener. Papaver. Rhæad.

Rhæad. Hyssopi aut Hederae terrestris assusum, una agitare, miscere; adeoque bibendum præbere, parva quidem quantitate una vice, solent, & sæpius repetere illius usum, vas denuo agitantes: nam oleum a syrupo facile recedit, eique supernatat.

Ad infantium tormina cochlearium propinatur cum syrupo Capillor. Vener. de Althæa vel de Cichorio composito cum Rheo. Ad eorundem tussim vehementiorem, cum Syrupo Papaveris Rhæados vel Diacodio. Purperis aliquot uncias ad dolores post partum demulcendos in jasculo vel scissas exhibentur. Similiter pleuritidis initio post venæ sectionem, aliquot illius uncias per intervalla sumptas incipientem pleuræ inflammationem mire discutere valent. In nephriticis affectionibus idem oleum cum aqua vel decocto Parietarum, syrupo de Limonibus, de Ibisco, aut alio utiliter propinatur: & hæc potio oleosa reiteratur, prout res postulat.

Hoc assatim bibitum in colicis affectionibus quibuscumque, in alvi siccitatis, & constrictione plurimum valet & est præterea singulare convulsionum remedium. Clysteribus permiscetur utiliter ad ℥iij. vel ℥viij. in colicis doloribus, alvinis obstructionibus, dolore nephritico, tenesmo, dysenteria.

Externe iunctum sæpius & calide tonsillarum tumores resolvit, pleuræ inflammationem & partium dolores lenit, durities emollit, cutis asperitatem tollit, quapropter inter cosmæica medicamenta usurpatur.

℥i. Amygdalar. dulc. a pellicula mundatar. paria vi. Contundantur in mortario marmoreo, sensim affundendo Decoct. Hordei vel Aquar. Portulacæ aut Lactucæ q. s. Fiat emulsio pro duabus dosibus. Unicuique adde Syrup. de Nymphæa ℥j. ad sitim extinguendam & æstum temperandum, in febribus, cæterisque calidis affectionibus pulmonum, pleuritide, peripneumonia, quarta quaque hora.

℥i. Amygdalar. dulcium excorticatarum ℥ss. Seminum quatuor frigidiorum majorum ana ℥j. Semin. Althæa ℥ij. Contunde, ut artis est, & affunde Decocti Hordei, & Liquiritiæ ℥ij. Fiat Emulsio, in qua dissolve salis prunellæ ℥j. Syrup. de Althæa ℥ij. Sumatur per vias in renum arloribus, gonorrhæa ad humoris & urinæ acrimoniam demulcendam.

℥i. Amygdalar. dulc. excorticatar. ℥ij. Semin. Melon. & Card. bened. ana ℥j. Aquar. Scabiosæ, & Scordionner. ana ℥vj. Adde Diaphoretic. miner. gr. xxx. Syrup. Caryophyllor. hortens. ℥ij. Fiat emulsio s. a. pro duabus dosibus in variolis & morbillis.

℥i. Amygdalar. dulcium & quatuor frigidior. major. Semin. ana ℥j. Contunde, ut artis est, cum aq. Nymphææ, Lactucæ, & Portulacæ ana ℥ij. Fiat colatura cum expressione. Adde Syr. Nenupharis, & Diacod. ana ℥ss. Fiat emulsio pro una dosi ad somnum conciliandum.

℥i. Aquæ vel Decocti Parietar. ℥iij. Syrup. de Althæa vel Limon. ℥j. Olei Amygdalar. dulcium recens & sine igne expressis ℥j. Fiat potio uno haustu sumenda, & sæpius iteranda in dolore nephritico, urinæ ardore & suppressione, præmissis præmittendis.

℥i. Mann. Calabr. ℥ij. Solve in decocti carnis vitulinæ ℥vij. Solutioni transcola-

scolatæ adde Olei Amygdalar. dulc. ℥j. Sumat æger in colicis doloribus, ad alvum blande subducendam.

24. Confect. universal. Mann. Glabr. ana ℥j. Dissolvantur & bull. leviter in Aqu. Plantag. ℥vj. Colaturæ adde Olei Amygdalar. dulc. ℥j. Fiat posio purgans, in dysenteria & alvi profluvio.

25. Syrup. de Cichor. comp. cum Rheo, & Olei Amygdalar. dulc. recens expressi ana ℥j. Misceantur & cochleatim infantulis exhibeantur ad tormina ventris sedanda, ventriculi & intestinorum saburram eliminandam.

26. Olei Amygdalar. dulcium ℥j. Spermat. Ceti ℥ij. Dissolvantur, & misceantur. Fiat linimentum ad maculas & asperitates cutis.

Amygdalæ dulces usurpantur in Ele&uario Diaphænico, Trochiscis Gordonii, Pb. Reg. Charas.

Amygdalas dulces tenellas, & virentes, antequam officula induruerint, mensisecundis inserunt, & integra una cum tegumentis essant præsertim Saccharo conditas: suntque revera subacido sapore palato acceptæ, sed prævum præbent alimentum.

Amygdalus amara, *Officinarum*: Amygdalus amara, C. B. P. 441. J. B. 1. 174. *Inst. R. H.* 627. Ab Amygdalo sativa dulci non differt nisi fructuum amarore; de cæteris conveniunt.

Analysi chymica, ex Amygdalarum amararum ℔v. prodierunt phlegmatis fere insipidi & inodori, obscure salis & obscure acidi ℥v. humoris ingrati, subacidi, obscure austeri ℥vij. gr. xiiij. humoris limpidi, rufescentis, empyreumatici, tum subacidi, tum sale volatili urinoso imprægnati ℥ix. ℥iij. olei rufescentis ℔ij. ℥vj. ℥j. Massa nigra in retorta residua pendebat ℔j. ℥ij. ℥ij. gr. xxxvj. quæ per 12. horas igne reverberii calcinata reliquit cinerem ℥ij. ℥iij. gr. xxvij. ex quibus salsis fixi alcali ℥j. gr. xiiij. lixivio fuerunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥vij. ℥ij. gr. xxiiij. in calcinatione ℥xv. ℥vij. gr. ix.

Licet olea empyreumatica, tum ex amaris, tum ex dulcibus Amygdalis distillata, empyreuma redoluerint, gustu tamen acrius est amararum, quam dulcium oleum. Deinde oleum expressum ex Amygdalis amaris odorem tantillo penetrantiorē spirare videtur, quam quod ex dulcibus expressum est. Horumce oleorum acrimonia & subtilis odor a volatilibus pendent salibus, qui paulo majori copia in amaris, quam in dulcibus deprehenduntur. Amaror autem a particulis crassioribus oritur, salinis potissimum; quandoquidem amarus in expresso oleo saporem minime distinguitur, licet expressum magna intensam ferret amaritiam. Et amaræ illæ particule fortasse a sale cathartico amaro non multum dissimiles sunt, oleo crassiori, & terræ subtili implicite.

Amygdalis amaris vis incidendi, abstergendi, aperiendi, urinas promovendi, ac vermes enecandi tribuitur. Rarius tamen propter amarorem ad usum internum usurpantur. Eorundem oleum expressum urinas ciere, alvum laxare, expunctionem promovere, & blande flatus discutere dicitur, si ejus dimidia vel integra uncia cum jasculo hauriatur.

Ætus hoc oleum commendatur, ad inflammationis sedandas, tumores resol-

solvendos, dolores mitigandos, & oleo Amygdalarum dulcium potentius resolvit. Tonsillarum inflammationem resolvit, si collum eo inungatur. Aurium fordes induratas emollit, & resolvit: idcirco efficax ad surditatem, & aurium tinnitum vulgo habetur, si gossypium hoc oleo madidum auri indatur: sed perperam si ab alia causa surditas oriatur, siquidem Fridericus Hoffmannus observat surditatem aut gravem auditum sæpiissime ejus usu auctum fuisse, eo quod tympani membranam nimium laxaverit. Idem auctor in tympanitide sequens oleum commendat.

℞. Amygdalar. amar. ℞j. Semin. Cymin. Absynth. ana ℞ss. Contunde in mortario & misce. Postea in lagena stannea, per quatuor horas, in atheno aqua serventissima pleno coque, deinde fortiter exprime. Prodit oleum viride. Dos. ℥ij. vel ʒss. mane & vespere in iulculo: & sæpius etiam venter hoc oleo inungatur.

Præterea oleum Amygdalar. amarar. faciei maculas a sole oriundas tollit: cum oleo ovorum mixtum, & inunctum variolarum foveolas præcave potius est.

Ad manuum nitorem, lævoremque conservandum usurpari solet magma ab olei expressione relictum, & exsiccatum, quo aqua diluto manus lavari, fricarique solent, & quovis Sapone præstantius est.

Observandum est Amygdalis amaris aves, vulpeculas, catellos, & animalia quamplurima, homine excepto, convulsionibus sæpe deleteriis affici; quod quidem magis exquisito fibrillarum nervosarum gulæ, & ventriculi horum animalium sensui tribuendum est, quo fit, ut ab his amaris, particulis gravius lædantur quam in homine, facilius crispentur, vehementius confringantur, convellantur.

Amygdalas amaras quinas vel lenas ante pastum comestas ebrietatem arcere vulgaris est opinio. Novimus tamen, inquit J. Bauhinus, qui remedium illud adversus ebrietatem in usu habentes, nihilo fecius a Bacchio obruuntur.

Amygdalæ amaræ usurpantur in Eleqtuario de Baccis Lauri, & Trochiscis de Capparibus.

A N A C A M P S E R O S.

A Nacampseros, Telephium vulgare, Fabaria, Faba crassa, Faba inversa, Crassula major. *Officinarum*: Anacamperos, vulgo Faba crassa, J. B. 3. 681. *Inf.* R. H. 264. Telephium vulgare, C. B. P. 287. Telephium alterum sive Crassula, *Dodon. Pempt.* 130. Fabaria, *Matthiol.* Scrophularia media vel 3. *Brunsfelsii*: Acetabulum alterum, *Cordi*: vulgo. *Orpin*, *Reprise*, *Grassette*, *Joubarbes des vignes*.

Radice est tuberculis carnosis, candidis, strumosa; caulibus rectis, teretibus, solidis, in ramulos aliquot divisus, palmum unum, aut alterum alris, quibus perquam crebra adnascuntur folia surrecta, carnosia, crassa, succulenta, Portulacæ foliis longiora, colore glauco, rubedine aliqua subinde persuso, crenata, ut plurimum, licet interdum integra sint.

sint. Flores in summis caulibus & ramulis insident in umbellas digesti, rosacei, pentapetali, rubentes & non raro albicantes, cum pluribus staminulis. Ex floribus calyce surgit pistillum quod abit in frustum ex quinque veluti capsulis vaginarum æmulis in capitulum quoddam collectis, compositum, seminibusque sætum perexiguis. Flore & fructu cum Sedo convenit, sicut & foliis crassiusculis, succulentis: ab eo tamen distinguitur, quod a prima statim germinatione excaulescat, cum folia Sedi in globulos oculi bovilli æmulos congerantur. In sylvis umbrosis & humidis maxime & ad sepes nascitur. Usu sunt radices & folia.

Analysi chymica, ex plantæ floridæ lbv. per retortam distillatis prodierunt phlegmatis limpidi, aliquantisper odorati, obscure falsi & obscure acidi ℥x. ℥vij. gr. xxiii. humoris primum limpidi, subacidi, deinde rufescentis, manifeste acidi, ac tandem fusci, intense acidi & austeri, empyreumatici, lbij. ℥xij. ℥iiij. gr. vj. humoris fusci, obscuri, empyreumatici, intense acidi, austeri & sale volatili urinoso imprægnati ℥j. ℥ij. gr. lxij. olei crassitudinis adiposæ ℥vj. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥iiij. ℥j. gr. xlj. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥j. gr. lxvj. ex quibus salis fixi ℥j. gr. xlij. mere alcali extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥j. gr. xxxix. in calcinatione ℥ij. ℥vij. gr. xvij.

Anacamperotis succus aliquantisper glutinosus est, & chartam cœruleam rubro colore inficit; sale acidum austerrimum continet sal aluminofo haud dissimilem, cum aliquantisper salis Nitrosi Ammoniacalis, & sulphuris portione mediocri commixtum. Hoc mucoso & subacido succo sarniei ulcerum erodentis acrimoniam retundit, spicula salina, acria, involvendo & irretiendo.

Ex Anacamperotis radicum recentium lbv. per retortam distillatis, prodierunt phlegmatis limpidi, saporis & odoris aliquantisper aromatici, non ingrati, subacidi lbij. ℥xiiij. ℥vij. humoris primum limpidi, saporis aromatici, manifeste acidi, deinde fusci, empyreumatici, intense acidi & austeri lbj. ℥iiij. gr. lx. humoris rufi, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥j. ℥ij. olei ℥j. ℥iiij. gr. xxxvj. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥vj. ℥vj. gr. xxiiij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥iiij. gr. xxxvj. ex quibus salis fixi mere alcali ℥ij. gr. xxvij. lixivio fuerunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥ij. gr. xxxiiij. in calcinatione ℥v. ℥j. gr. lx.

Per hanc analysim liquet has radices sale tum ammoniacali, tum aluminofo constare & oleo copioso tum tenui & aromatico, tum crasso. Radices plus olei & quidem tenuis & aromatici continent quam folia, & majorem salis ammoniacalis portionem: unde magis resolvunt quam folia. Hæc vero major acidi nitrosi salis portione donantur, quo refrigerant magis & abstergunt.

Internus Anacamperotis usus fere nullus est aut saltem rarissimus. Foliolorum succus in poru usurpatus a nonnullis in hæmoptisi, ulceribus internis & hæmorrhoidum affectionibus laudatur. In clysteribus eorum decoctum ad consolidanda intestinorum ulcera in dysenteria cum reliquis vulnerariis utiliter usurpatur: detergit enim & adstringit.

Externe in recentibus vulneribus sanguinem sistit, ulcera, detergit, & ad cicatricem perducit, tumorum suppurationem promovet, dolores

mitigat, præsertim hæmorrhoidales, tum planta contusa & in cataplasmaris formam redacta, tum ejusdem succus expressus. Nonnulli ad inflammationes sedandas totam plantam in mortario plumbeo contundunt & cum oleo Rosarum terunt. A Friderico Hoffmanno ejus succus in ulceribus uteri, & ejus excoriationibus plurimum commendatur.

Radices contusæ & cum insalfo butyro coctæ vel tritæ in unguenti consistentiam in hæmorrhoidum inflammationibus plurimum valent. Imò eadem radices recentes tot quot hæmorrhoidalia in ano tubercula prouberant, loco amuleti de collo filo usque ad Os sacrum suspensæ a Vedio & Estmullero multum prædicantur: marcescentibus enim radicibus, si illis credere fas est, tubercula tabescunt & evanescunt.

Silentio prætermitto Sympathicam herniæ inguinalis curandæ virtutem, quæ ipsis tribuitur, urpote admodum incertam.

Aqua ex tota planta distillatur, quæ per aliquot dies continuo bibita ad vulneta & ulcera interna laudatur.

Anacamperos usurpatur in Aqua vulneraria.

Alia est Anacamperotis species cujus radix in usum nonnunquam veniit: dicitur.

Rhodia Radix, *Offic.* Anacamperos radice Rosam spirante, major, *Inst. R. H.* 164. Rhodia radix, *C. B. P.* 286. *J. B.* 3. 683. *Dodon. Pempt.* 347. A Telephio vulgari parum differt, nisi radice odore saporeque Rosarum consimili. Radix sola in usu est. Cephalica & adstringens habetur. In adstringentibus decoctis quandoque usurpatur. Externe in capitis doloribus ex aplicatione contractis contusa & cum aqua Rosarum vel Verbenæ decocta fronti admoventur & circumligatur.

A N A G A L L I S.

A Nagallidis species duæ in Officinis usitatæ sunt, quarum una mas dicitur, altera foemina, quæ nonnisi floribus colore inter se discrepant.

Anagallis mas, *Off.* Anagallis phœniceo flore, *C. B. P.* 252. *Inst. R. H.* 142. Anagallis phœnicea, mas *J. B.* 3. 369. Anagallis mas, *Dod. Pempt.* 32. vulgo, *Mouron a fleurs rouges.*

Radice alba, simplici, fibrata donatur, cauliculis infirmis & humifusis palmaribus, quadratis, lævibus, quos folia bina opposita, nonnunquam terna singunt Alines mediæ paria, absque pediculis, inferna superficie punctis ex rubro nigricantibus guttata. Flores ex alis foliorum singularim exeunt, pediculis tenuibus oblongis nixi, monopetali, in quinque segmenta acuta totidem folia imitantia ad unguem fere divisi, phœnicei, cum staminibus purpureis, apiculis luteis & calyce quinquifido, ex quo surgit pistillum mediæ floris parti ad instar clavi infixum, quod abie infroctum seu restam fere globosam, pro plantulæ modo grandem, per maturitatem in duas partes quarum altera alteri incumberebat transversa dehiscens & seminibus foetam exiguis, ut plurimum angulosis, rugosis, subfuscis, placenta affixis.

Ana-

Anagallis foemina, Off. *Anagallis caerulea* flore, C. B. P. 242. *Anagallis caerulea foemina*, J. B. 3. 369. *Anagallis foemina*, Dod. *Pempt.* 32. vulgo, *Mouron a fleurs bleues*. Solo floris colore a praecedente diversa est. Nunquam flore albo floret. In campis & hortis agri Parisiensis utraque frequens nascitur. Usus est foliorum cum floribus.

Instituta Anagallidis maris analysi chymica, totius plantae floridæ Bv. per B. V. distillatæ præbuerunt phlegmatis limpidi odoris & saporis herbacei lbj. ℥xiiij. humoris manifeste acidi lbj. ℥xiv. ℥ij. quod in alambice supererat pendebat lbj. ℥ij. ℥vj. ex quo per retortam distillato prodierunt humoris fuscii tum intense acidi, tum manifeste alcali urinosi ℥iiij. ℥ij. gr. xxxvj. cum salis alcali urinosi concreti granis aliquot: olei syrapi ad instar crassi ℥j. ℥ij. gr. xxxiv. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥viiij. ℥i. quæ per horas quatuor in crucibulo igne reverberi calcinata reliquit cinerum leucophæorum ℥iiij. ℥vij. ex quibus salis fixi salis ℥ij. gr. xxj. lixivio fuerunt extracta. Partium iactura in prima distillatione vaporosa fuit tantummodo ℥vij. in altera per retortam ℥v. gr. xij. in calcinatione vero ℥ij. ℥ij.

Totius plantæ sapor herbaceus est, subsalsus, austerus. Ejus succus chartam caeruleam rubro colore tingit: unde concludere possumus essentialem hujus plantæ salem ad terram foliatam Tartari proxime accedere cum aliqua salis Ammoniacalis portione & oleo copioso permixtum.

Anagallis utraque *Cephalicas* inter plantas recensetur. Sudoriferæ sunt & vulnerariæ. *Anagallis* flore phoeniceo potissimum in usa est. In mania, phrenitide febres ardentes comitante, in epilepticis, convulsivis & hypochondriacis affectibus, necnon adversus infantium tormina utiliter usupatur. Succus vel decoctum præscribitur. In mania succus vel decoctum ad ℥iiij. ter die propinatur. *Anagallis* adversus pestem mire conducere Tragus asserit ita usurpatam ut postquam ex illa in vino decocta mediocrem haustum ægri acceperint, in lecto se componant bene contesti & sudabunt. Idem decoctum muliebres menses movet. Ad phthisim, pulmonum tabem, sputum scetidum & purulentum Joannes Rayus distillatam *Anagallidis* maris aquam cum pari vaccini lactis quantitate permixtam & Sacchari optimi q. s. edulcoratam, quotidie mane & vesperti ad ℥vj. epotam tanquam medicamentum multoties expertum commendat.

Anagallidis succus aut decoctum ex aqua vel vino ulcera mundificat & sanat, medeturque serpentum & viperarum ictibus & canis rabidi morfui, & bibatur aut si ex eodem vulnera colluantur, & herba contusa imponatur: dolores mitigat.

Usurpatur in Unguento mundificativo de Apio.

A N E T H U M.

A *Nethum*; Off. *Anethum hortense*, C. B. P. 174. *Inf. R. H.* 317. *Anethum*, J. B. 3. 2. 6. *Dod. Pempt.* 298. vulgo, *Anei*. Radice est gracili, singulari, alba, fibrata, caule sesquicubitali, ramoso, firmo, foliis Fœniculi sed minoribus, glaucis, odore gravi. Flores in summis amulis oriuntur in umbellam congesti, rosacci, & quinque petalis

Juteis conflati, quorum calyx mutatur in duo semina ex flavo pallescentia, ovata, compressa, lineam longa, tribus striis distincta & limbo foliaceo cincta.

In hortis seritur, & semel satum sæpe quotannis ex deciduo semine reviviscit.

Gravis utcumque est Anethi halius, sed tamen jucundus ac suavis.

Semen in primis usitatum est, deinde summitates & folia.

Analyti chymica, ex Anethi summitatum floridarum ℥v. prodierunt phlegmatis limpidi, odorati, manifeste acidi ℔ij. ℥j. ℥iij. gr. xxij. humoris limpidi, adhuc odorati, intense acidi ℔j. ℥vij. ℥vj. gr. xv. humoris rufescentis tum acidi, tum salis ℥v. ℥v. gr. xvij. humoris fusci, urinosi, & multo sale volatili urinoso sceti ℥v. ℥j. gr. xxxvj. olei tum essentialis fluidi & flavescens, tum fusci spissioris ad instar axungiae ℥ij. ℥ij. gr. xij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥v. ℥iij. gr. xij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥iij. gr. liij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥j. gr. lx. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥xi. ℥vj. gr. lj. in calcinatione ℥ij. ℥vij. gr. xxx. unde liquet hanc plantam sale ammoniacali & oleo tum tenui, tum crasso copioso turgere.

Anethum ratione ejus olei & ammoniacalis salis inter carminantia recensetur medicamenta, seu quæ viscidos ac lentos humores incidunt ac dividunt. Revera status & abdominis aut ventriculi distensiones quæ lentorum ac tenacium humorum effervescentiam comitantur, sale ammoniacali & oleo mire dissipat. Idcirco in colicis doloribus & flatulentis intestinorum affectionibus, quæ a causa, ut ajunt, frigida, seu partium atonia aut humorum lentore pendent, usurpatur & prodest: ciborum concoctionem juvat: singultri, vomituique medetur, modo ab humoribus tenacibus & acribus ventriculi parietibus inhaerentibus, ejusque membranas moleste vellicantibus ortum duxerint: urinas & menses provocat; resolvendo nempe obstructions renum aut uteri: lac nutricibus augeat, chyli tenuiorem ac fluidiorem efficiendo, adeo ut intricata mammarum vasa facilius permeare queat. Vis anodyna a nonnullis ipsi tribuitur: somnum vero conciliare valet & dolores pacare, non diversa ratione ab ea, qua Crocus, Nux moschata, & alia aromata oleosa hujuscemodi consopire valent. Semen ad ℥j. usurpatur.

Extrinsicis summitates, folia & semina in cataplasmatibus & sementibus resolyventibus usitata sunt ad tumores resolvendos vel maturandos. In encimaribus carminantibus semen & flores usurpantur: flores enim quatuor carminantibus floribus annumerantur, scilicet floribus Chamæmeli, Melilori & Matricariæ. Semina recentia contusa & puerorum temporibus apposita placidum somnum accersunt.

Ex Anetho in Officinis præparata asservantur, Aqua distillata, Oleum essenziale, & oleum per infusionem paratum.

Aqua odora ex tota planta distillatur iisdem virtutibus instructa, sed longe debilioribus. Præstantiores vero Oleum essenziale obtineri, carminans & anticolicum eximium. Ad guttas ij. vel iij. intus sumitur. Illi proxime accedit Oleum Anethi per infusionem præparatum, quo in colicis doloribus abdomen, in cephalalgia caput & tempora illiniuntur.

2. Decoct. folior. & seminum Anethi ℥vj. Theriaces veteris ℔j. Olei essential. Anethi guttas iiij. Syr. Menth. crispæ ℥j. Fiat julap. in colico dolore.

2. Rad. Althææ ℥ij. Summitatum Chamæmel. & Melilot. ana Pug. ij. Semin. Carvi & Aneth. ana ℥j. Coq. in aq. fontan. ad ℔j. cum Mell. Anthos. ℥ij. Fiat enema in colico dolore.

2. Olei essentialis Aneth. gutt. iiij. Olei Amygdalar. dulcium recentis express. ℥℔. Misce. Fiat haustus ab Otthon. Heurnio in singultu contumaci commendatus.

Summitates Anethi usurpantur in Oleo vulpino. Oleum per infusionem in Emplastro de Ranis cum Mercurio, Empl. Diachylo gummato, & Empl. de Mucaginibus.

A N I S U M.

Anisum vulgare, Off. Cuminum dulce *Quorundam*: Apium Anisum dictum. *Inst. R. H.* 305. Anisum herbariis, *C. B. P.* 159. Anisum, *J. B.* 3. 2. 92. vulgo, *Anis*.

Radice est exili, annua, fibrata, alba; foliis inferioribus subrotandis, læte virentibus, unciam superantibus, trifariam divisis, crenatis & glabris: superiora vero multifida sunt; caulis ramosus, striatus, cavus, flores sustinet in umbella dispositos, exiguos, rosaceos, & quinque petalis bifidis, candidis, constantes, cum calyce abeunte in fructum oblongum, turbinatum, ex duobus seminibus exiguis, gibbis, & striatis constatum, colore ex viridi cineraceo, odore ac sapore dulci, gratissimo, cum jucunda quadam acrimonia. Seritur copiose in Gallia apud Turones.

Anisi semen præcipue in usum est: herba raro in usum venit: radix tanquam inutilis.

Analyti chymica, ex totius Anisi plantæ recentis ℔vj. dempta radice, per balneum vaporarium prodierunt phlegmatis limpidi odori ℔j. ℥ij, absque ullo manifesti acidi indicio: humoris limpidi, acidi, occulti primo, deinde manifesti ac tandem intensi ℔ij. ℥iiij. cum olei essentialis tantillo. Herba in alambice residua, exsiccata, per retortam distillata præbuit humoris tum acidi, tum alcali, urinoso sale sæti ℥j. ℥iiij. gr. lx, olei tum tenuioris & essentialis, tum spissi ad instar axungie ℥v. gr. xxxiiij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥ij. ℥vj. gr. xxxvj. quæ igne reverberii per sex horas calcinata reliquit cinerum nigrorum ℥j. ℥j. gr. lx. ex quibus salis fixi mere alcali ℥vij. gr. xxvj. fuerunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℔j. ℥v. ℥iiij. gr. xiiij. in calcinatione vero ℥j. ℥iiij. gr. xlvij.

Semen multo plus olei essentialis continet quam cæteræ hujus plantæ partes, illudque fundit majori vel minori quantitate prout recens est & bene maturum aut vetus & exsuccum. Duplici modo extrahitur. Vel semen contusum aqua per viginti quatuor horas maceratur ac tandem igne vegeto distillatur. Aqua odorata extrahitur cui oleum limpidum Anisi lupernatæ rite separandum. Vel Anisi semen contusum seraceo imponitur. Seraceum linteo obiectum aquæ bullientis vapori expositum detinetur donec

femen madeat. Madidum & calens adhuc semen limbo involvitur, prælo subjicitur, & fortiter exprimitur. Sic oleum subviride odoratum, palato gratum ac dulce diffuit a ʒvj. ad ʒix. & amplius ex singulis Anisi libris. Illud oleum frigore facile concrefcit ob copiofum falcm acidum, tenuem tamen & cum oleofis partibus intime admixtum, atque conjunctum. Sapor Anifi dulcis oritur ab eorundem acidorum falium fubtilitate & accurata cum oleofis particulis mixtura: qualis in Saccharo, Mello & fale Saturni deprehenditur.

Anifi femcn inter quatuor femina calida majora primum locum obtinet. Sunt autem femina Anifi, Fœniculi, Cumini & Carvi: minora vero funt femina Ammeos, Amomi, Dauçi & Apii. Hæc autem femina a Pharmacopœis camminativa, hoc est, flatus discutientia vocitantur.

Veteres Medici in ventriculo frigido & humido semen Anifi tanquam ftomachicum eximium commendarunt. Hinc in difficili ciborum concoctione, quæ a ventriculicruditatibus, aut ajunt, oriuntur, ut in colico dolore, singultu, dolore capitis, vigiliis, diarrhæis, Dyspnœis & aliis hujuscemodi felicitur usurpatur. Lactis coagulationem in nutricum mammarum præcavet. In lacte ebullitum & propinatum uberem lactis copiam nutricibus suppeditat: aliis suavem somnum conciliare solet. In infantium torminibus & doloribus colicis a pituita crassa ac viscida plurimum conducit, humores viscidos ac tenaces dividendo & solvendo, ut de Anetho diximus, cui longe præstat. Eorundem convulsivos motus a prava ciborum concoctione oriundos sedat, unde ab Helmontio solamen intestinorum audit. Heurnius semine Anifi pulverato & ad ʒj. cum pulve propinato infantes tam valide purgari asserit, quam ætate provectiores Rhabbarbaro. In raucedine, tussi, asthma, difficili respiratione atque pectorisdoloribus punctioris, statulentis, qui ab humore crudo seu tenaci ac viscido nascuntur, felicitur usurpatur, & a quibusdam anima pulmonum dicitur. Urinas & menses promovet. Præterea cum purgantibus medicinis sæpius consociatur ad earum vim temperandam, & tormina quæ ab illis excitantur præcavenda.

Pulvis a ʒj. ad ʒj. intus sumitur solus vel cum Saccharo permixtus: vel ejus insusum in vino, aqua vitæ aut aqua simplici propinatur. Semen integrum Saccharo involutum sæpe etiam deglutitur. Ejus oleum tum expressum, tum distillatum in usu sunt, sicut & spiritus. Oleum expressum iisdem virtutibus ac semen donatur, sed valentioribus præsertim distillatum; a gutt. ij. ad x. vel xx. præscribuntur. Commendantur potissimum in respiratione difficili, asthma, tussi sicca: & ex oleo Anifi expresso paratur balsamum sulphuris Anisatum, non contemnendum his in affectionibus præsidium. Attamen de oleo Anifi Joannes Junckerus scribit in suo *Conspectu Medicinæ Theoreticæ præticæ*, illud in pectoris affectionibus nisi summa cum circumspectione adhibendum esse, ne phibicis & hæcicis febrilibus symptomatibus viam sternat. Heurnius observat, pulverem seu decoctum Anifi in colicis doloribus longe præferenda esse ejus oleo.

Tanta est autem olei Anifi subtilitas, ut si brevi post exhibitionem lac emulgeatur, odor ejus in eo adhuc deprehendatur. Forestus illud contra san-

sanguinis suffusiones, & contusiones in primis nervosarum parium externe admodum, singulare, & experitissimum remedium pronuntiat. Eodem adversus infantium tormina umbilicus inungitur.

Spiritus Anisi vel ex Aniso in aqua macerato, & fermentato præparatur, vel sola hujus seminis in aqua vitæ maceratione, cujus spiritus postea distillatur. Eisdem cum semine viribus pollet.

℞. Semin. Anisi, Fœnicul. dulc. ana ℥i. Nuc. mosch. ʒß. Cinnamon. ʒj. Caryophyllor. & Piper. long. ana ʒß. Sacchar. alb. ℥iiij. M. F. pulvis, cujus ℥i. in haustu vini post pastum ad ciborum concoctionem perficiendam exhibeatur.

Semen Anisi usurpatur in Syrupo de Arthemisia; anti-asthmatico, *Charas*, pulvere Diarrhodon, & Lætificante, in Theriaca, Mithridatio, Electuar. Catholico, Lenitivo, Confect. Hamech, Electuar. de Psyllio, Trochiscis de Rhabarbaro, Pilulis aureis, & polychrestis.

Oleum vero in pilulis aliquibus purgantibus excipitur, tum ad resinosas purgantium medicamentorum particulas dissolvendas, & expandendas, tum ad ventriculum roborandum & ventris tormina sedanda.

A Dulciariis semen Anisi voluptatis gratia Saccharo obducitur, quo palato jucundius fiat. Sic fœdum oris halitum tollit, ventriculum roborat, flatu discutit, & ciborum concoctionem juvat. Idipsum multis adhuc condimentis, & potulentis adjicitur ad majorem gratiam illis conciliandam.

Aliud est semen, Anisum Sinense dictum, ab Aniso nostro procul di-
versum, de quo in *Traçtatu de Exoticis* egimus. Solo odore conveniant.

A N O N I S.

Anonis sive Ononis, & Resta-bovis, Off. Anonis spinosa flore purpureo, C. B. P. 399. *Inst. R. H.* 408. Anonis sive Resta-bovis vulgaris purpurea, J. B. 2. 395. Anonis, *Dod. Pempt.* 743. Antella, *Adversar. Lobel:* Ononis, *Cordi:* Remora maris, *Quorumdam:* vulgo, *Arretebauf*, *Bugrande* ou *Bugrane*.

Radix est pedem superantibus; hac illac repentibus, fractu contumacibus, foris fuscis, intus albis, sapore ingrato. Caules humi sparguntur patuli, densi, tenues, lenti, rubescentes, hirsuti, spinosi, in quibus folia alternatim nascuntur terna, ex oblongo rotunda, leviter crenata, hirsuta, obscure virentia, tactu glutinosa, sapore leguminoso, odore fœtido. Flores in summo quasi spicatum nascuntur papilionacei, dilute purpurascens vel carnei coloris, raro albi, cum pistillo abeunte in siliquam tres pene lineas longam, unicapularem, bivalvem, compressam & semen unicum continentem renis formam. In agro Parisiensi sponte nascitur. Tota planta, sed præsertim radix, & radices cortex in usum veniunt.

Analyti chymica, ex Anonide multum olei, acidi salis, & terræ, salis fixi mediocris quantitas, spiritus urinosi exigua eliciuntur. Hæc autem principia a sucro quodam glutinoso, qui ab igne destruitur, involvuntur. Præterea Anonidis succus chartam cæruleam subrubro colore tin-

git: folia leguminoso sapore sunt scetida, & glutinosa; unde Cl. Tournefort concludit, hanc plantam constare ex sale Tartaro vitriolato fere simili, phlegmare, multa terra, multoque sulphure involuto. Ab his autem principis, quæ unanimi consensu ab omnibus Medicis ipsi tribuitur vis aperiendi, & urinas abunde provocandi pendet.

Radix Anonidis vulgo recensetur inter quinque minores aperientes radices, quæ sunt Anonidis, Cappar, Eryngii, Graminis, & Rubiæ radices; dum Apii, Asparagi, Fœniculi, Petroselinii, & Ruscii radices quinque majores aperientes dicuntur. Reipsa Anonidis radix inspissatos humores potenter resolvit, contumacibus hepatis obstructionibus & ictero apprimè conducit: nephritidi atque urinæ suppressionibus medetur: mucum spissum renibus aut vesicæ inhærentem resolvit, & foras amandat, atque simul arenulas, & calculos nonnumquam pellit. Hujusce radices cortex a Simone Paulli velut præstantissimum remedium tam in vesicæ, quam in renum calculo habetur. A Matthiolo quoque commendatur ad ramicem carnosum resolvendum. In sarcocoele ab Ettmullero euporiston, & polychreston existimatur. Verum enimvero Alexander Pfisterus Scaphusianus Medicus in *Dissertatione de Hydrosarcocoele*, §. 1. refert se scæpius, & in diversis subjectis eam præscripsisse, experientia aut didicisse. 1. Illam non in omnibus diureticam existere. 2. In pluribus anorexiam, & cardialgiam inducere. 3. Sarcocoelem veram nequaquam ex ejus usu continuato imminui; unde verissima esse quæ Olavs Borrichius scripsit, propria intellexit experientia. Is autem in *Actis Hafniensibus anni 1671. & 1672. Observ. 97.* arguit eos, qui non satis providi rei æstimatores confirmatam sarcocoelem vel medicamentis discussisse se putant, vel discuti posse evulgant, quod nimium occalheat massa illa, & mille plexibus nervosis iisque solidis contrahat invictam duritiem. Crediderit Matthiolus in *Dioscoridem*, inquit Borrichius, crediderit Scultetus in *Armentario Chirurgico*, sese sarcocoelem pulvere Ononidis percurasse, nihil tamen mihi sit verisimilius quam fuisse hydrocoelem duriori cortice circumdatam atque ideo sarcocoelem mentientem. Atque ut id credam, persuadent cum similia passim exempla apud Forestum, Sennertum, & alios, docentia, artifices sæpe aqua profundius in testiculorum sinubus latente deceptos, pro carnosis æstimasse herniis, quæ fuerint aquosæ: tum docet illud idem radix Ononidis, quæ cum inter nobilissima diuretica sit, aquas haud dubie in suu testium intimo occultatas, paulatim eduxit, atque ita concidentibus sensum in se involucris durioribus, sarcocoelem æstimata fuit, sustulisse.

Radix Anonidis vel ejus tantummodo cortex pulveratus intus sumitur ad ʒj. vel decoctum semiuncie radices propinatur. In decoctis, pilanis, & jusculis aperientibus usurpari solet.

ʒj. Cortic. radic. Anonid. pulver. ʒj. Propinetur aliquamdiu ex decocti radic. ʒvj. singulis diebus mane, jejuno ventriculo ad arenulas expellendas, & nephritidem præcavendam.

ʒj. Decoct. rad. Ononid. ʒvj. Syrup. de ʒ. radicib. aper. ʒj. Sp. Tartar. ʒij. Sal. volatil. Succin. gr. x. Fiat julep. propinandum in urinæ suppressione, & dolore nephritico.

ʒj. Radic. Anonid. Eryngii, Cappar. ana ʒj. Coquantur cum frusto carnis vitu-

vitulin. in aq. q. s. pro duobus jusculis, quibus dissolve Tartar. martial. solubil. ℥j. mane & sero pro hepatis obstructionibus.

24. Rad. Ononid. Brusci & Asparag. ana ℥j. Cortic. Sambuc. & radic. Cappar. ana ℥ss. Folior. Pimpinell. & Parietar. ana M. j. Semin. Sefeli & Lithospermi ana ℥ij. Flor. Genistæ & Leucoji ana pug. ij. Coq. in aq. comm. ℔ij. ad ℔ss. Fiat apozema pro tribus dos. Cuique add. Nitri purg. vel Tartar. Chalyb. solub. ℥ss. in viscerum obstructionibus.

Radicis decoctum optime detergit extrinsecus usurpatum. Ex eo cum pauxillo aceti gargarisma præparatur utile in gingivarum laxitate, exulceratione, putredine, item in dentium dolore a Scorbuto.

Essentiam Ononidis Ettmullerus in affectibus calculosis insigniter commendat. Sic præparatur.

24. Plantam integram cum radice & floribus rectenter avulsam, & minutim incisam. Affunde spiritum vini ad quatuor digitos. transversos. supereminentiam: in loco calido per octo dies noctesque digerantur. Postea distillantur, ut artis est. In hunc distillatum liquorem infunde recentem herbam cum radice & floribus, quibus adde ejusdem plantæ calcinatæ salem fixum: iterumque digerantur per totidem dies & noctes. Tum fiat colatura cum forti expressione. Colatura per aliquot dies in loco remoto reposita servetur, ac tandem limpidus liquor a fœcibus separetur & servetur ad usus. Dosis ab ℥ss. ad ℥ij.

Aqua distillata ex Anonide tum ad urinæ suppressionem, tum ad hernias curandas a nonnullis commendatur: sed levioris est armaturæ præsidium.

Anonidis radix usurpatur in Syrupo antinephritico *Charas*, in Aqua diuretica & antinephritica, *Ejusdem*.

A P A R I N E.

Aparine, Asperugo, Aspergula, Spargula, Asperula, Aspera Lappago, Philantropos & Omphalocarpus, *Off.* Aparine vulgaris, *C. B. P.* 334. *Inf.* R. H. 114. Apparine, *J.* B. 3. 713. *Dod. Pempt.* 353. *Raii Hist. flor.* 484. vulgo, *Grateron*, *Rieble*.

Radice est tenui, fibrosa; tenuibus & quadrangularibus viticulis asperis, geniculatis, obliqueiosis, scandentibus, tres quatuorve cubitos longis, ramosis: foliis quinis, senis, vel septenis Rubiæ modo ad singula genicula orbiculatim dispositis, stellæ ritu decussatis, angustis, asperis, in spinulam desinentibus. Flores prope summos ramulos & geniculis exeunt in pediculis oblongis, tenuibus, perpusilli, candidi, monopetali, campaniformes, patentes, quadrifariam divisi, cum calyce quadrifido, qui deinde abit in fructum siccum, durum & quasi cartilagineum, cortice tenui nigricante obductum, ex gemellis globulis constantem, semine fœtis umbilicato. Ad sepes, interdum etiam inter segetes agri Parisiensis. sponte nascitur. Herba in usum venit.

Analyti chymica, hujus plantæ recentis ℔v. per B. V. distillatæ præbuerunt phlegmatis limpidi, primo obscure acidi, deinde subacidi, ac tandem

dem salsi ℥iij. ℥iij. ℥iij. Ex herba exsiccata residua per retortam distillata proderunt humoris sulci empyreumatici, subalsi, subausteri & obscure acidi ℥j. ℥j. gr. xvij. humoris alcali urinosi, sale volatili urinoso imprægnati ℥vj. gr. xvij. olei crassioris & sere adiposi ℥j. ℥iij. gr. xxxvj. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥iij. ℥v. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum albicantium ℥j. ℥v. gr. xxx. ex quibus salis fixi mere alcali ℥v. lixivio fuerunt extractæ. Partium jactura in distillatione fuit ℥iij. ℥iij. in calcinatione ℥j. ℥vij. gr. xlij.

Hac analysi, Aparine constare videtur sale essentiali sali ammoniacali simili oleo crasso implicito.

Aparine incidit & aperit: obstructions resolvit, urinas promovet & nonnumquam sudores. Ejus succus a Theodoro Turquet de Mayerne plurimi æstimatur ad aquas hydropicorum per vias urinarias expellendas: ad ℥ij. propinatur. Ejus decoctum in vino albo vel ejusdem aqua distillata arenulas, renumque calculos pellit, narrante J. Rajo. Idem auctor affirmat, pulverem ex Aparine & Liene vitulino in clybano exsiccatissimis lienis tumores & hypochondriacos status discutere. Simon Pauli refert ejus aquam distillatam apud Hafnenses adversus molestos tum pectoris, tum hypochondriorum dolores, usitatam esse & plurimum commendatam. A nonnullis in pleuritide propinatur.

℥j. Aparines recenter collectæ M. j. Coquatur in aq. comm. ℥ij. ad 4. partis diminutionem. Colatura in tres doses dividatur, debitis intervallis propinandas, in urinæ suppressione.

Externe herba cum axungia trita & strumis imposita eas discutere dicitur: & ejusdem aqua distillata ad eundem morbum propinatur.

A P I U M.

A Pium vulgare, Apium palustre, Paludapium & Eleofelinum, Off. Apium palustre & Apium, Off. C. B. P. 154. Apium vulgare, J. B. 3. 2. 100. Eleofelinum, Dodon. Pempt. 695. vulgo, *Arche*.

Ex radice crassa, albicante, recta, profunde in terram descendente, in plura interdum capita divisa, fibrata, sapore acri subamaro, ingrato, odore gravi, aromatico, frondes exeunt multæ, pediculis dodrantalibus, rubentibus, striatis, concavis, duabus, tribusve pinnarum paribus & impari in extremo compositæ: sunt autem pinnulæ istæ latæ, circa margines dentatæ, in tres insigniores lacinias divisæ, læte virentes, glabræ, nitidæ, succulentæ, odore, dum digitis conteruntur, gravi sapore acri, ingrato. Caules ab eadem radice multi exsurgunt crassi, profunde striati, concavi, bicubitales & altiores, nodosi, longis internodiis, frondibus cincti iis quæ ad radicem similibus. Flores tum in caulium axillis, tum in extremis ramulis nascuntur in umbellam congesti, exigui, rosacei, e quinque petalis candidis constati, calyci insidentibus qui deinde abit in fructum ex duobus perexiguis seminibus compositum, una parte depressis, altera gibbis, striatis, cinereis, acribus, subamaricantibus, aromaticis. In humentibus & paludosis locis nasci gaudet: transfertur vero & ad hortos. Radix, herba, & semen in usum veniunt.

Ra-

Radix inter quinque radices aperientes recensetur. Semen feminibus calidis minoribus annumeratur.

Analysi chymica, ex totius plantæ floridæ lbv. dempta radice, prodierunt humoris limpidi, odori, acris obscure acidi lbj. ℥xij. ℥vij. gr. xij. humoris primo limpidi, deinde rufescentis, odori, abique acrimonia, intente acidi, & tandem austeri lbij. ℥v. ℥iiij. gr. liiij. humoris rufi, sale volatili copioso imprægnati ℥iij. ℥j. gr. xl. olei tum tenuis, tum crassi ℥j. ℥vij. gr. xij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥v. ℥v. gr. lxix. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum ℥iij. ℥ij. gr. xxvij. ex quibus salis fixi salis ℥j. ℥v. gr. lv. extracta fuerunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥v. gr. ix. in calcinatione vero ℥ij. ℥iij. gr. xxxj.

Per hanc analysim liquet, hanc plantam sale essentiali donari tum ammoniacali, tum sali Coralliorum simili, oleo acri, subtili, copioso, implicito.

Apium crassos humores attenuat, viscerum obstructions resolvit, urinas ciet, sudores promover, febres arcet, & vulnera sanat. Succus foliorum descæcarus in febribus intermittentibus ineunte paroxysmo ad ℥vj. propinatur. Egrotans debite contestus abundante sudore perfunditur & sanatur. Ad febrem quartanam & aliam quamcumque ab obstructionibus oriendam bolus sequens plurimum confert.

℥. Extracti folior. Apii palustr. ℥j. Cortic. Peruvian. tenuissime triti ℥ij. Syrup. de Absynth. q. s. M. F. bolus s. a. Sumat æger paulo ante paroxysmum.

Radix, folia, & semina in pituitis, apoxematibus & jussulis aperientibus præscribuntur.

℥. Radic. Apii, Fœnicul. Brusci & Asparagi ana ℥j. Cortic. Fraxin. & Tamarisc. ana ℥ss. Folior. Ap. & Agrimon. ana M. j. Semin. Apii dulcis & Cuscutæ ana ℥ij. Flor. Genist. Borrag. & Bugloss. ana P. j. Coquantur in s. q. aq. comm. ad ℥ss. Fiat apoxema pro tribus dosibus, cui adde Syrup. de s. rad. vel de Pom. simplic. ℥ss.

Apium lac nutricum minuit, & concretum resolvit.

℥. Folior. Paludapii & Menthæ ana M. ij. Coquantur in aq. comm. s. q. cum axungie suillæ tantillo, ad putrilaginem. Pulpa per setaceum exprimatur, cui immisce semin. Ap. pulver. q. s. Fiat cataplasma mammis lacte turgidis applicandum.

Ex Apii summitatibus floridis cum Saccharo conditum præparatur in asthma, orthopnea, flatulentis doloribus, urinae & mensium suppressione commendatum. Ad ℥ss. præscribi solet.

Joannes Bauhinus post Hollerium, internum Apii usum epilepticis suspectum censet. Eundem Robertus Boyle oculis insensum esse asserit *Tr. de Specific. & Simpl. remed.*

Externe Apii succus scorbutica oris ulcera & alia quæcumque detergit. Cancris etiam exulceratis confert: nam tametsi hos curare nequeat, putredini tamen resistit, auctore J. Bauhino, & fœtorem eorum reprimit.

Apii radix usurpatur in Syrup. de Cichor. cum Rheo dupl. Syrup. aperiente cachectico Pb. Reg. Cbaras, Syrup. anti-asthmatico *Ejusdem*,
de

de Hyssopo *Mesue*, de 5. rad. aper. Folia in ung. mundificativo de Apio dicto. Succus in Electuar. de Psyllio, Emplastro de Betonica. Semen in pulvere lithontriptico *Renodai*, *Benedicta laxativa*, Philanio Romano, & Pilulis aureis.

Illud Apii genus translatum diligenti cultura mitius, minusque ingratum evadit; unde apud nos folia ejus teneriora sub fimo dealbata, una cum superna radice parte abscissa, cum oleo, aceto & piperestantur & in deliciis habentur. Ejus usus Italis debetur a quibus *Seleri* vel *Celeri* vocatur. A Botanicis dicitur, Apium dulce *Celeri* Italarum, *H. Reg. Paris.* Selinum sive Apium dulce *Parkinson.* Licet autem Parkinsonus illud ut novam speciem ab Apio palustri diversam proponat, attamen J. Rajus asserit eandem prorsus esse, sola cultura diversam & mitiorem factam: quandoquidem observavit illud Apium dulce seu *Celeri* Italarum in Angliæ hortis satum & cultum, tandem post aliquot annos in vulgare Paludapium degenerare, scilicet ob aeris frigiditatem.

AQUIFOLIUM.

Aquifolium & Agrifolium, Off. Aquifolium sive Agrifolium vulgo; *J. B. 1. 114. Infl. R. H. 600. Agrifolium, Dod. Pempt. 758. Ilex aculeata baccifera, folio sinuato, C. B. P. 425. vulgo, Houx?*

Frutex est quandoque, cultura præcipue, in arborem excresecens & perpetua fronde virens. Caudex & rami lenti, flexiles, læves, cortice duplici conteguntur; exteriore in ramis viridi, in trunco ut plurimum cinereo; interiore pallido, odore cum avelluntur ingrato, foetente. Materies ligni dura & solida, albicans & interius nigricans, quæ præ pondere in aqua subsidit, Buxi aut Guajaci instar. Folia pulchre virent, lævia, glabra, laurinis fere similia, sed minora, in ambitu sinuata, angulosa & longis ac rigidis aculeis horrida, quos tamen, senescente arbore, pauciores vel nullos habent. Flores parvi, conferti, brevibus pediculis appensi, monopetali, rotati, in quatuor lacinias divisi, cum totidem staminibus & calyce quadrisido, ex quo surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum mollem seu baccam parvam, rotundam, umbilicatam, rubram, gustu subdulcem; ingratam, ossiculis foetam albidis, quaternis, triquetris, oblongis, hinc gibbis, inde vero planis. In agri Parisiensis sylvis occurrit. In hortis colitur, præsertim in regionibus septentrionalibus, ad opera topiaria, quibus præ aliis commodus & opportunus est, cum sit frigoris patientissimus & perenni nitentium foliorum virore aspectui gratus, nec tonsuram respuat. Radix, cortex, bæcæ in usum veniunt, sed raro.

Analysi chymica, baccarum maturarum & recentium ℞v. præbuerunt humoris limpidi fere inodori & inspidi, primo obscure acidi, deinde intensi ℞j. ℞ix. ℞vj. gr. xij. humoris limpidi primo intense acidi, & intense austeri ℞j. ℞viij. gr. xij. humoris rufescentis tum acidi, tum alcali urinosi ℞vij. ℞vj. olei ℞vij. gr. lxij. Massa nigra in retorta superflès pendebat ℞viij. ℞j. quæ per duodecim horas igne reverberii calcinata reliquit cinis ℞j. ℞j. gr. xlviij. ex quibus salis fixi mere alcali ℞iiij. gr. xvij. fuerunt extracta.

gasta. Partium jactura in distillatione fuit ℥iij. ℥ij. gr. lix. in calcinatione ℥vj. ℥vij. gr. xxvij. unde concludi potest, salem essentialem tartaro similem his in bacis contineri.

Radices & corticis decoctum emollit & resolvit. Eo foveantur utiliter articuli, qui prius luxati duritiem contraxerunt, teste Matthiolo.

Zithogalum factum ex cerevisia, & lacte in quo decocti sunt hujus foliorum aculei, mire conducit ad dolorem colicum & intestinorum tormina, cujus rei observationem J. Rajus refert de quadam matrona, quæ post alia medicamenta frustra tentata, a mulercula quadam vaga & circumforanea hocce remedio sanata fuit.

Baccæ ad colicos dolores utiles sunt. Crassos siquidem, pituitososque humores per alvum educunt decem aut duodecim numero sumptæ, auctore Dodonæo.

Viscum aucuparium ex Aquifolii cortice in Anglia sic præparatur.

Deliberatis Junio aut Julio mensibus quotquot videtur aut opus fuerit arboribus, cortices detracti in aqua fontana per septem aut octo horas continuas decoquuntur, donec tenerrimi evadant. Cocti in acervum humi cum silice s. l. componuntur, aqua prius curiose separata & per duas trêse septimanas fermentantur & computrescunt, donec in mucilaginem abeant. Exempli deinde in mortario tamdiu tunduntur, donec fingi, formarique possunt instar massæ farinacæ. Massa in aquam profluentem submersa manibus versatur & diligenter subigitur. Aqua brevi sordes omnes eluit, visco residuo puro & desecato. In fictili aliquo vase per quatuor adhuc aut quinque dies despumando relinquitur, donec se purgaverit & perfecerit; deinde in novum vas translatum reservatur ad usum. Non ex corticibus hujus arboris tantum viscum aucuparium paratur, sed etiam e fructu Visci, & Sebesten.

Viscum autem aucuparium ex hujus cortice factum intus sumptum non minus nocivum, quam ex arboreo visco Dodonæus pronuntiat; tenacissimum siquidem est: iteranea omnia conglutinat: excrementorum exitus contrahit & claudit, atque hoc modo perniciem homini affert, non qualitate aliqua deleteria, sed glutinosa sua substantia. Externe admotum resolvit, emollit, maturat.

AQUILEGIA.

Aquilegia, Aquileja, & Aquilina, *Offic.* Aquilegia sylvestris, *C. B. P.* 144. *Inf. R. H.* 428. Aquilegia flore simplici, *J. B.* 3. 484. Aquilegia, *Dodon.* 181. Aquilina, *Matthiæ.* & *Adversar. Lobel.* vulgo, *Angolie, Gants de Notre-Dame.*

Radice est pollicem crassa, candida, alte in terram descendente ramosa & fibrosa, sapore subdulci, & in multos annos vivace: foliis ternis Chelidonii majoris similibus, paulo tamen rotundioribus, per ambitum incisus, inferius glaucis, superne obscurius virentibus, cum quadam cærulei tinctura, ex pediculis longis, rigidis, hirsutis: caule vero cubitali tenui rubente, & leviter hirsuto: cujus alæ singulos proferunt flores cæruleos vel phæniceos polypetalos; anomalos, ex plurimis nempe petalis dissimilibus con-

constantes : horum enim quinque planta sunt, cætera vero cucullata utraque simul alterno ordine posita. E floris meditullio surgit pistillum staminibus stipatum, quod deinde abit in fructum, in quo velut in capitulum colliguntur vaginæ quaternæ vel quinæ, surrectæ, membranaceæ, univalves, suprema parte hiantes, inferiora versus conniventes, seminibus sætæ parvis, Milii magnitudine, ovatis, nigris, lubricis, splendentibus, sub testa tenui nucleolum oleosum continentibus. Color florum cultura diversus sit, squidem in hortis exultæ hujus generis plantæ colore cæruleo, rubro, candido carneo, herbaceo versicolore, infinitam pariunt varietatem. In agri Parisiensis sylvis, ut ponde nascitur, in hortis quoque colitur. Herba, radix, flos, & semen in primis uti medici inserviunt.

Semen multum olei & salis ammoniacalis continet.

Tota planta aperit menses suppressos, & urinas ciet, ac sudores provocat. Radix pulverata ad ℥j. Trago affirmante, cum vini haustu sumpta, colicos dolores sedat. Eadem in vino infusa, additis Becabungæ, Cochleariæ, & Nasturtii aquaticis foliis, egregium componit antiscorbuticum, quo sanatus fuit miles asciticus & scorbuticus, ut Ettmullerus refert. Camerarius narrat, hujus radices frustulum apud Hispanos contra calculum quotidie mane intus sumi. Joannes Rajus Aquilegiæ foliorum decoctum apud Anglos usitatum esse scribit contra calidos faucium & asperæ arteriæ affectus : & a quibusdam in scorbutio ad oris ulcera colluenda, & detergenda peculiariter commendatur. Flores cærulei elegantem, & ab Ettmullero plurimum laudatam in morbillis tincturam præbent, cum a qua calente macerati, cum olei vitrioli guttis aliquot ad ruborem tantummodo conciliandum : haustum mane, & vespere propinatur.

In scorbutio ad oris ulcera detergenda, firmandos dentes, gingivæque roborandas veluti præstantissimum remedium a Tournefortio proponitur eorundem florum tinctura, cum spiritu vini parata, & cum tinctura Lacæ, & Mastiches tinctura, anaticis partibus, mixta. Semen in ictero eximium censetur remedium. Hujus seminis pulverati ℥j. quotidie mane in haustu vini albi sumitur. Vel ejusdem contusi ℥ij. per noctem in vini albi ℥ss. macerantur. Colatura mane, jejuno ventriculo, propinatur. Tragus & Matthiolus idem semen pulveratum ad ℥j. cum Croci tantillo in haustu vini sumptum commendant, modo æger in lecto se componat, ut copiose sudet. Ex eo quoque cum aqua stillantia vel decocto florum Aquilegiæ paratur emulsio, cui eboris sine igne præparati q. s. permiscetur adversus eundem morbum. In morbis mali moris, nonnulli emulsiones ex seminibus Aquilegiæ & Ficum vel Passularum decocto plurimi faciunt. S. Paulli testatur semen pulveratum ℥ss. vel ℥j. pondere in emulso, Fumariz, Card. benedict. aut C. C. distillata aqua, propinatum, veluti ab orco revocasse tenuioris sortis puerulos morbillis ac variolis laborantes. Ab eodem & ab Hoffmanno idem semen in partu difficili maxime commendatur.

℥j. Semin. Aquileg. sylvestr. gr. xxv. Rasur. Ebor. tenuissime pulver. ℥ss. & pulver. Lumbic. terrestr. ℥ss. M. F. pulvis a Langio commendatus in ictero.

℥j. Semin. Aquileg. ℥ss. Croci ℥j. Fiat pulvis. Detur in vino.

℥j. Sc

℥. Semin. Aquileg. ʒʒ. Pulver. Lumbr. terrestr. ʒj. Croci ʒʒ. M. F. pulvis mane sumendus.

℥. Semin. Aquileg. ʒʒ. Contunde in aq. Aquileg. vel Chelidon. major. ʒj. Eboris philosophice pp. ʒʒ. Fiat emulso s. a. cum syrupi de ʒ. radicibus aper. ʒj. In duos haustus dividatur, mane & sero iſtericis propinandus.

℥. Semin. Aquileg. ʒvj. Croci pulver. ʒj. Tartar. vitriolati ʒʒ. Conserv. Cynorrhodon. q. s. Fiat opiata in septem partes æquales distribuenda. Sumantur mane, jejuno ventriculo, per septem dies continuos, decocti aperientis haustum super bibendo.

Hoc remedium a Timæo, & Ettmullero commendatum ac sæpius expertum raro spem meam fecellit præmissis præmittendis.

℥. Pulver. folior. Aquileg. Salviæ, Menthæ crisp. Nuc. Mosch. Rutæ & Myrrhæ ana ʒʒ. Alumin. usti ʒj. Mellis purissim. ʒvj. Mel leni igne despumetur. Despumato & calenti pulveres inspergantur. Fiat linimentum quo gingivæ putridæ inungantur. A Sennerto hoc linimentum tanquam efficax & longo usu compertum proponitur. *Lik. 3. Prax. Med. part. I. cap. 16.*

A R G E N T I N A.

Argentina, Potentilla, & Anserina, *Offic.* Pentaphylloides argenteum alarum, seu Potentilla, *Inst. R. H.* 298. Potentilla seu Argentina, *J. B.* 2. 398. Argentina, *Dod. Pempt.* 600. Potentilla Matthioli, *C. B. P.* 321. Pentaphylloides Argentina dictum, *Raii Histor.* 617. Argentina, *Volk. Tragi* 480. vulgo, *Argentine*.

E radice nigricante, nunc simplici, nunc fibrosa adstringente, mire reperitur in locis humidis secus vias & fluviorum ripas, & viticulis Fragariæ modo se propagat. Folia conjugata sunt Agrimonie similia, majoribus hinc inde pinnulis obrusis circa margines profunde dentatis, cum plurimis intermediis minusculis, constantia, superiore parte herbaceo colore virentia, inferiore vero argentea, & molli lanugine obducta. Ex alis foliorum quæ appendicibus suis viticulos amplectuntur, exeunt flores singulares, pediculis longis-hirsutis fulti, e quinque petalis aureis constati, cum calyce monotomo in quinque partes acutas diviso, inter quas toridem minores alternatim occurrunt, cum plurimis in medio ramulis & apicibus concoloribus. Pistillum mutatur in capitulum sphaericum trium linearum diametri, in quo semina congeruntur plura, subrotunda, minora, sublutea, papaverinis similia. Radix, herba, semen ex usu sunt.

Analysi chymica, ex herbæ recentis ℥v. per B. V. distillatis, prodierunt phlegmatis limpidi, mere inspidi & inodori ʒx. humoris limpidi primo obicure acidi, deinde acidi manifesti, ac tandem intensi ʒij. ʒv. ʒv. In alambice residuum ʒxiiij. ʒvj. pondere æquabat: quod per retortam distillatum præbuit humoris rufescentis tum acidi austeri. tum alcali urinosi ʒj. ʒv. gr. vj. humoris rufi empyreumatici urinosi & sale volatili urinoso copioso imprægnati ʒj. ʒvij. gr. xvij. salis volatilis urinosi concreti ʒi. gr. xvij.

xviij. olei spissi butyri ad instar ℥ij. ℥iij. gr. liij. Massa nigra in retorta supcistes pendebat ℥v. ℥vj. quæ per tredecim ho-as igne reverberii calcinata reliquit cinerum nigricantium ℥j. ℥v. ex quibus lixivio, salis fixi alcali ℥vj. extractæ fuerunt. Partium jactura in distillatione per alambicem fuit ℥xij. ℥v. in distillatione per retortam ℥ij. ℥v. gr. xlix. in calcinatione ℥iij. ℥j.

Tota planta sapore herbaceo, subsalfo, stiptico donatur, & ejus succus chariam cæruleam rubro colore inficit: unde liquet hanc plantam sale ammoniacali & aliquantisper aluminoso seu vitriolico confari, cum oleo crasso conjuncto.

Universa hæc planta refrigerare, adstrictoria & exsiccatoria virtute polere, repellere, & roborare dicitur. Inter herbas vulnerarias adstringentes recensetur. Revera hæmorrhagias quascumque coercet. In spūto cruento, in fluxu uterino, & hæmorrhoidali utiliter præscribitur, diarrhæam, & crevntos alvi fluxus compescit. Ejus succus ad ℥iij. vel ℥vj. decoctum vel infusum in vino vel aqua propinatur, necnon etiam in decoctis, aut jusculis adstringentibus & vulnerariis præscribitur. Tabernæmontanus eam ad album fluorem uterinum commendat & ex foliis exsiccatis, rasura: eboris, Coralliis, pulverem parat ejusdem aqua stillatâ propinandum. Tournefortius valde prædicat juscula ex Argemina, & Aflacis fluxuatilibus parata ad hunc fluxum cohibendum. Vulnere conglutinat & ulcera sanat, ea præsertim, quæ pudenda invasere & oris partes erodunt, si ejus decocto colluantur.

Ejus semen contusum & ad ℥ß. in ejus aquæ distillatæ ℥iij. hæmorrhagias sistit. Ettmullerus Argentinam ut specificum in ictero remedium commendat. Eadem Timæo a Guldenkleee in secretis fuit contra nephritidem & calculum renum. Sunt, inquit Ettmullerus, qui pro areæno habent frequentem potionem contra calculum.

℥j. Argentinæ viridis M. iij. Secalis viridis M. ij. Succum exprimunt & addunt vinum rubrum ad pondus omnium. Mixturem percolant pro una dosi in aurora primi die Maji mensis sumendum: & asserunt, si tribus annis continuis primo die Maji hoc repetatur, quod per totam vitam quis sit futurus immunis a calculo.

Vis febrifuga Argentinæ tribuitur. Idem Ettmullerus observat Argentinæ succum vel decoctum frequentius hæstum nimium calorem in paroxysmis febrilibus compescere, sed non semper adeo tuto propinari, quia paroxysmus exinde nonnumquam magis prolongatur. Unde potius herba contusa & cum sale & aceto subacta a nonnullis carpis admovetur, aut plantis pedum supponitur in febrilibus paroxysmis, quos sæpe mitigat, imo quandoque abigit, teste Simone Paulli. Sunt etiam, observante eodem, qui ad delirium compescendum eam contusam, & sale conspersam plantis pedum applicant. Quod quidem sanguinem acidis suis salibus virriolicis inspissando, ejusque circuitiorem nimis citam retardando perficit.

Adversus dysenteriam Castor Durantes jubet, ut dysentericorum calceis indatur: atque hac arte Simon Paulli eam non solum dysenteriam, sed omne genus fluxionum infimi ventris, ut nimios menses, imo narium hæmorrhagiam sistere existimat.

x

Ejus

Ejus decoctum in gargarismate nimis laxam columellam restituit, addito aluminis momento. In aceto cocta commotos dentes firmat & laxas cohibet gingivas.

Ejus aqua distillata in Officinis pharmaceuticis servatur, ad lentigines, panos & maculas faciei, fuscumque colorem sole contractum delendum commendata.

Ejus radices nonnulli apud Anglos, hyberno tempore esunt: sunt enim sapore suavi, nec minus grato quam Paltinacæ. J. Rajus observavit etiam porcos radices hæcæostro effusas libenter vorare.

ARMENIACA MALUS.

Armeniaca malus, Off. Armeniaca fructu majori nucleo amaro, I.R. H. 623. Mala Armeniaca majora, C. B. P. 442. Armeniaca mala majora, Cambr. Epitom. 146. J. B. I. vulgo, *Abricotier*.

Arbor est moderatæ magnitudinis, Pyro videlicet minor, Persica major, cortice nigriore, candide crassiore, firmo, ramis magis patulis brachiata. Folia ejus subrotunda, acuminata veluti nigræ Populi, at minora & ad Betulæ magis accedentia, marginibus serrata, quaterna, quinave simul emergunt. Flores ante foliorum exortum primo vere profert pentapetalos rosaceos, quinque scilicet petalis albicantibus in orbem positos constantes, cum calyce quinquifido ex quo surgit pistillum quod deinde abit in fructum carnosum, succulentum, firmum, fere globosum, utrinque plerumque compressum, secundum longitudinem sulcatum, intus, forisque luteum, aliquo rubore interdum perfusum, sapore dulcem & palato gratum, ossiculo sætum ligneo, duro, compresso pariter, non ut in Persica sulcato, sed lævi, nucleum includente seu Amygdalam candidam amaricantem, non injucundam, nonnunquam dulcem, pellicula flavescente obductam. In hortis & viridariis colitur: sobolescit insitione & inoculatione. Fructus ejus ob odoris gratiam & saporis dulcedinem plurimum arrident, & lautiores mensas tam cruda quam Saccharo condita nobilitant.

Analyti chymica, ex ejus fructuum immaturorum & tenellorum lbv. prodierunt humoris limpidi, odoris & saporis herbacei haud ingrati, subacidi lbj. ℥vj. ℥vj. humoris limpidi, intense acidi & austeri lbj. ℥v. gr. xxxvj. humoris rufi empyreumatici, tum acidi, tum alcali volatilii & sale volatilii urinosi imprægnati ℥j. gr. xxxvj. olei fluidi ℥vj. gr. liij. Massa nigra in retorta superflua pendebat ℥ij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum nigricantium ℥vj. gr. xxiiij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥ij. gr. ij. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥ij. gr. xviii. in calcinatione ℥ij. ℥j. gr. xlvij.

Caro fructuum maturorum, ossiculis rejectis, ad lbv. per retortam distillata præbuit humoris fructum odore & sapore leviter referentis, obscure acidi ℥xij. ℥j. gr. xxxvj. qui aliquamdiu asservatus acorem manifestum contraxit: humoris limpidi primo subacidi, deinde manifeste acidi, austeri admodum, & nucleorum contrusorum odorem referentis lbj. ℥ix. ℥vj. gr. xxx. humoris rufi empyreumatici sale volatilii urinoso imprægnati ℥j. ℥j.

Geoffroy Tom. II.

E

gr.

Er. xxliij. olei crassi & spissi ad instar extracti ℥ij. gr. xij. Massa nigra in retorta superflua & densa admodum pendebat ℥iij. ℥vj. gr. xxx. quæ per 20. horas calcinata reliquit cinerum nigricantium ℥vij. gr. xxxvj. ex quibus salis fixi mere alcali ℥iij. extractæ fuerunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥iij. ℥vj. gr. xij. in calcinatione ℥ij. ℥vj. gr. lxvj.

Analysis horumce fructuum comparata non adeo diversas ex quibus componuntur substantias exhibet. Magnam salis acidi & olei stricte conjunctorum copiam continent, ita ut olei portio tantum mediocri sub oleosa specie per retortæ nostrum transeat, major vero pars in capite mortuo fixa remaneat.

Fructus Mala Armenia vel Armeniaca dicuntur; a quibusdam Chrysomala, ab aliis Præcocia, Præcoqua & Bericocia, unde vox Gallica *abricot*, nuncupantur. Optima censentur quæ magna, quæ bene colorata, quæ matura, quæ gustu grata, & quorum caro ab ossiculis facile separatur.

Medici plerique, Galeni auctoritate freti, illa bonitate superare Persica dicunt, quod neque in ventriculo, ut ea, corrumpantur, neque facile aciescant, scilicet ob sicciorē pulpæ consistentiam: esse quoque Persicæ suaviora, hocque nomine ventriculo gratiora: omnibus enim quæ suavia sunt hoc inesse, ut stomacho sint grata atque accepta.

Alimentum hæc mala, sicut alii fructus fugaces dant exiguum. Conventientiora sunt calidis, siccisque naturis quæ sunt bilis feraces, quales sunt juvenes: in pituitosis quæ frigidæ sunt atque humidæ & quibus stomachus debilis est, facile corrumpuntur.

Immoderatus ingesta ventriculum inflant, cito corrumpuntur, febresque accendunt ut cœteri horæi fructus, mucosum scilicet chymum efficiendo, ventriculi & intestinorum parietibus adhærentem; facile aciescentem & ventriculi functiones lædentem, unde oriuntur febres quæ tamen facile solvuntur, & statim initio ventriculus & intestina emeticis & catharticis medicinis ab hac saburra tempestive liberentur.

Armeniaca cum Saccharo condita & asservata sive liquida, sive sicca, sive matura, sive immatura, inter præstantissima dulcioria seu bellaria a matronis nostris habentur. Nucleus eorum, quia amarus, necat vermes, Elici ex illis lacteus succus non secus ac ex Amygdalis & emulsio parati potest, quæ in febribus salutaris, incidendo nempe viscidos humores, existimatur. Oleum ex illis expressum valere tradunt inunctum ad inflammatas hæmorrhoidas & ad aurium dolores. Idem potum ℥v. pondere cum vini Malvatici ℥j. calculos pellere & colicos dolores levare Marthiolus refert.

Plura Armeniacorum sunt genera, cum sapore, tum magnitudine differentia. Sed his in regionibus hoc genus vugatilis est.

A R T E M I S I A.

A Artemisia vulgaris, Off. Artemisia vulgaris, major, caule & flore purpurascens, C. B. P. 137. Inst. R. H. 460. Artemisia vulgaris, J. B. 3. 184. Artemisia rubra, Tabern. Icon. 7. Artemisia inter herbarum, Lobel. Icon. 754. vulgo, *Armoise*, *berbe de la S. Jean*.

Ra-

Radice est tepente, digitur crassa, fibrosa, dulci, aromatica: caulibus bicubitalibus & altioribus, digiti crassitudine, teretibus, striatis, breviter lanugine hirsutis, firmis ac rigidis, ut plurimum purpurascens, medullosis, ramosis, cum foliis crebris alternatim positis, Absinthii fere divisura, ad costam usque incisus, superne obscure virentibus, subtus incanis, qua nota ab Absinthio facile distinguitur. Flores dense nascuntur in summis ramulis, longa serie quasi spicatum dispositi, minimi & flosculosi, plurimis scilicet flosculis constantes quinquifidis, purpurascens, embryoni insudentibus & calyce squammoso comprehensis. Inter flosculos vero occurrunt & embryones nudi in capillamentum bifidum desinentes, qui perinde ac flosculorum embryones abeunt in semen Absinthii æmulum. Flores Absinthitis crebriores sunt, minores, nec deorsum nuantes, odore aromatico haud ingrato persusi, minus, quam Absinthii vehementi. Secus fossas & rivulos agri Parisiensis nascitur. In hac planta caulis & flores interdum albescunt. Herba integra utilis est.

Analysi chymica, ex hujus plantæ recenter collectæ lbv. prodierunt humoris limpidi, primo laporis herbacei & obscure acidi, deinde manifeste acidi & aliquantisper austeri lbij. 3v. gr. xxx. humoris tum acidi, tum salis subausteri, rufescentis & aliquantisper empyreumatici 3ij. 3vi. gr. vj. humoris fuscii empyreumatici, alcali, urinosi & sale volatili urinoso 3i. 3v. olei adiposæ spissitudinis 3ij. 3vj. gr. iij. salis volatilis urinosi concreti gr. xlij. Massa nigra in retorta superstes pendebat 3v. 3iij. quæ igne reverberii calcinata, reliquit cinerum 3ij. gr. xxxvj. ex quibus salis fixi mere alcali 3ij. gr. xxxvj. lixivio extracta fuerunt. Lactura partium in distillatione fuit 3ij. gr. lxij. in calcinatione 3ij. 3ij. gr. xxxvj. Ex hac analysi manifestum est, Artemisiam sale essentiali donari ammoniacali, multo sulphure crasso & multa terra conjunctis. Quod etiam probatur ex salio ejus sapore, & rubro quem chartæ cœruleæ conciliat colore.

Artemisia uterina est & antihysterica vel etiam antispasmodica. Menstrues, sortum & secundinas pellit, uteri sordes abstergit, adeoque usus creberrimi est mulierculis, quæ eam adhibent non solum interne in decoctis, jusculis & porcionibus; sed etiam externe in balneis & lotionibus. Ex ea sacculi parantur qui repentes in suffocationibus hystericis, partu difficili & mensium aut lochiorum suppressione ventri admoventur.

℞. Folior. & summitatum floridar. Artemis. M. j. Maceretur in aq. bullientis lbß. Vas operiatur, & post horæ quadrantem aqua effundatur & forbillando propinetur.

℞. Folior. & radic. Artemis. M. ij. Cinerum rubr. 3j. Coquantur cum aq. comm. vel Artemis. distillatæ lbij. ad lbj. Colatura per cyathos propinetur adversus dolores post partum & lochior. suppressionem. Adde tantillum aq. Cinnamomi, si adsit virium prostratio.

℞. Folior. Artemis. & Matricar. ana M. j. Infund. per noctem in vini albi lbß. Colaturæ adde tincturæ Martis 3ij. Aq. Cinnamom. 3j. Propinetur in mensum & lochior. suppressione.

℞. Folior. Artemis. & Matricar. ana M. j. Coq. leviter in aq. comm.

ad 3vj. In colatura dilue (syrup. de Artemisia 3j. Adde sp. vol. C. C.) succinari gutt. xx. Fiat pulapium coebleatum sumendum in hysterica passione.

24. Submitatum Artemis. pulverat. 3ß. Succini pp. ʒß. Castor. gr. iijj. Extracti Aloes gr. xv. cum f. q. conserv. flor. Calendulæ. Fiat bolus in passione hysterica & mens. suppressione.

24. Folior. Artemisæ, Matricar. Mercurial. & utriusque Malvæ ana M. ij. Flor. Chamæmeli & Melilot. ana M. j. Semin. Lini & Sefeli ana 3j. Incisa & confusa sacculis includantur, & in aquæ comm. q. l. coquantur. Sacculi calentes regioni umbilicali admoveantur ad menses movendos & dolorem post partum sedandum. Ex iisdem herbis infusus præparetur pro partu difficili.

Herbæ siccatae pulvis ʒijj. pondere in vino potus optimum est doloris ischiadici remedium, auctore Parkinsono, qui & herbam recentem aut ejus succum haustum in convenienti aliquo liquore præstantissimum esse remedium asserit illis, qui nimium Opii sumperunt.

De præstantia hujus plantæ contra lassitudinem multa proferuntur; quæ ut superstitiose dicta habentur a nonnullis. Plinius de ea sic loquitur. Artemisiam & Eleliphacum (plantam nunc ignotam) alligatas qui habeat viator, negatur lassitudinem sentire. Post eum Botanici plurimi dicunt hanc plantam ad lassitudinem ex itinere maximum esse præsidium; quæ, ejus decocto si laventur aut foveantur pedes, omnis tollitur. Joann. Bodæus a Siaple, in notis ad Theophrasti Historiam plantarum, non dubitat emphatice proferre hujus decoctum hominum ex itinere lassorum pedes adeo recreare, ut nihil in rerum natura reperiatur quod ei sit conferendum; quod, licet C. Hoffmannus rideat, tamen S. Paulli haud a vero prorsus alienum putat. Scribit enim se sancte testari posse, se iis ægris, in quibus nervosum genus male habere sibi visum esset, flautento spalmo obnoxiiis, aut qui de doloribus aut lassitudinibus membrorum, præsertim post chronicos & quandoque etiam post acutos malignos morbos, conquesti sunt, felicissimo sæpe evento præscripsisse balneum maximam partem ex Artemisia, deinde Salviæ, Agrimonix, Chamæmeli & polentæ tritæ decocto repletum, ut in eum se immergerent vel in eo considerent. Quod quidem tribuit tenuibus parvibus quibus Artemisia instruitur, quæ vim habent attenuandi, resolvendi, discutendi. Illud autem probat non solum auctoritate ejusdem Hoffmanni qui hanc partium subtilitatem in ea agnoscit; sed etiam quotidiana coquorum experientia, qui duram anserum carnem, teneriorem efficere solent, eam Artemisix foliis infarciendo, antequam coquantur. Addit insuper observationem cujusdam verulæ, quæ, cum utraque genua tumor insignis œdematosus obfedisset, linteis duplicatis super Artemisiam fumigatis eum ex voto abegit: qua hæc partium Artemisix tenuitas confirmatur: non ergo adeo ridicula est aut spernenda defatigatos artus sublevandi facultas, quæ hujus plantæ decocto tribuitur.

Sunt qui carbones sacro Joannis Baptistæ die sub hujus radice effoscos ad epilepsiam commendant. Eos autem tum in pulvere exhibent, tum de collo suspendunt pro amuleto. Equidem rejecto quicquid superstitionis est in hac
praxi

praxi tanquam futili ac vano, non virtutis prorsus expertes sunt illi sic dicti carbonēs. Non enim carbonēs sunt, sed radices Artemisiæ annoſæ demortuæ & ita exsiccatæ ac semiputrefactione nigricantes factæ, ac principis aut ætuosis particulis non omnino destitutæ, ut Schroderus & Deekers in notis ad Barbetre praxim asserunt, & ut putat Fernelius, qui eas adversus epilepsiam proponit, & odorata expostulat. Eadem a Francisco Joële in *Praxi cap. de Epilepsia* laudantur, viro alias minus supersticioso. Ettmullerus quoque, qui, quæ de his carbonibus proferuntur, anile signum diu putaverat, refert novisse mulierculam quæ hosce carbonēs propriis infantibus epilepticis cum fructu, cuspis cultelli quantum capit, propinavit. Dosis illorum carbonum pulveratorum est ad ℥i. in aqua conveniente exhibita. Similes carbonēs interdum sub Absinthio, Plantagine, & aliis plantis reperiri solent.

In Officinis Pharmaceuticis pro usu medico ex Artemisia præparata servantur, aqua distillata ex planta florida, Syrupus de Artemisia dictus, Conditum, extractum, & Sal fixus, in quibuscunque uterinis affectionibus commendata.

Usurpatur Artemisia in Syrupo de Artemisia *Pharmacop. Regiæ Charar.* Pulvere *Palmarii* contra rabiem, Unguento martiato, Emplastro diabotano *Franc. Blondel. Penicber. Coll. Pharmac.* Aqua vulneraria *Ejusdem* & aq. hysterica *Pb. Reg. Charar.*

A R U M.

Arum & Aron *Offic. vulgo, Pied de veau.* Inter diversas Aris species duæ præsertim in Officinis occurrunt usitiores, quæ indiscriminatim usurpantur, scilicet Arum vulgare non maculatum, & Arum vulgare maculatum maculis nigris vel candidis.

Arum vulgare non maculatum, *Off. Arum vulgare non maculatum, C. B. P. 295. Inf. R. H. 158. Arum Tab. Icon. 746.*

Radice est tuberosa, carnosa, pollicem crassa, subrotunda, sed difformi, candida, succo lacteo turgida, fibris quibusdam stipata: foliis dodrantem longis, quasi triangulis, & sagittæ formam referentibus, nitidis, venenosis. Caulis ad cubitum pene assurgit teres, striatus, florem sustinens membranaceum, monopetalum, anomalum, auris asininæ, vel leporinæ forma, vaginæ in modum convolutum, ex albedo virescentem, in quo latet pistillum pallide flavescens, ad cuius exortum, flore marcescente, oriuntur acini seu baccæ fere globosæ, dense in capitulum oblongum congestæ, purpureæ, molles, succi plenæ, semen unum aut alterum, exiguum, duriusculum, subrotundum, contingentes. Tota planta acerrimi est saporis, & linguam deurentis.

Arum maculatum vulgare seu *Off. Arum maculatum vulgare*, maculis candidis vel nigris, *C. B. P. 195. Inf. R. H. 118. J. B. 2. 783. Dodon. Tempt. 318.* Hæc species a priori non discrepat, nisi maculis candidis vel nigris, quibus folia sunt repleta. Nascuntur in sylvis, locisque umbris, secus vias & in sepibus agri Parisiensis. Radix in usum venit, rarius folia.

Analysi chymica ex radicibus recentibus &c. prodierunt humoris limpidi saporis & odoris herbacei subacris, cum sale alcali occulto, & obscure augeffroy *Tom. II.* E 3 steri

steri ℥x. ℥i. gr. vj. humoris primo limpidi, deinde rufescentis, subacidi; austeri, odoris empyreumatici, tandem fusci, obscuri, saporis tum acidi, tum acris ℥iij. ℥viij. gr. lxxvj. humoris rufi tum acidi, tum alcali & sale volatili urinoso imprægnati ℥ij. gr. xxxvj. olei spissioris & ad instar extracti ℥ij. ℥viij. gr. xij. Massa nigra in tetorta superstes pendebat ℥vj. ℥viij. gr. xxxvj. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum ℥viij. gr. lx. ex quibus talis fixi mere alcali ℥ij. gr. lx. extracta fuerunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥v. ℥iij. gr. lx. in calcinatione ℥v. ℥viij. gr. xlvij.

Ari radix insigni pollet acrimonia, ita ut semel gustata verno tempore dum succo maxime turget, per diem integrum vellicationem in linguam relinquat. Succus foliorum igne blando paululum inspissatus ab olei tartari affusione spiritum urinosum dimittit. Chartam ceruleam robore colore tingit. Insuper glutinosa est & veluti farinacea. Ex quibus conjici potest Ari radicem sale essentiali donari simili sali Ammoniaco spiritu Nitri saturato, cum oleo crasso & succo viscido & mucaginoso intermixto. Insignis illius acrimonia a spiritu seu oleo quodam subtili & acerrimo quale in Cochlearia, Helleboro, Croco deprehenditur pendere videtur, quod sola radicis exsiccatione avolat. Nam radix recens acrior est quam exsiccata, quæ extrinsece fere insipida est, dum in medio conservat acredinem haud mediocrem.

Radix in primis in usu est tam recens quam exsiccata. Ratione particularum tenuium & volatilium mucum viscidum & spissum ventriculi, & intestinorum parietibus adhærentem potenter incidit, attenuat, atque resolvit: & ea de causa egregium fir stomachicum, appetitum prostratum mire restituit & acuit: febres intermittentes sæpe solvit, tenaces, lentosque succos in primis alimentorum viis aut in mesenterii glandulis morantes solvendo. In asthma humorali, tussi a pulmonum infarctu, plurimum laudatur; pulmonum enim bronchia a pituita viscida liberat; in ictero, chlorosi, cachexiis, & chronicis morbis apprimè conducit, viscerum obstructions referendo. In affectionibus melancholicis, hypochondriacis, hyssericis, & scorbuticis quæ pendent a succorum lentore, feliciter usurpatur. Non item illis in affectionibus quæ ab humorum acredine, & fibrarum spasmo, crispatura, & ereismo oriuntur.

Radix sive sicca, sive recens a ℥ss. ad ℥i. & ℥iij. intus exhibetur, & in opiat mesentericis, & aperientibus usurpatur. Recens radix decocta, & melle excepta medetur pectoris morbis omnibus pituitosis, expectoratur enim valdissime crassas, lentasque excretaiones, adeoque asthmaticos maxime juvat ℥ij. pondere sumpta.

Nonnulli vim catharticam illi tribuunt: Mesuæ tam velot catharticum præstantissimum commendat in morbis chronicis, & contumacibus, præteritum cum Cæpa aut Passularum decocto temperatam. In eadem sententia fuisse videtur Antonius Constantinus Medicus Aquifextiensis, & Pharmacopœæ Gallo-provincialis auctor, qui cachecticos ægros hoc Eleuario purgare solebat.

24. Radic. Aronis lotar. & mundatar. ℥iij. Contunde in mortar. mar. mor. & per setaceum pulpa trahatur; cui adde Menthe pulver. ℥ij. Folior. Absinth. ℥ss. Fiat Opiata quæ egregie purgat ad ℥ss. vel ℥i. in cachexia.

24. Rad.

24. Rad. Ari pulver. ʒʒ. Cinnamomi ʒj. Sacchar. albi ʒj. Misco. Fiat pulvis ex vino vel hydromelite sumendus in asthma, tussi, mensum & lochiorum suppressione.
24. Radie, Ari, Irid. Florentin. Antihæctic. Poterii, flor. Sulphur. ana q. pl. Cum melle vel syrup. de Erythimo fiat Electuar. de quo ʒj. æger bis die sumat, in asthma & pectoris affectionibus pituitosis.
24. Ari pulver. & Gummi. ammon. ana ʒj. Tartar. vitriolati, & Cremor. Tartar. ana ʒʒ. Sennæ pulver. ʒvj. Rhei & Diaphoret. mineral. ana ʒijj. Agaric. Trochiscati ʒij. Trochiscor. Althandæ ʒij. Diagyrii ʒj. Conserv. Calendulæ ʒij. Syrup. Rosar. pallidar. q. s. Fiat Opata dosi ʒij. quotidie vel alternis diebus per mensem sumenda, in mesenterii, & viscerum obstructionibus.
24. Rad. Ari pulver. ʒij. Acori vulgar. Pimpinellæ, Saxifragæ ana ʒj. Oculor. Cancror. ʒʒ. Cinnamomi ʒijj. Salis Absinth. & Juniper. ana ʒj. Sacchar. rosati ʒʒʒ. M. F. pulvis cachecticus, cujus dosi ʒʒʒ.
24. Rad. Ari pulver. ʒʒ. Croci martis aper. ʒʒ. Myrrh. & Gummi. ammon. ana ʒj. flor. sal. Ammon. martial. ʒʒ. Conserv. flor. Calendul. vel Genistæ ʒʒ. Syrup. de Absinth. q. s. M. F. Electuar. antichæcticum & multoties probatum. Dosi ʒj. bis in die.
24. Cortic. Peruvian. ʒʒ. Rad. Ari pulver. & Croci mart. aper. ana ʒij. Syrup. de Absinth. q. s. M. F. Electuar. Dos. ʒj. quarta quaque hora in febre quartana, febribus contumacibus, & cachecticis affectionibus.

Pulpa radices recentis, & confusæ a Trago dicitur præsentissimum remedium ac minime fallax adversus venenum & pestem, sive sola, sive cum Theriaca tantumdem. A quodam Philagrio, narrante Mesuæo, ex hac radice recenti confusa, placentalæ cum frumentaræ farinæ æquali portione simul mixtis conficiebantur, in clybano coctæ comedendæ adversus hæmorrhoidales affectiones. Laurebergius ad hernias sanandas solam radicem pulveratam ad ʒj. exhibebat. Dölæus Lib. 1. Cap. ʒi. Sectio: 16. radices Ari cum floribus sulphuris commixtas tanquam summum remedium in phthisi commendat.

Quidam summam Ari acrimoniam mitigare tentarunt, sed cavendum ne vis ejus atque præstantia simul cum acredine extinguantur. Ettmullerus improbat macerationem in aceto a nonnullis propositam, quia salia alcalia volatilia acido aceti retunduntur, & in tertium salem neutrum abrum ab utroque proorsus diversum. Alii fœculam parant ex radicem recentium confusarum succo expresso, quam residare sount, donec limus seu fœces quædam tenues subsederint: tunc liquorem per inclinationem effuso, limum exsiccant in tenuissimum pollinem fœculam dictam. Sed hæc fœcula elumbe remedium est, & omni virtute fore destitutum. Hinc radix exsiccata, & pulverata sine alia præparatione anteponenda est.

Ari folia, notante Ettmullero, adversus scorbutum usurparunt, vel cum infuso vino, vel in aceto una cum radice macerata, vel alio quocumque modo præparata.

Radix & ipsa planta recens & viridis in aceto cocta & mitiores factæ, vim diureticam obtinent, remediumque suppeditant egregium contra casum

sum ab alto, sanguinem grummosum factum solvendo; qua de causa ab Helmontio dicitur remedium magnum in casu magno. *Tr. Dispensator. modernor.* 840.

Externo ulu folia arthritidis dolorem sublevant, si contusa & cum stercore vaccino mixta dolenti parti calide admoveantur. Ulcera brevi mundificant & sanant. Ad anthracem & bubonem pestilentialem imposita plurimum laudantur a Trago. Radix etiam carcinomati exulcerato prodest, & ex ea fit pulvis a Sennerto, Hartmanno, & aliis commendatus.

℞. Radic. Ari ʒij. Arsenic. correct. ʒj. Fuliginis splendidæ ʒijj. M. F. pulvis inspergendus.

Matronæ nonnullæ ex Ari radicibus stillatitias aquas ad sucum præparant, quas ad faciem erugandam, illustrandamque magis laudibus effeunt. Fæcula quoque ad eisdem adhibetur usus, siquidem cuti splendorem, nitoremque conciliare dicunt. Apud Pictones rusticæ mulierculæ massam quamdam præparare solent ex caulibus, & radicibus plantæ floridæ minutim sectis, & aqua per tres hebdomadas maceratis, aquam quotidie renovando: tandem aqua effusa, massam conterunt, exsiccant, qua linteamina saponis loco mundantur. Eundem usum J. Rajus in quibusdam Angliæ locis haud ignotum esse refert.

Ari radix usurpatur in Pulvere cachectico *Quercetani*.

A S A R U M.

A Sarum, Asara Baccara, & Baccarus: Nardus rustica, *Off. Asarum*; *Dod. Pempt.* 358. & *Inst. R. H.* 501. *J. B.* 3. 548. *C. B. P.* 197. vulgo, *Cabaret*, *Oreille d'homme*, *Oreillette*, *Rondelle*, *Girard rouffin*, *Nard sauvage*.

Humillima est, & perpetuo virens planta, radice tenui, repente, angulosa, nodosa, fibrosa, spadicea, vel cinerea, acri, amaricante, nauseabunda, aromatica, Valerianam hortensem redolente: foliis rotundis, auritis, rigidis, nitidis, obscure virentibus, logis pediculis innixis. Flores prope radicem inter folia reconditi, tenui, & brevi pediculo insident, staminei, purpurei, & vix conspicui, si calycem excipias, qui crassior est, & in tria segmenta divisus, acuta, & atropurpurea. Hujus autem posterior pars, quæ hexagona est, abit in fructum in capsulas sex divisum, in quibus semina continentur subrotunda, exigua, acinis uvæ quoad formam externam similia, fusca tunacula involuta, quæ medullam albam continent acriculam. Delectatur sylvis, & frequens occurrit circa Parisios in septo sancti Mauri. Radices, & folia in Officinis usitata sunt.

Analysi chymica, ex radicum & folior. recentium ʒv. prodierunt humoris limpidi aliquantisper odorati, subamar, obscure acidi ʒij. ʒv. ʒj. humoris primo limpidi, manifeste acidi, deinde rufescentis, intense acidi ac tandem subausteri ʒij. ʒv. gr. xij. humoris fulci, tum acidi, tum alcali: urinosi ʒij. gr. xxij. olei spissioris ad instar extracti ʒij. gr. xv. Massa nigra in retorta superas pendebat ʒvj. gr. xij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum ʒij. gr. xlvij. ex quibus salis fixi mære. alcali ʒvij. gr. lxxvj.

gr. lxxj. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥i. gr. ix. in calcinatione ℥ij. ℥vij. gr. xxxvj.

Folia & radices Afari amara sunt & acria, chartam cæruleam rubro colore tingunt. Ex his liquet, Asarum succo donari simili spiritui virioli dulcificato & spiritui oleoso volatili, aromatico, acri, simul conjunctis.

Asarum remedium est polychrestum, vomitorium nempe & per inferiora valide purgans, diureticum, sudoriferum, aptissima morborum diuturnorum medicina & menses stimulas.

Radices & folia vomitum & secessum violenter provocant. Radix pulverata a ℥ß. ad ℥j. exhibetur: in infuso a ℥j. ad ℥ij. Pulvis autem variat ratione præparationis: si enim minutissime pulveretur, eo efficacius vomitum & urinam pellit, sicut & menses. Si vero minus accurate conteratur, per inferiora solummodo purgat, sine insigni ventriculi subversione. Decoctum autem præparatur vel in vino vel in aqua. Si decoquatur in vino, retinet vim vomitoriam & cathartica: si vero decoquatur in aqua simplici, a qua sulphurea ejus pars solvi nequit, vis ametica & cathartica perit, & rite administratum fit egregium alterans medicamentum, diaphoreticum & diureticum, in morbis chronicis & febribus intermittentibus summæ utilitatis. Quod quidem primum ab Helmontio & post eum a Zvvelfero & a Cl. Tournefortio observatum fuit.

Præter facultatem emeticam & cathartica Asarum insigni donatur virtute obstructiones referandi, visceraque roborandi, unde illud emetico-catharticum in febribus intermittentibus, istero, hydropse, diarrhæa & dysenteria, in affectionibus melancholicis, ischyadico dolore & arthritide utiliter exhibetur: urinas ciet & menses pellit, unde meretriculæ plus satis frequentant decoctum ejus, cum sentiant se gravidas: & eandem ob causam, prægraves ab eo abstinere debent.

Folia, observante Vedelio, radicibus violentius purgant. Exhibentur. n. 5. 6. 7. 8. vel 9. vino aut hydromelite macerata vel cocta & expressæ.

24. Pulver. rad. Afari ℥ß. vel ℥j. Capiat æger ex hydromel. aut Oximel. vel ex conserva sldr. Aurantior.

24. Rad. Afari ℥ij. Infunde per noctem in vini albi ℥vj. Colaturam æger capiat mane.

24. Folior. virid. Afar. n. 7. vel 8. Contusis affunde vini albi ℥vj. Macerentur frigide per horam. Fiat colatura cum expressione pro haustu ad vomitum provocandum.

24. Rad. Afar. ℥i. Macerentur per noctem supra cineres calidos in aq. commun. ℔j. Fiat colatura mane, jejuno ventriculo, propinanda & in viscerum obstructionibus.

Ex radicibus & foliis Afari cum spiritu vini extractum in Officinis præparatur emeticum a ℥ß. ad ℥j.

Rarius Asarum purgantis nomine in usum venit, ex quo vomitoria sibi præparationes invaluerunt.

Pulvis stolorum triphagum est præstantissimum de quo J. Colbatch Medicus

An-

Anglus in suo Tentamine Physico-Medico, *De alcalibus & acidis quatenus habent respectum ad morborum curationem*, mentionem facit, tanquam novissime detecto a quodam D. Pitt, Pharmacopœo Vvorcestriensi. Narrat autem tria, quatuor, aut quinque grana pulveris foliorum efficaciorum adversus cephalalgiam, cubitum euntibus Tabaci more exhibita, efficere ut non turbata ægri quiete mane sequenti per nasi glandulas materie serosæ non parva quantitas exoneretur, quod verum esse sæpius comperi: imo hunc pituitosum fluxum per tres dies continuos perseverasse observavi, cum summo ægri levamine.

Idem pulvis furdirati nonnumquam medetur, annorante eodem auctore, modo in aures granum unum: aut alterum insuffletur. Hujus novi errhini efficaciam expertus sum in oris & linguae paralyti, quæ unica dosi hujus remedii & largo inde suborto pievitæ fluxu sanata fuit. Quapropter hoc errhinum seu capitipurgium medicamentum contra capitis affectus diuturnos & contumaces, ex vitæda tenacique materia oriundos, gravativos dolores, paralytism; morbosque soporosos, utiliter præscribi posse censeo.

Cæterum Asarum a signatura quæ aurem refert, a quibusdam ad aurium morbos commendatur, referente Ettmullero. Folia vel sola vel cum aliis specificis remediis mixta coquant & decoctum auribus instillant, aut in suffitu auribus admovent. Alii lixivio in quo decoctum fuit Asarum, caput lavant, & specificum dicunt ad catarrhos quoscunque, speciatim si auditum affligant, & hinc auditum & memoriam firmare credunt.

Radix usurpatur in Syropo hydragogo *Ph. Reg. Cbaras*.

Radices, folia & fructus contrita & carpis admota, ineunte paroxismo, febres intermittentes nonnumquam profligant.

A. S C L E P I A S.

Asclepias, Vincetoxicum, & Hirundinaria, *Off. Asclepias albo flore*, C. B. P. 303. *Inst. R. H.* 94. Asclepias sive Vincetoxicum multis floribus albicanibus, *L. B.* 2. 138. Vincetoxicum, *Dod. Pempt.* 407. Hirundinaria, *Tragi* 180. Hirundinaria flore albo, *Parkinson*: Cisson, Cissophylon, Hederalis, *Ruel.* 728, vulgo *Domphe venin*.

Radice est numerosis stipata fibris, pluribus ex uno capite prodeuntibus, crassiusculis, longis, albis, sapore acri subamaro, ingrato, nauseoso, odore graviusculo: caulibus lentis, cubitalibus & altioribus, hirsutis, genicularis: foliis binis ex adverso nascentibus, nonnihil per extremos margines & nervos hirsutis, forma hederaceorum, longioribus, rugosioribus, brevibus pediculis innixis. Ex foliorum alis pediculi prodeunt divisi in plures alios, qui flores sustinent albicantes, monopetalos, campaniformes, parentes, & quinquifidos, cum quinque apicibus concoloribus, rotulæ modo dispositis, calyce in totidem partes diviso, & pistillo politæ floris parti ad instar clavi infixio. Flori supponitur capitulum etiam quinquifidum. Pistillum abit in fructum ex duobus vaginis consistentem membranaceis, sesquipediam & amplius longis a basi ad apicem dehiscens, multo

multo femine sætis rufo, latitculo, compresso, pappis seu cristata lanugine instructo, ac placente squammation affixo. Ab Apocyno & Periploca Asclepias differt, quod limpidus sit illius succus, non vero lacteus ut in illis. In nemore vici Bononiæ dicti apud Parisios sponte nascitur. Usus est radicum & foliorum.

Analyti chymica, ex plantæ floridæ recentis demptis radicibus lbv. per B. V. distillaris, prodierunt humoris limpidi, saporis herbacei, primo obscure acidi, deinde manifeste acidi lbj. ℥xij. ℥vj. gr. xxxvj. Massa exsiccata residua, per retortam distillata, præbuit humoris rufescentis, subausteri, deinde falsi lbj. ℥ij. ℥iiij. gr. lvij. humoris rufi tam acidi, tum falsi ℥ij. ℥ij. gr. xxxvj. humoris rufescentis, alcali, urinosi, & sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥v. gr. xxxvj. olei spissi & butyrosi ℥ij. ℥ij. gr. liij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥vij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum nigricantium ℥j. ℥vj. gr. xxxvj. ex quibus salis fixi mere alcali ℥vj. gr. xxxvj. fuerunt extracta. Partium iactura in distillationibus fuit ℥iiij. ℥j. gr. lxxix. in calcinatione ℥v. ℥j. gr. xxxvj.

Ex radicum recenter avulsarum lbv. per B. V. distillatis prodierunt humoris limpidi, odoris & saporis aliquantisper aromatici, acris, linguam pungentis, primo obscure acidi, deinde manifeste acidi, & subausteri lbj. ℥xij. ℥ij. gr. xxliij. Massa superstes per retortam distillata præbuit humoris primo rufescentis manifeste acidi & falsi, deinde fufel, intense acidi, tandem falsi & alcali urinosi volatilis ℥vij. ℥ij. gr. xxvj. humoris fufci, empyreumatici, alcali urinosi ℥vij. gr. xlv. olei butyri ad instar spissi ℥ij. ℥ij. gr. xxxvj. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥xiiij. ℥v. gr. xxxvj. quæ igne reverberii per 24. horas calcinata reliquit cinerum leucophæorum ℥vij. ℥vij. gr. xxxvj. ex quibus salis fixi falsi ℥j. gr. ij. extracta fuerunt. Partium iactura in distillationibus fuit ℥ix. ℥j. gr. xlvij. in calcinatione ℥vj. ℥vj.

Asclepiadis radices amaræ sunt, subacres, aromaticæ, & chartam cæruleam rubro colore tingunt, folia vero debilius tingunt & subsalta sunt. Unde concludimus, sicut ex analysi, hujus plantæ radices donari sale essentiali falso tum vitriolico, tum ammoniacali, acido plusquam saturatis, & multa terra, mulcoque oleo tum tenui, tum crasso bituminoso involutis: folia vero plus ammoniacalis salis continere.

Radix alexipharmaca est & sudorifera: in peste & aliis morbis mali moris plurimum commendatur. Menses & urinas provocat. Pulverata ad ℥j. exhibetur. In infuso vel decocto ab ℥ss. ad ℥j. Nonnullis, dum recens est, nauseam vel vomitum levem excitat. In variolis, morbillis & febribus malignis, ejus decoctum a Cl. Tournefortio Scorsbœneræ decocto antepositum ad diaphoresim aut sudorem promovendum. Decoctum ejus in aq. comm. lbj. præscribitur pro potu ordinario. Ad strumas sanandas, & ad menses suppressos revocandos utile est idem decoctum sæpius usurparum.

℥j. Radicum Vincetoxici ℥j. Infunde in aq. bullientis lbj. Infusum percoletur. Dividatur in tres cyathos, cum syr. de Arthemisia aut apertiente cachectico Pb. R. Charas propinandas quasque horas, in suppressione mensium.

Ejus-

Ejusdem decoctum cum vino a Paracelso laudatur in hydropse. Radix pondere semilibrae per noctem in vino macerata & deinde usque ad tertias decocta mane, jejuno stomacho, calida pota, sudore interm pro vocato, mirifice expellit aquam intercutem, adeo ut illa per pedum plantas erumpat: estque hoc singulare experimentum a Trago relatum.

Externe tam folia, quam radices & semina usurpantur in mammarum ulceribus, aliisque sordidis ac malignis mundificandis: ad morsus viperarum & insectorum venenatorum ictus. Folia contusa mammarum tumoribus resolvunt & discutunt.

Ex foliis & radicibus præparatur extractum ad eandem usurpatum a 3ß. ad 3jß.

Radix usurpatur in aceto Theriacali *Pharm. Reg. Charas* & in electuario Orvietano *Frederici Hoffmanni*.

ASPARAGUS.

DUplex est Asparagus in Officinis usitatus, sativus & sylvestris:

Asparagus, sativus *Off. Asparagus sativa C. B. P. 489. Inst. R. H. 300. Asparagus hortensis & pratensis J. B. 3. 725. Asparagus sylvestris Mathiol. 478. vulgo, Asperge.*

E radicibus numerosis, ab uno veluti capite pendentibus, teretibus, carnosis, candicantibus, subdulcibus, glutinosis, primo vere cauliculos emittit teneros, longos, teretes, virides, glabros, sine foliis, ab uno celsipite plures, esculentos, & grati saporis, qui paulatim ad duorum cubitorum altitudinem assurgunt & in numerosos, tenues, firmos dividuntur ramos & virgas, circa quas folia nascuntur frequentia, viridia, capillacea, mollia, uncialia. Flores rosacei sunt, hexapetali, pallide virentes, cum pistillo in fructum seu baccam mollem abeunte, Pili magnitudine, sere globosum, purpurascentem, mollem, subdulcem, cum seminibus duobus vel tribus umbilicatis, nigris, duris, cornæ soliditatis. In hortis & arvis colitur, in primis ad culinarium usum. Ejus enim recens enati turiones seu Asparagi proprie dicti diversimode cocti mensis apponuntur & palato mirifice placent, Radix & semen in Officinis Pharmaceuticis usitata sunt.

Analyti chymica, ex radicum tenerarum & recentium ʒv. per. B. V. distillatis, prodierunt humoris limpidi saporis herbacei, obscure salis ʒij. 3vj. gr. xxvij. humoris limpidi, subacidi ʒxi. 3j. gr. xlv. Residuum per retortam distillatum præbuit humoris rufescentis, subacidi, subacris & austeri ʒiiij. gr. xvj. humoris alcali, urinosi, volatilis empyreumatici ʒi. 3v. gran. xx. olei spissi ʒi. 3. gr. liij. Massa nigra in retorta residua pendebat ʒv. 3j. gr. xvij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum fuscorum, nigricantium ʒi. 3ij. gr. xv. ex quibus salis fixi alcali 3ij. gran. liv. extracta fuerunt. Partium jactura in distillationibus fuit ʒiv. 3vj. gr. xxxvj. in calcinatione ʒij. 3vij. gr. iij.

Illæ radices subdulci & glutinoso sapore donantur cum quadam austeritate, chartam cæruleam colore rubro levissimo quidem, inficiunt; unde Tournefor-

nefortius censet eas sale essentiali donari tartareo vitriolato simili, multo phlegmate diluto, oleo crasso, copioso & mediocri terræ portione implicito. Aliquid tamen nitrosi huic tartaro vitriolato conjungitur, quod quidem in turionibus majori copiaprehenditur.

Turionum viridum summitates ad ℥v. per retortam distillatæ præbuerunt humoris aliquantisper turbidi & lacteicentis, odoris, & saporis herbacei Asparagos referentis ℥xij. ℥ij. gr. xlvij. humoris limpidi, primo obscure acidi, deinde manifeste acidi ℥iij. ℥ix. ℥iij. humoris rufi empyreumatici, alcali. urinosi ℥j. gr. xxxij. salis volatilis urinosi, concreti gr. lx. olei adiposæ crassitudinis ℥ij. gr. xxiv. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥j. ℥iij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum ℥vj. gran. xlvij. ex quibus salis fixi alcali ℥ij. gr. xxij. lixivio extracta fuerunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥v. gr. lx. in calcinatione ℥j. ℥v. gr. xxij. Ex hac analysi liquet Alparagorum turiones salem ammoniacalem nitrosum continere copiosum, & magis explicitum quam in radicibus, a quo vis diuretica pendere videtur.

Asparigi turiones seu germina recentia ciborum appetitum excitant, sed nutrimenti parum præbent. Urinam provocant, & mirum factorem ei communicant. Sunt qui eos tanquam præservativum in calculo, & lithontripticum commendant; sed ab Helmontio, & Ettmullero arguuntur, qui ab eorum usu lithiasin inducit asserunt. In quibusdam venerem stimulant acribus suis salibus, nerveas partium & urinæ secretioni & generationi dicatarum membranas proritando. A nonnullis vis alvum emolliendi illis tribuitur, quæ ab aliis denegatur, adeo incerta est.

Radix Asparagi inter quinque radices aperientes majores numeratur cum Apio, Fœniculo, Petroselino, & Rusco. Diuretica censetur, sed hac virtute turionibus inferior mihi videtur. In prisanis, apozematibus, & jusculis aperientibus, præscribitur cum aliis radicibus aperientibus ab ℥ss. ad ℥j. pro decocti ℥j.

Eadem vis diuretica feminibus tribuitur, sed in usum rarissime veniunt.

Radicibus usurpantur in Syrupo de quinque radicibus aperientibus, Syr. de Althæa, antrinephritico Pb. Reg. Syrup. de Cichor. comp. Semina vero in pulvere lithontriptico *Renaudæ*, & Benedictæ laxativa.

Alparagus, sylvestris Offic. Alparagus sylvestris tenuissimo folio C. B. P. 490. Inß. R. H. 300. Alparagus sylvestris *Martbiol.* 478. A sativo non differt, nisi partium exilitate, ita ut nonnulli eos inter se discrepare existimarent sola cultura, quæ speciosiora & ampliora omnia reddit. Artamen Cl. Tournetfortius observavit Alparagum sylvestrem diu in horto Regio excultum nullam mutationem subuisse nec cultura ampliorem factum fuisse. Unde concludit eum non sativi varietatem esse, sed speciem diversam.

Idem donatur virtutibus, imo valentioribus; ita ut, pro usu medico, sativo a plurimis anteponatur.

A S P E R U L A.

A Sperula, Aspergula, Asperula odorata, Hepatica stellata, Stellaria; *Matrisylva* Off. *Aparinæ* latifolia humilior montana *Just. R. H.* 114. *Asperula* sive *Rubeola*, montana, odora *C. B. P.* 334. Rubiis accedens. *Asperula* quibuldam, sive *Hepatica stellaris* *J. B.* 3. 718. *Asperula* odorata flore albo *Dodon. Pempt.* 355. *Hepatica stellata* *Tabern. Icon.* 816. *Stellaria Brunfelsi*: *Matrisylva* *Trag.* 496. vulgo *Petit Muguet*.

Radice est tenuj, geniculata, fibrata, repente cauliculis tenujbus, quadratis, geniculatis, palmaribus & dodrantalibus: folijs ad singula genicula senis vel septenis verticillatim dispositis, aliquantulum scabris, folijs *Aparinæ* latioribus, pallidius virentibus. Flores in ramulis summorum caulium nascuntur, monopetali, campaniformes, patentes, quadrifariam divisi, candidi, suaviter olentes, cum calyce, qui abit in fructum siccum, cortice tenuj & aspero obductum, ex gemellis globulis constantem: Tota planta gratum, suavemque spirat odorem. In agro Parisiensis sponte nascitur. Tota planta in usum venit.

Analysî chymica, totius plantæ floridæ, dempta radice *℔v.* præbuerunt humoris limpidi, obscureacidi, saporis herbacei, amaricantis *℔j.* *℥ij.* humoris primo rufescentis, subacidi, amaricantis; acris, lingua pungentis, & *Perficorum* nucleorum saporem referentis, deinde fusci, empyreumatici, acidi manifesti, amari & aliquantisper austeri *℔ij.* *℥ij.* gr. xij. humoris empyreumatici, fusci, alcali, urinosi, & sale volatili imprægnati *℥j.* *℥vij.* gr. xlvij. olei instar syrupi crassi *℥ij.* *℥iij.* gr. xxiiij. *Massa nigra* in retorta residua pendebat *℥vij.* *℥ij.* quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum leucophæorum *℥iij.* *℥j.* gr. xxxvj. ex quibus salis fixi mere alcali *℥v.* gr. liij. lixivio fuerunt extracta. Partium iacturam distillatione fuit *℥xiiij.* *℥vj.* gr. lx. in calcinatione *℥iij.* gr. xxxvj. Per hanc analysim liquet *Asperulam* sale essentiali donari tartari vitriolato simili, multo oleo acri tum tenuj, tum crasso consociato. Tota planta gratum suavemque spirat odorem, saporem habet subsalsum, & aliquantisper austerum.

Ratione tenujum suarum particularum humores crassos ac tenaces incidit, attenuat, discutit: & levi qua donatur adstrictione viscerum fibras nimis laxas firmat & roborat. Eapropter in levioribus & incipientibus hepatis, lienis, mesenterii obstructionibus, in ictero, plurimum valet, necnon etiam in epilepsia, & paralyti commendatur. Vulnerariis quoque plantis annumeratur, nec immerito: blando enim suo sulphure humorum acrimonia demulcetur, & adstringentibus suis particulis solidæ partes leviter confringuntur. Externe herba contusa cataplasmatismodo hepatis tumori imponitur. Ejus decocto cutis scabie scædata lavatur.

Ex floribus conditum præparatur adversus epilepsium proficuum, & ex illis tinctura cum spiritu vini extrahitur adversus paralyfim commendata.

A T R I P L E X.

A Triplicis plures sunt species, quarum tres potissimum in Officinis usitatae sunt, de quibus hic agemus, scilicet *Atriplex alba*, *Atriplex rubra*, & *Atriplex foetida*.

Atriplex alba *Offic.* *Atriplex hortensis alba*, sive pallide virens *C. B. P.* 119. & *Inf.* *R. H.* 505. *Atriplex alba hortensis* *J. B.* 2. 970. *Atriplex sativa alba* *Lob. Icon.* 253. vulgo, *Arroche*, *Belle-dame*, *Bonne dame*, *Follette*.

Radice est recta, palmari fibrosa, annua: caule procero & erecto, imo terete, supremo anguloso, ramoso: foliis Blui minoribus, laevioribus, molioribusque, triangulis, ad pediculum quasi alatis nonnihil in ambitu sinuatis, & tenuj quadam farina respertis, colore ex viridi in laeum languente, gustu satuo. Flores in summo caule & ramulis copiosi nascuntur, aperiati, plurimis scilicet staminibus & apiculis constantes luteis vel herbidis, ex calyce pentaphyllo surgentibus, cum pistillo quod abijt in semen unicum, orbiculatum, compressum, spadiceum, saporis, dum recens est nidorosi, ipso calyce seu capsula folliculacea obvolutum.

Atriplex rubra *Off.* *Atriplex hortensis rubra* *C. B. P.* 119. & *Inf.* *R. H.* 505. *Atriplex rubra hortensis* *J. B.* 2. 970. *Atriplex sativa altera*, folio & flore purpureo livens *Lob. Icon.* 253.

Hae species cum praecedente omnibus suis partibus, totaque facie externa convenit, praeter colorem sanguineum seu purpureum obloletum, quo penitus tingitur, & imbuitur.

Atriplex utraque in hortis olitorijs, ubi seritur, annua est. Semel vero sata ex semine deciduo se quotannis renovat. Herba cocta estur, ut oleus nunc tamen rarissime caulinas ingreditur. Folia & semina in usum Medicum veniunt.

Analysi chymica, ex foliorum *Atriplicis albae* *Stv.* prodierunt humores primo limpidi, deinde sub turbidi, flavescentis, odoris & saporis subfalsi, lixiviosi, qui falsi & alcali salis notas praebuit *Stj.* *3vj.* *3vij.* gr. *lj.* humoris flavescentis cum falsi & alcali urinosi, tum acidi *Stj.* *3j.* *3vj.* gr. *lix.* humoris fusci, sale volatili urinoso impraegnati *3vj.* salis volatilis urinosi, concreti gran. *xliij.* olei *3.* *vj.* gr. *xvij.* Massa nigra in retorta residua, pendebat *3liij.* quae igne reverberij calcinata reliquit cinerum *3ij.* *3ij.* gr. *xxxvij.* ex quibus lixivio salis mere alcali fixi *3j.* *3ij.* gran. *xvij.* Partium deperditio in distillatione fuit *3j.* *3v.* gr. *ij.* in calcinatione *3ij.* *3liij.* gr. *xliij.*

Atriplex itaque sale essentiali donatur salso ammoniacali, nitroso qualis exurgeret ex mixtura spiritus nitri & salis volatilis urinosi, cum olei portione non mediocri conjunctis, multo phlegmate dilutis & pauca terra.

Atriplex utraque alba & rubra exiguum admodum nutrimentum vescens praebent, stomacho nocent, nisi aromatibus aut sale, & aceto condiantur. Jusculis quae alvi ciendae causa parantur non parum utiles sunt. Natura sua refrigerant & humectant. Herbis emollientibus annuerantur.

tur. Alvum emolliunt, blande laxant, fœces induratas fluxiles faciunt, simulque flatus discutiunt. Egregie præsertim conveniunt hypocondriacis, quorum viscera æstuant & alvus constricta est nimis. Ebullientes in primis viis humores acres & biliosos temperant, indeque natos ardores & inflammationes mitigant. In clysterum decoctis recentes præscribuntur. ad Mj. aut Mij. in primis emollientibus & anodynis, alvum durum provocantibus & moderate laxantibus. In cataplasmatibus etiam pro inflammationibus sistendis, doloribus mitigandis, partium tensionibus laxandis & emolliendis tumoribus duris imponuntur, atque podagricis doloribus leniendis. Cum foliis Vitis, herba Anethi & Chamæmeli ingreditur pediluvia, pro somno conciliando, in febris ardentibus & deliriis.

Atriplicis albæ semina recentia tum alvum abunde subducunt, non sine molestia, tum crebros vomitus provocant teste Matthiolo. Serapio narrat Rhasim vidisse hominem quemdam, qui ex Atriplicis semine Zij. pondere sumpto, crebris tum vomitibus, tum alvi defectionibus vexatus fuit, adeo, ut ad extremam virium imbecillitatem deveniret. A quibusdam in isto commendantur, ab aliis in rachitide. Usurpantur in pulvere de Guttera dicto, a Riverio adversum infantium epilepsiam præscripto.

Atriplex fœtida, Vulvaria *Offic.* Chenopodium fœtidum *Inst. R. H.* 506. Atriplex fœtida C. B. P. 119. f. B. 2. 974. Vulvaria *Tabern. Icon.* 428. Atriplex pusilla, olida hircina, Vulvaria vocata, Garum olens *Lob. Gurosmum Dod. Pempt.* 616.

Ex radice gracili, fibrata, cauliculos promit repentes, ut plurimum ramulos, dodranteales aut longiores, quos vestiunt foliola subrotunda, in obtusum acumen desinentia, colore formaque Atriplicis, sed minora multo, farinaceo pulvisculo asperso candicantia, odore viroso Garum putridum referentia, præsertim si digitos inter conterantur. Flores summis ramulis acervatim inhaerent, exigui, apetali, plurimis scilicet staminibus constantes ex calyce quinquifariam diviso surgentibus, cum pistillo, quod abie deinde in semen unicum minurum, splensens, nigricans orbiculatum, & planum, in capsula veluti stelliformis, quæ floris calyx fuit, reconditur. Locis incultis & juxta seminas nasci gaudet. In agro Parisiensi reperitur.

Analysi chymica, ex Atriplicis fœtidæ floridæ lbv. prodierunt humoris primo limpidi, deinde flavescens, odoris & saporis salsi, luviosi, qui alcali urinosi notas præbuit, lbj. Zvj. gran. xxxvj. humoris primo flavescens, deinde rufescens, salsi, tum alcali urinosi tum subacidi lbj. Zij. Zvj. gran. xxxvj. humoris sulci empyreumatici, sale volatili urinoso imprægnati Zj. Zij. gran. xxij. salis volatilis urinosi concreti Zij. gran. xij. olei adiposi, Zj. Zvj. gr. xxxij. Massa nigra in retorta superflua pendebat Zij. Zvj. gran. xxxvj. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum Zj. Zvj. gran. xlvij. ex quibus lixivio, salis fixi mere alcali Zj. Zvj. gran. xxx. Partium jactura in distillatione fuit Zj. Zij. gran. xxxix. in calcinatione Zj. Zvj. gr. lx.

Tota planta odorem fœtidum ammoniacalem urinosum refert, & consistat sale essentiali ammoniacali, sere explicito, & oleo crasso copioso permixto.

Hæc planta antihysterica censetur. Odore paroxysmos hystericos fugat. Porus infusi foliorum extractorum calide sumptus passioni hystericæ mire prodest. Ex foliis recentibus contusis, cum saccharo conditum præparatur hystericis utilissimum. Eorum tinctura cum aqua vitæ parata a Cl. Tournefortio ad eodem affectus commendatur. In paroxysmis hystericis ejus decoctum pro clystere utile censetur.

A V E N A.

Avenæ species duæ usitatæ sunt, Avena alba, & nigra.

Avena alba Off. Avena vulgaris seu alba C. B. P. 23. *Inf. R. H.* 514. Avena alba J. B. 2. 432. Avena, *Dodon. Pemptados* 511. vulgo, *Aveine*.

Ex radicibus tenuibus, copiosis, culmi aliquot ex gramineis vaginis prorumpentes assurgunt, geniculis quatuor aut quinque in eodem culmo distincti, cum foliis gramineis. In cacumine panicula se explicat sparsa, cum floribus apertis, per fasciculos pendulos dispositis. Singuli autem flores plurimis staminibus constant candicantibus, ex calyce surgentibus. Pistillum autem deinde abit in semen oblongum, tenue, acutum, subalbicans, farinaceum, & superiori parte exiguis capillis hirsutum; gluma quæ calyx floris fuit, crassa, & dura obvolutum. In omnibus regionibus tam calidis, quam frigidis feritur. Semen in usu est.

Avena nigra Off. Avena nigra C. B. P. 23. *Inf. R. H.* 514. J. B. 2. 432. Avena sylvestrior, nigra tenuiorque *Cæsalpin.* 177.

Alba aspectu magis agrestis est, stipula crassiore, & folio nigriore. Granum huic strigosius, longius, & pilosius est quam præcedenti, gluma pilosa, & nigra tectum.

Analysi chymica, ex Avenæ vulgaris optime purgatæ lbv. prodierunt humoris limpidi, Avenam coctam odore, & sapore referentis, subacidi, & occulte salis ℥x. ℥v. gr. lvij. humoris rufescentis, empyreumatici, intense acidi, austeri, acris, linguam aliquantisper pungentis, cum aliquibus alcali indicibus lbj. ℥ij. ℥iiij. humoris fusci, alcali urinosi, & sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥ij. ℥v. gr. xxxiiij. olei spissioris, Syrupi ad instar ℥vij. ℥ij. Massa nigra in retorta residua pendebat lbj. ℥vij. ℥ij. gr. xxxiiij. quæ igne reverberii per duodecim horas calcinata, cinerum reliquit pinguium adhuc, & viscidorum ℥ij. ℥ij. gr. xx. ex quibus lixivio, salis fixi alcali ℥j. gr. xi. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit lbj. ℥j. ℥iiij. gr. xx. in calcinatione lbj. ℥v. gr. xiiij.

Avena itaque constat sale ammoniacali multo oleo involuto; unde compositum exsurgit mucaginosum. Insuper Avena, cerealium more, aqua macerata fermentescit, & in liquorem vinosum posteaque in acetosum convertitur.

Avena in usu frequentissimo est, tum in cibo, tum in Medicina. Seritur quidem pro equorum pabulo, aliorumque animalium. Ex ea tamen optimæ, & variz pulres atque sorbitiones præparantur. Non alia fere

Geoffroy Tom. II.

F

jucu-

juscula apud Anglos in usu sunt, quam Avenata, tam apud nobiles; quam plebejos, quæ sane tam ægrotis, quam sanis saluberrima sunt. Facile coquuntur, & optimum alimentum corpori subministrant.

In annonæ caritate, inquit Rajus, tenuioris conditionis homines, hisce jusculis præcipue visitant, & tamen meliore valetudine fruuntur, quam qui delicatissimis, variaque arte confectis cibis utuntur. Bene nutriunt, floridumque satis colorem infantibus efficiunt.

In montosis septentrionalibus Angliæ, inque Cambria, ex Avena decorticata, & molita panes, & placentas varii generis conficiunt. Nec alio pane utuntur rustici, & tamen optima valetudine fruuntur, & maxime longævi sunt, narrante J. Raio: & sane minime dubium est, quin panes illi saluberrimi sint, quamvis non assuetis ob amarorem minus grati.

Est & edulium quoddam, quod ex ea decorticata leviter tusa, pinsitaque, apud inferioris Normanniæ, & Armoricarum Regionum populos conficitur, Grualdum, *Gruau* vulgo nuncupatum. Vel solum ex aqua, vel lacte, vel carniū jure leviter coquitur: & decoctum in sorbitione seu jusculo acceptum bechicum est, confertque russienibus. Humorū acrimoniam demulcet, æstum temperat, effervescentiam coerct, æstuantesque sales per urinarum vias præcipitat, & expellit. Ex eo quoque pulcicula seu cremor paratur, cui adjicitur lac vaccinum, aut succus Amygdalarum dulcium, itemque saccharum, qua ratione fit palato gratissimum. Omnes fere apud Anglos Medici in morbis acutis non aliis fere sorbitionibus ægrotos alunt, quam avenatis. Revera blanda mucagine humoris acrimoniam demolcent, æstum temperant, effervescentiam coercent, tenuibus suis particulis crassos ac tenaces succos dividunt, æstuantesque sales per urinarum vias præcipitant, & expellunt, necnon etiam sudores quandoque provocant, & insensibilem transpirationem restitunt: unde in catharris, raucedine, tussi, exulceratione, & asperitate faucium, aphthis ab acri lymphæ oriundis, pleuritide, peripneumonia, erysipelatosi affectionibus utiles sunt, & in febribus acutis jusculis carniū anteponendæ, quandoquidem humores, & sanguineam massam ad effervescentiam minus inducunt.

Cerevisiam quoque ex Avena non secus quam ex aliis frugibus Angli & Lithuani conficiunt, quæ hordeacæ bonitate non multum cedit, aliquo etiam respectu ei præfertur.

VValli ex amylo Avenæ in aqua ad gelatinæ crassitiem decocto ferculum parant, quod in magno, non in VVallia tantum, sed per totam Angliam pretio est. Gelatinam hanc amyleami, avenaceam, calidam, in taleolas dissectam cum lacte, vel cum cerevisia, aut vino albo Saccharo edulcorato mixtam comedunt.

Avena cum pugillis aliquot salis in sartagine torrefacta, sacculo tenuioris telæ inclusa, calensque abdomini applicata, in colico dolore levamen affert, & eo felicius si grana Juniperi, & Cumini semen illi admisceantur.

Farina Avenæ extrinsecus ad cataplasmata non minus utilis est quam Hordei: exsiccat enim, & mediocriter digerit. Cum butyro cocta in scabie capitis-exsiccanda commendatur.

Illis

Illis qui calculo renum laborant, Simon Pauli commendat balneum ex Polenra trita, Lupulo, & Avena stramine, quod insigniter mitigat dolores nephriticos.

AURANTIA MALUS.

Inter varias Aurantiarum arborum species, duæ sunt potissimum, quarum fructus apud nos in usu sunt, scilicet malus Aurantia fructu acri, & malus Aurantia fructu dulci.

Malus Aurantia, fructu acri *Off. Aurantium acri* medulla vulgare, *Ferrarii Hesperid.* 377. *Inf.* R. H. 620. Malus Aurantia major C. B. P. 436. Aurantia Malus J. B. 1. 97. *Oranger a fruit aigre*, vulgo *Bigarvades*.

Elegantissima hæc arbor parum procera, radice est crassa, lignosa, ramosa, alte, & late diffusa, intus lutea: trunci materie dura, spissa, intus candida, odorata, cortice glabro ex viridi subalbicante circumvestita; ramis numerosis, nitide virentibus, & complures in ramulos flexiles, & spinis nonnullis refertos divisas: foliis Lauro larisoliæ proximis, perpetuo virentibus, crassis, lævibus, latis, & utrimque in acumen desinentibus, cum pediculo foliato seu corculi aspectu, & infinitis Hyperici instar, cellulis oleariis minutissimis translucentibus refertis, velut totidem foraminulis perviis. Flores odorati, quasi fasciculatim conferti, rotacei sunt, quinque scilicet petalis, candidis, in orbem positis, constantes: ex floribus calyce surgit pistillum viride, foliolis in albicantia desinentibus stamina, cum apicibus luteis stipatum, quod deinde abit in fructum fere globosum, cortice carnoso, lineas duas, tres, quatuorve crasso, intus albido, extus aureo vel croceo, dum maturus est, ante maturitatem, viridi, amaro, acri, linguam pungente, facile ab interiori medulla separabili, in octona loculamenta facile ab invicem separabilia divisum, succi acidi, & pulpæ vesicularis plena, nucleisque vel seminibus sæta oblongis, ex luteo candicandibus, callosis, cum medulla amara.

Malus Aurantia dulci medulla *Off. Aurantium dulci* medulla vulgare *Ferrarii Hesperidum* 377. *Inf.* R. H. 620. Malus Aurantia *Dod. Pempt.* 792. *Oranger a fruit doux*, *Orange douce*.

Hujus inter, & prioris arboris folia, & flores nullum observatur discrimen. Soli fructus inter se differunt, tum cortice, tum medulla. In acribus ille subtristi colore flavet, granosa plerumque scabritie rugat, peracri amaritudine mordet, odore peracuto ferit: hæc autem, medulla nempe, dilutioris est palloris, & asperioris acrimonie. Differt autem Aurantium dulce corticis tenuitate, lævore sæpius mollissimo, colore ardenter croceo, amaritie remissiori, & odore diluto: medullæ quoque subflavo sive sulphureo aspectu, insulsa nonnumquam, nonnumquam vinoso dulcedine, laxiore frequenter orbe, succoque uberiore. Utraque hic in horis summa cura colitur. In insulis Stœradibus (*Hesperes*) & in Gallo Provinciæ maritimis oris, adeo familiaris est Aurantia Malus, ut semper virentium lucorum amœnitate, & Pomorum fœtura perenni

neutiquam inquilina videatur. Folia, flores, & fructus seu fructuum cortex, medulla, semen in usu sunt.

Fructus in officinis varia obtinet nomina. Malum dicitur Aurantium, Arantium, Aureum, Anarantium, Nerantium, Chryfigenum, & Citrangulum.

Analyſi chymica, unaquæque libra petalorum florum Aurantium a piſtillis, & calycibus ſeparatorum per B. M. blando igne diſtillatorum, præbuit humoris aquoſi, limpidi, odorati, fragrantis, tubamaricantis, & ſub finem obſcure acidi ℥xiiij. circiter, cum aliquot olei eſſentialis guttulis.

Eorundem petalorum exſecratorum ℔v. per retortam diſtillatæ præbuerunt humoris reſuſcentis turbidi, primo odoris, & ſaporis non ingrati ſorem adhuc referentis, acidi, pungentis, deinde intenſe acidi, & empyreumatici ℔j. ℥v. ℥j. gr. l. humoris turbidi albicantis cum acidi, tum alcali, & ſale volatili urinoſo copioſo imprægnati ℥ix. ℥ij. gr. xliiij. ſalis volatilis urinoſi concreti gr. xxvj. olei ſum eſſentialis, tum craſſioris ℥viij. ℥j. gr. xxviij. Maſſa nigra in retorta reſidua pendeat ℔j. ℥x. ℥viij. gr. xl. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum albicantium ℥v. ℥v. gr. xl. ex quibus ſalis fixi mere alcali ℥iiij. ℥ij. gr. xij. lixivio extracta fuerunt. Partium iactura in diſtillatione fuit ℥xiiij. ℥ij. gr. xxx. in calcinatione ℔j. ℥v. ℥ij.

Per hanc analyſim liquet flores Aurantios ſalem eſſentialem continere ammoniacalem; aliquantiſper aſterum, cum multo oleo aromatico, tum tenui, tum craſſo, conſociatum.

Ex corticum malorum Aurantium acidorum, recentium, per vaporarium diſtillatorum ℔v. prodierunt humoris limpidi odorati acidi, primo occulti, deinde manifeſti ℔iiij. ℥viij. cum olei eſſentialis ℥ix. Maſſa ſicca in alambice reſidua pendeat ℥xxij. ℥ij. quæ igne reverberii diſtillata fudit humoris intenſe acidi ℥v. ℥ij. & peculiaris indolis; quippe qui vitrioli Hungarici ſolutionem rubro colore inficit, modo unicæ vitriolicæ ſolutionis parti, huiuſce liquoris partes 15. vel 16. affundantur: humoris tum acidi, tum alcali volatilis urinoſi ℥j. gr. xxxvj. olei fluidi tum eſſentialis, tum craſſioris ℥ij. ℥viij. gr. lxj. Maſſa nigra in retorta reſidua pendeat ℥viij. Quæ igne reverberii per 14. horas in crucibulo calcinata reliquit cinerum leucophæorum ℥j. ℥iiij. gr. xij. ex quibus ſalis fixi mere alcali ℥iiij. gr. xviij. extracta ſunt. Partium iactura in diſtillatione per vaporarium fuit ℥j. ℥viij. in diſtillatione per retortam ℥v. ℥viij. gr. xlvij. in calcinatione ℥v. ℥iiij. gr. lx.

Itaque cortex Aurantium multum olei continet eſſentialis, & craſſi cum ſale eſſentiali tartareo, & aſtero commixtum.

Succus malorum Aurantium acidorum per vaporarium diſtillatus ad ℔ij. fudit humoris limpidi, ſere inſpidi, acidi, primo occulti, deinde manifeſti ℔ij. ℥viij. Maſſa reſidua ſpiſſa, & ſere arida pendeat ℥iiij. ℥vj. quæ per retortam igne reverberii diſtillata præbuit humoris tum alcali urinoſi, tum acidi ℥j. ℥iiij. humoris alcali urinoſi ℥iiij. gr. liij. olei ſpiſſi ad inſtar ſyrupi ℥ij. gr. xxxj. Maſſa nigra in retorta ſuperſtes pendeat ℥j. ℥ij. gr. xxxvj. quæ in crucibulo per ſex horas calcinata reliquit cinerum nigricantium ℥j. gr. lxix. ex quibus ſalis fixi mere alcali ℥j. lixivio extracta fuit.

Succus

Succus ille licet gustu acidus mediocri tamen acidi salis quantitate donatur, & cujus portio non exigua in salem alcali urinosum igne convertitur. Sal ille acidus rarus est, admodum & cum tenuissimo sulphure intermixtus. Ea sane de causa succus ille recenter expressus & per aliquod tempus in loco frigido asservatus in tenuem gelatinam seu mucaginem concrevit.

Succus malorum Aurantium dulcium exigua admodum salis acidi portione donatur, & parum salis alcali præbuit.

Flores malorum Aurantium odoris gratia apud nos hodie in præcipuum honorem sunt, in odoramentis, tum in condimentis. Hic odor fere solus super Rosas, Ambarum & Moschum prævaluit. Ex his floribus distillatur aqua fragrantissima quæ non solum odoris præstantia cæteras præcellit, sed ad medicamenta etiam optime facit. Aqua Naphæ a nonnullis nuncupatur. Cephalica est, stomachica, hysterica & alexipharmaca. Ventriculum roborat & flatus discutit blando suo amaro haud ingrato. Paroxysmos hytericos & spasmodicos hypochondriacorum motus sedat, & menses promover ad cochlear unum aut alterum epota sola vel cum alio quocumque liquore idoneo. Ad febres pestilenciales & mali moris a Matthiolo commendatur tanquam alexiteria & sudorifica, si sex unciarum pondere potanda exhibeatur. In portionibus & julapis cephalicis, cardiacis, stomachicis & hytericis ad ℥i. aut ℥ij. præscribitur.

Ex iisdem floribus condita varia tum solida, tum molliora, & tabellæ conficiuntur, quæ palato gratissima mensis secundis apponuntur, aut medicamentis admiscuntur ad eorum saporem ingratum corrigendum, aut ad ventriculum roborandum.

Ex foliis viridibus mali Aurantiæ aqua stillatitia quoque paratur a nonnullis magis laudata ad easdem affectiones, utpote amara magis, licet minus odora.

Cortex malorum Aurantium acidorum utpote magis amarus, non solum ad intinctus reservatur, sed etiam in usum medicum præ dulcium cortice venit. Ventriculum roborat, ciborum concoctionem juvat, humores crassos ac tenaces dividit, attenuat, flatus discutit, colicos dolores sedat, menses movet & lochia, & vermes necat. In ischuria & dysuria laudatur a nonnullis ut præsidium specificum. Pulvis a ℥j. ad ℥j. exhibetur.

Idem cortex ad immodicos mulierum menses sistendos a Ludovico Septalio commendatur. In aq. comm. ℥vij. trium acrim Aurantium subviridium adhuc & nondum perfecte maturorum cortices in phyllas seu pelliculas confectos incoquit, donec sint ejusdem aquæ partes duæ consumptæ: tum decoctum percolatur, cujus ℥vij. aut ix. mane potui dantur. Huic decocto, si valentius desideretur Pilosellæ manipulum postremo excoquendum adjicit, & in eo candens ferrum sæpius extinguit.

Oleum essentielle dictum ex hoc cortice distillatum vel leviter expressum ad guttas ij. vel iij. cum Saccharo sub elæosacchari forma exhibetur iisdem in affectionibus.

Tinctura quoque ex hisce corticibus tum siccis, tum recentibus, cum spiritu vini tartarizato extrahitur ad eadem commendata. A ℥ss. ad ℥j. exhibetur.

Usurpatur cortex in tinctura amara stomachica *Londinensium*, & in Aqua Theriacali *Charas*.

Cortices tum dulcium, tum acidorum, Saccharo conditi, inter delicatissima bellaria mensis secundis inferuntur.

Pulpa interior Aurantium dulcium comeditur sola vel cum Saccharo; sitim extinguit, refrigerat, appetitum prostratum suscitatur: sed exiguum admodum vel nullum alimentum præbet nisi prævum. Itaque cavendum ab illius ingurgitatione, diarrhæas enim, & dysenterias excitat. Acidorum pulpa deterior est, pulmones irritat & tossim inducit. Succus Aurantium acidorum e medulla expressus, aqua dilutus & Saccharo temperatus potum *Orangeat* vel *Orangeade* vulgo dictum, sanis gratissimum in diebus æstivis ad sitim extinguendam, & temperandum sanguinis æstum suppeditat, biliosis naturis, febricitantibus, & scorbuticis utilissimum. In potionibus antiscorbuticis, & febrifugis ad ℥j. aut ℥ij. præscribitur. Idem succus urinas, & menses promovet, quapropter in mensium suppressione succus unius mali Aurantii acidi in haustu vini albi expressus cum Croci pulverati gr. xij. a mulierculis haud inutiliter usurpari solet.

Malum Aurantium dulce integrum cum cortice, & medulla comestum ante febris intermittens accessionem tertianæ præsertim sæpe paroxysmum avertit, & febrem ipsam nonnumquam profligat. Idem ad scorbutum sanandum efficacissimum est: cum cæteris antiscorbuticis medicamentis optime confociari solet: imo Aurantia, & Citrea mala sola plurimum valent, siquidem scorbutici nonnulli solo esu crudorum diuturno perfuncti sunt.

Semina amara sunt; vermes necant, putredini resistunt, quare inter alexipharmaca a quibusdam recensentur.

B A R D A N A.

Bardana, Personata, Lappa major, *Off.* Lappa major, Arcium Dioscoridis *C. B. P.* 198. *Inf. R. H.* 450. Personata sive Lappa major aut Bardana *J. B.* 3. 570. Personata, Lappa major, Bardana *Lobel. Icon.* 388. Personata *Fuchsii*: vulgo, *Bardane*, *Glouteron*.

Radice[m] habet crassam, simplicem, pedem longam, rectam, foris nigricantem, intus albam, & fibris stipatam, saporis subdulcis, & subausteri. Folia ampla sunt, pedem longa, & majora, qua pediculo adhærent utrimque aurita, in summo mucronata, hirsuta, obscure virentia, subtus incana. Caulis bicubitalis, crassus, hirsutus, flores capiteatos sustinet summis ramulis innascentes, & flosculosos, plurimis scilicet flosculis constantes purpureis, profundius quinquefariam difectis, embryoni insidentibus, & calyci capiteato, qui e pluribus squammis constat in hamum desinentibus, introrsum incurvatis. Embryo autem abie deinde in semen oblongum, compressum, striatum, nigricans, pappis brevibus aut potius villis instructum, saporis subamari, subacris. Occurrit in pratis, & viis agri Parisiensis. Radices, folia, & semina usitata sunt.

Analysi

Analysi chymica, ex *ſſv.* recentium hujus plantæ radicum prædierunt humoris limpidi, ſaporis herbacei, obſcure acidi *ſſj.* *ſſx.* humoris primo limpidi, intenſe acidi, ſub finem ruſeſcentis auſteri *ſſij.* *ſſiij.* *ſj.* gr. vi. humoris ruſi tum acidi ſubſali, tum alcali urinoſi *ſj.* *ſſij.* olei *ſvij.* gr. xxiii. Maſſa nigra in retorta reſidua pendeſcit *ſij.* *ſvij.* gr. xlvij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum *ſj.* *ſſij.* ex quibus lixivio ſalis fixi mere alcali *ſv.* gr. lx. extracta fuerunt. Partium jaçtura in diſtillatione fuit *ſxj.* *ſſij.* gr. lxxvj. in calcinatione *ſij.* *ſſij.* gr. xlvij.

Radices *Bardanæ* ſapore donantur ſubdulci cum quadam levi auſteritate in reſeſſu. Earum ſuccus chartam cæruleam ſubrubro colore aliquantiſper inſcit. Unde liquet ſale eſſentiali donari tartareo, ſtyptico, cum medio-cri olei portione conjuncto.

Ex ſoliorum recentium *Bardanæ* per retortam diſtillatorum *ſſv.* prodierunt humoris limpidi, ſaporis herbacei, primo inſpidi, deinde obſcure acidi *ſſj.* *ſſxiii.* *ſvj.* gr. liij. humoris primo limpidi ſubacidi, deinde ruſeſcentis, acidi, ſali, ſub finem ruſi, empyreumatici, ſubaſteri, & aliquantiſper alcali urinoſi *ſij.* *ſix.* *ſj.* gr. xlij. humoris ruſi, alcali urinoſo volatili impregnati *ſj.* gr. xlij. ſalis volatilis concreti *ſj.* olei ſpissi extracti ad inſtar *ſj.* *ſv.* Maſſa nigra in retorta reſidua pendeſcit *ſij.* *ſvj.* gr. xxiii. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum *ſj.* *ſvij.* gr. xlij. ex quibus ſalis fixi mere alcali *ſvij.* gr. xl. extracta ſunt lixivio. Partium jaçtura in diſtillatione fuit *ſj.* *ſſij.* gr. xlvij. in calcinatione *ſj.* *ſvij.* gr. xlij.

Folia *Bardanæ* amara ſunt: eorum ſuccus chartam cæruleam non mutat. Exſiccata, & combuſta levia fulgura ad inſtar Nitri emittunt. Unde conjicere licet ſalem ammoniacalem nitroſum continere, multo oleo craſſo involutum. Seminum recentium *Bardanæ* per retortam diſtillatorum *ſſv.* præbuerunt humoris limpidi, ſere inſpidi, & inodori, obſcure acidi *ſvj.* gr. xxiii. humoris intenſe acidi, auſteri *ſvij.* *ſvij.* gr. xxxvj. humoris ruſi, empyreumatici, tum acidi, tum alcali urinoſi volatilis *ſxiii.* olei fluidi *ſj.* *ſv.* gr. xxxvj. Maſſa nigra in retorta ſuperſteſcit pendeſcit *ſj.* *ſvij.* *ſvij.* quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum albicantium *ſiij.* *ſſij.* gr. xxxvj. ex quibus ſalis fixi ſali cum particulis talcoſis nonnullis *ſij.* gr. xiii. lixivio extracta ſunt. Partium jaçtura in diſtillatione fuit *ſxj.* *ſſij.* gr. xlvij. in calcinatione *ſj.* *ſſij.* *ſſij.* gr. xxxvj.

Semina *Bardanæ* amara ſunt, & acria. Multo oleo donantur cum ſale tartareo ammoniacali conjuncto.

Radix *Bardanæ* diuretica habetur, ſudorifera, peçtoralis, uterina, vulneraria, & febrifuga. Ejus decoctum in morbis malignis, & variolis *Scorionneræ* decocto a nonnullis nec immerito anteponitur: & a Simone Paulli in morbis venereis decocto *Salsæperillæ*, & cæterorum lignorum exoticorum præſtantius cenſetur, ſaltem pro emaciat, & rarioris texture ægris. Henricus tertius Galliarum Rex a Petro Pena, decocto radicum *Lappæ*, ab hac lue ſanatus fuit, narrante Samuele Formio apud Riverium obſ. 41. Cæſalpinus eam radicem intus ſumptam cruentis, & purulentis expuitionibus utilem eſſe aſſerit. Pro pleuriticis

commendatur, illis præsertim quorum pleuritis in empyema aut phthisim degenerat. Arthriticis succurrit. Quidam Vassellius, narrante Foresto ab arthritide liberatus fuit radicis decocto, quo uberrimum urinæ, lactis ad instar albæ, profluvium provocatum fuit. Radices pulveratæ ad ℥j. in decocto ad ℥j. pro unaquaque aquæ libra vel etiam Saccharo conditæ ad ℥ij. ulque comedendæ præscribuntur: sicque urinas potenter movent, & calculos, & arenulas expellunt, referentibus Pena, & Lobelio.

Folia, & flores iisdem virtutibus donantur. Eorum succus expressus, & defœcatus ad ℥iij. utiliter propinatur iisdem in affectionibus. Caules antequam flores perficiantur, derafo cortice, crudi, codique ex oleo, & aceto non insuaves sunt, & urinam potenter cient. Foliorum, & caulium decoctum pleuriticis assatim propinatur, sumptis prius decem vel duodecim ovorum germinibus: & hocce remedio sudor copiosus diffluit. Adversus quartanam idem decoctum plurimum laudatur.

Semen Bardanæ diureticum est valentissimum. Ad ℥j. ex vino albo vel alio liquore idoneo sumitur: vel ex eo emulsio cum Bardanæ decocto vel aqua stillatitia conficitur. Idem semen pulveratum, & quotidie mane sumptum ab Apulejo adversus ischiadicum dolorem præscribitur.

℥. Pulver. rad. Bardan. ℥j. Dilue in aq. vel decoct. Bardan. ℥v. Fiat potus sudoriferus in pleuritide.

℥. Rad. Bardan. ℥iij. Coq. in aq. comm. q. s. Fiat pitana, cui adde crystall. mineral. ℥ß. pro singulis libris.

℥. Radic. Bardanæ taleolatum dissectar. ℥ij. Rasur. C. C. ℥j. Bulliant in aq. ℥iij. ad quartæ partis diminutionem. Adde malum citreum taleolatum sectum ad gratiam conciliandam. Fiat pitana in febribus malignis, & variolis.

In decocti folior. & caul. Bardan. ℥ij. dissolve syrup. de s. Rad. aper. ℥ij. Fiat apozema diureticum per vices propinandum.

℥. Semin. Bardan. pulverator. ℥j. Vini albi ℥iij. Macerentur per sex horas: sumat æger ad urinam promovendam.

℥. Semin. Bardan. ℥iij. Cum decocti Gramin. & radic. Petroselin. q. s. fiat s. a. emulsio diuretica.

℥. Semin. Bardan. & Card. benedict. ana ℥ij. Contund. in aq. Meliss. ℥vj. Fiat emulsio sudorifera s. a. cum syrup. Caryophyllor. hortens. aut alterius idonei ℥j. edulcoranda.

Extrinfecus Bardanæ folia ulcera mundificant, membris luxatis, & amputatis conferunt. Ex illis contusis vel sub cinerem aut cum lacte coctis fit cataplasma ad arthriticos dolores demulcendos, parti afflicte admovendum, & sexta quaque hora renovandum. Dolores arthriticos tam fixos quam vagos cum insigni tumore conjunctos sedat, teste Ettmullero. Sanguinem grumofum ex contusionibus mire dissolvit, & discutit. Pulpa vel rasura radicum recentium super lineum extensa, & calide parti afflicte admota ecchymosum sive suggestionem sanat.

Ex foliis aqua distillata in officinis præparatur, & extractum quæ ad eadem valent. Folia usurpantur in Ung. Populeo Nicol. Salernitan.

B E C C A B U N G A.

Beccabungæ species duæ occurrunt in officinis quæ a Casparo Bauhino inter Anagallides recensentur, & a Morifono & Tournefortio inter Veronicas. Altera major, minor altera dicitur.

Beccabunga major *Off.* Veronica aquatica major, folio subrotundo, *Morif. Hort. Oxon part. 2. 323. Inf. R. H. 145.* Anagallis aquatica, major folio subrotundo *C. B. P. 252.* Berula seu Anagallis aquatica *Tabern. Icon. 719.* Anagallis aquatica folio rotundiore, major *J. B. 3. 791.* Anagallis sive Beccabunga major, *Parkins.* Radicibus est fibrosis, albis, repentibus, caulibus supinis, rotundis, fungosis, rubentibus, remosis, in quibus folia bina ad nodos oriuntur subrotunda, unciam superantia, glabra, nitida, crassa, crenata, atrovirentia. Ex eorum alis pediculi prodeunt palmares aut sesquipalmares cum floribus spicatum positis, monopetalis, rotatis, cæruleis, quadripartitis, in umbilico perforatis, apicibus dilute cæruleis, ternis, & pistillo abeunte in fructum membranaceum quodammodo cordatum, compressum, tres lineas longum, in duo loculamenta divisum, in quibus semina plura, exigua, compressa continentur.

Beccabunga minor, *Off.* Veronica aquatica minor, folio subrotundo *Inf. R. H. 145.* Anagallis aquatica minor, folio subrotundo *C. B. P. 252.* Anagallis aquatica, flore cæruleo, folio rotundiore minor *J. B. 3. 790.* Anagallis aquatica, sive Beccabunga Germanorum, *Adversarior. Lobel. Dodon. Tempt.*

Hæc species priori similis est; ab ea tantum differt quod caulibus, foliis & floribus minor sit. Ambæ in agro Parisiensi sponte nascuntur juxta rivulorum margines.

Analyti chymica, ex Beccabungæ floridæ *℞v.* prodierunt humoris limpidi fere insipidi & inodori, obscure acidi *℞j. ℥j. ℥iij. gr. xlvij.* humoris primo limpidi, manifeste acidi, deinde rufescens, intense acidi, austeri *℞iij. ℥v. ℥j. gr. liij.* humoris fæci empyreumatici tum acidi, tum alcali urinosi *℥j. ℥v. olei ℥j. ℥iij. gr. xxiiij.* Massa nigra in retorta superstes pendebat *℥iij.* quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum *℥j. ℥iij. gr. vj.* ex quibus lixivio, salis fixi salis *℥v. gr. xliij.* Partium jactura in distillatione fuit *℥ij. ℥j. gr. xx.* in calcinatione *℥ij. ℥iij. gr. lxxvj.*

Totius plantæ sapor nullus manifestus. Sale essentiali donari mihi videtur salso vitriolico blando & temperato, salis mirabilis Glauberi haud absimili, multo phlegmate diluti & non mediocri olei portione involuti.

Anagallidi aquaticæ ab Hieronymo Trago, Casparo Bauhino & aliis, vis calida, urinam ciens, calculos frangens, menses promovens & mortuos sævus propellens tribuitur, cum tamen Beccabungam menses, fluxusque & tenues humores sistendi & incrassandi virtute præditam Theodorus Corbejus in sua Pharmacia Francofurti edita 1656. affirmet, expectantia id testante. Reipsa herba est temperatæ naturæ quæ etiam in cibo

cibo & in medicina ad scorbutum adhibetur, acetariisque adjungi commodè potest, sicut Nasturtium aquaticum: imo calidis & siccis naturis magis convenit. Reliquis acrioribus plantis antiscorbuticis antepositur, in eo scorbuto qui a causa calida oriri dicitur, nempe a summa salium fere causticorum acrimonia, qui summa sanguinis dissolutione, maculis lividis erysipelatosis, febre & calore præter naturam comitatur. Tunc sola exhibetur, vel cum Acetosa, Oxytriphyllo, Lapatis, succo Limonum & Aurantiorum confociatur: vel etiam læpe cum Cochlearia, Nasturtio & aliis acris plantis antiscorbuticis admiscetur ad earum acrimoniam contemperandam.

Succus desiccatus ad ℥iij. vel solus vel cum sero lactis permixtus præscribitur. Herba in jusculis & apozematibus alterantibus aperientibus & antiscorbuticis a M. j. ad iij. usurpatur. Extractum ad ℥j. Conditum ex herba florida cum saccharo præparatur, quod per tres menses continuos ad ℥j. quotidie mane, jejuno ventriculo sumptum impetigines & cutis viiia sanat.

℥j. Folior. Beccabungæ, Nasturtii aquatici, Oxytriphylly & Acetosæ rotund. ana M. ij. Carnis vitulinæ ℔j. Fiat jusculum in balneo mariæ & in vase probe obturato.

Extrinfecus Beccabungæ folia contusa vel in aqua cocta hæmorrhoidibus cæcis & condylomatibus cataplasmatis forma admota mira præstant, teste Simone Paulli. Testatur quoque Jacobus Fabricius in notis Crollianis sola Beccabunga cocta in cerevisia & bis quotidie apposita satis magnum ulcus universam fere tibiam occupans & ad os fere profundum feliciter in scorbutico quodam sanatum fuisse. Simon Paulli eandem hujus plantæ vulnerariam virtutem confirmat praxi Rusticorum Megalopolitanorum, (*Mechelbourg*) qui certo experimento vulnera consolidare norunt Beccabunga recenti cum modico salis & telæ aranearum permixto. Ex eadem quoque fusus aut balneum vaporarium præparantur quæ paralyti scorbuticæ plurimum conferunt, & quibus delentur maculæ, quibus scorbuticorum crura & brachia varie pingi conspiciuntur. Nonnumquam etiam contingit, observante Ettmullero, ut post partum difficile intumescant puerperis iguina, & ad gangrenam inclinent, ubi itidem Beccabunga cum floribus Chamæmeli vel contusa in forma cataplasmatis, vel decocta cum fomentis genitalibus applicata egregie discutit ac resolvit.

Ejus aqua distillata in Officinis asservatur, sed debilioris admodum virtutis est.

BELLADONA.

Belladonna, Solanum furiosum, Solanum maniacum, Solanum letale; *Off. Belladonna Clus. Hist. lxxxvi. Inst. R. H. 77. Solanum melanoceras C. B. P. 166. Solanum maniacum multis, sive Belladonna J. B. 3. 611. Solanum letale Parkins. Raii Hist. pl. 679. Solanum somniferum Adversar. Lobel. 102.*

Radice est crassa, longa, succosa, albicante, in plures ramos divisa; cau-

caulibus bicubitalibus & altioribus, rotundis, pollicem crassis, ramosis; hirsutis, e subrubro nigricantibus, foliis Solani hortensis forma, sed duplo triplove maioribus, mollibus, nonnihil lanuginosis. Ex foliorum alis flores nascuntur monoperali campaniformes, quinquifidi, striati, subhirsuti, obscuriore purpurea nigricantes cum staminibus quinis & totidem apicibus albidis. Ex eorum calyce quinquifariam diviso & hirsuto surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum veluti globosum, mollem, acino næ fere similem, splendide nigricantem, vinoso succo prægnantem, calyci insidentem, septo intermedio in duo loculamenta divisum & seminibus numerosis minutis ovaris foetum placentæ affixis. Circa sylvas, juxta parietes & sepimenta agrorum, aliisque perinde parum cultis ac desertis locis reperitur. Umbrosa amat. In agro Parisiensi circa Cantiliacum (*Chantilly*) sponte nascitur. In hortis nonnumquam seritur. Folia & bæccæ ad usum externum solummodo adhibentur.

Analysi chymica, ex herbæ floridæ & jam fructiferæ lbv. per vaporarium distillatis, prodierunt humoris limpidi, odoris & saporis herbacei cum acrimonia levi qui nullam aut acidi aut alcali notam præbuit lbj. ℥xij. humoris limpidi obscure acidi lbj. ℥x. gr. liij. Ex massa sicca in alambice residua per retortam distillata prodierunt humoris tum acidi, tum alcali urinosi ℥ij. ℥v. gr. xij. olei spissi ad instar syrupi ℥ij. ℥v. gr. x. Massa nigra in retorta superflua pendebat ℥v. ℥j. gr. xvij. quæ in crucibulo per 12. horas calcinata reliquit cinerum fuscorum ℥ij. ℥j. gr. lxxvj. ex quibus salis fixi mere alcali ℥j. gr. xlix. lixivio extracta sunt. Partium jacketura in distillatione fuit ℥xij. ℥ij. gr. l. in calcinatione ℥ij. ℥vij. gr. xxiiij.

Per hanc analysim patet Belladonam medloceri salis essentialis tartarei quantitate donari & multo oleo acri & narcotico admixto.

Ex fructuum maturorum lbv. per B. V. distillatis prodierunt humoris limpidi odoris non ingrati, saporis herbacei subacris, qui nulla acidi aut alcali signa præbuit lbj. ℥iiij. humoris limpidi r. obscure acidi, deinde manifesti lbj. Massa in retorta residua per retortam distillata fudit humoris rufescentis tum acidi, tum alcali urinosi ℥vj. ℥vij. olei spissi ad instar syrupi ℥iiij. gr. xxxij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥vij. ℥vj. quæ per 18. horas in crucibulo calcinata reliquit cinerum pallide flavescentium ℥vj. gr. xxx. ex quibus salis fixi mere alcali ℥ij. extractæ fuerunt.

Belladonæ fructus plus olei crassi continet quam herba & majorem acidi salis quantitatem, minus vero salis urinosi & perparum terræ.

Belladonna somnifera est & maligna. Bæccæ comestæ in summum vitæ discrimen hominem inducunt, & plerumque mortem tenellis adserunt, quod multis experimentis & exemplis constat. De quibusdam adolescentulis Anglis in adversariis Lobelii sit mentio, qui cum per imprudentiam peregre sribundi bæccas illas inesitassent, lymphatici & somno semitepulis interlerunt. Bodæus a Stapel. refert 486. *Hist. plantar.* adolescentulos duos Lugduni Batavorum in horto medico ex imprudentia bæccas duas tresve devorasse, & altero quidem die alterum obiisse, altero admodum periculose laborante, qui evasit. Simon Paulli in *quadr. Bor.* narrat quasdam filiolas quinquennes & septennes harum bæccarum esu ad orci

orci fauces perductas fuisse, e quibus illas, una excepta, ipse remedium alexipharmacis eripuit. Accidit Romæ, referente Hocchstetero *Decad. observ. 7.* quoddam de famulatio cuiusdam Cardinalis infundisse in vino Malvatico Belladonam per noctem ut hujus herbæ effectus dicerent. Infusum hoc propinaverunt fratri cuidam mendicanti. Primo breve delirium, cachinni, gesticulationes variæ, dein infania vera, postea stupor mentis, qualis est ebriorum vigilantium. Medicus qui hujus morbi causam subolfecerat, acetum cyathum propinato, a dementia quam Belladona causaverat, eum liberavit. Acetum enim aut succus Limonum pro hujus veneni antidotis habentur.

Plura aliaque exempla referunt auctores: nobis hæc memorasse sufficit. Quamvis aut baccarum esus periculosus & letalis supra dictus fuerit, nihilominus tamen Gesnerus *L. 1. Epistolæ. p. 34.* refert quod succus harum baccarum expressus & ad syrupi consistentiam cum paucis saccharo redactus, sit conveniens & efficax medicamentum ut cochlearis parvi mensura somnum inferat, quascunque fluxiones sistat, dolores tollat & dysenterias curet: quod etiam confirmari videtur *Ephemeridum Germanicarum observatione 64. Decad. 2. anni 3.* de quodam Pastore, qui in Cherlonefo Cymbrica adversus dysenteriam, morbum eo loci contumacissimum & contagiosissimum, summo cum fructu & successu decumbentibus propinavit vinum cui infusæ sunt bæccæ Solani: non solum, inquit auctor, enormem fluxum sistunt, & dolorem demulcent: sed etiam malignitatem in sudorem resolvunt. Verum ab hoc remedio satius est abstinere, a quo plus non raro periculi imminet ægrotantibus quam ab ipso morbo.

Folia recentia contusa & exterius admota dolores demulcent & potenter resolvunt, ad erysipelas, sacros ignes & alios calidos affectus commendantur. Hæmorrhoidum inflammationem compescunt. Mammis imposita earum durities & humores etiam cancriferos emolliant & discutiant, narrante Joanne Raio.

Vel sola recentia contusa tantummodo, vel in aqua aut axungia porcinæ costâ sub cataplasmati forma applicantur: vel etiam eorum succo solo aut cum spiritu vini admixto partes affectæ foventur.

A Matthiolo folia contusa & oculis admota ad oculorum palpebrarumque phlegmonas leniendas proponuntur. Sed non adeo tutum & innoxium esse illius usum ad oculos constat ex hac Raii observatione. Nobilis Domina ulcusculo cuidam paulo infra oculum, quod cancriferos esse suspicabatur, folii Belladonæ recentis particulam imposuit: quæ noctis unius spatio uveam oculi tunicam adeo relaxavit, ut omnem explicandi sese & pupillam contrahendi facultatem ei adimeret: siquidem pupilla clarissimo lumini obversâ vehementer dilata perstitit, socio & pari suo plus quadruplo amplior: donec amoto folio uvea musculosam vim suam & tonum paulatim recuperaret. Atque hoc ne quis casui imputet, tribus distinctis vicibus in seipsâ nobilis matrona experta est. Non ergo incaute remedia illa stupefacientia etiam externe adhibenda sunt.

Aqua e tota planta distillata pota, duorum aut ad summum trium cochlearium mensura, internas viscerum inflammationes extinguit, referente Matthiolo, sed a copiosiore potu abstinendum est.

Ex

Ex Belladonæ succo vel aqua stillatitia Italæ mulieres fucum conficiunt quo faciem oblinunt, ut ex rubicunda pallidam efficiant, unde Belladonna planta dicta fuit.

Usoatur herba in Balsamo Tranquillante P. *Tranquilli Franciscani Regii.*

B E L L I S.

DUæ plantæ genere diversæ Bellidis nomine censentur in officinis, major scilicet, & minor.

Bellis Major, Leucanthemum vulgare, Buphthalmum majus, Oculus bovis, Off. Leucanthemum vulgare *Inst. R. H. 492.* Bellis sylvestris, caule soluto, major C. B. P. 261. Bellis major *Dod. Pempt. 265. J. B. 3. 114.* Oculus bovis *Brunsfelsii.* Contolida media vulnerariorum *Adversarior. Lobel. 253.* Buphthalmum majus *Loniceri*: Bellium majus *Tabern. Icon 351.* vulgo *Grande Marguerite. Grande Paquette. Oeil de Bœuf.*

Radice est fibrosa, repante, acri: caulibus bicubitalibus, pentagonis, rectis, villosis, ramosis, in quibus folia alternatim nascuntur pingua, duas uncias longa, semunciam lata, & crenata. Flores adfunt inodori, radiati, ampli, quorum scilicet discus ex plurimis flosculis tubulosis, aureis, in quinque segmenta divisus, cum stylo in medio uniuscujusque; corona vero ex semiflosculis candidis componitur, embryonibus insidentibus, & calyce semisphærico squammoso, & nigricante comprehensis. Embryones autem deinde abeunt in semina exilia, oblonga, striata, non pappiæcentia. Folia, & flores in usu sunt.

Analysi chymica, ex Bellidis majoris lrv. prodierunt humoris limpidi fere inodori, & insipui, obscure acidi lrv. 3v. gr. xlv. humoris 1. limpidi, sub finem rufescentis, acidi manifesti, & subaustri lrv. 3xiiij. 3v. humoris rufi empyreumatici tum acidi tum alcali, & sale volatili urinoso imprægnati 3ij. 3j. olei spissi ad instar extracti 3ij. gr. xxiiij. Massa nigra in retorta residua pendebat 3v. 3ij. gr. xxxvj. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum 3j. 3vj. gr. lxxvj. ex quibus salis alcali fixi 3v. gr. xx. lixivio extracta sunt, Partium jactura in distillatione fuit 3iiij. 3vj. gr. xxxvj. in calcinatione 3iiij. 3ij. gr. xliij.

Folia saporis sunt herbacei, subfalsi, chartam cœruleam levissimo rubore tingit. Sale essentiali donari videtur Tartaro vitriolato vel sali Coralliorum simili cum multo oleo conjuncto.

Bellis Minor Off. Bellis sylvestris minor C. B. P. 261. & *Inst. R. H. 491.* Bellis minor sylvestris spontanea J. B. 3. 111. Bellis minor *Tabern. Icon. 328.* Solidago consolida species *Brunsfelsii*: Symphytum minimum *Quorumdam*: Primula veris *Casalpini 493.* Contolida minor *Herbariorum*: vulgo *Paquette ou petite Marguerite.*

Radicebus est multis, tenuibus: foliis numerosis, humi sparsis, pinguiculicis, hirsutis, longis, versus radicem angustis, sensim latescentibus rotundatisque, levissime serratis, nullo caule, sed pediculis frequentibus inter folia exortis, palmaribus, & altioribus, tenuibus, teretibus, hirsutis, quorum singulis flos insidet unus, radiatus, cujus scilicet discus ex plurimis floscu-

Hosculis luteis corona verò ex semi-hosculis lacteis aut ex albo sanguineis componitur, embryonibus insidentibus, & calyce simplici, & multifido comprehensis. Embryones autem deinde abeunt in semina exigua nuda Thalamo pyramidato affinia. Folia, flores, & radices in usu sunt. Utraque Bellis in pratis, & pascuis agri Parisiensis passim nascitur.

Analysi chymica, ex Bellidis minoris floridæ lbv. prodierunt humoris limpidi, odoris, & saporis expertis, obscure tamen acidi lbj. ʒv. ʒij. gr. lx. humoris primo limpidi, manifeste acidi, deinde rufescentis, empyreumatici, austeri lbj. ʒxv. ʒv. gr. xxiiij. humoris fuscii, sale volatili urinoso imprægnari ʒi. ʒij. gr. xlvij. olei spissi ad instar extracti ʒi. ʒiiij. Ma sa nigra in retorta superstes pendeat ʒv. ʒvij. gr. xxxvj. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum ʒiiij. ʒvij. gr. xxx. ex quibus lixivio salis fixi alcali ʒiiij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ʒij. ʒi. gr. xlvij. in calcinatione ʒij. gr. vj.

Hujus plantæ folia acria sunt, succo viscoso turgida, & chartam cæruleam tingunt colore rubro. Sale essentiali donantur ammoniacali tartareo aut Corallino simili, multo oleo acri involuto.

Bellides vulnerariæ sunt, emolliunt, attenuant, & detergent. Earum succus expressus, & defœcatus ad ʒiiij. propinatur. Coquuntur folia, & flores in aqua communi vel in junculo carniæ ad M. j. vel confusa in vino macerantur, & expressum bauritur. Ex Bellide majore collectæ priusquam flores erumpant, habetur decoctum acris saporis, Piperis modo subtilis, & penetrantis, diureticum, & vulnerarium insignis. In parulenta expuitione plurimum commendatur. Alii utuntur infuso folior. & florum in aqua calcis vivæ, cujus ʒiiij. quotidie mane propinant. J. Rajus herbam integram in Zythogalo decoctam, & potam adversus asthma, phthisim, & orthopnoeam tanquam singulare remedium proponit.

Externe unguentum ex Bellidis majoris floribus, & axungia suilla adversus porriginem (*la Teigne*) a Cæsalpino laudatur.

Maximam Bellidis minoris præbari efficaciam in curatione vulnrum Jacobus Cornutus in *Hist. plantar. Canad.* asserit, nec præstantius ullum ab herbariis præsidium dicatum esse. Ejus folium impositum labia unit, & cicatrice obducit: succus inditus aut linamentis exceptus inflammationi quæ supervenire solet, valide obsistit, ad omnes cervicis dolores, tumoresque quacumque in parte illinitur: strumas discutit: podagras lenit: in serventium intestinorum cruciatibus utiliter injicitur, ulceratis bibendus datur. Ejus succus aut decoctum, auctore Ettmullero, multum prodest in quocumque sanguine grumoso dissolvendo, & discutiendo, sive ex casu, sive ex vulnere, sive ex contusione. Hinc etiam inter antipleuritica ad sanguinem fere coagulatum resolvendum ab Helmontio commendatur. Mindererus in *Medic. Melit.* p. 77. iis, tanquam singulare specificum, qui post nimiam incalescentiam corporis, subito frigidum potum ingurgitant, proponit. Ettmullerus refert experimentum Michaelis in coquo, qui per diem incaluit, & sitibundus arripuit haustum frigidum, unde asthma aliisque symptomatibus correptus fere suffocandus videbatur: hunc succo ex tenellis folijs floridis recenter expresso, & in vino

Vino propinato per sudorem curavit, ut sequenti die optime se habuerit. Ad hepatis inflammationem, & adversus hydropem a nonnullis commendatur. Obstructiones enim discutit tenuibus suis partibus, sanguineam molem spissiore dissolvit, attenuat, & fibrarum tonum restituit. Emanuel Konig Medicus Basileensis in *suo Regno Vegetabili* refert vultus thoracis cum læsione pulmonum usu continuato decocti Bellidis minoris cum oculis cancer. sanatum fuisse, & idem decoctum in diathesi pulmonum inflammatoria plurimum valere asserit. VVepferus, referente eodem, phthisicis desperatis auxilium fecit illis Bellidis minoris, Nasturtii & Nummulariæ succi recens expressi cochlearia duo vel tria cum pauxillo mellis rosati vel cum jusculo carniū propinando. Horum usu duos prope desperatos præter expectationem convalescere testatur: quod etiam Simonis-Paulli testimonio, & experientia confirmatur. Schroderus refert mulierculis Germanicis usitatum esse herbam cum floribus ad alvum laxandum infantibus exhibere. Et Garidelus in *Hist. Plantar. Aquisext.* observat hujus herbæ succum alvum ciere. Quapropter monet hunc succum pleuriticis non incaute propinandum esse, præsertim dum humoris purulenti excretio per expectorationem fieri incipit, ne naturæ molimen laxante medicamento irritum fiat & morbi crisis interrumpatur. Herbx decoctum alvum non movere idem observat.

Ruellius asserit Bellidis minoris folia trita cum Arthemisia strumas efficacissime resolvere. Ejus flores & Geranii Roberciani folia hemicranie plurimum conducunt, auctore D. J. Comel Medico Parisiensi peritissimo Acad. Reg. scientiar. Socio.

Aqua distillata paratur in Officinis ad eundem affectus utilis, sed decocto vel succo debilior. In potionibus vulnerariis præscribitur ad ℥iij. ad ℥iiijve. Extractum quoque conficitur ad eadem commendatum: ad pondus ℥j. exhibetur.

Bellis utraque usurpatur in aqua vulneraria Lemerii.

B E R B E R I S.

Berberis & Oxyacantha, Off. Berberis Dumetorum C. B. P. 454. *Inf. R. H.* 614. Berberis vulgo quæ Oxyacantha putata J. B. 1. 52. Spina acida sive Oxyacantha Dod. *Pempt.* 750. Crespinus *Matthioli*. Amirbar *Avicenna*: Uva ursi, Spina Sancta, Spina Christi, Spina acuta *Quorumdam*: vulgo: *Epine-vinette*.

Frutex est procerus radicibus flavescens, multifidis, fibrosis & reptantibus: stolonibus tres cubitos altis, ramosis, spinis minacibus armatis, intus luteis: folia parva sunt, oblonga, ex angusto principio lateſcentia subrotunda, in ambitu crenata, mollioribus aculeis cincta, dilute virentia, glabra, gustu acida. Flores odore gravi in uvam nascuntur conglobati, rosacei, petalis scilicet fenis, luteis, in orbem positis constantes, cum toridem flaminibus concoloribus & pistillo viridante abeunte in fructum cylindraceum mollem quatuor lineas longum, rubrum, succi acidi plenum, nucleum unum aut alterum oblongum continentem. In agro Parisien-

Parifienfis fponte nascitur. Transfertur & ad hortos ad quorum sepimentis utilis est. Radix, fructus & semina in usu sunt.

Analysî chymica, ex succi acidi fructuum Berberis expressi ℔v. prodierunt humoris limpidi sere inodori, saporis aliquantisper vinosi & acidi ℔j. ℥xij. ℥vij. gr. xxix. humoris r. saporis & odoris ejusdem, sed minus grati, acidi & subausteri, deinde rufescentis, empyreumatici, acidi austeri ℔ij. ℥xij. gr. lj. humoris rufi, subacris, acidi & aliquantisper alcali urinofi ℥j. ℥j. olei fluidi ℥j. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥ij. ℥v. gr. xlvij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum nigricantium ℥j. ℥ij. gr. xlvij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥ij. gr. vj. lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥j. ℥j. gr. xv. in calcinatione ℥j. ℥j.

Fructuum succus saporis est acidi austeri: chartam cæruleam colore intente rubro inficit. Radix amara est & styptica & chartæ cæuleæ colorem vix mutat. Sale igitur donatur essentiali tartareo aluminoso haud dissimili.

Berberis fructus refrigerant & adstringunt: humorum effervescentiam ab acri & fervida bile excitatam compescunt, biliosos alvi fluxus sedant, ventriculū & intestina roborant, appetitum languentem recreant, dysenterias compescunt, hæmorrhagiis ab humorum acrimonia vel nimia sanguinis dissolutione oriundis conducunt.

Maturi comeduntur recentes, soli vel Saccharo conditi. Exsiccati in prifanis vel decoctis adstringentibus usurpantur: exsiccati enim magis adstringunt. Eorum succus expressus & defœcatus ad ℥j. propinatur: & ex eo syrupus, gelatina, sapa, in Officinis præparantur quæ in julapiis refrigerantibus usurpantur, tum ad sitim extinguendam in febribus ardentibus, tum ad humorum malignitatem debellandam. Vis enim cardiaca & alexipharmaca ipsis tribuitur.

Ægyptii, narrante P. Alpino de Medic. *Ægyptior.* hosce fructus in febribus malignis & pestilentialibus felici cum successu & simplici interveniente apparatu usurpare solent. Horum siquidem libram in vase magno aqua pleno vel duodecim etiam aquæ libras continente mittunt, cum nonnullis seminibus Fœniculi vel frusto panis, atque per noctem vel diem sic macerare volunt, deincepsque de frigida hac expressione per colum transusa cum Saccharo multo rosaceo vel simplici, vel syrupo ex acido Citri, large ægrotis propinant, qua potione calorem febrilem sitimque extinguunt, vires rescunt, atque etiam putredini prævalide obstant. Præstantissimum auxilium ad alvi fluxiones apud eam gentem sua adstrictione habetur, eoque potu ipse P. Alpinus, pestifera ibi febre correptus, cum immoderata diarrhæa biliosa, felici cum successu Ægyptiorum Medicorum consilio usus est. Simon Paulli Prosp. Alpini exemplum imitatus ab acri febre & enormi diarrhæa quibus hic Luretiæ Parisorum olim afflictus fuit, solius syrupi Berberis usu limpidissima fontana diluti fuit liberatus: atque post deinde ex his fructibus parata medicamenta plurimi fecit.

Idem S. Paulli observat Ægyptios Medicos non sine causa remittere infuso ejus tantillum seminis Fœniculi, nempe ad frigidiorē ejus temperiem corrigendam, ne officiat ventriculo. Gaspar Hoffmannus eandem cautelam circa illius usum commendat his verbis: Tu vero, inquit, ante omnia
vide

vide ne ventriculus sit frigidior. Siquidem acida minus conveniunt illis quorum ventriculus cibos tardius concoquit, tum ob caloris aut potius spirituum defectum in hujus visceris succo, tum ob ejusdem succi tenacitatem quam acida semper augent.

S. Paulli *Quadr. Bot.* hujus fructus salem essentialem plurimi facit cujus conficiendi ratio hæc est.

24. Succu Berberis ℥ij. succi Limon. ℥ij. Digerantur per biduum in balneo arenæ: fiat colatura ad dimidias blando calore balnei maris exhalanda, tunc per aliquot dies in locum subterraneum aut cella reponatur. Crystalli tartarei circa vasis fundum & latera concresecunt. Succus per inclinationem effundatur ad dimidias, iterum evaporetur & reponatur ut in crystillos concresecat; quod toties repetatur, donec nullæ amplius crystalli concresecant. Crystalli blando calore exsiccata serventur ad ulum.

Sal ille essentialis instar cremoris Tartari pulveratus jusculis ptisanæ, decoctis & julapiis adversus febres immixtus, non solum illis acore suo ori & ventriculo pergratum saporem conciliat, sed etiam corruptioni humorum & febrili æstui insigniter resistit.

In ischuria, dysuria & inflammationibus internis Nitrum in succo Berberis solutum exsiccatum & in crystillos coactum Cl. Tournefortius ut præstantissimum remedium proponit.

Succus vel decoctum Berberis faucium & tonsillarum inflammationem compescunt, gingivis laxis & putrescentibus scorbuticorum medentur, si os eluatur & fauces gargazentur.

24. Confectio. Alkermes s. od. ℥j. Syrup. Berberis ℥j. aq. Cinnamom. ℥ss. aquar. Meliss. & Oxytriphyl. ana ℥ij. M. F. potio cochlearum lumen in febrib. malign.

24. Aq. Plantag. ℥vj. succi Berber. ℥j. Mellis Rosati ℥ss. salis Prunel. ℥j. M. F. gargasima in fluxum inflammatione.

24. Rosar. rubrar. siccata. & Balaustior. ana ℥ij. affunde aq. Plantag. ℥ij. Macerentur in B. ciner. per aliquot horas; in Colatura dilue Syrup. Berber. ℥ij. Sumat æger ℥ij. tertia quaque hora in hæmoptoe aut diarrhæa.

Acini sex semina potenter siccant & adstringunt: quare in quocumque alvi fluxu & albo mulierum fluore a nonnullis ad ℥j. pulverati præscribuntur in liquore convenienti.

Cortex interior flavus tam ramorum quam radicum in convenienti liquore decoctus vel in vino albo aut Hispanico maceratus & potus in ictero a Joan. Rajo commendatur. Clusius vinum album tenue in quo cortex ille per trium horarum spatium maceratus fuerit potum mirifice purgare scribit. Ejusdem corticis pulverem in aceto maceratum Camerarius in aphthis puerorum laudat.

Eo cortice Tinctorii artifices lixivio macerato ad flavum colorem pannis conciliandum utuntur.

Berberis fructus usurpatur in syrupo myrtino *Charas*; succus in syrupo Corallor. & in syrupo dytenticco *Medicor. Parisiensium collectancor. pharmaceuticor. Lud. Penicher.*

Aqui utrapur in pulvere Diarrhodon *Abb. Nicolai præpos. Geoffroy Tom. II.* G in

in Diaprano simpl. Nicol. Alexandrin. & in Eiectuar. de Pyllyo Mesuati.

B E R U L A.

Berula & Sium, Off. Sium sive Apium palustre foliis oblongis, C. B. P. 154. & Inf. R. H. 308. Sium umbelliferum, J. B. 3. 172. Sium, Dod. Pempt. 589. Crescione vulgo, Celsapin. 300. Sium, sive Laver Dioicoridis Olosatri tollio, sive Pastinaca aquatica, Lobel. Icon. 2 8. vulgo, Berle Arche d' eau.

Ex radicibus geniculatis, repentibus, albis, fibrosis, caules promit cubitales & altiores, teretes, striatos, inanes, rectos, ramosos, & frondes longos pediculo striato, glabro, intus cavo, innixos, ex pluribus singularibus foliis per conjugationes costæ innascentibus & uno impari claudente constantes, pinguibus, glabris, & per circumferentiam serræ modo incis. Flores umbellatim dispositi caulium extrema occupant Rosacei, e quinque petalis albis constantes in orbem positæ & calyci insidentibus. Is autem abt in fructum subrotundum ex duobus seminibus parvis odoratis, acris, hinc gibbis & striatis, inde vero planis compositum. Hæc agri Parisiensis incola planta delectatur in rivulis & fossis. Planta integra in usum venit.

Analyti chymica, ex Berulæ recens collectæ lbv. prodierunt humoris limpidi, odoris & saporis herbacei, primo aliquantisper obscure alcali, deinde obscure acidi ℥xj. ℥v. gran. vj. humoris primo limpidi, odoris herbacei, subacidi, tandem sulci, empyreumatici, subaustri, tum acidi, tum alcali lbij. ℥xj. ℥vij. gr. ix. humoris fusci alcali & sale volatili urinoso imprægnati ℥ij. gr. xxxvj. salis volatilis urinosi concreti gr. lvij. olei spissi ad instar extracti ℥v. gr. l. Massa nigra in retorta superflua pendebat ℥ij. ℥j. gr. xij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥j. gr. lx. ex quibus salis alcali fixi ℥vj. gr. lxi. lixivio fuerunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥j. ℥j. gr. xxiij. in calcinatione ℥vj. gr. xxiiij.

Folia sapore subacri donantur. Itaque cum hæc planta parum acidi contineat, plus vero salis salis & urinosi; sale essentiali donari videtur ammoniaco simili cum olei portione mediocri conjuncto.

Berula inter plantas antiscorbuticas, & aperientes recensetur. Obstructiones refert, menses & urinas movet. Quapropter in scorbuto, cachexia, chlorosi, hydrope, & febribus intermittentibus convenit, & arenolas expellit. In acetariis comeditur, vel in jusculis aut apozematibus aperientibus præscribitur. Succus etiam defæcatus ad ℥ij. quatuorve exhibetur.

Extus admota abdominis tumores resolvit.

B E T A.

Betæ, triplex genus in olitoriiis hortis tum ad usum culinarium, tum ad usum medicum excolitur: scilicet Beta alba, Beta rubra vulgaris, & Beta rubra radice Rappæ.

Be-

Beta, Beta alba, Beta candida, Sicla & Cicla, *Off.* Beta alba vel pallescens quæ Cicla Officinarum, C. B. P. 118. *Inst. R. H.* 502. Beta candida, J. B. 2. 961. *Dod. Pempt.* 620. *Trag.* 706. vulgo, *Bette ou Poiree*.

Radice est terete, lignosa, minimum digitum crassa, longa, candida: foliis magnis, latis, lævibus, crassis, succulentis, quandoque dilute, alias saturatius virentibus, sapore nitroso, cum costa spissa, lara: caulibus bicubitalibus, gracilibus, striatis, in ramulos effusis: in quibus longa serie ex foliorum alis nascuntur flores exigui, flaminei seu constantes ex plurimis staminibus cum apicibus luteis, ex quinque folio surgentibus calyce, subviridi, qui deinde abit in fructum fere globosum, asperum, verrucosum, in quo veluti nidulantur semina duo vel tria, exigua, oblonga, angulosa, seu inæqualiter rotunda, rubentia.

Beta rubra vulgaris, Beta nigra, *Off.* Beta rubra vulgaris, C. B. P. 118. *Inst. R. H.* 502. Beta rubra, J. B. 2. 961. *Dodon. Pempt.* 620. vulgo, *Bette ou Poiree rouge*.

Radice est alba: foliis brevioribus quam præcedens, plurimum rubentibus plus minusve, interdum atro rubentibus. Hoc foliorum colore a priori distinguitur.

Beta rubra radice Rapæ, Beta Romana, Beta Erythroris, Beta rapa, *Off.* Beta rubra radice Rapæ, C. B. P. 118. *Inst. R. H.* 502. Beta radice rubra crassa, J. B. 2. 961. Beta rubra Romana, *Dod. Pempt.* 620. Rapum rubrum sativum, *Fuchsi*: vulgo, *Bette rave*.

Caulis est altiore quam Beta vulgaris rubra: radice uncias duas tresve crassa, ventricosa, intrus torisque sanguineo saturo colore infecta. Betæ omnes in hortis inter olera colantur. Alba ad usum medicum sæpius usurpatur: ejus folia & pediculi seu costæ inter cibos magis recipiuntur: rubræ vero fere Romanæ radices in primis appetuntur.

Analysi chymica, ex foliorum & costarum Betæ lbv. prodierunt humoris limpidi odoris & saporis herbacei, obscure acidi lbj. ℥vj. ℥ij. gr. xxxvj. humoris limpidi, primo ejusdem odoris & saporis cum acido manifesto, tandem intense acidi & austeri lbij. ℥iij. ℥j. gr. xxij. humoris rufi, alcali, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥v. gr. xxxvj. salis volatilis urinosi concreti ℥j. gr. x. olei spissi ad instar extracti ℥vj. Massa nigra in retorta superfluis pendebat ℥ij. ℥vj. gr. lxx. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum nigricantium & in massam asurum ℥j. ℥j. gr. xlij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥vj. gr. xii. luvio extracta sunt. Partium pæctura in calcinatione fuit ℥j. ℥iij. gr. xxiiij. in distillatione vero incrementum fuit ℥j. gr. xxvj.

Beta sale essentiali donatur ammoniacali nitroso cum terra adstringente & oleo permixto & multo phlegmate diluto. Betæ enim folia exsiccata & in prunas injecta ad instar nitri comburendo fulgurant.

Beta alba laurioribus mensis hodie non est ingrata, quamquam Betas Martialis Poeta satuas fabrorumque prandia carmine suo appellavit. Inter herbas emollientes numeratur cum Acantho, Althæa, Malva, Viola, Arriplice, Mercuriali & Parietaria: succus sale nitroso ammoniacali imbutus absterfona & quodammodo acri qualitate donatur: quapropter alvum ad excretionem stimulat assumpta, atque interdum ventriculum mordet, præsertim si cui natura exquisitoris sit sensus; proinde & stomacho

macho frequens aut nimius ejus usus noxius est . Nonnulli adstrictionem quandam in Betæ corpore seu crassamento observasse credunt , qua ratione ventrem stipare & indurare asserunt , dum succus absterioria & laxante virtute donatur , unde tritum adagium :

Sicla parum nutrit , ventrem consipiat & urget .

Quamobrem ad alvum subducendam cum jure in quo decoquitur suamendam esse præscribunt , & absque jure esitaram minus aut nullatenus alvum laxare arbitrantur . Verum reipia nulla adstrictio in Beta deprehenditur .

Nutritimentum ex Beta exiguum , sicuti ex cæteris oleribus corpori accedit . Nostre culinæ varia ex ea ciborum genera concinnant . Ejus folia ob satium saporem cum Acetosæ foliis sæpe consociantur . Costæ latiores & candidæ coctæ in pretio sunt .

Succus Betæ tum foliorum tum radicis naribus exceptus sternutamenta proicit , humores pituitosos magna copia elicit , adeoque cephalalgiam , hemigraniam , catharras , coryzam compescit & profigat : & in inveteratis distillationibus in oculos quæ subinde ophthalmiam causantur illis , a Simone Paulli commendatur : hunc succum cum aqua Majoranæ diluere solebat , quod quidem medicamentum a nonnullis pro secreto habetur . At Olavus Borrichin in *Artis Hassiensibus ann. 1673. Observ. 63.* Betæ succum esse periculosum & valde noxium errhinum scribit : quod confirmat experientia cujusdam virginis jam nubilis , quæ ludibunda & ullo absque incommodo liberalem hujus mixturæ portionem naribus sanis excepit ; sed paulo post inter cruciatus intensissimos caput ejus totum ita intumuit , ut duplo majus naturali appareret , & de vertigine , anxietate , agrypnia , doloribusque gravissimis per plures dies conquereretur : tandem ab his malis , curante eodem Olav Borrichio , præmissis universalibus , errhino contrario ex solo lacte recenti & tepido paulatim liberata fuit .

Foliorum decoctum intus sumptum lenit , emollit , & alvum blande laxat , quare folia in apozematibus & jusculis refrigerantibus , laxantibus , atque etiam aperientibus usurpantur , obstructions enim lienis & hepatis aperiunt .

℥℥. Folior. Betæ , Lactuc. Portulac. Chæresol. Oxytriphyl. ana M. j. Coq. cum pullo gallinaceo aut frustulo carnis colli vitulini . Fiat jusculum .

℥℥. Radic. Gramin. Acetos. Fragar. ana ℥j. Folior. Bet. Lactuc. Portulac. Cichor. Borrage. Bugloss. Pimpinell. ana M. j. Coquantur in aq. comm. q. s. ad ℔ij. Fiat apozema pro sex dosibus . Cuique adde Syrup. Violar. ℥j.

In decoctis pro clysteribus emollientibus & abstergentibus folia Betæ usurpantur .

℥℥. Folior. Betæ , Attriplic. Malv. Althoræ ana M. j. Semin. Lini pug. j. Coq. in f. q. aq. fluviatil. In colaturæ ℔j. dilue mellis violati ℥ij. Olei Lilior. ℥j. Fiat enema emolliens .

℥℥. Decoct. folior. Betæ , Cichor. Lactuc. Portulac. ℔j. qua dilue salis Prunell. ℥j. Mellis Nenuphar. ℥ij. Fiat Clyster emolliens & refrigerans .

℥℥. Succ. radicem Betæ ℥j. aq. Majoran. ℥ij. Mellis anthosati ℥℥. Misce . Fiat errhinum naribus attrahendum in coryza .

Externe folia vel integra vel sub cinerem cocta cuti a medicamento caustico aut comburente admoventur : & humorum excretionem per cutis glandulas blanda irritatione promovent.

Betæ rubræ radice Rapæ radix rarissime in usum medicum venit , frequenter in usum culinarium expetitur.

Analysî chymica , ex radicum Betæ Romanæ recentium. ßv. prodierunt humoris odore & sapore radicem crudam referentis , obscure salis & alcali urinosi ʒxj. ʒj. gr. xxx. humoris limpidi ejusdem odoris & saporis , obscure acidi ʒij. ʒj. ʒij. humoris primo limpidi , deinde rufescentis , intense acidi ʒij. ʒx. ʒij. gr. xvij. humoris rufi , empyreumatici , acris , tum intense acidi , tum alcali urinosi & sale volatili urinoso copioso imprægnati ʒij. ʒj. gr. xlvij. salis volatilis urinosi gr. xxxvj. olei fluidi ad instar (syrupe ʒj. gr. lx. Massa nigra residua pendebat ʒij. ʒvij. gr. xxxvj. quæ calcinata reliquit cinerum ʒvij. gr. lxxvj. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ʒij. gr. liij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ʒj. ʒvj. gr. lx. in calcinatione ʒij. ʒvij. gr. xlij.

Betæ Romanæ radix sale essentiali donatur ammoniacali cum olei & terræ portione mediocri conjuncto.

Betæ Romanæ radix alvum minus movet , imo nonnullius adstrictionis particeps censetur , parum nutrit & in ventriculo difficile coquitur. In clybano vel sub cineribus cocta , tum calida , tum frigida comeditur. Hierno tempore in acetiis præcipue est æstimationis. In assulas vel circulos transversum secta a coquis ad margines patinarum & fercula exornanda adhiberi solet.

B E T O N I C A :

Betonica , Off. *Betonica purpurea* , C. B. P. 235. & *Inf. R. H.* 203. *Betonica vulgaris* , purpurea , J. B. 3. 301. *Betonica* , *Dod. Pempt.* 40. vulgo , *Betoine* .

Radice est pollicem crassa , transversa , fibrosa , capillata , gustu amara : caulibus cubitalibus , quadrangulis , nodosis : foliis aliis ad caulium nodos binis ex adverso nascentibus , aliis humi sparsis , inconditis , pediculis palmaribus circiter donatis , oblongis , villosis , rugosis , obscure virentibus , ad basin auritis , in ambitu crenis acuminatis , incis , & sapore aromatico præditi . Flores in spicas dense oriuntur verticillatim dispositi , monopetali , labiati , purpurascetes , labio superiori sulcato & ad posteriora veluti reclinato , inferiori vero trilobato , cum staminibus flori concoloribus e medio exortis . Ex calyce monosomo in quinque partes incito surgit pistillum posticæ floris parvi ad instar clavi infixum . & quatuor veluti embryonibus stipatum , qui deinde abeunt in toridem . semina subrotunda & sulca in capsula , quæ floris calyx fuit recondita . In agri Païensis dumetis & sylvis sponte nascitur . Folia & flores creberrimi sunt usus .

Analysî chymica , foliorum *Betonicæ* ßv. præbuerunt humoris limpidi , odorem foliorum referentis , subacidi ʒx. ʒy. humoris primo limpidi acidi , deinde rufescentis , odoris acescentis , intense acidi , austeri ʒij. ʒvij.

Geoffroy Tom. II.

G 3

ʒij.

℥ij. gr. xlviij. humoris rufi, empyreumatici, tum acidi austeri, tum alcali urinosi & fale volatili urinolo imprægnati ℥ij. ℥vj. olei ℥j. ℥ij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥v. ℥ij. gr. xvij. quæ calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥v. gr. xxx. ex quibus salis fixi mere alcali lixivio extractæ sunt ℥iij. gr. xlvij. Parsum jactura in distillatione fuit ℥iij. ℥v. gr. vj. in calcinatione ℥ij. ℥v. gr. lx.

Folia sapore herbaceo subtiliſſo donantur, & odore aromatico: chartæ cœruleæ colore non mutant. Sale essentiali donantur composito ex sale tariareo & ammoniacali conjunctis cum multo oleo & pauca terra. Flores chartam cœruleam rubro colore leviter tingunt, & analysi chymica multo plus olei præbent.

Samuel Fitch Medicus Sheffieldensis apud Rajam observat expressos plantarum omnium succos quos expertus est, postquam aliquamdiu steterint & sæcibus subsidentibus clari evaserint, aliqua ruboris sinctura perfusos apparere, alios dilutiore, saturatiore alios: at Betonicæ succum omnium diluissimum esse & minime coloratum.

Betonica dicitur, attenuat, aperit & abstergit. In primis cephalica est, hepatica, splenetica, thoracica, uterina, diuretica, antiarthritica & vulneraria. In capitis affectionibus præcipue commendatur. Nonnulli vim anodynam & fere inebriantem in ea observaverunt. Simon Paulli in *Quadrupartito Botanico*, refert quasdam edemulas anus occupatas in eruenda & eradicaunda Betonica, eaque transplantanda in distantiorum areolam sole sub ardente cernuas & conquinſcentes, a nimia Betonicæ fragrantia temulentas factas fuisse, & miros, ridiculosque corporis gestus egisse. Bartholinus in *Historia Anatomicarum observationum*, *Observ.* 97. *Centur.* 3. recenset quod cum hortulani operarii hero suo evellere voluissent Betonicam pro usu medico, omnes velut temulenti & ebrii titubarent. Quæ quidem vis oritur a Betonicæ recentis & vegetæ subtili sulphureo spiritu cerebrum & nervos feriente.

In Officinis frequentissime ex Betonicæ floribus conditum; ex foliorum succo syrupus & extractum; ex herba ipsa aqua distillata, infusa, decocta & episthemata præparantur. Foliorum vel recentium vel exsiccatorum manipulus unus in aqua bulliente maceratur Thææ ad instar, aut in ℥ij. decoquitur. Flores a nonnullis ad hunc usum anteponuntur. Syrupus vel conditum ab ℥ss. ad ℥j. foliorum succus ad ℥iij. vel extractum ad ℥ss. præstibuntur & iisdem virtutibus instruuntur. In hemierania, vertigine, membrorum stupore & paralyſi hæc omnia usurpantur. Expectorationem promovent & ulcera interna detergant & ad cicatricem perducunt.

Fabricius Hildanus *Centur.* 3. *Observ.* 32. observavit, multos arthriticos curatos fuisse quotidiano usu florum foliorumque Betonicæ in juseulis, acetiariis, potu & balneis: sed exquisitam observabant victus rationem, corpus per intervalla expurgabant, & fonniculos aliquor gestabant.

Doctor Bowle Medicus Anglus apud Rajam, infusum e foliis Betonicæ, Scorodoniæ & Chamæpithyos exsiccatis paratum & calide porum ad ℥vj. bis, terve die, & per longum tempus continuatum proponit velut medicamentum admirandæ efficaciz in poſagra, cephalalgia, & nervorum affectionibus.

Poterius historiam cujusdam calculo laborantis refert, qui Betonica cum Herniaria in carnium jufculo cocta sanatus fuit. Bibit quotidie hoc jufculum ad tres vel quatuor menses, & vespertis ꝑ. oculorum Cancrorum cum succo Limonum fumpfit, ac tandem convaluit.

Betonice folia exficcata & pulverata sternutatorium præbent potiffimum & in morbis capitis præstantiffimum. Cerebrum enim purgat iritando fibras nerveas quarum extremitates in interiori narium tunica expanduntur. Hac iritatione nervi & cerebri membranæ commotæ humores viscosos in glandulis cerebri aut in sinibus altius impactos fortiter excutunt, qui per vasa sanguinea ad glandulas narium, faucium & vicinas partes delati, sub aquæ, mucî, pituitæque viscidæ specie e naribus per sternutationem ejiciuntur. Aptè igitur Betonicæ pulvis præscribitur contra capitis affectus diuturnos & contumaces ex tenaci materia oriundos, uti gravativos dolores, paralyfim præsertim linguæ & faucium, morbos soporosos, necnon rheumaticos oculorum affectus sine multo dolore & rubore.

Sternutatoriis autem abstinendum est ubi inflammatio imminet vel adest, in cerebri defluxionibus cum febre, oculorum inflammatoriis affectionibus, ulceribus narium, aut quando malum est inveteratum, in obnoxio vertigini, hæmorrhagiæ, & in gravidis. Nonnulli foliorum Betonicæ exficcatorem & conciliorum vel seorsim vel cum Tabaco mixtorum & tubis infarctorum fumum ore haurire & reddere solent in capitis affectionibus.

Externe folia contusa sola vel vino calido macerata capiti admoventur tum ad dolores capitis gravativos sedandos, tum ad vulnera sananda.

Ꝓ. Folior. Betonic. M. j. Liquiritiæ raf. & contul. ꝑ. Coquantur in aq. comm. ℞ij. Colatura per cyathos propinetur. In capitis affectionibus.

Ꝓ. Folior. exficicator. Betonicæ & Majoran. ana q. v. M. F. pulvis sternutatorius ad usum.

Ꝓ. Folior. Beton. Salviæ, Majoran. & rad. Irid. Florentin. ana ꝑ. folior. Nicotianæ ꝑ. Fiat pulvis sternutatorius.

Ꝓ. Folior. recentium Beton. Majoran. Salviæ ana M. ꝑ. Contund. sensim affundendo vini albi & aq. Betonicæ ana ꝑ. Liqueor percoleatur cum expressione & fiat errhinum, de quo tepido, prono capite & aqua ore pleno naribus attrahatur aliquantisper, ter quaterve mane, jejuno ventriculo, ad purgandum cerebrum a crassis & viscidis humoribus.

Radicum facultates in hac planta a foliorum & florum viribus longe diffares sunt: multum ori, stomachoque ingrata nauseam, ructus, vomitumque provocant. Rarissime in usum veniunt.

Betonica usurpatur in pulvere contra rabiem *Palmarii*, Syrupo de *Arthemisia Charas*, de *Hisco Pharmacop. Parisiensis*, Emplastro de Betonica, de Gracia Dei, Unguento mundificativo de Apio, & Ung. martiato, Aqua vulneraria *Lemery Chymie*. Ex planta florida aqua distillata servatur in Officinis, & ex foliorum succo syrupus conficitur.

B E T U L A.

Berula ; Off. Betula ; C. B. P. 426. & *Inst. R. H.* §88. *J. B.* 1. 148. *Dodon.* *Pempt.* 839. Populo albæ similis in Alpibus, *Cesalp.* 121: vulgo, *Bouleau*.

Arbor est satis procera, sæpe etiam fruticans. Ramos spargit tenues ; flexiles, magna ex parte deorsum pendentes. Multiplici libro vestitur. Cortex ejus exterior caudicem conveſtiens crassius, scaber, albidus at rimosus ; qui vero huic subest interior tenuis admodum, lævis atque instar membranæ pellucidus : crassiorum ramulorum cortices inalbescunt quoque, sed minimorum non ita qui spadiceo resplendent. Ligni materia alba est similiter ac ramulorum, qui adeo lenti & flexibiles, ut ex illis circuli ad dolia magna constringenda probatissimi parentur. Viminum seu furculorum gracilium usus ad scopas & ad fascium vincula frequens est. Folia quæ primo exeunt plicata & crispâ prorumpunt læte virentia, singula singulis illic tenuibus dependentia pediculis, subrotunda, acuminata, Populi nigræ haud abſimilia, sed minora, minus lævia, in ambitu serrata ; subpinguia, odorata, sapore amaro. Fructus huic arbori a Matthiolo & Camerario denegatur, a Trago & Dodonæo cum nucamento confunditur. De eo J. Rayus dubitanter loquitur. Clariss. Tournefortius & fructum & florem distinguit in *Inst. R. H.* & accuratissime descripsit in *Agri Parisiensis plantarum Historia*. Julos menses Aprili proſere seu flores amentaceos & quasi vermiculares, sequiunciam longos, lineas duas crassos, ex plurimis foliolis rubescenſibus, subrotundis, culpidatis, duas lineas longis, axi seu capillamento affixis & squammatim dispositis constantes : squamulæ paulatim dehiscunt, promuntque congeriem quatuor vel quinque apicum sub foliolis delitescentium, gracilium, flavescentium vel purpurascantium, lineam longorum, bivalvium, seu in duas partes hiantium, & pulvisculum tenuissimum subluteum expansionis tempore fundentium. Hos inter apices quædam occurrunt foliola intermixta. Eodem tempore fructus iisdem ramis separatim adnascuntur, primo vermiculis similes, semiunciam longi, lineam crassi, ex squamulis virentibus compositi acuminatis cum acumine reflexo, axi cuidam affixis. Singulis sub squammis seminum embryones cum quatuor vel quinque plumulis tenuissimis purpurascenſibus delitescunt. Maturitatem adepti cylindracei sunt, pollicares, tres, quatuorve lineas crassi, utraque parte extrema rotundati, ex squamulis conflati fuscis duas lineas & amplius longis, trifidisque. Squamulæ semina tegunt minuta, fusca, compressa, lineam longa, sere ovata, cum duabus alis membranaceis utrimque dispositis, semine latoribus & pallidioribus. Autumno matureſcunt, & adhuc hyeme & vere sequente in arbore nondum decidui reperiuntur. Ratione fructus hæc arbor inter coniferas a nonnullis recensetur, a quibus distinguitur folio deciduo ad Populeum accedente. In nemore Bononiaco agri Parisiensis sponte crescit. Folia, cortex & lacryma in usum veniunt.

Hieronimus Tragus existimat veteres antequam papyri usus esset inventus,

tus, libro Betulæ, hoc est, cortici candido opera sua inscribere solitos fuisse. Revera non inepti sunt huic usui exteriores illi candidi & membranacei cortices, qui veluti cuticulæ quædam in mediocris magnitudinis arboribus, crassiores corticem amplectuntur, ejusmodi quatuor aut etiam quinque diversas nonnumquam separasse J. Rajus testatur. Unde suspicatur novam quorannis huic arbori cuticulam accedere, vel ex humore, qui paulatim per corticem transsudat concretam, vel ex annua a cortice decedente tunica spoliū Serpentis in modum excrecente. Quicquid sit; J. Bauhinus Trago assentiri nequit Betulæ librum fuisse papyrum veterem.

Hujus arboris cortices bituminosi sunt & Alpini ex illis contortis nocturnas facies parant, quæ optimæ flagrant & incenduntur.

Sub finem hyemis Betula sacco turgida lacrymare incipit. Si vero in trunco aut ramis vulneretur, dulcem, & potulentum humorem adeo copiose effundit ut ramulus aliquis unico die facile ploret libras 8. vel 10. liquoris. Hunc sibi pressi pastores in sylvis sæpenumero potare solent.

Helmontius observat quod si vulneretur cortex Betulæ prope terram in trunco, liquor qui ex vulnere manat, sit totus aqueus ac pene insipidus, si autem ramus crassitudinis trium digitorum ad medium usque perforetur, fluat liquorem sapidiorem, subacidulum, non ingratum, quod quidem noratu dignum videtur.

Analysi chymica, ex foliorum Betulæ recentium ℥v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, coriarum odorem referentis, subamari, occulte salis & subacidi ℥ij. ℥vij. gran. xlvij. humoris primo rufescentis, deinde rufi, ejusdem odoris, manifeste acidi, deinde intense acidi austeri, empyreumatici ℥ij. ℥xiiij. ℥iij. gran. xlvij. humoris rufi, austeri, sale volatili urinoso mediocriter imprægnati ℥ij. ℥vij. gran. xxxvj. olei adiposi ℥iij. ℥vij. gran. lx. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥x. ℥vij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥vij. gr. xxx. ex quibus lixivio, salis fixi mere alcali ℥ij. gran. xiiij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥v. ℥vj. gr. xxiiij. in calcinatione ℥viij. ℥vij. gran. xlij.

Ex ramulorum recentium ℥v. prodierunt humoris limpidi fere inodori, & insipidi, obscure acidi ℥viij. ℥vij. gran. xij. humoris rufescentis manifeste acidi pungentis, subausteri ℥ij. ℥xlij. ℥iij. gran. xvij. humoris fusci, empyreumatici intense acidi, subsalis & subausteri ℥ix. ℥iij. gr. xlij. olei ℥iij. ℥ij. gr. xij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥xv. ℥iij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum læucophæorum ℥v. gran. xxxviij. ex quibus salis fixi mere alcali & caustici gran. lix. lixivio extracta sunt. Partium deperditio in distillatione fuit ℥xiiij. ℥iij. gr. lx. in calcinatione ℥xiiij. ℥v. gr. xxxiiij.

Betulæ folia sale essentiali tartareo, nitroso & aliquantisper ammoniacali cum multo oleo bituminoso permixto donantur. Lignum minorem olei quantitatem continere videtur & minus terræ. Chymici observant optimos ex Betula parari carbones, ad fundenda metalla peridoneos; sane ratione bituminis copiosi quod in illis continetur.

Folia aperiendi, resolvendi & potenter abstergendi facultate sunt prædita.

Coſta

Costa cum aqua & imposita pro epithemate adversus hydropem & scabiem a S. Paulli & Friderico Hoffmanno commendantur, Cortex & ramuli teneri ad eadem valent. S. Paulli narrat se balneo ex tenellorum ramulorum & corticis decocto parato honestissimam matronam scabie pruriginosa universalis, quam ex contagio contraxerat, laborantem sanavisse. Cortex aerem halitibus malignis & pestilentialibus inquinatum suffitu corrigere dicitur, præsertim ad inferiorem caudicem natus. Horum suffimentorum duo adsunt specimina a Medicis Vvratislaviensibus proposita, ad puras necnon etiam infectas ædes pestis tempore sumigandas.

24. Baccar. Juniper. M. iij. Rutæ virentis, Absinth. radic. Helen. corticis Betulæ inferius circa caudicem nati ana M. ij. Folior. Quercus ʒi. Myrrhæ rubr. ʒiij. Exsiccentur & fiat l. a. pulvis pro fumo purarum ædium a contagio præservandarum.

24. Baccar. Juniper. M. iij. Rutæ virentis, Absinth. radic. Helenii, corticis Betulæ ex caudice inferiori detracti, cornu Hirca rasi, non-castrati, Sabinæ, pilor. Hirca, ana M. ij. Folior. Quercus, Myrrhæ ana ʒi. Fiat pulvis pro domibus contagio infectis.

Humoris verno tempore ex Betula profluentis vim & efficaciam in calculo renum & vesicæ, in stranguria & urina cruenta Tragus, Helmontius & alii non immerito celebrant. Hic humor colligitur vel ex cortice ejus terebra perforato, cui filum laneum vel xylinum inferitur, vel ex ramorum extremis præcisus antequam folia erumpant: simulatque enim hæc apparent, liquor, qui exstillat nullius est usus, inquit Helmontius. Ante germinationis tempus collectus saporem habet suavem, acidulum, quasi Terebinthinaceum, & facile acescit. Servatur autem optime vasis & lagenis prope clausis, superaffundendo tantisper olei Olivarum ad aeris contactum arcendum: vel etiam leni committitur fermentationi, quam liquor ille musti ad instar facile concipit, donec in liquorem convertatur potulentum & quasi vinosum: sic enim gratum saporem retinet & per totum annum servari potest. Cyathus unus aut alter hujus humoris Betulini hauritur matutino tempore, jejuno ventriculo. Nonnulli eum ad ʒij. tresve propinant in phthisi incipiente aut ad calculi præventionem. Diuresim promovel, sicque calculos renum & vesicæ propellit, eorum generationem impedit, & ipsum paroxysmum nephriticum sedat; quapropter a nonnullis Betula vocatur lignum nephriticum Europæum, & succedaneum habetur signo nephritico ex Indis allato. Ut major ipsi concilietur vis diuretica, cuilibet haustu potest admisceri aliquid vini cui primo vel radix aut semen Raphani, semen Lithospermi, vel baccæ Alkekengi infusæ sint. Podagricis confert humorem podagræ causam per urinæ vias eliminans. Dysuriis & stranguriis quibus senes obnoxii sunt medetur. In scorbuto Cerevisiæ recentee coctæ & liquori Betulæ æquali proportionem simul mixtis immittunt nodulem ex antiscorbuticis, sumuntque pro potu ordinario. In ictericis, cachecticis, item melancholia hypocondriaca egregii est usus. Hepatis, lienis, mesenterii obstructions nitroso sale suo referat & curat crassos succos resolvendo. Ettmullerus illum mense Martio per aliquot dies haustum ad massam san-

sanguineam tenuiorem, & puriorem efficiendam apprimè convenire asserit : In scabie quoque commendatur, tum externe, tum interne adhibitus. Idem tamen Ettmullerus observat, hunc succum sanguineam molem adeo purgare ut etiam usu suo quosdam scabiosos reddiderit, dum scilicet heterogenea salia ex massa sanguinea secreta & intra cutim defixa, parhemata illa scabiosa produxerunt : sed brevi ab illius usu continuato perfecte sanantur. Gualther. Needham Medicus apud Anglos celebris hoc succo partim mero, partim cum melle permixto phthisim scorbuticam, referente J. Rajo, non semel curavit. Quidam hunc succum distillant, & creber ejus potus cum aqua Sambuci in hydropè laudatur. Aqua præcipue commendatur ad vulnè absterisionem & curationem. Simon Pauli hunc succum jonibis seu varis faciei certo experimento mederi affirmat : sinierdiu, & præsertim mane & vespèri facies colavetur, atque non deterfa siccescat.

BISTORTA.

Bistortæ duæ sunt species in Officinis usitatæ, una radice minus intorta, altera radice magis intorta, quarum radices promiscue venales prostant in seplasiariorum officinis, & iisdem virtutibus donantur.

Bistorta vulgaris radice minus intorta, *Offic.* Bistorta major, radice minus intorta, *C. B. P.* 192. *Inst. R. H.* 511. Bistorta major, rugosioribus foliis, *J. B.* 3. 538. Bistorta, *Dod. Pempt.* 333. Colubrina, & Dracunculus major, *Brusselsii* : Serpentaria scemina, & Colubrina, *Fuchsi* : Bulapathum seu Bistorta : vulgo *Bistorte*.

Ex radice crassa, oblonga, geniculata, articulum digiti complicatum referente, nonnumquam retorta, multis fibris capillata, foris fusca vel ex spadiceo nigricante, interiore vero pulpa non intense rubente, gustu austeriusculo adstringente, folia in longiusculis pediculis promit oblonga, lata, & acuminata, Lapathi similia, verum minora, venosa, superne, quidem atrovirentia, inferne vero glauca : inter quæ mediè exeunt caules pede altiores, teretes, glabri rotundi, geniculati, minoribus aliquot foliis circumvestiti : in quorum fastigio pica florum nascitur apetalorum, qui scilicet ex plurimis staminibus constant, cum apicibus coloris carnei, & ex calyce quinquifido, & concolori surgentibus : pistillum abit in semen triangularem rufum & scitè nigricans, splendens : in capsula, quæ calyx floris fuit reconditur. In hortis colitur : Sponte crescit in regionibus calidis super altiora montium juga, in locis humentibus. Radix in usum venit.

Bistorta radice magis intorta, *Off.* Bistorta major, radice magis intorta, *C. B. P.* 192. *Inst. R. H.* 511. Bistorta media, folio minus rugoso, *J. B.* 3. 538. Serpentaria mas, seu Bistorta, *Fuchsi*.

A priori differt foliis minoribus & lævibus, radiceque magis intorta & complicata. Hæc radix exsiccata ex calidioribus regionibus nobis affertur. Iisdem virtutibus donatur.

Analysi chymica ; ex radicem Bistortæ recentium *℞.* prodierunt humoris limpi.

limpidi, subacidi, aliquantisper odorati, aromatici, cum olei essentialis guttis aliquot ℥ij. ℥ij. ℥j. gr. xliij. humoris primo limpidi, aromatici, deinde rufescentis, manifeste acidi ac subausteri ℥xij. ℥vij. gran. lx. humoris fusci, empyreumatici, manifeste acidi, subalsi ℥vij. ℥vij. olei spissi ad instar extracti ℥j. ℥ij. gran. xl. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥xiiij. gran. xxiiij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥vj. gr. xlvij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥ij. gr. xl. lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥vij. ℥ij. gr. xlvij. in calcinatione ℥xi. ℥j. gr. xlvij.

Hæc radix continet talem essentialem aluminosam seu acidum terra & oleo, cum tenui, tum crasso ac bituminoso copioso involutum.

Virtute balsamica, vulneraria & adstringente donatur. Usurpatur solet ad versus omnes affectus in quibus adstrictione opus est, ut urinæ incontinentiam, gonorrhæam, menses nimios, sanguinem e vulneribus manantem, sanguinis sputum, vomitiones biliosas, dysenteriam, aliaque alvifluxiones.

Recensetur quoque inter alexipharmaca & sudorifera; quapropter ad febres malignas, varietas, pestem, & dysenteriam malignam usurpatur, & sæpius cum Tormentilla consociatur. Verumtamen diaphoreticam, & sudoriferam virtutem illi sicut & Tormentillæ S. Pauli denegat; vim exsiccantem solum & refrigerantem aut incrassantem concedendo. Reipsa si in peste & in malignis febribus Bistorta præstantissima sit, sane quia sanguinis ællum compescit, nimiamque dissolutionem ejus coercescit, tum sale suo luminoso, tum etiam bituminoso suo sulphure, quibus acres massæ sanguinæ sales rerunduntur, irretiuntur. Radix recens vel siccata usurpatur in pilulis, & apozematibus adstringentibus ab ℥ss. ad ℥j. in aq. comm. ℥ij. ad ℥ij. Pulvis exhibetur a ℥ss. ad ℥j. cum conserva Rosar. rubrarum mixtus vel liquore idoneo dilutus, ejus infusum in vino ab ℥ij. ad ℥iiij. propinatur. Pulveris Bistortæ ℥ss. cum parti Succini portione ex ovo sordili diebus aliquot continuis usurpata abortum prohibet, auctore J. Rajo. Ettmullerus in hæmorrhagia ex febris maligna hunc pulverem ad ℥j. scilicet exhibuit. Sylvius decoctum ejus ad fluxus sanguinis uterini nimios post partum, qui contingunt ex retentione particularum secundinæ stimulantium ad excretionem, sicque sanguinis fluxum inducentium, præscribit permixtum cum uterinis & leniter expellentibus. Sic enim aptissime conducit secundinæ reliquiis expellendis & hæmorrhagiæ sedandæ. Eiusdem radices decoctum adversus mulierum fluxum album commendatur.

24. Rad. Bistortæ minutim concisæ ℥j. Glycyrrhizæ ratæ & consusæ ℥j. Raturæ C. C. ℥ss. Radic. Graminis M. j. Coquantur in aq. comm. ℥iiij. ad ℥iiij. Fiat colatura pro potu solito in alvi fluxu variolis suæ perveniente.

24. Rad. Bistort. pulver. ℥ss. Conserv. Rosar. rubr. ℥j. Syr. Berberis q. s. M. F. bolus adstringens in dysenteria, & alvi fluxu.

24. Rad. Bistort. ℥j. Coquantur in aq. comm. ℥xvj. ad ℥x. Adde sol. Majoran. & Pulegii ana M. j. Vini albi ℥xij. Digeantur in vase clauso. Infusum refrigeratum transcoletur. Colatura dilue syr. de Artemisia ℥ij. Adde aq. Cinnamomi ℥ss. Dosis ℥ij. bis terve die, in hæmorrhagia uterina ex secundinæ portione retenta, Vel

24. Rad.

24. Rad. Bistortæ pulv. ℥ij. Corall. rubr. pp. Cinnamomi acuti pulver. & Boracis ana ℥j. Croci pulver. ℥ss. M. F. pulvis pro duabus dosibus cum syrupi Kermisini q. s. fumendus.

Bistortæ radix usurpatur in Aceto theriacali *Charas*, in pulvere dysenterico *Ejusdem*, & in Electuar. *Dialcordio Fracastor.*

B O L E T U S .

Boletus esculentus vulgaris : Boletus esculentus , *Inst. R. H.* 561. Fungus porosus , *C. B. P.* 370. Fungus rugosus vel cavernosus, sive Merulius niger, & albus, *J. B.* 3. 836. Primi generis Fungorum esculentorum 3. species, *Clusii Histor.* 363. Fungus spongiosus, *Dalechamp. Lugd.* Fungi terreni præcoces, Spongiolæ nonnullis, *Dodon. Tempt.* 481. Fungi favaginosi, sive Fungi rugosi savis mellis similes, *Lobel. Bolg. vulgo, Mo-villes.*

Plantæ genus est cujus flores, & fructus adhuc ignoti sunt. Nucleis Juglandis magnitudinem sæpe æquat, nonnumquam superat, substantia carnosus, totus circumquaque scrobiculis pervius ut favos apum imitetur, ex albo nonnihil rubescens, fulvus, aut niger, interiori parte cavus, albus, & velut farinaceo quodam lævore asperius. Pediculus vero, qui Fungi corpus sustinet, totus albus, cavus, & infima parte tenuibus radiculis filamentosis instructus est.

Clusius quatuor hujus Boleti species observavit, quæ magnitudine, figura & colore differunt. Verno tempore reperitur in sylvis Vitæ sanæ, vernaculo idiomate, *Vincennes*, in sylvis Castellæ regii sancti Germani dictæ, & in valle pagi *Montmorency* dictæ. Ad usum culinarium tantummodo colligitur.

Analysi Chymica, ex Boletor. esculentor. recentium ℔v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi Boletorum odorem, saporemque referentis, primo subacidi, deinde acidi manifesti ac tandem intensi ℔ij. ℥vij. ℥j. gr. lx. humoris limpidi, intense acidi ℔i. ℥xiiij. ℥ij. gr. xxxvj. humoris primo rufescentis, limpidi, acidi & subasali, deinde rufi sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥j. ℥vj. gr. xxxvj. salis volatilis urinosi concreti gr. xlvij. olei fluidi ℥j. ℥ij. gran. xxx. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥ij. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥v. ex quibus salis fixi asali ℥iij. gr. xliij. lixivio extracta sunt. Partium perditio in distillatione fuit ℥ij. gran. vj. in calcinatione ℥j. ℥ij. Itaque Boleti salem essentialem continent tartaro similem, cum sale ammoniacali conjunctum, cum oleo copioso permixtum, & multo phlegmate dilutum.

Boletus tum recens, tum exsiccatus ob gustum suavissimum in deliciis habetur variis modis præparatus, & hominum palatum variis condimentis oblectatur. Appetitum excitat, sanguinis motum augeat, vires instaurat, sed parum nutrit: usui nimio sanguinem accendit: quapropter biliosis, & calidis naturis noxius censetur.

Boletus olim exitio Claudii Imperatoris nobilitatus fuit. Optimus, inquit Plinius, cibus Boletus est: sed immenso exemplo in crimen adductus veneno Claudio Principi per hanc occasionem dato a conjuge Agrippina. Certum est

est non vitio Boleti extinctum Claudium, sed vi medicamenti, quo imbutum fuisse omnes tradunt. Hinc medicatum Boletum dixerunt.

BONUS-HENRICUS.

Bonus-Henticus, & Tota-bona, *Off.* Chenopodium folio triangulo, *L.* *R. H.* 516. *Lapathum unctuosum folio triangulo*, *C. B. P.* 115. *Bonus-Henricus*, *J. B.* 2. 965. *Tota-Bona*, *Dod. Pempt.* 651. *Rumex unctuosus*, *Tregi* 319. *Spinacia sylvestris*, *Matthiol.* *Mercurialis*, *Anglor* : vulgo *Bon-Henry*.

E radice crassa, sublutea : fibris aliquot donata, acri & amara plures emittit caules striatos, concavos partim erectos, partim supinos, brevi lanugine hirsutos, pedales aut cubitales : folia triangula, Atriplicis aut Atri similia, & interdum paria, superne glabra, inferne farina tenui respersa, longis pediculis nixa, caulibus alternatim adnata, sapore nonnihil nitroso. Flores in summis caulibus nascuntur conferti in thyrsis, exigui, apetalis, plurimis scilicet staminibus constantes luteis, ex calyce multifido surgentibus. Eorum pistillum abit in semen parvum, orbiculatum, planum, ad renis figuram accedens, per maturitatem nigrum, in capsula veluti stelliformi, quæ floris calyx fuit, reconditum. Herba integra in usum venit. In incultis locis ac rudertis, secus vias, veteres muros & agrorum sepium frequenter reperitur, aut etiam in oleraceis excolitur.

Analysi Chymica, ex totius plantæ cum semine, & radice lib. per retortam distillatis, prodierunt humoris limpidi, odoris, & saporis herbacei, occulte acidi ℥xv. ℥j. gr. xij. humoris limpidi, ejusdem odoris saporisque manifeste ac tandem intense acidi libj. ℥xij. ℥ij. gr. xxxvj. humoris rufescentis, empyreumatici, intense acidi, subfalsi, subaustri ℥j. ℥iiij. gr. xxx. humoris rufi, empyreumatici sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥j. ℥v. gr. lx. olei crassi ad instar syrupi ℥j ℥iiij gr. xxxvj. Massa nigra in retorta residua pendebar ℥vij. ℥iiij. quæ calcinata reliquit cinerum leucophæorum ℥iiij. ℥vij. gr. lx. ex quibus sali fixi mere alcali ℥j. ℥j. gran. xlv. lixivio extracta sunt. Partium deperditio in distillatione fuit ℥vj. ℥j. gr. xliij. in calcinatione ℥iiij. ℥iiij. gr. xij. Itaque hæc planta continet sallem essentialem nitroso ammoniacalem oleo copioso permixtum & multo phlegmate dilutum, & ex hac mixtura compositum lentum & aliquantisper mucaginosum.

Hujus plantæ turiones, germina novella, florum thyrsi dum adhuc teneri sunt, & folia in aqua aut carniū jute decocta & cum butyro & sale condita comeduntur : sed parum nutrimenti præbent. Alvum emolliunt & laxant.

Ejusdem folia concisa aut contrusa externe admodum vulnera recentia uniunt, ulcera sordida & vetustiora expurgant & deterguunt, & vermes, si qui in eis enati fuerint, interimunt, tumores digerunt atque resolvunt, dolores sedant. Simon Paulli, in *Quadrupartito Botanico*, non sine felici successu totam plantam cataplasmatris forma ad mirigandos podagricos dolores adhiberi semel atque iterum apud plebejos observavit : nec quidquam

quam periculi timendum esse affirmat, cum non repellat, sed discutiat, & digerat; imo insuper anodyna est: quæ qualitates raro in uno simplici conveniunt.

℞. Folior. Boni-Henrici recentium M. iij. Flor. Sambuc. & Chamæmeli siccior. ana M. ij. Contund. grosse: coquantur in f. q. aq. Sambuc. ad putrilaginem. Tum adde gummi. Carann. ℥ss. Camphor. ℥ss. Fiat lege artis cataplasma ad podagram parti dolenti applicandum, præmissis prætermittendis.

B O R R A G O.

Borrage, Off. Borrage floribus cæruleis, J. B. 3. 374. *Inst. R. H* 123. Buglossum latifolium, Borrage flore cæruleo, C. B. P. 256. Buglossum sive Borrage, *Matthiol.* 1186. Borrage, *Dod. Pempt.* 627. Corago quorundam: vulgo, *Bourrache*.

Radice est alba, digitum crassa, fibrata, mansu, viscida: foliis latis, subrotundis, e viridi nigricantibus, asperis, rugosis & plicatis, per terram sparsis, eminentibus pullis, tenuissimisque aculeis: caule hispidio, terete, inani, cubitali, ramoso. Flores ejus in cæcuminibus ramulorum nascuntur eleganter cærulei, raro carnei aut albi, pediculis uncialibus & sesquialibus insidentes, purpurascens, & deorsum incurvatis. Monopetali sunt, rotati, in quinque segmenta acuminata divisi, cum umbone acuto in medio e quinque apicibus nigricantibus fastigio coeuntibus pyramidis in modum coagmentato, & segmento oblongo purpurascens cuique apici seu cincinnulo exorsum apposito calyce quinquifido, acuminato, viridi, hirsuto sustentur, ex quo surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum & quatuor veluti stipatum embryonibus qui deinde abeunt in toridem semina nuda, viperini capitis æmula, basi lata, mucrone acuto rugosa, per maturitatem nigricantia, quæ in calyce ipso longe ampliori maturescunt. Tota planta succo donatur viscido & satui saporis. In hortis colitur. Radices, folia, & flores in usum veniunt.

Analysi chymica, ex totius Borrage recentis cum radicibus ℞v. per retortam distillaris prodierunt humoris primo limpidi & deinde albicansis, odoris & saporis lixiviosi, subsalsi ℞ij. ℥ix. ℥vj. gr. xliij. humoris primo limpidi, deinde rufescentis ejusdem odoris & saporis, sed debilioris, qui primo subsalsi, deinde subacidi notas præbuit ℞ij. gr. lxx. humoris rufi, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥v. gr. xxxv. olei spissi ad instar extracti ℥v. gr. iij. salis volatilis urinosi concreti gr. xij. Massa nigra in retorta superflès pendebat ℞ij. ℥ij. gr. lx. quæ igne reverbera, calcinata reliquit cinerum ℞i. ℞ij. gr. ij. ex quibus salis alcali fixi ℥v. gran. xxiv. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℞ij. ℥ij. gran. lxxvj. in calcinatione ℞i. gr. ix.

Borrage exsiccata & super prunas projecta comburendo plurimas edit fulgurationes nitri ad instar, & revera salem essentialem continet nitroso ammoniacalem, qualis ex mixtura spiritus nitri & spiritus urinæ exurgeret. Quemadmodum aurem sal ille medius nunquam concreveret in salinam formam, ita pariter nitrosum acidum in Borrage contentum non concrevit cum urinoso sale in salem essentialem aut potius in nitrum nisi calce

calce aut sale alcali fixo imprægnetur, quæ cum sale acido nitroso avide consociantur, & urinosum salem deiciunt. Radicum succus Heliotropii tincturam efficit rubram: dilutior est tinctura ex florum succo. Nulla vero a foliorum succo hujus tincturæ fit mutatio, unde conicere licet acidum in radicibus magis evolutum esse, minus in floribus, ac in foliis sulphure & terra magis implicitum esse.

Borrago, licet temperata censeatur, inter cardiaca medicamenta numerari solet. Vis corroborandi, lipopychiam removendi, lætitiæ melancholicis excitandi, & sanguinem deſecandi omnibus ejus partibus vulgo tribuitur. Vulgari tamen sententiæ C. Hoffmannus adversatur, qui Borriginis partes aut præparata in affectibus cordis biliosis, ad cor muniendum in febribus pestilentibus, in ictu serpentum aliisque venenis frustra adhiberi se novisse affirmat. Sed in hac sententiarum diversitate non possumus quin multum concedamus sali nitroso ammoniacali, quo hæc planta donatur utpote digestivo potentissimo. Humores enim lentos, tenaces, & crassos dissolvit, dividit & attenuat, sanguinem fluidiorem efficit, obstructions tollit, secretiones, & excretiones restituit, urinas promovel, vel sudores excitat, expectorationem provocat. Quapropter in calida, ut vocant, viscera intemperie a succis crassis, stagnantibus, acrioribus factis, & phlogosum minantibus hæc planta utiliter præscribitur: in pleuritide, peripneumonia, morbisque inflammatoriis incipientibus, in affectionibus ex atra bile oriundis, melancholicis nempe hypocondriacis, & hysteris, in cordis palpiatione, in cachexia, & mensium suppressione a succorum crassitie, aut ab irritatione membranarum, ubi calidiora medicamenta vitanda sunt, ægrotantes ab illius usu diuturno non parum levaminis recipiunt.

Radices, folia & flores utriusque in decoctis, & jusculis alterantibus Succus ex foliis confusus extractus & deſecatus propinatur ab ℥ij. ad ℥iiij. vel ℥vj. nonnumquam permiscetur cum succis Buglossi, Chærefolii & Cichorii sylvestris, & edulcoratur cum syrupis pectoralibus vel laxantibus pro libitu.

Succi harumce plantarum, aliarumque per residentiam spontaneam solam deſecantur, vel per levem ebullitionem, despumationem, & colaturam. Recepta per solam residentiam purgati majoris sunt energię; verum illis quorum ventriculus imbecillior est, nocent, ventriculum enim gravant. Idcirco levi decoctione indigent. Nec adeo effecti sunt illi succi ut nonnullis videtur. Alius plantarum succos obtinendi modus a Th. Fullerio in sua *Pharmacopœa extemporanea* proponitur, non contemnendus.

24. Borrigin. q. l. Concisa & leviter confusa ponatur in olla fictili vitæata cum operculo debite obturato, quæ clibano calido post panes extractos indita stet per sex horas. Dein massa in colum effusa, liquor clarus distillans servetur ad usum.

Quandoquidem per hyemem plantarum succi facile obtineri nequeunt vere vel æstare, dum herbæ videntur, earum succos extrahere & rite reconditos ad usum medicum asservare expedit. Cum autem facile corumpantur, triplicem illorum conservandorum modum idem Fuller proponit: 1. Scilicet affuso oleo olivarum, mediante quo a mucore & acore per tempus præservantur. Post ali-

aliqualem phlegmatis exhalationem, & despumationem ad quartæ partis consumptionem coquantur. Deinde pro utraque succorum libra spiritus vini ʒij. vel iij. adjiçuntur. 3. Per residentiam spontaneam despurati succi immituntur vasis halitu sulphureo conditis. Nimirum tæda sulphurea incensa in vase suspensatur, ita nebula alba totam lagenam implebit: hoc tamdiu fiat donec a fumo sulphuris extingatur: deinde lagena succo repleta claudatur. Ita per longum tempus succi incorrupti commode conservari possunt. Verum ab acido sulphuris fumo nonnihil immutari possunt, ad quod attendendum est.

Flores Borriginis inter flores cordiales recensentur, nempe Borriginis; Buglossi, & Violarum, quibus nonnulli Rosas addunt. Recensentes in acetariis comeduntur: vino injecti animum exhilarare dicuntur. Ex his conditum in Officinis, & syrupus præparantur. Exsiccati quoque servantur. Verum observandum est, hos flores, quando exsiccantur, exiguae admodum virtutis esse, & tunc ad medelam ægrotantium parum conferre.

Ex integra planta aqua distillatur, & extractum conficitur.

Borrigo, & Buglossum sæpius consociantur, & iisdem fere virtutibus donantur.

R. Succor. defœcator. Borrigin. Bugloss. ʒij. Dilue syrup. Violar. Tussilag. aut Caryophyll. hortens. ʒij. Distribuatur in quatuor Meses quarta quaque hora interjectis jusculis propinandas, in pleuritide, pèripneumonia, & febribus inflammatoriis. Sæpe etiam succi Chæresolii, & Cichor. sylvestris adjiçuntur ad diuresim promovendam, & viscerum obstructions potentius referandas.

R. Radic. Borrigin. & Cichor. ana ʒj. Folior. Borrig. Bugloss. Laſtuc. & Agrimon. ana M. j. salis prunellæ vel polychrestæ ʒj. Decoquantur cum pullo gallinaceo, aut frustullo colli carnis vitulinæ. Fiant juscula duo mane & sero sumenda, ad sanguinis æstum compescendum, viscerum obstructions referandas; in cachexia, chlorosi, aut hydropo incipiente.

Borrigo usurpatur in illo apozemate satis noto quod vocatur jusculum D. De Lorme, cujus descriptionem alibi dedimus. Ejus succus usurpatur in Electuar. de Pſyllo correcto Charas, & in syrupo de pomis composito Ejusdem, Syrupo Mercurialis seu De longa vita dicti, de Eryſimo Lobelli.

B O T R Y S.

DUÆ plantæ hujus generis in usum medicum veniunt, scilicet Botrys ambrosioides vulgaris & Botrys ambrosioides Americana.

Botrys ambrosioides vulgaris: Off. Chenopodium ambrosioides, folio sinuato: *Inst. R. H.* 506. & *Raii Hist.* 196. Botrys ambrosioides vulgaris, C. B. P. 138. Botrys: *Dod. Dempt.* 34. Atriplex odora seu suaveolens: *Moriss. Hist.* Botrys plerisque Botanicis: *J. B.* 3. 2. 298. vulgo: *Piment.*

Radice est parva, alba, recta descendente, paucis fibrillis donata: caule dodrantali, aut pedali, terete, rigido, hirsuto, crebris foliis alternatim positis vestito, ab imo statim ramoso: foliis Quernorum æmula diffusura u rinq̃ue laciniatis, ac profundius incisis, venis majoribus rubri

Geoffroy Tom. II.

H in-

insignitis, pediculis longis insidentibus, cum primo emergunt, rubris; postea pallescentibus. Flosculi ad tactum glutinosi in summis caulibus, & ramulis numerosissimi, longa serie velut in spicas laxas digesti sunt. Ex uniuscujusque autem folioli sinu duo exeunt surculi, & velut racemuli flosculi, & seminibus onusti. Hi surculi divisionibus suis *Ἀχροποιον*, observant, & in unoquoque divaricationum angulo flosculus sedet nullo pediculo, itemque in ipsis foliorum alis inter pediculos surculorum modo dictorum. Flosculi apetalii sunt, plurimis scilicet staminibus constantes, ex calyce herbaceo multifido surgentibus. Singulis singula succedunt semina Sinapeos similia, sed minora multo in capsula, quæ calyx floris fuit, inclusa.

Tota planta odorata est cum quadam graveolentia non insuavi, saporis subacris, aromatici, & resinoso quodam lentore prædicta, quo colligentium manus inficit.

Sponæ nascitur in Gallo-provincia circa profluentes aquas, & fontes, in aridis, ærenosisque locis. Facile nostris in hortis adolescit. Herba integra visitata est.

Analysi chimica, ex hujus plantæ floridæ dempta radice ℞v. per retortam distillatis, prodierunt humoris limpidi, odoris, & saporis aromatici, subamaricantis, acris, obscure salii, & obscure acidi ℞ij. ℞j. ℞j. gr. xxxvj. humoris primo subacidi, deinde manifeste acidi, tandem subausteri ℞ij. ℞ij. ℞ij. humoris rufescentis, limpidi, sale volatili urinoso copioso impregnati ℞ij. gr. xxxvj. olei spissi ad instar extracti ℞j. ℞j. gr. xij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℞ij. gr. vj. quæ igne reverberii calcinata reliquit cinerum leucophæorum ℞ij. gr. lx. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℞vij. gr. xxx. extracta fuere. Partium jactura in distillatione fuit ℞ij. gr. liij. in calcinatione ℞j. ℞vij. gr. xvij.

Hæc planta sale essentiali ammoniacali cum oleo tum tenui, tum crasso conjuncto donatur.

A recentioribus ad pectoris affectus pituitosos magnopere commendatur, præsertim in tassi, & asthmate humido, & orthopnoea. Insusum in vino aut hydromelite, aut in aqua bulliente instat Theæ mane, & vesperti ad ℞vj. propinatur, vel herbæ siccæ pulvis cum melle vel syrupo idoneo ad ℞j. exhibetur. Sic pulmonum infarctum referat, mucum spissum incidit, attenuat, & expectorationem promovet. Parulenta exspuentibus mirifice auxiliatur, attestante Matthiolo. Pulmonum ulcera derergit, & vomicas sanat. Camerarius in *Horto suo* scribit in Misnia herbam mandi, & cum paucio vino deglutiri, vel etiam fieri ex ea cum melle electuarium ad pulmonis vitia præstantissimum.

Puerperarum flatulentos dolores colicos, & abdominis inflationem sedat. Præterea expertam Ettmullerus asserit in inflammatione hypochondriorum infantum, in qua succus cum pulve permixtus exhibetur.

Externæ admota herba ipsa recens facit quoque ad uteri dolores, & ad puerorum flatulentam abdominis distensionem, si in calenti tegula, vino generoso irrorata calefiat, & ventri imponatur. Eadem quoque una cum Matricaria, & Chamæmeli floribus puerperarum a partu cruciatibus

sibus auxiliatur, & est præsentaneum auxilium, ubi simul omnia concisa in oleo Liliorum in patella parumper coquantur, & deinde ovis galinaceis excipiantur, simul misceantur, coquanturque quod placentæ formam referant, & calida ventri superponantur.

Aqua ejus distillata fervatur in Officinis, & epota ad dolores post partum leniendos, & hypochondriorum infantum inflationem sedandam perutilis censetur.

R. Botrys M. j. Infund. in aq. cal. ℥j. Colaturæ adde mell. Narbonens. q. s. Sumat æger infusum calens instar Theæ in orthopnea, tussi & asthma humido.

R. Botrys exsic. & pulver: q. s. Adde Mel. despumati q. s. Fiat Electuar. Dosis ℥j. ter quaterve die adversus vomicas pulmonum.

R. Herbar. Botrys recentis M. vj. Capillor. Vener. M. iij. Passular. Corinthiacar. ℥ss. Glycyrrhiz. rasæ ℥iij. Incisa & confusa infund. in aq. Botrys q. s. Coquantur. Fiat colatura, cui adde succi Botrys ℥iij. Succi Hederæ terrestr. ℥j. Sacchari albi q. s. Coq. Fiat Syrupus s. a. Sumat æger ℥j. mane & vesperti cum cyatho infusi Botrys in phthisi incipiente, ulcere pulmonum, & purulenta expuitione.

Nonnulli inter vestes Botrym reponunt ad tineas abigendas & ad odoris suavitatem communicandam.

Botrys ambrosioides Americana, Off. *Chenopodium ambrosioides* Maximianum: *Infusum*. R. H. 506. Botrys ambrosioides Mexicana: C. B. P. 138. & *App.* 516. Epazotl seu Atriplex odorata Mexicana, *Hennandez* 159.

Radice est oblonga, fusca, capillaribus fibris cincta, intus candida: caule pedali, etiam altiore, eoque subrubente quandoque, rotundo, striato, pilis levissimis, & rarissimis aspersis: foliis pallide virentibus, Atriplicis sylvestris vulgaris forma similibus, oblongis, sinuatis, & absque ordine caulem ambientibus. Ad singulorum exortum ramuli, ut in Atriplice emergunt, pluribus velut capitulis alternatim dispositis onuli, quibus singulis foliolum exiguum subjicitur, quibusque apertis flosculi exigui luteoli, ut in Botry vulgari conspiciuntur, hisque semen minutum, copiosum succedit. Tota planta odorem gravem sed non ingratum spirat, & saporem aromaticum ad Cuminum accedentem refert.

Analyti chymica, ex foliorum, & summitatum recentium Botrys Americana lbv. prodierunt per B. V. humoris limpidi, odorati, saporis resinolum, & subamarum referentis primo obscure acidi, ac tandem subacidi ℥iij. ℥iij. ℥j. gr. ij. cum olei essentialis flavescens gr. lxix. deinde per retortam humoris subalsi, subacidi, & urinosi ℥ij. ℥iij. gr. xvij. humoris rufescentis, obscure acidi, manifeste alcali, urinosi, & sale volatili urinoso copiosa imprægnati ℥iij. gr. x. salis volatilis urinosi concreti ℥j. gr. iij. olei adiposi ℥iij. vij. gr. x. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥vj. ℥j. gr. lvij. quæ calcinata reliquit cinerum leucophæorum ℥ij. ℥vj. gr. ix. ex quibus salis fixi mere alcali ℥vij. gr. lxvj. lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥vj. ℥j. gr. lxix. in calcinatione ℥ij. ℥iij. gr. xlvij.

Per hanc analysim manifestum est ; Botrym Americanam continere saltem ammoniacalem multo oleo tum tenui, tum crasso conjunctum . Multo plus salis volatilis urinosi, & olei in ea deprehenditur quam in vulgari Botry .

Hæc planta sudores, urinas, & menses potenter movet, flatus discutit, & ventriculū roborat . Francisc. Hernandez herbam crudam coctamve adjectam condimentis corroborare scribit, pectus i asthmaticis, & obstructis conferre, gratamque alimoniam præbere ; radicum decoctum dysenterias coercere, dissipare inflammationes, & noxia venenis animalia peliere .

B R A S S I C A.

Brassicæ, seu Caulis species non paucæ observantur in hortis excultæ ; vel colore, vel forma differentes. Quædam enim sessili folio parulæ sunt ; aliæ contracto capitatæ ; nigre nonnullæ, vel rubræ ; pleræque albidæ, vel etiam saturato colore virentes jam ex lævi folio. islæ, illæ vero crispæ aut laciniatæ . Est etiam, quæ ex florido caule Cauli-flora dicitur, sicut ex rumente caule Caulo-rapa . Quarum varietatum præcipuæ, & magis usitatæ sunt, Brassica capitata alba, Brassica capitata rubra, Brassica rubra vulgaris, Brassica alba vulgaris, Brassica alba crispæ, Brassica cauliflora .

Brassica capitata alba : *Olitorum*, C. B. P. 111. J. B. 2. 826. *Inst. R. H.* 219. Brassica capitata albidæ : *Dod. Tempr.* 623. vulgo: *Cheou pomme blanc.*

Ex alba, & fibrata radice caulem producit humilem, crassum, albicantem, crasso cortice tectum, medulla parum acri, & subdulci . Folia quæ primum erumpunt lata habet, & ampla, nullis insignibus laciniis sinuata, longis, crassis pediculis hærentia, costis nervisque albicantibus crassis intertexta, colore cæsius aut cinereo cærulescente, quorum inferiora evulsa, aut sponte decidua sepietern relinquant densa vestigiorum serie rugosum & inæqualem ; superna vero, quæ remanent, lata quoque & subrotunda, & ex viridi albicantia, aut cæsia, mutuo incubitu in caput maximum nonnumquam ultra libras quadraginta ponderantem, durissimum, conglobantur tam arcto amplexu, ut difficile separentur. Horum interiora planè albicant . Porro glomer, adveniente vere, quo tempore semini ergo plantari solet, parum dehiscens, e medio caulem erectiorem profert, floribus onustum cruciformibus, qui scilicet quatuor petalis constant luteis aut luteo pallidis, calyce quadrifido, ex quo surgit pistillum quod deinde abit in fructum seu siliquam teretem, longam, tenuem, cylindraceam, septo medio cui valvæ imbricatæ utrinque adhærescunt, in duo loculamenta divisam, seminibusque særam subrotundis, nigricantibus .

Brassica capitata rubra : *Olitorum* : Brassica capitata rubra C. B. P. 111. J. B. 2. 831. *Inst. R. H.* 219. Brassica rubra capitata : *Dodon.* 621. vulgo: *Cheou pomme rouge.*

Quod folia attinet, albæ similia quodammodo sunt : at colore magna varietate ludunt : quædam enim atro-purpurea, quædam atro-virentia, aut etiam dilutius virentia : nonnulla quoque cæsius nebulæ aspersu glauca sunt . At omnes rubris costis, ac nervis intertexta . In reliquis cum alba convenit .

Brassica rubra vulgaris : *Olitorum* : Brassica rubra : C. B. P. 111. *Inst. R. H.*

R. H. 219. & *Tabern. Icon.* 396. *Brassica rubra vulgaris*, J. B. 2. 821. vulgo, *Chou rouge*.

Procerior hæc reliquis esse videtur. Stipite namque velut arborescit duorum, trium aut quatuor pedum, aut etiam cubitorum alto, crasso, ætopurpureo, ima parte verrucoso, alias singulo, alias in ramos divaricato: quem folia fortuito posita stipant lata, ex viridi rubentia, alias sanguineo rubore aut obscuriore etiam tota perfusa, non sine obductu nebulæ cujusdam glaucæ, crebro crassarum venarum discursu rugosa, patula, sinuataque. Flores lutei cauli erecto hærent: quos siliquæ excipiunt palmares, in quibus semen rufum, rotundum. Hujus folia patula manent & expansa. Hyemem perfert, ac sæpe, præsertim culta, arboream acquirit proceritatem, firmitatemque, ac ita in plures durat annos. Sæpe etiam laterales producit ramulos. Ramorum extrema adventante vere delicatioribus in acetaria expetuntur.

Brassica alba vulgaris, Olerorum: Brassica alba vel viridis, C. B. P. 111. Inf. R. H. Brassica alba vulgaris, J. B. 2. 829. vulgo, Chou blond, ou Chou verd.

Ex radice tophosa surgit stipes qui foliis, nervorumque divisura atque intertextu rubræ quodammodo respondet. Folia tamen subrotunda, auriculata ex longis, crassis pediculis delicatiora videntur, in quorum circuitu ferraturæ quædam apparent. Flores albi cruciformes sunt in cæteris Brassicis. Tota planta albicat, & cæso quodam colore obducta est.

Brassica alba crispa, Olerorum: Brassica alba crispa, C. B. P. 111. Inf. R. H. 219. Brassica Sabauda rugosa, J. B. 2. 828. Brassica Sabauda, Dodon. 624. vulgo, Chou frisé blanc.

Hujus folia rotunda, rugosa valde & ita quidem rugis inæqualia sunt, ut singula cœu ex vesicis aut cellulis quibusdam similibus congesta videantur subtus extuberantibus atque prominentibus, aversa parte cavis, & brevibus pediculis hærentia, ex luteolo quodam & atro-virentia & pallide viridantibus costis intertexta. Eadem etiam in densum globum coguntur, sed parvum & candicantem, dum extremitates interim obscurius vident. Flos luteus. Semen ut in reliquis.

Brassica Cauli-flora, Olerorum: Brassica Cauli-flora, C. B. P. 111. Inf. R. H. 219. Brassica multi-flora, J. B. 2. 828. Brassica florida Botrytis, Label. Icon. 245. vulgo, Chou fleur.

Perampla hæc quoque fert folia, cubitalia, longiora quam Brassicæ capitæ albæ, acutiora, nec ita lata, nulla insigni laciniarum divisura, dilute virentia, quædam etiam colore magis glauco, exteriora præsertim nervis candicantibus conspicua, per ambitum nonnihil denticulata & veluti ferrata, sed nec profunde, nec dense. In caput glomerantur sed mollius, minus denso foliotum incubitu formatum: inter quorum sinum cauliculi florigeri densissimo stipatu prodeunt crassi, albi, molles, qui cocti palato grati, cum suavitate comeduntur. His cauliculis, si per tempus liceat, debitam proceritatem adeptis innascuntur flores & siliquæ aliorum similes.

Hæc omnes Brassicæ species in hortis coluntur ad culinarium usum potius quam ad Medicum. In Officinijs Pharmaceuticis præsertim usitata sunt folia Brassicarum rubrarum.

Geoffroy Tom. II.

H 3

Analysi

Analyſi chymica, Braſſicæ capitatæ folior. lbv. per retortam diſtillatæ præbuerunt humoris limpidi, odore & ſapore caules coctos referentis, obſcure ſaſſi ℥xi. ℥v. humoris limpidi ejuſdem odoris & ſaporis, primo obſcure acidi, & deinde manifeſti, nonnihil ſaſſi lbj. ℥viii. gr. xxxv. humoris primo limpidi, deinde ſubturbidi, odoris & ſaporis ejuſdem, ſed ingrati, quaſi porracel, intenſe acidi; ſubſaſſi & ſubauſteri lbj. ℥vj. ℥j. gr. xxxvj. humoris fuſci, ſale volatili urinoſo copioſo imprægnati ℥j. ℥ij. gr. xxxv. ſaſis volatilis urinoſi concreti gr. xx. olei adipoſi, ℥ij. gr. xxi. Maſſa nigra in retorta ſuperſtes pendeſcit ℥ij. gr. vj. quæ calcinata reliquit cinerum ℥v. gr. xl. ex quibus ſaſis fixi mere alcali ℥ij. gr. lxxvj. lixivio fuerunt extracta. Partium jactura in diſtillatione fuit ℥j. ℥ij. gr. lxxij. in calcinatione ℥ij. gr. xxxij.

Per hanc analyſim liquet, Braſſicam capitatam ſale eſſentiali donari tariaco, nitroſo, ammoniacali, cum olei portione mediocri conjuncto.

Ex Braſſicæ cauli-floræ ſummisſimum recentium lbv. per retortam diſtillatis prodierunt humoris limpidi, odore plantam referentis, fere inſipidi, obſcure ſaſſi & obſcure acidi ℥xiiij. ℥j. gr. xxxvj. humoris limpidi ejuſdem odoris, ſaporisque, obſcure alcali lbij. ℥v. gr. xxxij. humoris primo limpidi ejuſdem odoris, ſubſaſſi, alcali, urinoſi, deinde ruſcicentis, ac tandem ruſi, ſale volatili urinoſo copioſo imprægnati ℥v. ℥ij. gr. xlvij. ſaſis volatilis urinoſi concreti ℥ij. olei ſpiſſi ad inſtar extracti ℥j. ℥ij. gr. vj. Maſſa nigra in retorta ſuperſtes pendeſcit ℥ij. ℥vj. gr. xxxvj. quæ calcinata reliquit cinerum ℥vj. gr. xxiiij. ex quibus ſaſis fixi mere alcali ℥iiij. gr. lxxvj. lixivio extracta ſunt. Depeſcitio partium in diſtillatione fuit ℥ij. ℥iiij. gr. lxxij. in calcinatione ℥ij. gr. ℥ij. Ex hac analyſi concludendum ſalem eſſentialem Braſſicæ cauli-floræ eſſe ammoniacalem.

Braſſicæ decoctum ex aqua ſumme foetet & Braſſica in terram putreſcens tetrum ſpirat odorem. Ille foetor oritur ex ſulphure craſſo & admodum compacto, per ſalia volatilia in putrefactione aliquantiſper eveſto.

Braſſica omnis apud olitores & coquos magis familiaris eſt, quam apud Pharmacopœos. A quibuſdam veterum pro Medicina univerſali plane habita eſt. Narrant Romanos per ſexcentos annos ſola Braſſica ad omnes morbos uſos fuiſſe. Etiam medicina magni Canonis audit, qui ejuſdem beneficio familiam ſuam a lue peſtilenti immunem ſervaviſſe dicitur. Hodie quamplurimum tum ex magnatibus, tum ex plebeiis eam inter edulia avidè appetunt. Ruſtici fere omnes ea veſci ſolent. Verumtamen ex omnium fere Medicorum ſententia difficilis eſt concoctionis, parum nutrit, & ſuccum craſſum, ac melancholicum gignit, quod facile quivis in ſeipſo colligere poteſt ex ruſtibus foetidis ingratique, quos excitat. Ventrem inflat, halitibus caput replet, mentis operationes hebetiores reddit, ſomnumque turbulentum efficit. Quapropter eam relinquendam cenſemus illis, qui valent ſtomacho, aliiſque hominibus qui multis diuſque laboribus exercentur. Alba guſtu cenſetur præſtantior rubra, præſertim folia illius interiora quæ tenera, ſuaviſſima, delicatiſſima, concoſtuque facilior cauli-flora. Rubra vero ad uſum medicum reſervatur, quæ ſpeciali dote peſtori convenire dicitur.

Medici

Medici contrarias distinguunt in Brassica virtutes scilicet alvum solvendi, & adstringendi. Soccus qui nitrosus est ammoniacalis, alvum movet; ipsum corpus seu substantia terrena adstringens est. Hinc illud Scholæ Salernitanæ:

Jus Caulis solvit, ejus substantia stringit.

Præterea vis detergens & vulneraria in ea deprehenditur. S. Pauli vidit verrucas illitas succo Brassicæ spatio 14. dierum evanuisse in ancilla quadam, cui manus oblitæ erant verrucæ, quas sinebat sponte exsiccari sua citra dejectionem ullam. Camerarius refert folia ejus in ulceribus & lepra vino incocta admodum utiliter adhiberi. Tragus tantæ Brassicæ efficaciam ait, ut urina eorum qui hoc olera vescuntur, fistulis, cancro, serpiginis, & similibus vitis mederi queat. S. Pauli potum vulnerarium ad consolidanda vulnera ex Brassicæ rubræ, Saniculæ, Verbenæ ana M. j. Nucis mosch. Zingiber, ana ℥ss. in ℔vj. Cerevisiæ maceratis describit & vulneratis pro potu ordinario propinandum proponit. G. Hieronymus Velschius refert ex Ottone Heurnio quemdam scorbuto adeo, misere laborantem, ut maculis toto pectore & cruribus diffusis, membrisque rigentibus vix incedere posset, sanatum potu quotidiano ex vini ℔iij. quibus Brassicæ rubræ concisæ M. iij. cum Zingiberis ℥ss. Cinnamomi ℥ij. immacerata fuerant. Grube *De Arcanis Medicinæ*, testatur quemdam hydrope & scorbuto laborantem ope solius Brassicæ vino cum suis corrigentibus insulsæ feliciter fuisse restitutum.

Rubra acrimoniam humorum in pectore potissimum summo opere mitigat, tussim egregie sedat, & incipientia ulcera detergit. Eo nomine in decoctis & jusculis pectoralibus præscribitur. Concionatoribus quibusdam & cantoribus in usu est pro ræcedine nimiam loquelam insequente emendanda, ac voce conservanda, decoctum ejus cum passulis frequenter haurire.

R. Pulmonem unum vitulinum minutim sectum, Brassicæ rubræ frustulatim sectæ ℔j. Napor. n. xij. Orizæ mandatæ cochlear unum. Coquantur in aq. comm. ℔vj. ad ℔iij. pro quatuor jusculis adversus tussim vehementem, & spirandi difficultatem.

R. Succ. dejectæ caulium rubror. ℔j. Croci minutim concisi ℥iij. Mellis despumati & Sacchari albi ana ℔ss. Coquantur ad syrup. consistentiam. Fiat colatura. Syrupus rite coctus servetur ad usum.

Hartmannus ad lateris dolorem parti imposita proponit. Puerperarum mammis ad lactis abundantiam aut coagulationem præcavendam, mammarum quoque abcessibus, ad præcavendam inflammationem, & ad ulceris consolidationem promovendam utiliter imponuntur.

Brassica rubra usurpatur in Unguento mundificativo de Apio. Ex ejus succo syrupus Caulium rubrorum in Officinis paratus servari solet.

B R U N E L L A.

Brunella, Prunella, Consolida minor, & Symphytum minus; *Off.* Brunella major, folio non dissecto, C. B. P. 260. *Inst. R. H.* 182. Prunella flore minore, vulgaris J. B. 5. 428. Brunella, *Dod. Tempt.* 136. Consolida minor, *Matthioli. Camerar. Epitom.* 703. Symphytum petraeum, *Lobel. Icon.* 474. vulgo, Brunelle.

Radice est transversa, fibrata, parva: caulibus spithamam superantibus, quadrangulis, hirsutis, ramosis: foliis subrotundis, obscure virentibus, sinuatis, pediculis, longiusculis hærentibus. Flores quasi spicati & verticillati in densis capitulis oriuntur monopetali, labiati, purpurei, labio superiori galeato, inferiori vero trilobato. Calyx monotomos quatuor semina subrotunda continet & pistillo nata. Delectatur locis herbidis & soli expositis agri Parisiensis. Herba integra in usum venit.

Analysi chymica, folior. Brunellæ recentium lbv. per retortam distillatæ præbuerunt humoris limpidi, primo odore & sapore plantam referentis, deinde saporis & odoris expertis, obscure acidi libij. ʒiij. humoris primo limpidi, deinde rufescentis, inodori: manifeste acidi, deinde fusci, empyreumatici, intense acidi, subausteri, ac tandem aliquantisper & obscure urinosi lbj. ʒiij. ʒj. humoris fusci, turbidi, sale volatili urinoso copioso imprægnati ʒvij. salis volatilis urinosi, concreti gr. viij. olei spissi ad instar extracti ʒiij. gr. xxxvj. Massa nigra in retorta residua pendebat ʒiij. ʒvj. gr. xxxvj. quæ calcinata reliquit cinerum ʒij. ʒj. ex quibus salis fixi mere alcali ʒv. gr. lx. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ʒvj. ʒj. gr. lxxij. in calcinatione ʒij. ʒv. gr. xxxvj.

Brunellæ succus chartam cœruleam rubro inficit colore, saporem refert herbaceum, slipticum, mucaginosum, cum exiguo amaro. Salem essentialem continet aluminosum cum Ammoniæ portione exigua & mediocri sulphuris crassi, bituminosi, portione conjunctum.

Brunella inter plantas vulnerarias astringentes recensetur, nec infimum locum tenet. Usus præcipuus in vulneribus, in primis pulmonum, in spuro & mixtu cruento, uterinis hæmorrhagiis, & dysenteria. In decoctis, juleculis & potionibus vulnerariis ejus decoctum ad ʒvj. succus ad ʒij. vel ʒiij. præscribitur. Usurpatur quoque decoctum in enematibus vulnerariis & adstringentibus adversus cruenta ventris profluvia, necnon in profundiora vulnera inficitur. Ab animali venenato demorsis J. Bauhinus ejus succum propinat.

In faucium & tonsillarum inflammationibus, in aphthis & ulceribus oris & palati, decoctum ejus in ore detentum specificè convenit & ingreditur gargarismata anginosa.

R. Brunellæ M. j. Coqu. in aq. comm. lbj. ad medias: sub finem coctionis adde mellis rosati ʒj. Salis Prunell. ʒj. Fiat colatura cui adde phlegmatis vitriol. ʒj. Fiat gargarisma.

ʒc. Folior. recent. Brunell. & Veronicæ ana M. j. Vini rubr. lbj. Macerentur in

in vase clauso in balneo Mariæ per sex horas. Fiat colatura cum expressione ℥iij. ter die in mistu cruento sumat æger.

R. Succor. defæcator. Brunell. Bugulæ, Saniculæ ℥iij. Syrup. Heder. terrestr. ℥ss. Fiat potio in sputo cruento, & hæmorrhagiis sæpius pro urgentia mali reiteranda.

Rustici plantam recentem contusam vulneribus imponunt ad sanguinem sistendum, & agglutinandum vulnus. In putridis ulceribus sedis, & pudendorum commendatur. Cæsalpinus plantam contusam in cataplasmate furunculis ad eorum suppurationem excitandam admovebat. Idem in vehementi cephalalgia, succo Brunellæ cum oleo Olivarum, & aceto commixto tempore colluebat.

Brunellæ aqua distillata servatur in Officinis.

Brunella usurpatur in balsamo polychresto *Bauderoni*, in Emplastro pro fracturis *Nic. Præpositi*, in Emplastro ad herniam *Ejusdem*, & in Aq. vulneraria.

BRYONIA.

BRYONIE sub nominæ duæ plantæ genere diversæ in Officiis usitate sunt; *Bryonia alba*, & *Bryonia nigra*. *Bryonia alba* adhuc duplex, baccis rubris scilicet atque baccis nigris.

BRYONIA, & *Bryonia alba*, *Vitis alba*, *Uva serpentina*, *Uva anguina*, *Offic. Bryonia aspera* sive *alba*, baccis rubris, *C. B. P.* 297. & *Inf. R. H.* 102. *Vitis alba* sive *Bryonia*, *J. B.* 2. 143. *Bryonia alba*, *Dod. Pempt.* 400. *Tamarum* vulgo, vel *Cerasiola*, *Cæsalp.* 206. vulgo, *Colewortte*, *Bryone*, ou *Vigne blanche*.

Radice nititur brachium superante, & femur humanum, cum annosa est, æquante, carnosæ, in crassiores fibras divisa, cum exsiccat fungosa, circulis ac radiis distincta, saporis aeris, amaricantis, ingrati, & odoris, dum recens est, virosi: caules longissimos fundit tenues, scandentes, striatos, subhirsutos, caprellis donatos, in quibus folia alternatim nascuntur angulosa, ad *Vitis* formam quodammodo accedentia, sed longe minora, & subaspera. Ex foliorum alis flores aliquot simul juncti exeunt, monopetali, campaniformes, patentes, in quinque partes subrotundas divisi, ex albedo virentes, & venis distinctas, quos ita complecti solet calyx ut ab iis sejungi nequet. Ex floribus alii steriles sunt, majores, & nulli embryoni adhærescentes, alii fecundi, minores, insidentes embryoni qui abit in baccam sphericam, *Pisi* magnitudine, primum viridem, deinde rubram, mollem, succi nauseosi plenam, seminibus sætam subrotundis, mucagine quadam obductis. Nascitur passim in sepibus, & sylvis præsertim in temperatis, & frigidiorebus regionibus. Agri Parisiensis est incola. Radix potissimum in usum venit.

Bryonia alba baccis nigris, *C. B. P.* 297. *Inf. R. H.* 101. *Bryonia nigra*, *Dod. Pempt.* 399. Hæc a priore differt radicem, & baccarum colore. Hujus radix interius buxæ colore pallet, illius ex albedo sub-lutei coloris est: hujus baccæ nigricant, illius rubent. Hæc priore minus usitata est.

Analysi chymica, radicis *Bryoniæ* recensitis *Th.* per *B. V.* distillatæ præ-

præbuerunt humoris limpidi, insipidi, obfcure falſi ℥iij. ꝑ℥iij. humoris limpidi, ſaporis herbacei, obfcure acidi ꝑ℥iij. ℥vij. gr. xvij. Maſſa reſidua per retortam diſtillata præbuit humoris ruſceſcentis primo, manifeſte acidi, deinde auſteri ꝑ℥ij. ℥vj. gr. xxxvj. humoris fulci, empyreumatici, alcali urinoſi ꝑ℥ij. gr. xxxij. ſalis volatilis urinoſi concreti ℥ij. olei fluidi ꝑ℥ij. gr. xxxiiij. Maſſa nigra in retorta reſidua pendebat ꝑ℥vj. ℥vij. gr. lxiij. quæ calcinata reliquit cinerum ꝑ℥ij. ℥vij. ex quibus lixivio, ſalis alcali fixi ꝑ℥ij. ꝑ℥ij. extractæ ſunt. Partium jactura in diſtillatione fuit ꝑ℥iij. ℥vj. gr. xxxj. in calcinatione ꝑ℥v. gr. lxiij.

Radix ſuccus chartam cœruleam rubro colore inſcit, amarus eſt, & odoris naſeabundi. Itaque patet, eam continere ſalem eſſentialem, tartareum, ammoniacalem, cum oleo acri & foetido conjunctum.

Bryoniæ radix recens ſerum lentum, craſſam & glutinoſum potenter diſſolvit, quacumque in parte ſit condenſatum, illudque evacuat per ſecceſſum & nonnumquam per vomitum. Siccata vero debilior eſt, & per inferiora ſolummodo purgat. Feliciter uſurpatur in hydropo, paſſione hystérica, aſthmæ, epilepſiæ, vèttigine, paſalyſi, arthruide, & morbis chronicis. In primis in aſthmate humoralis, in hydropo pectoris & uteri & in hystérica ſuffocatione ab obſtructionibus hujus viſceris ſpecifica audit. At vero cum potens ſit & acre catharticum, ejus vehementia temperari ſolet a cremore Tartari, Sale vegetabili, Aceto tum ſimplici, tum ſtillicitio, aut aliquo pulvere aromatico & ſtomachico. Radix ſiccata & pulverata exhibetur a ꝑ℥i. ad ꝑ℥ij. ſuccus a ꝑ℥i. ad ꝑ℥ij. in juſculo. Radix ex lacte vel vino cocta ad ꝑ℥ij. vel ꝑ℥vj. Ex ſucco radice paratur ſyrupus ad eodem morboſ efficax ſi propinquetur ad ꝑ℥ij.

Reſert Arnaldus a Villa-nova epilepticum curatum fuiſſe trium ſeptimanarum ſpatio, purgandum ſe-quotidie cum ſucco Bryoniæ deſecato, addito paucis Saccharo. Thomas Sydenham manix curationem hoc cathartico inniti aſſerit, ſi, debitis ventris ſectionibus, tum ex brachiis, tum ex jugularibus venis præmiſſis, æger hujus radice pulveratæ ꝑ℥i. cum lacte, vel infuſum ꝑ℥ij. in vino tertia vel quarta quaque die ſumat, donec convaleſcat. Ad paſſionem hystericam vel ſuccus vel decoctum in vino præſtat ex Matthiolo, ſi bis vel ter in hebdomada uſurpetur.

Aqua vel ſuccus radice Bryoniæ ſingularis a quibuſdam adverſus hydropem commendatur, qui ſic præparatur. Primo vere radix Bryoniæ circa caput ex tranſverſo reſecatur: pars vero reliqua terræ cohzrens excavatur: tum ſuperior pars reſecta tanquam operculum ipſi imponitur. Cavitas poſtero die reperitur repleta ſucco quodam ſere lacteo, qui exhibetur ad cochlear unum, duo vel tria quotidie mane jejunio ventriculo, clementer purgat per inferiora, aquas hydropicorum ſubducit, viſcerumque obſtructiones tollit.

Fœcula Bryoniæ præparata ſervatur in Officinis; quæ nihil aliud eſt quam farinacea pars radice quæ dum ſuccus depuratur in pelvis fundo ſubſidet, & effuſo paulatim ſucco exſiccatur. Sed exiguæ admodum eſt virtutis.

Extractum majoris eſt energiæ & præparatur radicem recentem minutim conciſam decoquendo in vino ad medias, decoctum exprimendo, & colaturam ad extracti conſiſtentiam inſpiſſando. A ꝑ℥ij. ad ꝑ℥ij. exhibetur.

R. Ra.

R. Radic. Bryon. pulver. ʒʒ. Cremor. Tartar. ʒj. Fiat bolus cum f. q. conserv. Rolar.

R. Radic. Bryon. alb. pulver. ʒj. Lactis vaccin. ʒiiij. Hauriat æger. Vel

R. Rad. Bryon. recentis ʒʒ. Vini albi ʒiiij. Macerentur per noctem. In colatura dissolve syrup. Violar. ʒj. M. Fiat potio in mania.

R. Radic. Bryon. recent. ʒij. Coque ex aq. ad ʒvj. In colatura dissolve Mann. Calabr. ʒj. Sal. vegetabil. ʒj. Fiat potio.

Externe admota radix potentissime resolvit. Ad hydropem, lateris dolorem, ischiadicum dolorem, & scrophulas commendatur. Radix recens confusa, & renum regioni applicata sola vel cum stercore vaccino, urinas promovet, & hydropem sanat, auctore J. Raio. Tachenius refert dolorem ischiadicum radice recente tusa, cum oleo Lini mixta, & tepide applicata, mirum in modum pacari.

Zacutus cum juramento affirmat scrophulas tam apertas, quam non apertas hoc unguento sanari.

R. Rad. Bryon. alb. succosæ libʒ. In taleolas minutim sedam frige in sartagine, quousque contabescat. Cola. Adde Terebenthin. Abietis libʒ. Ceræ ʒv. Fiat unguentum. De hoc unguento supra strumas appones manè, & vesperi. Vel enim strumas resolvit, vel ad supurationem deducit, tandemque sanat ulcera.

Turiones, & Bactæ alvum vehementer commovent, & ventriculū gravant. Rarius in usum veniunt.

Circulariores, & Agrytæ nonnulli ex hujus radice mira quædam monstra effingunt, quæ cum aliquot dies siccæ arenæ mandaverint, pro Mandragoris postea distrahunt, & vendant.

Radix Bryoniæ usurpatur in syrupo aperiente cachectico *Charas*, in unguentis *Agrippæ* & *Aregon*. *Nicolai Salernitani*.

BRYONIA nigra vulgaris seu racemosa, Vitis nigra, Tamnus, Sigillum Beatæ Mariæ, *Off.* Tamnus racemosa flore minore, luteo-pallecente, *Inst. R. H.* 103. Bryonia levis sive nigra racemosa *C. B. P.* 297. Vitis nigra quibusdam sive Tamnus Plinii, folio Cyclaminis, *J. B.* 2. 147. Vitis Sylvestris, *Dodon.* 401. vulgo, *Sceau de Notre Dame ou Racine vierge*.

Radice est magna, crassa, longa, tuberosa, foris nigra, intus alba, succo glutinoso, & lento turgida, sapore acri non ingrato: cauliculis viticulosis, tenuibus, longis, scandentibus, lignosis, obscure subrubentibus, absque capreolis: foliis alternis, mollibus, læte virentibus, splendens, Smilacis lævis haud absimilibus, multis nervis sinuatis præditis, saporis viscidī. Flores ex foliorum alis oriuntur racemam coherentes, exigui, monopetali, campaniformes, patentes, in sex partes divisi, ex luteo virentes, quorum alii steriles sunt, nulli embryoni adhaerentes, alii fecundi insidentes embryoni, qui deinde abit in baccam ovatam, rubentem, aut ex rubore fuscā, calyptra membranacea instructam, seminibusque sætam subrotundis. In agro Parisiensī frequens nascitur. Radix in usu est.

ALIA est Bryoniæ nigra species quæ Bryonia nigra baccifera dicitur: Tamnus baccifera flore majore albo, *Inst. R. H.* 103. Bryonia lævis sive nigra baccifera, *C. B. P.* 297. *J. B.* 2. 149. A vulgari Bryonia nigra race-

racemosa potissimum in his differt, quod vulgaris florem minorem habeat, & racemosa sit: hæc vero flore sit majore, & albo, atque baccas ferat Cerasis fere similes, & singulatim in singulis pedicellis e caule prodeuntes.

Analysi chymica, Bv. radices Bryoniæ nigre vulgaris recentis per retortam distillatæ præbuerunt humoris limpidi, fere inodori, & insipidi, obscure acidi ℥ij. humoris primo limpidi subacidi, obscure austeri, deinde rufescentis, empyreumatici, intense austeri ℥ij. ℥iij. ℥j gr. xlvij. humoris fusci, empyreumatici, intense acidi, cum quadam acrimonia, nec non obscure alcali, urinosi, & austeri ℥ij. ℥vij. gr. xxxvj. humoris fusci, mediocri salis volatilissimis urinosis portione imprægnati ℥j. olei ℥j. gr. xxxvj. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥vj. ℥v. quæ calcinata reliquit cinerum ℥iij. ex quibus salis fixi alcali ℥ij. gr. xiiij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥iij. ℥vij. gr. xxiiij. in calcinatione ℥iij. ℥v.

Hæc radix salem continet essentiali aluminoso similem cum ammoniacali, & oleo tenui ac raro conjunctum. Licet enim parum olei extractum videatur: attamen duæ posteriores humoris distillati portiones iterata distillatione rectificatæ olei fere ℥iij. reliquerunt.

De internis hujus plantæ viribus inter Botanicos non convenit. Comperitum est, inquit Lobelius, vel mulierculis vehementius urinam renumque sabulum, mensiumque saburram impellere potu. Quidam contendunt ejus radicem aquosa detrahare ac hydropicis utilem esse. Verum C. Hoffmannus de vi purgatrice valde dubitat: & J. Rajus refert Mart. Lister celeberrimum apud Anglos Medicum, tum radicem ipsam in substantia, ut vocant, tum ejus extractum, larga dosi sæpius exhibuisse, numquam tamen observasse eam vel per vomitum, vel per secessum, vel alio quovis modo sensibili operari.

Externe hæc radix vulneraria est, & potenter resolvit. Vulgaris est usus in suggillationibus hanc radicem rasam, & confusam sub forma cataplasmatibus contusæ parti imponere: & livorem cito discutit. J. Rajus pulverem radicis cum aceto, & stercore vaccino ad formam cataplasmatibus redactum podagricos dolores lenire asserit.

Usurpatur in pulvere ad puerorum enterocolem Pauderoni, & in Empli. Diabotano D. Blondel, *Collesianeor. Pharmaceuticor.*

BUGLOSSUM.

BUGLOSSUM, & Buglossa, *Off.* Buglossum angustifolium majus flore cæruleo, C. B. P. 256. *Inst. R. H.* 134. Buglossum vulgare majus *J. B.* 3. 578. Buglossa Italica, *Tragi* 232. Buglossa vulgaris, *Dodon. Pempt.* 628. Cirsium Italicum, *Fuchs*: Lycopsis *Anguill*: vulgo, *Euglose*.

Ex radice oblonga, terete, digitali crassitudine, pluribus annis restante, foris rubente aut nigricante, intus candida, lenioque succo prædita, caules plures exterius sesquicubitales aut cubitales, teretes, pilis rigidulis asperos, sum-

summa parte ramosos : quibus absque pediculis adnascuntur folia crebra , angusta , oblonga , ex viridi glauca , non ut Borriginis rugosa , in acutum mucronem desinentia , consimilibus pilis utrimque hirsuta , ad margines æqualia . Flores in fastigiis caulium & ramosum , e calyce quinque oblongis , angustis , acutis , pilosis segmentis composito , exeunt monopetali , infundibuliformes , in quinque segmenta obtusa seu orbiculata e cæruleo purpurascencia , divisi , cum umbone medio obtuso , villosa , quinque staminibus composito . Pistillum oblongum ex imo calycis fundo nascitur posticæ floris parti ad instar clavi infixum , & quatuor veluti stipatum embryonibus , qui deinde abeunt in totidem semina viperini capitis æmula , in acutum mucronem ad latus spectantem fastigiata , per maturitatem pulla , rugosa , quæ in calyce ipso longe ampliata maturescunt . Summitates caulium & calyces florum purpurascunt . Surculi floriferi , antequam flores expandantur , reflectuntur , seu contorquentur caudæ scoppii in modum . In agro Parisiensi sponte nascitur , & in hortis ad usum medicum colitur . Tota enim plania usitata est .

Analysi chymica , ex folior. Buglosi recentium lbv. prodierunt humoris limpidi , saporis & odoris herbacei , obscure alcali lbj. ℥xij. gr. lxxij. humoris limpidi , tum obscure acidi , tum obscure alcali lbj. ℥x. gr. xl. humoris limpidi subsalsi , tum obscure acidi , tum obscure alcali ℥ijj ℥ij. gr. xxxvj. humoris rufi , sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥vij. salis volatilis urinosi concreti gr. lx. olei spissi ad instar extracti ℥vij. gr. lxxij. Massa nigra in retorta superflua pendebat ℥ijj. quæ calcinata reliquit cinerem ℥j. ℥vij. gr. lxxvj. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥vj. gr. xlij. extracta sunt . Partium jactura in distillatione fuit ℥j. ℥ijj. gr. xxij. in calcinatione ℥j. gr. vj.

Buglosi radicem succus glutinosus est , & chartam cæruleam rubram efficit . Non adeo lentus est florum & foliorum succus , & longe debiliorem rubedinem conciliat . Præterea folia exsiccata & prunis imposita accenduntur , & leves emittunt fulgurationes , quales ex sale nitri in prunas projecto exfurgere solent . Ex quibus concludere licet , saltem huic plantæ inesse essentialem , nitrosum , ammoniacalem , quadam mucagine involutum , & multo phlegmate dilutum . Sed acidum in radicibus magis est evolutum , minus vero in floribus & in foliis .

Buglosum easdem obtinet virtutes , quas Borrago : cum illa sæpe confociatur aut illi substituitur . Borragine minus succosum videtur . Ratione salis nitrosi tenuis & volatilis qui in illo deprehenditur , sanguinis æstum & effervescentiam biliosam temperat & coerces : ejus lentorem sale ammoniacali blando resolvit : sicque sanguineum latorem resolvendo , fermentatitium ejus motum compescendo , ejusdem circuitionem expeditiorem efficit , secretiones excretionisque imminutas aut interruptas restituit . Ea ratione utiliter exhibetur in affectionibus melancholicis & hypochondriacis , in febribus inflammatoriis , pleuritide , peripneumonia , & aliis .

Flores sunt e numero florum cordialium quorum pugillus unus aut alter in liquoris idonei cyatho uno infusus instar Theæ præscribitur , aut eorum con-

conserva a ʒij. ad ʒʒ. Folia & radices in decoctis bechicis, in iusculis alterantibus & refrigerantibus usurpantur. Buglossi succus sicut & Borraginis expressus & defœcatus ad ʒiiij. vel ʒvj. pro dosi sumitur in pleurinde : & tertia vel quarta quaque hora iteratur, ut diximus articulo de Borrachine. Sæpe sudorem movet, sanguinem spissum & fere coagulum resolvendo.

Extractum Buglossi in officinis præparatur, & aqua distillata quæ inter aquas cordiales temperatas recensetur.

Succus Buglossi usurpatur in syrupo Mercuriali, de longa vita dicto, syrupo de Fumaria *Mesue*, syrupo de Pomis composito *Charar*, Electuar. de Pyllo *Ejusdem*, Pilulis angelicis *Colledaneor*. *Pharmaceutic*. Flores adhibentur in syrupo Elleborato *Quercentani* : Conserva florum in opiata *Salomonis*. & in Electuario de Citro solutivo.

B U G U L A.

Bugula, Consolida media, & Symphytum medium, *Off.* Bugula, *Dodon. Pemptad.* 135. *I. R. H.* 209. Consolida media pratensis cærulea, *C. B. P.* 260. Consolida media, quibusdam Bugula, *J. B.* 3. 430. Prunella Germanis, *Tragi* 311. Herba Laurentiana, *Cass. Dur.* Arthetica *Pandelhar.* *Anguill.* Chamæcissus quorundam, *Legd.* 109. Symphytum medium *Lonicer* : Sylvarina vulgaris cærulea, *Hort. Oxon.* *Morisson* : vulgo, Bugle ou petite Consolide.

Radice est tenui, fibrosa, alba, styptica : foliis duabus uncias longis, subrotundis, mollibus, sinuatis, leviter incisis, nitidis, obscure virentibus, & in apricis & saxosis nonnumquam inferiore parte purpurascens, sapore primo occurso subdulci, mox amarescente & adstringente : duplici caulium genere, aliis tenuibus, teretiusculis, humi repentibus quibus se propagat, aliis erectis, palmam superantibus, quadrangulis, non ex omni parte hirsutis, sed duobus oppositis tantum lateribus, idque alternatim ad singula internodia, in quibus folia bina ex adverso nascuntur inferioribus minora. Flores in foliorum alis verticillatim oriuntur monopetali, unilabiati, cærulei, in tres divisi partes, quarum media bifida est, labii superioris locum occupantibus denticulis, cum pistillo & apicibus cæruleis : calyci insident sessili, brevi, hirsuto, cyaneo, monotomo, quinque-partito : ex quo surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum & quatuor veluti embryonibus stipatum, qui deinde abeunt in totidem semina subrotunda, in capsula quæ calyx floris fuit recondita. Delectatur pratis & locis umbrosis. Herba integra in usum venit.

Analysi chymica plurimum præbet spiritus urinosi, phlegmatis acidi & olei, mediocrem vero salis volatilis & terræ quantitatem ; unde exsurgit sal essentialis aluminosus ammoniacalis cum oleo spisso bituminoso & aliquantisper aromatico consociatus.

Vulneraria est adstringens tam intrinsecus quam extrinsecus adhibita. Commendatur in hæmorrhagiis quibuscumque, cruenta exspuione, dysen-

dyſenteria, fluore albo mulierum. In infuſis, apozematibus, juſculis & potionibus vulnerariis, folia ad M. j. flores ad P. j. aut ij. præſcribuntur vel ſola, vel cum Sanicula, Brunella, aut aliis herbis vulnerariis permixta. Succus foliorum expreſſus & deſecatus ad ℥iij. vel ℥vj. ad eadem valet. Inſuper ſanguinis concretiões ubicumque ſint diſſolvere & circulationi denuo reddere dicitur. Qua ratione propinatur ab alto devolutis, item cæſis, ruptis contraſtiſque, & iis qui externa, ineſtinave vulnera acceperunt. Idem ſuccus externe adhibitus vulnera ulceraque ſanat. Utiliter quoque adhibetur in collutionibus ad aphthas, oris & gingivarum ulcera, ſicut & pudendorum utriuſque ſexus.

Quidam huic plantæ vim diureticam & aperientem tribuunt. Camerarius & Dodonæus eam in hepatis obſtructionibus, ictero, urinæ ſuppreſſione utilem eſſe aſſerunt. Poterius decoctum Bugulæ in juſculo vervecis factum maxime in phthiſi, commendat & internis ulceribus. Hepati quoque conferre mirifice aſſerit: & obſervat eam parum & clementer ventrem laxare, contra naturam Conſolidarum inter quas reponitur.

R. Folior. Bugulæ, Saniculæ, Alchimillæ, Vincæ Pervincæ, Pyrolæ, Veronicæ ana P. j. ſeu ℥℥. Affunde vini rubri generoſi lb. Infundantur per ſex horas in vaſe clauſo: deinde ſuperaffunde aq. comm. ſerventis lbij. Macerentur adhuc ſimul per aliquot horas, & colentur. Doſis erit ℥℥. mane & ſero propinanda, in cruenta exſpuitiōe, caſu ab alto, &c.

R. Radicum Ariſtoloeh. rotundæ & Gentianæ ana ℥iij. Radicis Rubiæ tinctor. ℥℥. Minutum inciduntur, & bulliant per horæ quadrantem in aq. commun. lbij. Tum adde foliorum Bugulæ, Saniculæ, Brunellæ, Alchimill. ana ℥℥. flor. Centaur. minor. & Hyperici ana P. j. Bulliant leviter, & colatura ſervetur ad uſum. Doſis ℥v. vel ℥vj. cum ſyrupi de Hedera terreſtri ℥℥. Eſt potio vulneraria inſignis ad vulnera, ulcera, & caſum ab alto.

Aqua diſtillata Bugulæ ſervatur in Officinis, iſdem fere virtutibus inſtructa ac planta ipſa ſed debilioribus. Extractum quoque conficitur in Officinis non contemnendum.

Parkinſonus unguentum e foliis Bugulæ, Scabioſæ & Saniculæ ruſæ, in axungia bullitis ad ſiccitatem uſque, deinde expreſſis, ad omnis generis ulcera, contuſiones, & vulnera ſananda plurimum valere ſcribit.

Bugula uſurpatur in aq. vulneraria Lemerii; Baſſamo polychreſto Banderoni, & mundificativo de Apio Charat.

BURSA PASTORIS.

Burſa Paſtoris, Off. Capſella, Sanguinaria, & Criſpula, } *Quorundam*: Burſa paſtoris major, folio ſinuato C. B. P. 108. Inſt. R. H. 226. Burſa paſtoria J. B. 2. 936. Paſtoria Burſa Dodon. *Pemptad.* 103. Burſa paſtoris major, capſula cordata, foliis lacinia-
tis, *Moriſſon. Oxon*: Thlaſpi ſatuum, Burſa paſtoris dictum *Raii Hiſtor.*

Hist. 838. vulgo, Tabouret, Bourfette, Bourse ou Malotte Berger.

Radice est alba, recta, fibrosa, exili, sapore subdulci & nauseoso: caule cubitali singulari vel multiplici, in ramulos alternatim positos diviso: foliis inferioribus modo integris, plerumque tamen profunde utrimque laciniatis, & Dentis leonis pene modo dissectis, ex angusto principio sensim dilatatis, asperis; quæ vero caulem amplectuntur, minora sunt, lata basi, cum auricula utrimque producta, nec omnino laciniata. Flores longa serie in summis ramulis oriuntur parvi, cruciformes, seu e quatuor petalis subrotundis, albidis constantes, cum staminulis aliquot apices luteos gestantibus, calyce quadrifolio & pistillo abeunte in fructum compressum & quasi cordatum, aut latiusculam bifidam crumenulam referentem, tres lineas longum, septo intermedio cui valvæ utrimque adhærescunt, in duo loculamenta divisum, in quibus continentur semina minutissima per maturitatem sulva aut subrufa. In agro Parisiensis secus vias, locis incultis & desertis ac in rudibus passim provenit. Herba integra in usu est.

Analysi chimica, hujus plantæ floridæ lbv. præbuerunt humoris primo flavescens, deinde limpidi, odoris & saporis quasi sulphurei & alcalini lbij. ℥viij. ʒij. gr. xxxvij. humoris primo limpidi, obscure salis & urinosi, ac tandem rufescenti, intense alcali, urinosi & obicure acidi ʒxij. ʒvj. gr. xij. humoris rufescentis sale volatili urinoso copioso imprægnati ʒi. ʒiiij. gr. xlvij. salis volatilis urinosi concreti ʒij. gr. lvj. olei ʒi. ʒviij. gr. xlvij. Massa nigra in tetorta residua pendebat ʒv. ʒij. gr. lx. quæ calcinata reliquit cinerum ʒiiij. ʒi. gr. vj. ex quibus salis fixi mere alcali ʒvj. gr. liij. lixivio extracta fuerunt. Partium jactura in distillatione fuit ʒj. ʒv. gr. xxvj. in calcinatione ʒij. ʒi. gr. liij.

Herba integra saporem herbaceum, subsalsum, nonnihil adstringentem, aliquantisper glutinosum refert. Succus foliorum chartam cæruleam rubro tingit colore. Parum tamen acidi analysi chymica exhibet, plurimum vero alcali tum volatilis, tum fixi, non parum terræ & olei quibus alcalini sales involvuntur. Salem igitur ammoniacalem continet cum aluminosi portione & cæteris principiis implicitum.

Inter plantas vulnerarias, adstringentes & refrigerantes recensetur. Hinc in hæmorrhagiis quibuscumque utiliter adhibetur, necnon etiam in diarrhæis, dysenteris, alvi profluviiis, & gonorrhæa. In aqua vel vino rubro cocta vel infusa ad M. j. vel succus defæcatus ad ʒiiij. vel ʒvj. vel folior. siccator. & pulverator. ʒj. præscribuntur & in iusculis, apozematibus, & clysteribus recipiuntur.

In mictu cruento specificæ habetur. Theodorus Turquet Mayerne refert quemdam in paroxysmis nephriticis, & etiam extra paroxysmos urinas cruentas fundere sæpius solitum, pluribus frustra tentatis, intra decem dies curatum fuisse sequenti methodo.

R. Folior. virid. Bursæ pastoris, Plantagin. Centinod. & summ. Hyperici ana q. l. Concisis affundatur in vesica stannea lactis vaccini recenter multati q. s. Fiat distillatio & aqua reservetur ad usum.

R. Hujus aquæ ʒvj. Syrup. Althææ vel Symphyti ʒj. M. Capiat æger ter in die

die, videl. mane, hora quinta pomeridiana, & hora somni, per duodecim vel quindecim dies.

In gonorrhæa succus vel decoctum ejus ad ℥ij. cum granis tribus vel quatuor Camphoræ epotum confert præmissis præmittendis.

Ipsi quoque febrifuga virtus tribuitur. Succum vel decoctum bis die febricitantibus propinani in febribus intermittentibus.

Externe in usu est contra qualvis hæmorrhagias: in primis planta contusa & naribus indita, vel in nucha, vel sub axillis utriusque applicata, vel in ea manu detenta ex quo latere nares sanguinem fundunt, narium hæmorrhagias sistit. Quidam succum expressum naribus attrahunt, aut turundam succo intinctam naribus applicant. Eandem in cataplasmatibus formam redactam cum aceri tantillo vel cum foliis Plantaginis contusam, regioni pubis contra nimium mensium fluxum cum successu sæpius adhibui.

Herba contusa vulneribus recentibus pro sistendo sanguine, & ad inflammationem præcavendam utiliter apponitur, vel pulverata iis inspergitur, vel ejus succo vulnera eluuntur. Cum aceto contusa, & imposita tumores calidos, inflammationes, & erysipelata sedat, & a nonnullis cum Sempervivo confociatur. Abdomini imposita etiam dysentericæ confert. Item cum aceto, & sale adhibetur a mulierculis carpis manuum pro febribus intermittentibus, imminente paroxismo, vel sola, vel cum Plantagine contusa ac tantillo Croci, & Camphoræ in cataplasmatibus formam redacta. Tota planta a quibusdam in idero commendatur calceis indita, & nudis pedibus admota. Decoctum in gulæ affectionibus purulentis pro gargarismo inservit.

24. Folior. Bursæ pastoris, & Plantaginis ana M. ij. Aceto irrorata contundantur, & in sartagine decoquantur ad consistentiam cataplasmatibus regioni pubis calide applicandi, in uterinis hæmorrhagiis. Expertum.

25. Folior. Bursæ pastoris, Erysimi, Plantaginis, & Millefolii ana q. f. Contusa instar pulvis plantis pedum applicantur incunte paroxismo in febribus intermittentibus cum cephalalgia. Ab Emmanuele König commendatum.

B U X U S:

Buxus, & Buxum, Off. Buxus arborescens C. B. P. 471. Inf. R. H. 578. Buxus J. B. 2. 496. Dodon. P. 782. vulgo *Bovis* vel *Buis*.

Radice est magna ex parte nodosa tuberosaque: caudicibus subinde humani cruris, raro femoris crassitudine, non alte assurgentibus, densis ramis, cortice scabro albicante, materie densa, dura, ponderosa valde æquali, flava, nulla intus medulla: foliis creberrimis, semper virentibus, lævibus, splendens, oblongo-rotundis, crassis, rigidis, & interdum concavis, odoris & saporis ingrati amaricantis. Flores ex foliorum alis secundum ramulos racematim nascuntur distincti a fructibus qui in aliis ejusdem plantæ locis oriuntur, ut primus observavit Clariss. Tournefortius. Apetali sunt seu plurimis staminibus constantes e fundo plerumque tetragonocalycis foliati flavescents surgentibus. Steriles sunt: fructus enim aliis in partibus

Geoffroy Tom. II.

I

nascuntur.

nascuntur ollæ inversæ quodammodo similes, virides, in tres partes apice dehiscentes, in tria divisi loculamenta, quibus singulis bina plerumque continentur semina oblonga, lucida, spadicea, in capsula vi elastica munita recondita. In agro Parisiensi sponse nata reperitur in via, quæ ducit ad Pagum *Marcouffy*, & circa vicum *Cbevreuse*. Necnon etiam in hortis colitur.

Analysî chymica, ex *Barchusen Acroamarib.* ex folior. Buxi viridium liv. proderunt humoris primo limpidi, odoris ingrati, obscuræ acidi, ac tandem flavescents, empyreumatici, subausteri, & alcali urinosi ℥iij. ℥vij. 3rj. gr. xlvij. olei ipsi ℥vij. 3vj. gr. xliij. Massa nigra in retorta residua pendebat 3x. gr. lx. quæ igne aperto cremata reliquit cinerum albidorum 3ij. gr. viij. ex quibus salis fixi salis 3j. gr. lxxvij. lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit 3vj. gr. lxxij. in calcigatione 3vij. gr. liij.

Hæc folia amara sunt, foetida, & chartam cæruleam debili rubore tingunt: salem essentialem tartareo-vitriolicum continere videntur cum multo oleo crasso, & narcotico conjunctum.

Ex ligno Buxi multum spiritus acidi, & olei foetidi crassi extrahitur, parum vero spiritus urinosi. Quidam, ut Amatus, erronee Buxum cum Guaiaco eandem esse arborem putaverunt. Amatus, Prævotius, & alii in lue venerea idem præstare decoctum ligni ejus cum decocto Guaiaci asserunt. Lobelius virgulta ejus, lignum, & folia decocta Guaiaci modo sudores elicere scribit, & hoc decocto famulam pauperculam a lue venerea vindicantem fuisse. Sunt quoque nonnulli, qui in decoctis sudoriferis, & antiveneris Buxum pro Guaiaco, pro ligno Sassafras Juniperinum, radices Bardanæ, & Caryophyllatæ pro Chinga, & Sarsaparilla substituunt. Sed quid opus est nova, & incerta medicamenta in locum certiorum & longo usu comprobatorum medicaminum sufficere?

Fernelius folia Buxi inter purgantia medicamenta recenset. Verum tanta est purgantium medicamentorum, & quidem præstantiorum multitudo, ut a nemine hodie præscribantur.

Quidam ajunt, Buxei ligni leobem adstringere, & exsiccare: unde decoctum in aqua, alvi profluvia sanare tradunt, & cum vino rubro professe in doloribus dentium a frigidis fluxionibus?

Oleum nigrum, & empyreumaticum ex Buxeo ligno arte chymica distillatur eodem modo quem exposuimus articulo de Guaiaco. Huic oleo vis narcotica, & antispasmodica tribuitur. In epilepsia, & in hysteriis atque spasmodicis affectionibus magnopere commendatur. Mira de hoc oleo prædicat Quercetanus in *Tetrade cap. 16. p. 211. & 215.* illudque tantæ virtutis esse asserit, ut omnis generis dolores edomare, corruptiones, & putrefactiones corrigere, vermes enecare, & expellere, malignosque vapores ex quibus sympathicæ epilepsiæ nascuntur, quæ facile tandem in idiopathicas transeunt, arcere, & absumere valeat. Ab eodem Quercetano, & aliis habetur pro oleo Heraclino genuino Rulandi, sed perperam, contra affirmant Friderico Hoffmanno, qui oleum esse ex visco Coryllino distillatum pronunciat. Usurpatur ad dolorem dentium compescendum, & eorum cariem emendandam, guttulam in cavum carioli dentis instillando.

Cum

Cum autem fere intolerabilis sit ejus fœtor, rectificatur iteratis distillationibus, & cohobationibus cum aqua simplici, cum calce viva aut cum sale communi, vel etiam cum vini spiritu. Sic multum de suo fœtore empyreumatico deponit. Hoc oleum rectificatum intus sumptum anodynum est, & diaphoreticum; a gutt. x. ad xx. præscribitur. Illitum impetigines sanat. Cum oleo Hyperici permixtum ad rheumaticos dolores, sub forma linimenti commendatur.

Buxum lignum ad opera quævis conveniens est, & summe expetitur. Alia est Buxi species minor, quæ Buxus foliis rotundioribus C. B. P. 471. J. R. H. 579. Chamæpyxos *Tabern. Icon.* 1050. vulgo, *Bouis a Partere*, quæ ad hortorum areolas, & pulvillos limitandos magni usus est. A priori nonnisi magnitudine discrepat.

CALAMINTHA.

Calaminthæ species tres quatuorve occurrunt in Officinis: Calaminthæ nempe vulgaris, Calamintha Pulegii odore, Calamintha magno flore, & Calamintha arvensis.

Calamintha vulgaris *Off.* Calamintha vulgaris vel Officinarum Germaniæ, C. B. P. 228. & J. R. H. 194. Calamintha flore magno vulgaris J. B. 3. P. 2. 228. Calamintha montana *Dod. P.* 98. Nepeta montana *Cordi*: vulgo, *Calament*.

Radice est fibrata, calicibus palmaribus, & altioribus, quadrangulis, ramosis, in quibus folia bina nascuntur ex adverso posita unciam aut sequiunciam longa, subrotunda, obtuse acuminata, leviter serrata, pilosa, saporis acris, odoris grati. A medio ad summum usque ramorum ex alis foliorum pediculi duo in plures minores divisi flores sustinent monopetalos labiatis, quorum labium superius surrectum est, subrotundum, bifidum, inferius vero tripartitum; semiunciales, & longiores, purpurascetes, odore jucundo præditi. E calyce hirsuto, striato, surgit pistillum posticæ floris parti infixum, & quatuor veluti embryonibus stipatum, qui deinde abeunt in totidem semina subrotunda, lævia, nigricantia, in capsula quæ calyx floris fuit recondita. Frequens occurrit in Sylvis Regii Castellii Sangermaniaci. Herba integra usu est.

Calamintha Pulegii odore. *Off.* Calamintha Pulegii odore, sive Nepeta, C. B. P. 228. & J. R. H. 194. Calamintha flore minore, odore Pulegii, J. B. 3. P. 2. 229. Pulegium sylvestre sive Calamintha altera *Dod. Tempr.* 98. Nepeta agrestis *Cordi*.

Priori haud dissimilis est, at foliis, & floribus minoribus, & sapore ac odore Pulegii ab illa discrepat. In calidioribus Galliæ Narbonensis regionibus sponte nascitur.

Calamintha magno flore, *Off.* Calaminthæ magno flore C. B. P. 229. & J. R. H. 194. Calamintha montana, flore magno ex calyce longo, J. B. 3. P. 2. 229. Calamintha montana præstantior *Lebel. Icon.* 512.

Gignitur in herbidis Alpium, & Pyrenæorum collibus, prioribus minor si caulis spectetur: sed foliis ac floribus longe amplioribus, & suavius olentibus.

Calamintha arvensis, *Off.* Mentha arvensis verticillata hirsuta J. B.

3. P. 2. 219. & J. R. H. 189. *Calamintha arvensis verticillata* C. B. P. 229. *Calamintha arvensis* 1. *Tab. Icon.* 352. *Polycnemon Lobel. Lugd.* 332. *Nepeta agreste Tragi* 16. *Pulegium agreste Scrap. Eidem* 17. vulgo, *Poulier-Thim* quorundam.

Calaminthæ vulgaris similis est foliorum figura & odore : ab ea vero florum figura discrepat quæ ad *Menthæ* genus reducitur. Flores enim ejus verticillatim nascuntur monopetali labiati, quorum labium superius fornicatum est, inferius vero tripartitum : sic tamen ambo secantur ut flos quadripartitus primo aspectu videatur. In agro Parisiensi sponte nascitur.

Calaminthæ species sale essentiali ammoniacali donantur cum oleo aromatico copioso conjuncto.

Viscidos humores potenter incidunt : appetitum excitant, ciborum concoctionem juvant, status discutiunt, menses, & urinas movent, ulcera renem detergunt, lochia, & secundinam expellunt, expectorationem promouent, asthmaticis conferunt, & pulmonibus exulceratis auxiliantur, ex infuso Thææ modo assumptæ.

Externe discutiunt, attenuant, & resolvunt, præscribuntur vel in balneo vel in fomentis. Herbarum aqua vel vino macerata abdomini in affectibus intestinorum flatulentis, vel regioni pubis ab ciendos menses, & sistendos mulierum dolores post partum, vel capiti in vertigine aut veterino admoventur. Earum decocto partes paralyti tentatæ utiliter foveantur.

Oleum essentialis distillatur utile ad status discutiendos, & colicos dolores sedandos, Menses quoque ab uteri infatu suppressos promouet. Aqua distillata fragrans in officinis servatur, & syrupus ex earum succo præparatur.

Usurpatur in decocto cephalico *Chara*, Lohoch sano *Ejusdem*, syrup. de *Artemisia*, de *Stæchade*, de *Præssio*, & *Theriaca Andromachi*.

CALCITRAPA.

Calcitrapa & *Carduus stellatus*, Off. *Carduus stellatus* sive *Calcitrapa* J. B. 3. 89. I. R. H. 440. *Carduus stellatus foliis Papaveris erratice* C. B. P. 387. *Spinatella Tab. Icon.* 701. *Hippophæstum Column. Phytobasan.* 107. vulgo *Chardon étoile* ou *Chaussetrappe*.

Radicebus est albidis, longis, mollihus, succosis, intus nervosis, digitum crassis : caulibus sesquicubitalibus, angulosis, & ramosis, in quibus folia nascuntur villosa in profundas lacinias *Papaveris rhæados* more divisa. Extremis in ramulis capitula florida nascuntur composita ex floribus flosculosis, purpurascensibus, embryoni insidentibus, & calyce squammaro aculeatoque, cujus squammæ in unciales, & sesquiunciales, rigidas, mordaces, recta foras minantes spinas desinunt, ut radiatam stellam imitari videantur. Embryones deinde abeunt in semina lubrica, parva, oblonga, pappis instructa. In agro Parisiensi frequens occurrit. Radices, folia, & semina in usum veniunt.

Analysi chymica, *Calcitrapæ* ßv. præbuerant humoris limpidi, absque odore, & insigni sapore, obscure salis ßj. 3. 3v. humoris limpidi primo obsecu-

obscuræ acidi, deinde manifesti, postea rufescentis, leviter empyreumatici, austeri ℞ij. ℥iij. humoris fulci sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥j. gr. xxiiij. salis volatilis urinosi concreti gr. xx. olei spissi, extracti ad instar, ℥j. ℥ij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥iij. ℥vj. gr. xxxvj. quæ calcinata reliquit cinerum ℥ij. gr. lx. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥iij. gr. xl. extracta fuerunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥iij. gr. lxiij. in calcinatione ℥j. ℥v. gr. xlvij.

Calcitraxæ folia insigni amarore donantur. & chartam cœruleam levitunt rubore. Radix vero sapore dulcis magis intensum ruborem ipsi conciliat. Unde liquet, saltem: essentialium continere ammoniacalem, tartareum cum sulphure crasso conjunctum. Ammoniacalis copiosior est in radicibus. Tartareus vero uberior in foliis.

Calcitraxa diuretica est, vulneraria & febrifuga. Succus foliorum expressus ineunte paroxysmo ad febres intermittentes sedandas propinatur ad ℥iij. vel ℥vj. Extractum ad ℥ij. vel pulvis foliorum & florum exsiccatorem ad ℥j. ad eadem valere dicitur. Ejusdem succus externe vulnera consolidat.

Tota planta in decoctis & jusculis diureticis & aperientibus utiliter præscribitur. Semen contutum ad ℥j. vino per noctem maceratum & mane jejuno ventriculo potum urinas pellit, & urinarias vias a muco viscido liberat. Sed caute his utendum est, ne mistum cruentum afferant.

Cortex radicum mense Septembri effossarum exsiccatus & pulveratus insigni præbet remedium ad dolores nephriticos præcavendos summo perecommendatur. Hæc est illius remedii præparandi & exhibendi ratio.

24. Cortic. radic. Calcitraxæ ℥j. Infunde per noctem in vini albi ℥v. Infusum capiat mane jejuno ventriculo, die 28. mensis lunaris. Postridie porus sequens mane propinandus est.

24. Foliorum Parietar. M. j. ligni Sassafras, Semin. Anisi ana ℥j. Cinnamonomi ℥ss. Bull. leviter in aq. comm. ℥viij. Infunde per noctem. Summo mane ad ignem admoveantur ut incalescant. Fiat colatura cum expressione, qua dissolve Sacchari candidi ℥ij. Fiat potio calidissime propinanda, nullumque exhibeatur alimentum nisi tribus post elapsis horis. Hoc remedium veluti specificum a D. De Lamoignon de Baviile in Gallia Narbonensi summo Præfecto publici juris factum fuit, ejusque jussu typis mandatum.

C A L E N D U L A.

Calendulæ vel Calthæ duæ species in officinis usitatæ sunt, hortensis scilicet & sylvestris.

Calendula hortensis, Caltha vulgaris. Off. Caltha vulgaris flore pallido C. B. P. 275. *Iss.* R. H. 498. Caltha flore simplici J. B. 3. 101. Calendula *Dod. Temp.* 254. Chrysanthemum & Caltha Poetarum, *Lobel. Icon.* 552. vulgo, *Saucy.*

Radice est furculosa, in fibras multas crassiores oblongas divisa: caulibus tenuibus, teretibus, aut nonnihil angulosis, hirsutis & tactu nonnihil viscidis, in crebros ramos divisis: foliis sine pediculis, caulem amplexis,

Geoffroy Tom. II.

I 3

oblon-

oblongis, ad basim angustioribus, summitate latoribus & subrotundis; pinguibus, hirsutis, incanis, dilute viventibus, gustu herbaceo, mox calidiusculo, odore gravi. Flores in summis ramulis nascuntur cum gravitate quadam aliquantulum odorati, coloris aurei, radiati, quorum discus ex plurimis floretulis rubulosis, in summitate quinquefariam divisus; corona vero ex sem floretulis in summo crenatis componitur, embryonibus insidentibus, & calyce multifido, hirsuto, comprehensus. Embryones autem deinde abeunt in capulas incurvas & marginatas, semine tætas oblongo. In hortis colitur. Flores & folia usitata sunt.

Calendula sylvestris Off. *Caltha arvensis* C. B. P. 276. & I. R. H. 499. *Caltha minima* J. B. 3. 103. *Calendula arvensis*, *Taberna. Icon.* 335. vulgo, *Soucy de vigne* ou *Soucy sauvage*. A priori magnitudine tantum differt. In agro Parisiensi sponte nascitur.

Analysi chymica, ex *Calendula* multum extrahitur olei & humoris acidi, parum vero salis volatilis & spiritus urinosi.

Flores *Calendulae* annotante Riverio *observ.* 30. a Pachequo communicata, odorem sanguinis menstrui bene valentis exhalant. *Calendulae* arvensis folia, observante Cl. Tournefortio, amara sunt, sœcida & charitam cœruleam levissimo rubore tingunt. Exsiccata dum comburuntur, fulgurationes nonnullas nitrosas edunt. Unde liquet has plantas talem essentialem continere nitroammoniacalem multa terra & sulphure copioso permixtum.

Utrique *Calendulae* eadem virtutes tribuuntur. *Sylvestris* ut valentior a nonnullis anteponitur. Aperiendi & resolvendi vim obtinent. Obstructiones hepatis, lenis & uteri resolvunt. Ictero medentur, menses cunct, partum promovere. Humores crassos ac viscidos attenuant; necnon inter alexipharmaca recensentur. Succus totius plantæ ab ℥j. ad ℥iij. propinatur. Infusum florum & foliorum contusorum in vino albo ab ℥iij. ad ℥vj. extractum a ℥j. ad ℥ij. conditum a ℥ij. ad ℥j. præscribuntur. In scrophulis flores & folia cruda vel octa comesta, & decoctum pro potu solito commendantur. Decoctum florum *Calendulae* in *Zythogalo* ad variolas expellendas, teste J. Rajo, apud Anglos usitatissimum est. Pestilentia, eodem narrante, floribus *Calendulae* cum oleo & aceto comestis præcavetur, eademque sanatur sudoribus provocatis per succum florum *Calendulae* calide potum. Acetum *Calendulatum* tanquam prophylacticum in peste a plurimis laudatur, si mane jejuno ventriculo os primum abluatur, & cochlear hujus aceti unum aut alterum potetur.

℥j. Succi florum *Calendulae* ℥ij. Pulver. lumbrior. terrestrium ℥j. Salis ammoniaci gr. xij. Fiat haustus in ictero.

℥j. Extracti *Calendulae* ℥j. Aloes gr. xij. Boracis pulver. ℥j. Olei Cinnamon. gutt. j. Syrup. de Ablynth. q. s. Fiat bolus in remora mensium.

Aqua ex floribus distillatur quæ oculis instillata eorum rubori & inflammationi medetur.

Folia contusa & tumoribus admodum eos resolvunt: callosis ulceribus, verrucis & clavis pedum utiliter applicantur.

Florum extractum & conditum in opiatis aperientibus usurpantur.

Flos perinde atque ipsa herba secundas educt mirifice, teste Trago; si aridus suffribus admotus fuerit.

C A M.

CAMPHORATA.

Camphorata *Off.* *Camphorata hirsuta*, C. B. P. 486. In *Commentario- rum Regie Scientiar. Academ. Parisiensis anni 1705.* 238. *Camphorata* *Montepelienſium J. B. 1. P. 2.* 379. *Camphorata* *Montepelienſ.* an *Chamaepeuce* live *humilis Picea Pinii*, *Adviſarior. Lobel.* 174. *Selago* *Plinii* five *Camphorata Lugd.* 1207. vulgo, *Campbreæ*.

E radice lignoſa, longa, pollicari, cauliculos plures emittit lignoſos, craſſiuſculos, cubitales, ramoſos, ſubhirsutos, albicantes, cum nodulis alternatim poſitis, ex quorum ſingulis conſertiſſima prodeunt foliola trientem uncia non excedentia, tenuia, piloſa, mediocriter rigida, odore aromatico dum inter digitos teruntur, ad *Camphoram* accedente, ſapore aliquantulum acri. Flores proſert apetalos ſeu quatuor conſtantes ſtaminibus, cum apicibus roſeis ex calyce monophyllo herbaceo, modo trifido, modo quinquifido ſurgentibus, & piſtillo quod deinde abit in ſemen exiguum, nigrum, oblongum, ſubrotundum, in capſula quæ calyx ſloris ſuit reconditum. In *Gallia Narbonenſi* & in *Gallo-provincia* ſponte naſcitur. Planta integra in ulum venit.

Lobelius inter *Boranicos* fere ſolus de hujus plantæ virtutibus mentionem fecit. *Vulnerariam* & *adſtringentem* virtutem illi tribuit. Vir Doctiſſimus *Claudius Burlet*, *Doctör Medicus Pariſienſis* & quondam *primarius Hiſpaniarum Regis Medicus* in *Commentariis Academicis anni 1703.* eam aliis dotibus inſtructam oſtendit. *Urinas* ciet, *ſudores* aut *blandam diaphoreſin* excitat & *menſes* provocat. *Recentes viſcerum obſtructiones* tollit & in *morbis chronicis* proſicit. *Aſthmati humido* prodeſt. Apud *Montepelienſes* adverſus *hydropem* uſitatiffima eſt. At vero non omni *hydropi* conſert, obſervante *Cl. Burlet*. Illis tantum conducit in quibus nulla ſitis, nullus ardor deprehenditur; in *hydropiſi* inveterata fere ſemper inutilis eſt. Hujus plantæ uſus diuturnus eſſe debet, & identidem *catharſis* opus eſt. In *decottis* ad ℥j. in aquæ ℔ij. coquenda vel in vino maceranda præſcribitur; necnon etiam ejus inſuſum inſtar *Theæ* propinatur. *Multum* autem calefacit, quapropter ea caute utendum eſt.

CANNABIS.

Cannabis nomine duæ ſunt plantæ non genere ſed ſpecie tantummodo diverſæ, fructiſera ſcilicet & ſtorigera, ex eodem ſemine natæ.

Cannabis fructiſera, *Off.* *Cannabis ſativa*, C. B. P. 320. *Inſt. R. H.* 535. *Cannabis mas*, J. B. 3. P. 2. 447. *Cannabis ſæcunda*, *Dodon. P.* 535. vulgo, *Chanvre*.

Cannabis ſtorigera, *Off.* *Cannabis erratica* C. B. P. 320. *Inſt. R. H.* 535. *Cannabis ſæmina*, J. B. 3. 2. 447. *Cannabis ſterilis*, *Dod. P.* 535.

Radice eſt ſimplici, alba, lignoſa, fibrata; caule quadrato, hirsuto, ad

ad tactum aspero, intrus concavo, singulari, quinque aut sex pedes alto, cortice in fila ductili: frondes contrariis inter se pediculis bini, in quatuor, quinque vel plura segmenta ad pediculum usque dividuntur angusta, oblonga, acuminata, serrata, venosa, atro-virentia, aspera, odore gravi caput tentante. Flores & fructus non in eadem planta nascuntur, sed in stirpibus diversis. Florifera dicitur species quæ flores ferit, ab aliis sterilis seu fœmina improprie nuncupatur: altera vero fructifera quæ fœcunda seu mas ab aliis. Flores in florifera stirpe ex alis foliorum exeunt in quatuor surculis seu racemulis decussatis, apetalis, quinque staminibus & apicibus subluteis calyci quinque: foliolis exterius purpuratcentibus, intus albicantibus composito insidentibus constantes, & steriles sunt. Fructus in fructifera stirpe copiosi nascuntur ullo præeunte flore secundum caules conferti: pistillis constant capsula membranacea ex luteo virescente involutis, quæ abeunt in semen subrotundum, nonnihil compressum, glabrum, sub testa tenui, ex cinereo spadicea, lucida, albidam, teneram, dulcem & oleosam medullam, odoris dum recens est gravis, caput ferientis, continens, & capsula seu pellicula univalvi, in apicem desinente, inclusum. Ex ejusdem plantæ feminibus utraq; species nascitur. In omnibus fere regionibus in agris feritur, ob culmorum filamenta valida & tenacia ad funes & linteamina texenda idonea. Folia & semen in usum medicum veniunt.

Analysi chymica, ex foliorum & summitatum recentium lbv. prodierunt humoris limpidi plantæ odorem aliquantisper referentis, saporis subacris, obscure salis lbj. ℥iij. ℥iij. gr. xvij. humoris limpidi, obscure salis, obscure acidi, deinde rufescentis, empyreumatici, obscure acidi lbj. ℥iij. gr. xlv. humoris fusci, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥iij. gr. xlv. olei spissi syrupi ad instar ℥ij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥xj. ℥iij. quæ calcinata reliquit cinerum ℥iij. ℥vj. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥iij. gr. xlv. extracta sunt. Partim iactura in distillatione fuit ℥v. ℥iij. gr. xij. in calcinatione ℥vj. ℥v.

Hæc planta sale essentiali ammoniacali videtur instructa cum multo oleo crasso & narcotico conjuncto.

Nulla fere planta hominibus magis necessaria occurrit propter fila, funes, linteamina & papyrus quæ cunctis populis suppeditat. Cannabis utriusque salces lacunis & scrobibus aqua plenis immerguntur, ubi macerantur eluunturque multum & diu, deinde siccantur in sole & tunduntur: ac demum cortices staminei tundendo idonei fiunt, ut pectines separentur a lignosis culmorum partibus fungosaque substantia ad filum postea inde parandum. Sed aqua in qua intabuit tantopere viru nocet, ut epota præsentissimo sit sitientibus exitio, cui antidotis præstantissimis & tempestive etiam datis occurri vix possit. Itaque vi inebriante & stupefaciente Cannabis folia donata videntur. Siquidem ex illis aut saltem ex Cannabis specie in nonnullis Indiæ orientalis locis nata & nostrato paulo minore. *Kempferus in Amoenitat. Exotic.* refert parari potum inebriantem apud illos populos usitatum, terendo nempe Cannabina folia in aqua fervida, & aquam cum pulvere permixtam ac turbidam statim hauriendo.

Sehen Cathabinum a nonnullis inter cæteros cibos quotidie decoquitur non aliter quam hordeum. At caput vaporibus replet, & immodice fit estur, delirium facit ut Coriandrum, referente Rajo.

Idem lacte decoctum tussi opitulari dicitur. Franciscus Sylvius a solo Cannabis semine in lacte ad crepaturam cocto, & colato atque bis terve die ad ℥v. vel ℥vj. sumpto, plures curavit ictericos. Idem præstat emulsio ex eodem semine parata, si quando icterus ex sola obstructione & citra febrem exoritur, observante Dodonæo: eadem quoque gonorrhææ & ardori urinæ conducit.

Ex hoc semine contuso oleum exprimitur non solum lucernis idoneum, sed etiam ad tumores resolvendos utile. Idem cum cera in unguenti consistentiam redactum plurimum commendatur ad ambusta, quorum dolorem sedat.

Ferunt, Elisabetham Angliæ Reginam contractas variolarum suppuratio- ne maculas in seipsa delevisse emulsione lactea ex semine Cannabis; de- tractis corticibus, cum aqua Rosarum parata, & cum gossypio sæpius die admota. Folia & semina contusa & in cataplasmate apposita tumores po- tenter resolvunt. Etmullerus pro uvulæ inflammatione aut relaxatione gargarisma ex semine Cannabino proponit.

℥i. Semin. Cannabin. ℥j. Contund. in decoct. rad. Chelidonii maj. Fra- gar. & Oxalyd. ℞ij. Colatura cum expressione facta propinetur per cyathos in ictero & in hepatis obstructionibus.

Matthioli Cannabis semen Gallinas ovorum feraciores reddere ex- perientia sese comperisse scribit, adeo ut hoc semine pastæ, etiam hyeme sæviænte quo tempore rarius parere solent, ova frequentius multo ponant. Verum eadem, ut observat Lobelius, ob alimenti copiam quam soggerit, postea steriles & quasi pinguedinis mole obrutas reddit. Aviculis omnibus cibus est optimus & valde appetitus.

C A P P A R I S.

Capparis, *Offic.* Capparis spinosa, fructu minore, folio rotundo *C. B. P.* 480. *Inst. R. H.* 261. Capparis spinosa, *J. B.* 2. 63. Capparis retulo folio, *Lobel. Icon.* 635. vulgo, *Caprier*.

Ex radice lignola, grandi, numerosa, crassiore cortice circumvestita, plu- res stolones bicircales proferit hic frutex, aculeis duris & acutis munitos, in quibus folia alternatim nascuntur circumatæ pene rotunditatis, semiuti- ciam lata & peramara. Ex eorum alis pediculis exeunt singulares, longi, quibus flores insident rosacei, tetrapetali, candidi, quorum medium occu- pat numerosa staminum congeries, cum pistillo longiori, e calice tetra- phyllo, viridi, surgente, cujus extrema pars abit in fructum turbinatum & quasi pyriformem, Olivæ aut Glandis magnitudine, in quo nidulantur semina plurima, parva, albidæ, veluti reniformia. In Italia sponte nasci- tur in muris ac rudibus. Circa Tolonam in Gallo-provincia ad muros & maceris culta reperitur. In foraminibus scilicet murorum lapideorum trium vel quatuor pedum intervallo prope terram ad id factis Cappares plantant. Radicis cortex & florum gemmæ in usum veniunt.

Gem.

Gemmas florum adultas, quas vulgo *Capres* dicimus, antequam explerentur colligunt, & per trium quatuorve horarum spatium in umbra sparsas relinquunt, donec flaccescere incipiant, ad impediendum, ne se aperiant. Tum vasi immittunt & acetum superaffundunt, asserculo imposito vas contegentes, adeoque contactas ossiduum servant. Deinde exemptas leniter premunt & recenti aceto infundunt: per alterum ossiduum. Eandem operationem iterum repetunt expressis gemmis & novo aceto tertium affuso, quo peracto eas in dolia cum aceto recondunt, Nonnulli salem aceto admiscunt: Gemmæ hoc modo conditæ in frequenti usu sunt in acerariis & ad intinctus.

Cortices ex radicibus delibrantur, & Cinnamomi modo in tubulos exsiccati contorquentur colore cinereo, lienis quibuldam & rugis transversis notati, amari sunt, acres, acerbis.

Analyti chymica, ex corticis radicum Capparidis lbv. per retortam distillatis, prodierunt humoris primo rufescentis, inodori, subacidi, deinde fusci, odoris empyreumatici, manifeste acidi ac austeri lbj. ℥ij. ℥iij. gran. xxxvj. humoris fusci, saporis & odoris empyreumatici, intense acidi, sub-salsi, obscure alcali, urinosi & austeri ℥ix. gr. xxxvj. humoris fusci, sale volatili urinosa copiosa imprægnati ℥ij. ℥j. xxiiij. olei ℥ij. ℥ij. Massa nigra in retorta superflua pendebat lbj. ℥ix. ℥vj. quæ per horas octo calcinata reliquit cinerum fuscorum ℥vi. gran. xxxvj. ex quibus lixivio salis fixi ℥ij. ℥iij. gr. xij. extracta sunt. Peritum jactura in distillatione fuit lbj. ℥vj. ℥ij. gr. xlvij. in calcinatione lbj. ℥ij. ℥ij. gran. xxxvj.

Totus ille frutex saporis est subamari, adstringentis, & salem essentialem continet nitroso-aluminosum cum oleo copioso conjunctum.

Conditæ Capparidis gemmæ palato pergratæ invitant ad epulas & languentem revocant appetitum, unde inter irritamenta galæ recensentur. Verum illarum sapor ascititius est a muria aut aceto: ipsæ vero difficilis sunt coctionis. Unde stomacho imbecilliori nocivæ a nonnullis habentur. Hepati autem & lienis obstructis ob vim suam abstergentem, incidentem & resolventem valde conducibiles existimantur. Schenckius lib. 3. *observationum* ex Benivenio refert quemdam a 7. annis splenicum liberatum fuisse solo usu Capparidis adjuncto potu aquæ ferrariorum. Et Forestus lib. 20. *observ.* 2. simile quid refert de verula 20. annorum splenetica a tumore ingenti solo usu Capparidis curata.

Cavendum est, ne Cappare ab ærugine virorem suum contraxerint: tunc enim maxime nocerent. Quandoquidem sæpius mercatores ob eleuationem colorem viridem Capparibus conciliandum eas in vase æthereo cum aceto macerant: acetum autem cuprum erodendo vitidescit & eodem virore. Cappare inficit.

Externe acetum quo gemmæ conditæ fuerunt, utilissime cum linteo seu spongia lateri sub hypochondrio sinistro apponitur ad tumores splenis discutiendos. Etmullerus semen Sinapi huic aceto admiscet.

Cortex radicum diureticus est, & vulgo refertur inter aperientia & resolventia. Nitroso suo sale humores viscidos dissolvit, urinas provocat: stypica sua terra viscerum tonum laxiorem restituit, & firmat. Unde omnibus fere morbis chronicis conducit. Sed in hepatis, pancreaticis, etc.

uteri & porissimum lienis obstructionibus & in hypochondriacis affectionibus plurimum laudatur. Menses provocat & ad paralysem utilis dicitur. Pulvis ad ℥j. intus sumitur, insulum vero vel decoctum ℥j. in ℔j. aquæ vel vini.

℥j. Cortic. Cappar. ℥iij. Capparum muria conditar. ℥j. Coq. in aq. mull. vel vini aut oxymelit. ℔iij. Fiat apozema ad induratum lienem.

℥j. Cortic. Cappar. medii Fraxini, Tamarisci ana ℥j. Cuscutæ, Epithym. summitatum Lupul. & folior. Scolopendrii ana. M. j. Capparum conditar. ℥ss. Fiat decoctum ex aqua ad ℔iij. quo dilue Syrup. Capillor. vener. ℥iij. Dosis ℥iij. sexta quaque hora in morbis ex viscerum obstructionibus, & in affectionibus hypochondriacis.

Gemmæ, & cortex radices usurpantur in oleo de Capparibus *Mesue* ad tumores resolvendos perutili. Cortex radices usurpantur in Trochiscis de Capparibus, Syrupo hydragogo *Charas*, & in oleo Scorpionum compositio *Mesue*.

CAPRIFOLIUM.

Caprifolium, & Matrifylva, *Off.* Caprifolium Germanicum, *Dod. Pempt.* 411. *R. H.* 608. Per-clymenum non perfoliatum Germanicum, *C. B. P.* 302. Periclymenon non perfoliatum, *J. B.* 2. 104. Matrifylva, *Schroderi* vulgo, *Chebreseville*.

Radice est lignosa, repente, in plures fibras crassiores divisa, longis, tenuibus, lignosis, repentibus cauliculis in ramulos paritis: circa quæ ex intervallis folia nascuntur bina, ex adverso posita, oblonga, acuta, mollia, dilute virentia, subtus incanescencia. Flores in summis ramulis complures emicant candicantes, interdum flavescentes, suavissime olentes, monopetali, tubulati, ex corniculato angusto principio in latius orificium fascientes & in duo labia dehiscences, quorum superius multifidum, inferius linguiforme, plures in orbem positi, & calyci insidentes monotomq. viridi. Calyx autem ab initio in fructus molles seu baccas conglomeratas actus Sambucinis similes, per maturitatem rubentes, seminibus foetam duriusculis, subrotundis, & compressis. In agro Parisiensi sponte nascitur & in hortis colitur. Folia, flores, & bæcæ rariores sunt usus.

Analysi chymica, ex florum Caprifolii recentium ℔v. prodierunt humoris limpidi, odorati nec ingrati saporis, obscure acidi ℥xv. ℥iij. gran. xxxvj. humoris manifeste acidi, deinde austeri ℔iij. ℥v. ℥vj. gr. lxxvj. humoris rufescentis, subtilis & sale volatili urinoso imprægnati ℥iij. gran. lx. olei spissi ad instar extracti ℥vij. gr. xxxvj. Massa nigra in reitoria superstes pendebat ℥iij. ℥j. gran. xxxvj. quæ calcinata reliquit cinerum ℥vj. gran. xij. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥iij. gr. lviij. extracta sunt. Parium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥j. gr. liiij. in calcinatione ℥iij. ℥ij. gr. xxiiij.

Caprifolii folia distillatione plurimum humoris tum acidi, tum salis, tum austeri præbuerunt, parum spiritus urinosi, non mediocrem olei portionem, nec parum salis fixi mere alcali.

Infus.

Insuper folia saporis sunt satui, styptici, odoris gravis, ingrati, cimicem sedolentis eorumque succus chartam cæruleam levissimo rubore tingit. Intensior sit rubedo a radicum succo. Earum cortex gustu est acris, salus, stypticus & odoris ingrati. Hæc planta salem essentialem continere videtur tartareum cum salis ammoniacalis aliquantulo & multo oleo tum tenui, tum fetido crasso conjunctum.

Omibus Caprifolii partibus vis diuretica tribuitur. Vetus est à Dioscoride traditio fructum maturum in umbra siccatum ℥i. pondere in vino exhibitum per quadraginta dies, lienem absumere, lassitudinem discutere, sed urinam ciere statim a sexto die cruentam; quapropter illius usum reformidat, nec immerito si Capritolium nostrum sit Periclymenon Græcorum. Ejus decoctum in Cerevisia paratum Ettmullerus in arthritide vana laudat.

Ex foliis succus expressus vulnerarius est & abstergens. Ad capitis vulnera & ad impetigines aliaque cutis vitia sananda commendatur. Foliorum decoctum in tonsillarum & faucium affectionibus, gulæ inflammatione, exulceratione & aphthis, in gargarismatibus usurpatur.

Bacæ maturæ contusæ in balneo maris vel in fimo equino in vase clauso digestæ resolvuntur in liquorem oleosum, qui a G. Agricola in *Chirurgia parva* 110. velut catholicum balsimum magnopere commendatur in omnibus vulneribus, non vero in ulcere sanando.

Aqua ex floribus distillatur, quæ oculorum inflammationi confert, & a Rondeletio ad partum accelerandum plurimi æstimatur, præsertim si seminis Lavandulæ triti ℥i in hujus aquæ ℥iij. propinetur.

Alia Periclymeni species in hortis nostris colitur, quæ Caprifolium Italicum, *Dodon. Tempt.* 411. Periclymenum perfoliatum, *C. B. P.* 302. Periclymenum perfoliatum, *J. B.* 2. 104. A priori differt foliis pene glaucis, rotundioribus, & pediculis brevissimis, quorum quædam sunt sæpe continua & a viticulis trajecta pertusæ, suprema autem acetabuli instar modice concava, floribus ex purpura albescens aut in luteum languescentibus, brevioribus & minoribus. In Italia & Gallia Narbonenæ si sponte oritur. Eædem virtutes ipsi tribuuntur.

C A R D I A C A.

Cardiacæ & Agripalma. *Off.* Cardiacæ, *J. B.* 3. 320. *Inst. R. H.* 186: *Dod. Tempt.* 94. *Lobel. Icon.* 516. Marrubium Cardiacæ dictum, forte Theophrasti, *C. B. P.* 230. Lycophis Brancalopina, *Anguill.* Cardiacæ vel Lycopus, *Fuchsi*: vulgo, *Agripaume*.

Plurimæ proradicibus fibræ ab uno veluti capite descendunt: plures quæ ex eodem assurgunt quadrangulares caules, crassi, duri, duos tresve pedes alti, obscure & ex nigro rubentes. Folia longis insidunt pediculis, venosa & rugosa, breviter lanugine utrinque obsita ut nihilominus glabra videantur: quæ inferius occupant, subrotunda sunt, pallidius virentia, in tres insigniores lacinias profunde divisa, lacinis circa margines dentatis; quæ in caulis sunt obscurius virent, sensim angustiora fiunt & integra fere in lon-

longam cuspidem definunt, ad latera utrinque unico denie incisa. Calyces monotomi, duri, in quinque spinulas rigidas, pungentes divisi, plurimi denie stipati, nullis pediculis, ex alis foliorum orti verticillatim caules ad nodos amplectuntur, & flores sustinent ex albido purpureos, exterius lanugine alba, densa, hirsutos, parvos, monopetalos, labiatos, quorum labium superius imbricatum & multo longius est inferiore tripartito. Ex calyce autem surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, & quatuor veluti embryonibus stipatum, qui deinde abeunt in totidem semina parva, oblonga, angulata, lævia, spadicea, totam capsulam, quæ floris calyx fuit, occupantia. Tota planta gravi satis odore prædita gustu amaricat. Ruderibus & locis incultis ac asperis gaudet agri Parisiensis incolæ. Planta integra ex usu est.

Analysi chymica, ex foliorum & summitatum floridarum recentium lbv. prodierunt humores limpidi, odoris & saporis herbacei, subacidi lbj. ℥ix. ℥vj. gr. lxxvj. humoris acidi manifesti, deinde austeri lbj. ℥vj. ℥ij. gr. xxxvj. humoris rufi, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥j. ℥ij. gr. xxiiij. olei ℥ij. gr. xxiiij. Massa nigra in retorta superstes pen-debat ℥v. ℥vj. quæ calcinata reliquit cinerum leucophæorum ℥ij. ℥iiij. gr. xij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥vij. gr. xij. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥vj. ℥v. gr. lxxvj. in calcinatione ℥ij. ℥j. gr. lx.

Cardiaca salem essentialem continet tartareum multo sulphure tenui & crasso conjunctum. Nomine longe quam usu celebrior est hæc planta quam nonnulli cordis affectibus convenire dicunt. Eam autem Schroderus & Ettmullerus sic dictam tantummodo putant, quod molestiis cordis, ut vulgus loquitur, seu potius ventriculi succurrere solear. Medetur enim puerorum cardiægiis ab inflatione & distensione hypochondriorum & ventriculi cataplasma ex foliis contusis & coctis præparatum & abdomini applicarum, viscidos nempe humores quorum effervescentia status producit resolvendo. Fertur convulsis mederi, obstructions viscerum tollere, ventris tinea & lumbricos interimere, & ejus pulverem ad ℥j. cum vino exhibitum non modo urinam & menses evocare, sed etiam difficulter parientibus prodesse.

Decoctum Cardiæ, ejusve siccæ pulvis cum Saccharo mixtus & haustus in palpitacione cordis lienis morbis & affectibus hysteriis, ut admirandæ virtutis & efficaciæ medicamentum a J. Raio proponitur.

A Veterinariis & Mulo medicis ad quosdam Boum & Equorum morbos usurpatur cum successu.

CARDUUS BENEDICTUS.

Carduus Benedictus & Carduus sanctus, Off. Cnicus sylvestris hirsutior sive Carduus benedictus, C. B. P. 378. & Inst. R. H. 450. Carduus benedictus. J. B. 3. 75. Dod. Pempt. 737. Carduus sanctus Attractylis Dioscorid. Cæsalpini 354. Attractylis hirsutior, Fuchsii: Acanthium Cordi: vulgo, Chardon benit.

Radicem habet albam, multifidam, fibratam: folia laciniata Dentis leonis pene

pene modo sed minus profunde incisa, amara valde, hirsuta & in-spinulas breves & molles desinentia, alternatim in caule posita. Is autem sesquicubitalis, ramosus, supinus, villosus, striatus, flores magnos (sustinet flosculosos, plurimis scilicet flosculis luteis constantes quinquepartitis, pistillo tribdo, quod quinque staminula apicibus longis, fuscis, sibi invicem adnatis, & velut tubulum quemdam efformanibus donata amplectuntur, cum calyce pyriformi squammoso, spinis ramosis munito, foliis amplioribus capitelli instar obvallato & multa lanugine instructo. Semina longa sunt striata, sublutea & papposa. Tota planta amarore insigni prædita est, radice excepta quæ vix leviter amaricat. Hujus Cardui capitula antequam flores pandantur, & florida recisa succum sanguineum paucum fundunt. Colitur vulgo in hortis. Folia, capitula & semina usitata sunt.

Analysi chymica, ex foliorum & summitatum Cardui benedicti Læv. prodierunt humoris limpidi, odoris & saporis herbacei, obscure salsi, obscure acidi lbj. ℥viij. ℥vij. humoris limpidi, subacidi, deinde rufescentis, austeri lbj. ℥xv. gr. lviij. humoris fusci, empyreumatici, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥vij. gr. xxxvj. salis volatili urinosi concreti gr. xv. olei ℥vij. gr. xij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥iij. gr. xlvij. quæ calcinata reliquit cinerem ℥ij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥v. gr. xv. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. gr. l. in calcinatione ℥ij. gr. xlvij.

Carduus benedictus salem essentialem continet tartareo ammoniacalem cum paucis oleo admixto. Diaphoresim & sudores potenter movet. Alexiterius est, antipleuriticus & febrisægus. In omnibus malignis febribus utiliter usurpatur, & in ipsa peste a Palmario plurimum commendatur. Succus ad ℥ij. iijve exhibetur; decoctum ad ℥vj. sæpius die iteratum; pulvis ad ℥j. in vino vel in ejusdem plantæ aqua distillata; extractum ad ℥j. vel ℥ss. quod Ettmullerus cum tantillo Laudani opii propinarum sudores adeo promovere asserit ut ægri sudore quasi distuant. Pleuriticis opitulatur statim initio una aut altera præmissa venæ sectione. Febres intermittentes sæpiissime sanat continuato aliquamdiu usu ante paroxysmum, præmissis universalibus, in primis vomitorio, vel solus vel cum Centauro minori aut Asaro usurpatus. Conducit quoque ad sanguinem in corpore grumoso dissolvendum, præsertim in casu ab alto, illum autem resolutum per urinas expellere dicunt. Notari sane dignum est quod Ballonius *Lib. 2. Consil. 2.* observat, decoctum Cardui benedicti ad ℥ij. vel ℥iij. assumptum urinam reddere crassam & fœtidam.

In morbis chronicis summitatum infusum cum aliis amaris plantis sæpius die utiliter propinatur.

Semen in emulsionibus cum aqua stillatitia Papaveris rhæados paratis adversus pleuritidem & rheumatismum sæpe felici cum successu usurpatur. Sudorem enim copiose prolicet. Eadem emulso in variolis & morbillis, aliisque morbis mali moris utiliter præscribitur: exanchematum enim eruptionem faciliorem efficit & feliciorem.

Virtus quoque vulneraria huic plantæ a nonnullis tribuitur. Simon Paulli in *Quadr. Botanico* scribit vix huic secundam aliquam reperiri herbam

ham in consolidandis putridis, & contumacibus ulceribus, etiam in cancro ipso. At Schroderus tempus colligendi hanc plantam pro usu vulnerrario observandum esse existimat. Si enim, inquit, sub initio Junii collectus fuerit *Carduus benedictus*, vulnera recentia mirabiliter sanat, sin alio tempore, numquam id præstabit. Quandoquidem eo tempore succo illo sanguineo balsamico turget, quod in hac planta aliis temporibus non reperitur.

24. Folior. Card. bened. M. ß. Contund. in vini alb. generos. 3v. Colatura hauriatur ad sudorem proliciendum in pleuritide.

24. Semin. Card. bened. 3ij. Contund. in aq. Card. bened. 3vj. In colatura dilue syrup. Meliss. vel Caryophyllor. 3i. F. emulsio ad sudorem provocandum in pleuritide, & ad variolar. aut morbillor. eruptionem promovendam.

In Officinis aqua distillata servatur quæ sudorifera est, & in julapiis ac potionibus cardiacis & sudoriferis præscribitur. Sæpe Pharmacopœi aquam ex alia planta sub *Cardui benedicti* nomine distillant, quæ dicitur *Attractylis lutea*, Off. *Cnicus Attractylis lutea* dictus, *H. Lug. Bat. & Inst. R. H. 451. Attractylis vera J. B. 3. 83. Attractylis, Dod. Pempt. 736. Chartamum sylvestre, Casalp. 432. Attractylis lutea, C. B. P. 379.*

Cardui bened. folia usurpantur in aceto theriacali *Charas*: Ol. Scorp. *Matthiol. Ung. Martiato Charas*, semina in opiata *Salomonis* & in decocto amaro *Pharm. Londin.*

CARDUUS MARIE.

Cardus Mariæ, *Carduus Marianus*, *Carduus lacteus*, Off. *Carduus albis maculis notatus vulgaris*, *C. B. P. 381. Inst. R. H. 440. Carduus Marianus sive lacteis maculis notatus, J. B. 3. 52. Carduus Leucographus, Dod. Pempt. 722. Leucacantha, Lacun: Sylibum Carduus Mariæ, Lobel. Icon. T. 2. p. 7. Spina alba hortensis, Fuchf. vulgo, *Cardon Mariæ, Char-don de Notre-Dame, Artichaut sauvage.**

Radice est longa, crassa, succulenta: foliis latis, longis, sinuatis, ambitu crenatis, multis duris aculeis horrentibus, nitidis, glabris, dilute viridibus, notis, & lineis varie ductis, candidis, ac lactei coloris maculatis: caule digium crasso, striato, lanugine villosa incano, bicubitali aut tricubitali, ramoso. Summi ramuli sustinent flores capitatos flosculosos, plurimis scilicet flosculis purpureis constantes tubulosos, in summitate quinquefariam divisos, quorum singuli singulis insident embryonibus, & calyce squammato aculeatoque comprehensos. Embryo autem abit deinde in semen læve, Carthami magnitudine, ovatum, & aliquantisper compressum, pappi instructum, gustu dulce. Agri Parisiensis incolæ sponte nascitur in campestribus, & incultis locis, secus itinera, & agrorum margines. Semen in usum venit, raro folia, & radices.

Analysi chymica *Carduus Mariæ* plurimum humoris acidi, non medio-crem olei & alcalini humoris portionem, parum terræ præbet. Folia amara sunt, & adstringentia. Eorum succus intenso colore rubro char-

tam

ram cæruleam inficit. Salem essentialem in hac planta Tournefortius contineri suspicatur enixum, seu alcalinum acido sale plusquam saturatum, quale est Oxyial Diaphoreticum *Angeli Sala*.

Hujus Cardui folia tenera, demptis spinis a nonnullis inter olera recensentur.

Eadem ipsi tribuuntur virtutes quibus Carduus benedictus insignitur. Sudorem & urinas promovet.

Foliorum & radicum decoctum ad hepatis & viscerum infarctus utiliter præscribitur. In hydropo, ictero, nephritide a Matthiolo commendatur.

Seminis insignis est usus in pleuritide & rheumaticis pectoris doloribus. In emulsionibus propinatur, aut pulveratum ad ℥j. aut ℥ij. ex vino aut aq. distillata sumitur. Lindanus *super praxim Hartmanni*, hoc semen ut specificum adversus hydrophobiam proponit: quod egregie sudorem movet. Succus febrifugus dicitur: ineunte paroxismo ad ℥iij. propinatur.

℥℥. Semin. Card. Mariz & semin. Card. bened. ana ℥ij. Semin. Nasturtii ℥j. Contund. sensim affundendo aq. still. Card. bened. ℥viij. Fiat colatura cum expressione, qua dilue syrup. Meliss. ℥j. Fiat emulso sudorifera, in pleuritide & rheumaticis doloribus punctoriis.

Externe hujus Cardui decoctum vel aqua distillata in phagedænis, nomis & ulceribus erodentibus, in cancro narium utilia censentur.

CARYOPHYLLATA.

Caryophyllata; *Off.* Caryophyllata vulgaris, *C. B. P.* 321. *Inf. R. H.* 294. Caryophyllata vulgaris, flore parvo luteo, *J. B.* 2. 398. Vulgaris Caryophyllata, *Lobel. Icon.* 693. *Herba Benedicta*, *Brunfels*: Gariofilata, vulgo *Casalpi*: Sanamunda, *Quorumdam*: vulgo, *Benoite*, *Herbede S. Benoit*, *Galiot*, *Gariot*, *Recife*.

Radice est fibrata, subrusta, acri, aromatica, verno tempore Caryophyllum olente: caulibus cubitalibus, hirsutis, alternatim ramosis: foliis inferioribus veluti conjugatis cum extremo impari claudente, cæteris ampliori, trifido superioribus vero cauli adnexis, tripartitis, & duabus pinnulis minoribus ad pediculi basim stipatis, obscure virentibus & villis tenuioribus aspersis. Flores in summis ramulis adsunt aurei, rosacei, pentapetali, quorum umbilicum occupat pistillum globosum & quasi echinatum, quod ætatur in capitulum sphaericum pluribus seminibus conflatum villosis, compressis, in orbem positis, acutis & in filum quoddam rigidum extremo reflexum uncinatumque abeuntibus. Calyx monotomus in decem partes acutas, majores, minoresve alternatim positas dividitur. Nascitur in sepibus & sylvis agri Parisiensis. Radix & folia in usu sunt. Radix non semper æque odorata est: verno tempore & in aridis calidioribus locis collecta longe fragrantior est.

Analysi chymica, ex plantæ integræ recentis cum radicibus ℥v. prodieunt humoris limpidi, leviter aromatici, obscure acidi ℥viij. ℥ij. gr. xxxvj. humo-

humoris primo limpidi, manifeste acidi, ac tandem rufescentis austeri ℥iij. ℥j. gr. xij. humoris fulci sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥iij. gr. xxxvj. olei adiposi ℥j. ℥iij. gr. xxxvj. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥ix. ℥ij. gr. xxxvj. quæ calcinata reliquit cinerum ℥iij. ℥v. ex quibus salis fixi mere alcali ℥vj. gr. xxxvij. lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ix. ℥iij. gr. lx. in calcinatione ℥v. ℥v. gr. xxxvj.

Radices solæ recentes distillatæ plurimum humoris acidi, odorati, aromatici præbuerunt, parum spiritus volatilis urinosi, mediocrem olei portionem, sed adeo gravis ac densi ut aquæ fundum peteret. Caryophyllatæ folia amara sunt, & styptica: & eorum succus chartam cæruleam intenso rubore tingit. Itaque hæc planta ammoniacalem salem continet acido plusquam saturatum, oleo tum tenui, tum crasso involutum.

Radix recens, & in calidioribus locis nata, blandumque aroma Caryophyllatum spinas adversus catarrhos, & capitis obstructions commendatur ob salem volatilem quo donatur: sicca vero, & sale volatili fere orbata magis adstringit, & utiliter usurpatur ad fibrarum ventriculi, & intestinorum tonum firmandum in diarrhæis, & alvi profluviiis cruentis, in cruenta expuitione, & hæmorrhagiis. Decoctum radicum recentium ℥j. vel herbæ integræ M. j. in aq. communis ℔ss. ad medias; vel eorumdem contusorum insusum in vini ℔ss. per noctem, deinde percolatum, & ineunte paroxismo haustum sudorem potenter provocat, & sæpius febres abigit. In variolis, morbillis, aliisque malignis morbis ejusdem radicis decoctum cum rasura Cornu Cervi utiliter propinatur, ubi alvi profluvium metuendum est. Eadem radix in sanguine coagulato resolvendo in illis commendatur qui ex alto deciderunt pulverata ad ℥j. in vino calido. Foliis. fuccus ad eadem valet. Ad ℥iij. propinatur,

℥. Radic. Caryophyllatæ exsiccata, & contusa, Rasur. Cornu Cervi ana ℥ss. Radicis Scorsonn. taleolatim concisæ ℥j. Coquantur in aq. comm. ℔ss. ad ℔ij. Detur pro potu solito in dysenteris, & morbis malignis alvi fluxu stipatis.

℥. Rad. Caryophyllatæ recentis & Acori veri ana ℥j. Infunde per noctem in vini generosi ℔j. Sumat æger ad ℥iij. quarta quaque hora in catarrho.

Folia contusa carpis admota ante paroxysmum febres intermittentes nonnumquam profligaverunt.

C A R V I.

Carvi, Off. Carvi, *Casalpini* 291. *Inf. R. H.* 306. Cuminum pratense, Carvi Officinarum, *C. B. P.* 158. Caros, *J. B.* 3. 2. 69. Carum, *Dod. Pempt.* 299. Careum, *Fusch. Ger*: vulgo, Carvi.

Radice est singulari, longa, pollicem crassa, acri & aromatica, fibris nonnullis stipata: caulibus cubitalibus & sesquicubitalibus, striatis, glabris, ramosis frondibus partim e radice partim ex ramulorum alis enatis, compositis ex longo carinato pedicello, sed angusto & foliis conjugatis tenuissime incis, nitidis & obscure virentibus. Flores in umbellis nascuntur parvi, odorati,

Geoffroy Tom. II.

K

rosa-

rosacei, e quinque petalis cordiformibus, inæqualibus, & nonnihil ad fissuras crispis, in orbem positis, & calyci viridi insidentibus, staminibus tenuissimis, albicantibus, & apicibus virentibus constantes. Calyx mutatur in fructum ex duobus seminibus compositum exiguis, longiusculis, hinc gibbis, & striatis, inde vero planis, subnigricantibus, acris, aromaticis. Nascentur in pratis circa Parisios, tum & in Alpibus, & Pyrenæis. Semen in usum venit, nonnunquam etiam radix.

Analysi chymica, semen Carvi plurimum exhibet olei tum essentialis, tum empyreumatici crassi, nec mediocrem portionem humoris tum acidum, tum volatilis urinosi. Oleum essenziale acre, aromaticum, & exurens paratur ex semine cum aquæ magna copia distillato.

Semen Carvi passim in Germania, Batavia, & Anglia usitatissimum est: nam cum panibus quos biscoctos vocant, pinsitur, & caseis adjicitur, jusculis, placentis, aliisque ferculis incoquitur, & Saccharo obducitur.

Stomachicum, & diureticum dicitur. Inter quatuor semina calida majora recensetur, quæ sunt Anisi, Fœniculi, Carvi, & Cumini semina. Minora vero sunt semina Ammeos, Amomi, Apii, & Dauci. Humores crassos ac tenaces incidit, flatu discutit, colicos dolores sedat, ciborum concoctionem juvat, urinas promovel, & menses. Sed actuosius suis partibus, oleosis, & acris æstum accendit in sanguine, & ardorem invehit in partibus, & eas ad inflammationem disponit. Quapropter hæc oleosa, aromatica, & acria remedia prorsus evitanda sunt ubi adest in visceribus ardor, & inflammatio. Semen pulveratum a ℥j. ad ℥j. usurpatur, vel infusum ℥j. in vino aut vehiculo idoneo. Ejus oleum essentielle a gutt. iij. ad vj. præscribitur, cum Saccharo.

Radix dum adhuc tenera est non minus efficax censetur quam semen. In apozematis, & enematibus carminantibus nonnunquam præscribuntur.

℥. Sem. Carv. pulver. ℥j. Sacchar. alb. ℥j. cum vini generosi ℥iij. Sumat æger in colica flatulenta.

℥. Olei essential. Carv. gutt. v. Sumat ex aqua Menthæ vel vino.

Externe in colicis doloribus fomenta abdomini admoventur ex seminum, & radicum decocto; vel oleo essentiali Carvi cum oleo Amygdalar. amarar. vel oleo Absinth. permixto abdominis regio utiliter inungitur.

℥. Rad. Carvi, Acori veri, & althææ ana ℥j. Folior. Malvæ, Calamenth. Puleg. Majoran. & summ. Anethi ana M. j. Flor. Chamæmeli, & Melilot. ana P. j. Semin. Carv. & Cumin. ana ℥ss. Fiat decoct. in aq. comm. addendo sub finem vini albi ℥vj. Colatura foveatur abdomen, & ventriculi regio ad emolliendum, & discutiendum in colicis doloribus aliisque morbis a flatu.

Semen Carvi usurpatur in Electuar. de Baccis Lauri, El. Micleta, & Benedicte laxativa Pharm. Reg. Charas, necnon in Clareto vulgo dicto Rossolis des fix graines, quod sic conficitur.

℥. Semin. Anisi, Fœniculi, Anethi, Coriandr. Carvi, & Dauci ana ℥j. Contusa macerentur ad Solem in vase vitreo clausa per tres hebdomadas cum sp. vini ℥iij. Fiat colatura cui adde (sympi præparati ex Sacchari albisimi ℔j. cum l. q. aq. Chamæmeli vel Menth. cœ-

pæ.

præ. Servetur ad usum. Dosis cochlear unum aut alterum ad cibor. con-
coctionem iuvandam, dolores colicos flatulentos discutandos, urinas pro-
vocandas, & menses ciendos.

CARYOPHYLLUS.

Caryophyllus hortenſis, Caryophyllea, Tunica, Off. Caryophyllus al-
tilis major, C. B. P. 207. Inſt. R. H. 330. Betonica coronaria ſive
Caryophyllus major flore vario, J. B. 3. 327. Caryophyllus multiplex,
Lob. Icon. 441. Caryophyllea, Trag. 574. Herba Tunica, Quibusdam,
Cantabrica, Turneri: Viola flammea, Scaligeri: vulgo, Oseille.

Radice eſt ſimplici, fibroſa: caulibus numeroſis, lævibus, teretibus,
cubitalibus, raro altioribus, geniculatis, nodofis, ramoſis: foliis e ſingulis
geniculis binis, anguſtis, gramineis, duris, per extremum acuminatis,
caſſo quaſi vel glauco colore. Flores in ſummis caulibus naſcuntur Ca-
ryophyllei ſeu plurimis conſtantes petalis, coloris diverſi, coccinei, ni-
gricantis, carnei, candidi vel variegati, in orbem poſitis, quinis, ſenis
aut pluribus, lente ſimbriatis, odore Caryophyllos aromaticos ſuaviter re-
ferentibus, ſtaminibus, & apicibus candidis, in medio emicantibus, pi-
ſtilloque in duo vel tria filamenta recurva deſinente, ex calyce cylindra-
ceo, membranaceo, ad exortum ſquammato, in ſummo denticulato, e-
mergentibus. Piſtillum autem abit deinde in fructum cylindraceum, api-
ce dehiſcentem, calyce ipſo involutum, ſeminibus ſæpe parvis, planis
& quaſi foliaceis, rugoſis, per maturitatem nigris, placentis aſſixis. Va-
ria ſunt horum ſorum genera magnitudine, colore, & petalorum nume-
ro differentia: quæ quidem varietates a diverſa cultura emergunt. Co-
luntur in hortis ob ſorum elegantiam, & odoris ſuavitatem. Seruntur
frequentius avulſis exiguis cum foliis ſurculis, ſeminibus rariis; nam e
ſemine nati flores ad agreſtem naturam redeant, minores minusque odo-
rati, & ſimplices, etiamſi prius multiplices, redduntur. Uſus eſt ſorum.
Coccinei, & odorati cæteris anteponuntur.

Analyſi chymicæ, ſorum a calycibus ſeparatorum lbv. per retortam di-
ſtillatæ præbuerunt humoris limpidi, odore, & ſapore Caryophyllos aro-
maticos referentis, obſcure acidi ℥ix. ℥ij. gr. xij. humoris primo odorati,
ſubacidi, deinde empyreumatici, manifeſte acidi, & auſteri lbij ℥viii.
gr. xxxvj. humoris roſeſcentis, ſale volatili urinoſo imprægnati ℥j. ℥vj.
gr. xliij. olei ſpiſſi ad inſtar extracti ℥ij. ℥iiij. gr. liij. Maſſa nigra in re-
torta ſuperſtes pendebat ℥v. ℥iiij. gr. xlviij. quæ per decem horas calci-
nata reliquit cmerum nigricantium ℥j. ℥vij. gr. xlviij. ex quibus ſalis fi-
xi mere alcali ℥v. gr. xxxvj. lixivio extracta fuerunt. Partium jaſtu-
ra in diſtillatione fuit ℥iiij. ℥vj. gran. xxiii. in calcinatione ℥ij. ℥iiij.
gr. xliij.

Caryophylli flores non mediocrem olei tenuis, & ſubtilis portionem
continent ut ex eorum odore fragranti conſpicere licet, multum olei den-
ſi, & rareſcentiæ capaciſ, & ſalem tartareum ammoniacalem. Copioſo
ſuo ſulphure acres ſanguinis ſales involvunt ac demulcent. In omnibus
capitis, & cordis affectionibus commendantur, ſed præſertim in morbis
malignis, & peſtentialibus. Nonnulli ſuccum totius plantæ vel etiam

radicum ut alexipharmacum commendant. Verum solus flos hac virtute donatus videtur, nec quidem tota substantia, sed solum infusum vel decoctum quod C. Hoffmannus præsertim commendat. Simon Pauli testatur, innumeros solo decocto florum a febris malignis liberavisse, & asserit hoc decoctum sudores, & urinas potenter provocare citra magnos naturæ motus, cor simul corroborare sitimque sedare.

Ex his floribus syrupus, conditum, aceturum in officinis præparata servantur, & aqua distillatur odorata. Syrupus in julapiis ac potionibus cardiacis frequenter usurpatur ad ℥j. vel ℥ij. conditum ab ℥ss. ad ℥ijss. in electuariis cephalicis, cardiacis, & antispasmodicis. Aqua distillata ad sudores proliciendos aut exanthematum eruptionem promovendam utilis censetur. Flores in aceto macerati illud colore rubro, odore suavi, sapore grato, & virtute cardiaca insigniunt. Tempore pestilentie ad contagium arcendum linrea hoc aceto Caryophyllato madesfacta gestanda, & identidem olfacienda sunt, nec non etiam illius acetii cochlear unum aut alterum mane utiliter assumitur ad contagium præcavendum.

C A S T A N E A.

Castaneæ arboris duæ sunt species in Officinis, altera sativa; sylvestris altera.

Castanea sativa, *Off.* Castanea sativa, *C. B. P.* 418. *Inf.* R. H. 584. Castanea, *J. B.* 1. 121. Castaneæ majores, *Lugd.* 31. vulgo, *Maronier*.

Arbor est magna, procera, ramosa, furculosa, tantæ nonnumquam amplitudinis ut truncum ejus tres homines vix complecti potuerint: ligni materie solida, durabili, non obnoxia putredini, & in igne multum crepitante, cortice lævi, maculoso, subnigro aut ad cinereum vergente. Folia gerit ampla, uncias duas plus minus lata, quatuor aut quinque longa, tenuia, aspera, rugosa, ambitu incisa, transversis multis venis in dorso eminentibus a media insigni costa extensis. Flores e ramulis dependent amentacei, plurimis staminibus e calyce quinquefolio viridi surgentibus cum luteis apicibus constantes, tenui capillamento seu axi affixis, steriles. Fructus echinati, pungentes, erinaceis similes, in eadem arbores a floribus separati nascuntur subrotundi, quadrifariam dehiscentes, intus villosi, in quibus continentur binæ aut ternæ Castaneæ, alias uncia, unciales circiter, subrotundæ, ex lata basi veluti in acumen desinentes, ab uno latere planæ, ab altero plerumque gibbosæ, cortice exterius obductæ veluti coriaceo, duro ac lento, exterius spadiceo ac lævi, excepta basi scabriore & subcinerea qua parte adhæsit, interne incana, lanugine molli pubescente, cui subjacet alia tenuior membrana rufa, crispa, fragilis, amaricans & adstringens, nucleum seu medullam continens albam, solidam ac duram satis, sed dulcem, & gratam palato, præsertim si cocta fuerit. Maturo fructu echinati cortices sponte dehiscunt & Castaneas maturas dimittunt. In Galliæ meridionalis provinciis colitur. Materies arboris ædificiis atque aliis domesticis utensilibus admodum apta est. Castaneæ in cibos veniunt.

Cast.

Castanea, Off. *Castanea sylvestris* quæ peculiariter *Castanea*, C. B. P. 419. *Inst. R. H.* 584. *Castanea*, *Dod. Pempt.* 814. vulgo, *Chataignier*.

Magnitudine tantum a priori differt ratione culturæ. Fructus enim & cœteræ arboris partes minores sunt. In agro Parisiensi sponte nascens reperitur.

Analysi chymica, ex *Castanearum* sativarum decorticatarum lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, fere insipidi, sub finem obscure acidi ℥xij. ℥iij. humoris subacidi & austeri lbj. ℥xv. ℥ij. gr. xxiiij. humoris fulci, empyreumatici, intense acidi, austeri ℥ij. ℥iiij. gr. xlvij. humoris fulci, empyreumatici, intense acidi, subfalsi ℥ix. olei ℥ij. ℥ij. gr. xlvj. Massa nigra in retorta superstes pendeat ℥x. ℥iiij. quæ calcinata reliquit cinerum ℥j. ex quibus salis fixi mere alcali ℥v. gr. xx. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥xj. ℥vij. gr. vj. in calcinatione ℥ix. ℥iiij.

Castanearum medulla dulcis est, aliquantisper styptica, & chartam cœruleam rubro colore tingit: unde liquet abundare sale essentiali aluminoso multo sulphure involuto.

Castaneæ gentium multarum apud nos opes sunt: adjuvant in primis rem efscarum. Integræ vel in aqua coquuntur, vel igne torrentur, idque duobus modis, vel in sartagine aut perforata patina ad ignis flammam, vel sub prunis & cineribus candentibus. Prius tamen quam cineribus aut igni credantur, cultello obiter vulnerari debent, ut e plagæ hiatu flatus igne citatus evadat: alioqui ubi flagrantem incaluerint, humore intus contento rariore facto, magno cum strepitu proficiunt non sine adstantium periculo: & insuper æquabilius torrentur. A nonnullis posterior coquendi modus præfertur: nam in sartagine tostæ partim comburuntur, aut aliquid fuliginosi empyreumatis contrahunt. Apud lautiores *Castaneæ* sub cineribus tostæ & decorticatæ cum succo Aurantiorum vel Limonum & rantillo Sacchari mensis secundis inferuntur. In Gallia Lugdunenses prædicantur amplitudine & saporis suavitate commendatissimæ, non solum quæ in agro Lugdunensi nascuntur, sed etiam quæ ex Delphinatu, ubi maximus est earum proventus, a negotiatoribus Lugdunum devehuntur, unde in alios tractus deinde comportantur.

Multis populis pro pane *Castaneæ* sunt, præcipue Perogoriis, Lemoicensibus & Gebennicorum montium incolis. Sic autem illas parare solent. Primum ut diutius servari possint spoliantur lento cortice coriaceo qui sub echinato calyce primo subest, deinde proxima corpori membrana, quæ infestat saporem, detrahitur: mox ut siccetur exacte, curant sedulo: nam cratibus sic delibratis imponunt, quas postea in caminis suspendunt, & siccatas in usus servant. Coquunt plerumque cum sula in capaci cacabo: viceque pulmentarii ac panis jucundissime vescuntur.

Castaneæ quocumque modo paratæ statulentæ sunt, difficile coquuntur: multum quidem præbent nutrimenti sed crassi, nec conveniunt nisi robustis & duris laboribus assuetis. Citra igitur satietatem comedendæ sunt: quippe valetudinem mire infestant si modus absit & potissimum eorum qui calculus renum, colicis doloribus, & viscerum infarctibus obnoxii sunt.

Assurgunt cum ipsæ nuces & præsertim crudæ, tum quoque membrana

subrufescens quæ carnem ambit. Siftunt utique stomachi & ventris fluxiones, & sanguinem excreantibus prolunt. Earum farina cruda, vel medulla cocta cum melle & sulphure subacta tussientibus & cruenta expuentibus utile præbent electuarium. Diarrhæis decoctum. Castanearum vel earum cortex exsiccat & pulveratus conferunt. Interior membrana rubens commendatur ad alvi profluvia & sanguinis rejections seu in aqua decocta & pota, seu in vino austero ℥ij. pondere: quin etiam cum pari pondere eboris rasi alba sceminarum profluvia cohibet. Emulsio Castanearum & seminum Papaveris albi cum decocto Glycyrrhizæ extracta, confert iis, qui ardoribus urinæ laborant.

Externe cataplasma cum Castanearum medulla, farina Hordei & aceto mammis admorum earum duriciem resolvit & lac coagulatum dissolvit.

CENTAUURIUM.

DUæ in Officinis occurrunt plantæ Centaurii nomine insignitæ, genere tamen profus diversæ: Centaurium majus & Centaurium minus.

Centaurium majus, Centaurea major, Rhaponticum vulgare seu Pharmaceuticum, Off. Centaurium majus folio in plures lacinas diviso C. B. P. 177. Inf. R. H. 449. Centaurium majus Juglandis folio J. B. 3. 38. Centaurium magnum Dodon. Pempt. 334. Rhapontica quæ hodie Centaurea major Tragi 138. vulgo, Grande Centauree ou Rhapontique vulgaire.

Ex radice crassa, ponderosa, solida, tripedali, foris nigricante, intus rubefcente, succo sanguineo prægnante, cum dulcedine & adstrictione nonnihil mordaci, caules edit rotundos, teretes, bicubitales aut tricubitales, ramosos cum multis adnatis; frondes gerit amplissimos in plures particulas divisos & in alæ formam dispositos, quorum folia oblonga, spithamam fere longa, tres vel quatuor uncias lata, Juglandis foliis fere similia, in ambitu serrata, nervosa, glabra, saturate virentia. Surculorum extrema capitula sustinent seu flores strobiliferos, plurimis nempe strobilis constantes cæruleis, quinquifidis, embryoni insidentibus & calyce squammoso non aculeato comprehensis. Embryo autem abite deinde in semen oblongum, glabrum, Cnico fere simile & pappi instructum. In Alpibus sponte nascens reperitur, unde radix quæ usus est affertur. In hortis colitur.

Analysi chymica, radicum recentium ℔v. præbuerunt humoris limpidi, saporis aliquantisper herbacei, obscure subasali ℥viij. ℥ij. humoris limpidi primo obscure acidi, deinde manifesti, ac tandem austeri ℔ij. ℥vij. ℥v. gr. xxiiij. humoris rufi, empyreumatici, tum acidi, tum urinosi & sale volatili urinoso imprægnati ℥iiij. ℥j. gr. xxiiij. olei adiposi aqua gravioris ℥j. ℥ij. gr. xij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥viij. ℥ij. gr. xxxvj. quæ calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥v. gr. xxiiij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥iiij. gr. vj. lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. gr. xlvij. in calcinatione ℥vj. ℥v. gr. xij.

Centaurii majoris radix cum quadam adstrictione ac dulcedine acris, sale donatur essentiali tartareo aliquantisper aluminoso cum olei crassi portione non mediocri, unde concretum exurgit salmorefinosum.

Virtu-

Virtutes contrariæ huic radici tribuuntur, ob acrimoniam crassos humores incidit, viscerum obstructions resolvit & menses movet: ratione adstrictionis profluvia sistit, prodest in hernia & exspositione sanguinis. Ad vulnera recentia conglutinanda efficax admodum dicitur. Hepatis obstructions referat & hujus visceris tonum firmat ac roborat, unde hydropicis & isticis auxiliatur tum vino macerata, vel aqua decocta, tum in pulvere pota. Ad ℥j. usurpatur in infusis aut decoctis vulnerariis, adstringentibus necnon etiam aperientibus. Pulvis ad ℥j. præscribitur in vino vel alio liquore idoneo.

Usurpatur in Pulvere antipodagrico *Principis Mirandolani*.

A nonnullis hæc radix pro Rhapontico vero sumitur, sed perperam, ut jam alibi diximus.

Centaureum minus, Centaurea, Fel Terræ Off. Centaurium minus C. B. P. 278. *Inf. R. H. 122. Dodon. Pemptad. 336.* Centaurium minus, flore purpureo J. B. 3. 353. Centaurea *Brunfelsi*: Gentiana dydropica *Hoffm. Altorf. vulgo, Petite Centauree.*

Radice est parva, candida, lignosa, fibrata, insipida: caule spithameo, anguloso, ramoso: foliis aliis in terram sparsis, aliis in caule binis ex adverso positis, Hypericis forma, sed majora, glabra, nervosa, dilute virentia. Flores in summis ramulis velut in muscarium nascuntur monopetali, infundibuli forma, quinquepartiti & suave rubentes. Calyx florum e quinque foliis acutis constat, & pistillum quod infimam floris partem perfodit, mutatur in fructum semiunciam longum, cylindraceum, membranaceum, bicafularem, in duas carinas hiantem & semina fundentem minutissima. Folia & flores intenso amarore donantur. In agro Parisiensis sponte nascitur. Usus est herbæ cum floribus.

Analyti chymica, ex plantæ floridæ ℔v. demptis radicibus, prodierunt humoris limpidi, fere inodori, saporis acris, linguam pungentis, subacidi ℥xij. ℥vj. gr. xxxv. humoris primo limpidi, acris, deinde rufescentis, minus acris, intense acidi, tandem odoris & saporis empyreumatici, intense acidi & austeri, ℔ij. ℥ix. gr. xxj. humoris fuscæ, odoris & saporis empyreumatici, fumum referentis, austeri, alcalini ac. tandem sale volatili urinoso imprægnati ℥ij. ℥iiij. gr. xlij. olei spissi ℥j. ℥v. gr. vj. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥vij. quæ calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥ij. gr. liij. ex quibus salis fixi alcali ℥ij. gr. xl. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥xij. ℥vij. gr. xxxix. in calcinatione ℥vj. ℥iiij. gr. xvij.

Centaurei minoris folia & flores insigni amarore donantur, chartam cœruleam intenso rubore tingunt: saleem continere videntur essentialem Tartaro vitriolato haud abfimilem cum ammoniacali consociatum & multo oleo acris & crasso conjunctum.

Centaurei minoris summitates floridæ, ratione salis digestivi quo donantur, viscidos humores potentissime incidunt & obstructions viscerum referant. Hinc in affectionibus chronicis & febribus intermittentibus plurimum valent. Ratione olei tenuioris & acris sanguinem in vasis infimi ventris expandunt & fermentant: hæmorrhoidales venas aperiant & menses provocant. Summitates floridæ ad pugillum unum aut alterum in vino macerantur, vel in aqua Card. Benedict. decoquuntur pro

haustu . Pulvis earundem exsiccatarum ad ℥j. præscribitur , & conditum ad ʒß.

Rulandus , referente Ettmullero , febres intermittentes fere omnes ; præmisso vomitu , solo ejus florum , vel etiam herbæ decocto curabat ; in chronicis vero radicem Afari cum Centauryo minori confociabat . In istero & mensium suppressione utiliter exhibetur . Centaurium minus ad suppressum hæmorrhoidum fluxum revocandum tum interno usu tum externa affictione conducit . Ventriculum roborat , ciborum concoctionem juvat , vermes enecat . A Palmario in morbis contagiosis , veluti specificum laudatur : si pulveris Centaurii minoris ℥j. in vino vel aqua Cardui benedicti hauriatur , sudorem moderate provocat .

Licet stirpes nostrates cum veterum plantis comparare nolim , non possum tamen quin hic obiter dicam , veteres tanti fecisse Centaurium minus ut inter opera Galeno adscripta , integer libellus reperiatur *de virtute Centauria* inscriptus , in quo Simon Paulli duo observavit notatu digna ; primum scilicet veteres aut saltem auctorem illius libri extracta conficiendi modum non ignoravisse , quippe qui Centaurii extractum præparandi modum accuratissimum proponit : alterum quod ingens præsidium idem collocet in hac planta tanquam specifica . in curandis canis rabidi aliorumque venenatorum animalium moribus . Hac ratione Julianus Palmarius illud usurpat in præparatione insignis sui pulveris contra rabiem , quem adeo probatum esse dicit , ut nullum unquam animal hoc usum se vidisse scribat , quod non atrocis morbi periculum evitaret quacumque uteretur vitæ ratione , illæsis tamen capitis partibus quæ dentes superant : his enim vulneratis exigua spes est , ut & vulnerata parte statim a morfu frigida elota annotante eodem Palmario . Hæc est illius pulveris præparandi ratio .

℥. Foliorum Rutæ , Verbenæ , Salviz minoris , Plantaginis , foliorum Polypodii , Absinthii vulgaris , Menthæ , Artemisiz , Melissophylli , Betonicæ , Hyperici , & Centaurii minoris , p. æq. Legantur singula quo tempore viribus pollent maximis , id est circa Junii plenilunium , & cælo sereno . Papyraceis dein chartis conclusa siccentur seorsim in loco ad quem neque sol , neque pluvia pertingat , ne vel nimium exarescant , vel situm contrahant . Siccata ad futuros usus asserventur ea lege ut quotannis renoventur .

Cum autem utendi necessitas incidet , singulorum æquale pondus in pulverem tenuissimum redigatur , qui a ʒß. ad ℥j. demoris quotidie exhibeatur , idque ex cochleari cum duplo Sacchari , vel ex vino , vel ex pomaceo , vel ex jusculo , vel ex butyro aut melle eleuarii forma jejuno stomacho tribus horis ante cibum . Quamquam autem ʒß. aut ℥j. satis sint tum homini tum omni animali quantumvis crudeliter sauciato , nihil tamen obfuerit ad tres quatuorve processisse , cum præsertim vel longo post morsum tempore , vel jam nata etiam hydrophobia curationem aggredimur . Nonnulli hujus pulveris ℥j. cum pulveris Viperarum ʒß. in vini albi generosi haustu quotidie propinant per novem , nonnunquam etiam per quindecim dies . Interim vulnus non aqua frigida lotum , sed siccis linteis aut spongia exsiccata vino aut hydromelite in quo supradicti pulveris ʒß. soluta sit bis terve quotidie fovetur . Deinde unguentum aut emplastrum inducitur quale alijs vulneribus ex usu est .

Ferne.

Fernelius ad ſchiadicum dolorem Centuarii minoris decoctum per clyſterem inſuſum plurimum commendat.

Conferat quoque Centaurium minus glutinandis vulneribus recentibus, & ulceribus inveteratis, quæ abſtergendo ſiccandoque glutinat & carne replet. Contra furfures, & cruſtoſam capitis ſcabieſem viæ præſtantius ullum decoctum S. Pauli reperiri aſſerit quam Centaurii minoris ex Piſorum brodio paratum. Illo enim decocto ſi lavetur caput, inſigniter furfures & ſcabieſem detergit, imo una myriades pediculorum enecat.

Sal ex ejus cineribus extrahitur qui tertianam fugare dicitur & menſes ſuppreſſos reſtituere. Ad 36. exhibetur.

Aqua arte diſtillatoria ex Centaurio parata in uſum venit, ſed exiguæ virtutis eſt. Uſurpatur in Theriaca *Andromachi*, aceto theriacali, ſyrupo de Arthemifia, Pulvere *Comitis Mirandolæ* antiarrhithico, decocto amaro *Pb. Londinenſi*, & mixtum reperitur cum cæteris plantis vulnerariis quæ ex Helvetia ſub *Faltran* titulo advehuntur.

C E P A.

Ceparum diverſæ ſunt ſpecies ratione coloris, magnitudinis, formæ &c. quarum uſitatæ ſunt, Cæpa vulgaris candida & rubra, Cæpa Alcalonica, & Cæpa fiſſilis.

Cæpa vulgaris candida vel rubra, *Off. Cæpa vulgaris* floribus & tunicis candidis vel purpuraſcentibus *C. B. P. 71. Inſt. R. H. 382.* Cæpæ ſive Cæpa rotunda, alba vel rubra *J. B. 2. 347. vulgo Oignon.*

Radice nititur bulbosa, ex variis tunicis contexta, interioribus carnoſis, exterioribus membranaceis, modo rubra, modo alba, interdum orbiculari, alias oblonga, alias depreſſa, pendulis ab imo fibris albis, ſubtili & æſerrimò turgida ſucco oculos mordicando lacrymas eliciente: ex qua folia aſſurgunt longa, pedalia, fiſtuſoſa, teretia & acuminata, acri ſapore, & caulis nudus, reſtus, duorum triumve cubitorum alitudine, circa medium in ventrem utrinque turbinatum turgescens, qui glomeratam in ſummo ſaſtigio geſtat ſorum caput pugni magnitudine. Flores liliacei ſunt ex petalis ſex compoſiti, quorum medietallium occupant ſtamina ſex & piſtillum, quod deinde abit in fructum ſubrotundum in tria loculamenta di- viſum ſeminibuſque ſætetum ſubrotundis, anguloſis, atris. Ab omnibus aliis bulbosis differt quod ejus radix nullam omnino lobolem edat, unde & Unio latinis dicta eſt olim, referente Columella. Unde forte gallicum *Oignon*. In hortis olitorii ad uſum culinarium colitur. Radix uſus eſt.

Analysi chymica, Ceparum albarum a tunicis membranaceis mundatarum lbv. per B. V. diſtillatæ præbuerunt humoris limpidi, ſere inſpidi, odore Cepas referentis, obſcure ſaſſi lbj. 3xij. 3vij. humoris limpidi, obſcure acidi, lbj. 3vij. 3v. gran. xlvij. Maſſa reſidua per retortam diſtillata præbuit humoris uſſi, ſubſaſſi, & obſcure auſteri 3ij. 3ij. humoris ruſſeſcentis, obſcure acidi, & alcali urinoſo imprægnati 3iij. gran. vj. ſaſis volatilibus urinoſi concreti 3j. gran. xxxvj. olei adipoli 3ij. Maſſa nigra

nigra in retorta superstes pendebat ℥iij. ℥j. quæ per duodecim horas calcinata reliquit cinerum fulcorum ℥ij. gr. lxxij. ex quibus salis fixi salis ℥j. gr. viij. extracta sunt.

Cœpæ rubræ minorem salis volatilis & olæi quantitatem præbuerunt ꝑ scilicet gr. xxxvj. & olei ℥ij.

Partium jactura in distillatione fuit ℥iij. ℥vj. gr. liij. in calcinatione ℥ij. ℥vij. gr. viij.

Cœpa itaque saleam continet ammoniacalem cum olei crassi portione mediocri, & spiritu quodam oleoso essentiali tenui, & acerrimo conjunctum.

Cœpæ ad escarum condimenta frequenter hodie in culinis usurpantur. Nonnulli eas devorant crudas: Delicatiores tamen coctis magis delectantur, quia non adeo fetidum spirant odorem.

Coctæ enim asperum & acrem saporem amittunt. Appetitum languentem excitant, palatum irritant, & conducunt stomacho frigido, crassis, glutinosisque humoribus repleto: hos enim coquunt, incidunt, attenuant, atque detergunt, urinas & menses movent, sed nil aut parum nutrimenti suppeditant: succi sunt pravi, status gignunt, largiori esu capitis dolores invehunt, somnia efficiunt turbulenta, halitibus multis & acerbis caput implendo quibus nervosæ cerebri membranae commoventur, sitim pariunt, alvum faciunt lubricam acredine sua intestinorum membranas vellicando. Oculis nocere dicuntur, & animi functionibus obesse intus sumptæ. Venærem irritant, sanguinem inflammant & biliosis nocent.

Cœpæ cum melle coctæ asthmatis & pulmonum affectionibus a pituita crassa & lenta oriundis conveniunt. Succus bulbi & foliorum ad ℥vj. cum Saccharo epotus a nonnullis velut diureticum præstans commendatur in urinæ suppressione & hydropse. Adversus nephritidem Cœpa alba taleolatum secta in vini albi ℥viij. per noctem maceratur, insulum mane percolatum propinatur, jejuno ventriculo, quod per tres mensis lunaris ultimos dies iteratum a D. Chomel Med. Parisiensis tanquam comprobatum remedium prædicatur.

Cœpa non secus ac Allium rusticorum est Theriaca, & Prophylactica existimatur: in peste & morbis contagiosis mane comesta. Quidam Cœpam excavatam Theriaca replent, sub cineribus coquunt, & comedendam præbent peste correptis, vel ejus succum propinant ut remedium antipestilens, & diaphoreticum. Eadem simili modo coctæ, tusa, & cataplasmatibus ritu impressa pestilentes bubones efficacissime attrahit, emollit, & aperit. Nonnulli Cœpam in aquæ pauco coctam, & cum porcino adipe non salso contusam & Theriacæ ℥j. ad bubonem pestilentem potenter attrahendum supra partem affectam imponunt, & mane ac vespere illud cathaplasma renovare solent.

Fernelius Cœpas cum sale contusas parti impositas ambustæ sanare scribit. Easdem quoque Ambrosius Paræus mire commendat, modo ne Epidermide pars sit spoliata vel ulcerata. Cœpæ contusæ ad Alopeciam ab omnibus prædicantur, unde Schola Salernitana canit:

Contritis Capis loca denudata capillis

Sæpe fricans poteris capitis reparare decorem.

Mane & vespere caput iis confricetur dum prorsus rubescat & mox mole oblinatur vice cathaplasmatibus.

Ad

Ad Cephalam Cēpa alba per medium incisa & in spiritu vini macerata applicata supra partem dolentem valde prodest. Auditas difficultatem tollit succus Cēparum cum equali portione spiritus vini mixtus & ad aliquot guttas auribus instillatus.

Cēpæ contusæ plantis pedum admodum edematosis pedum tumores tollunt urinas promovendo, ventri vero applicatæ ascitidi, necnon & leucophlegmatias medentur. Cēpæ contusæ & in cathaplasmatibus formam redactæ a Riverio commendantur ad urinæ suppressionem. Vel etiam placenta ex Cēpis minutim concisus, cum ovis agitata, in axungia porcina frictis calide applicetur parti dolenti, si urinæ suppressio sit renalis, remibus; si vesicalis, regioni pubis; necnon etiam perineo admoveatur.

Cēpa alba sub cineribus assata & cum butyro insalfo in cathaplasmatibus formam redacta hæmorrhoidum dolorem sedat & tumorem discutit, narrante Riverio. Suppositoria ex Cēpa parata hæmorrhoides aperiant.

Cēpa Alcalonica & Alcalonia *Obsionorum*: Cēpa Alcalonica *Matthioli*. 556. *Inst. R. H.* 382. Cēpa Alcalonica sive fissilis *J. B.* 2. 551. vulgo: *Echalottes*.

Plures simul conjunctos bulbos nuce avellana paulo majores, ab uno radicum fibrosarum cespite prodeuntes habet, sapore Cēpæ vulgaris admodum acri, haud tamen ingrato, ex quibus folia exeunt tenuia, fistulosa, teretia, glabra, eodem sapore prædita. Seritur in hortis olitorius ad ciborum condimenta.

Analysi chymica, bulborum recentium a tunicis mundatorum per retortam distillatorum *℔v.* præbuerunt humoris limpidi, odoris sapidi, obscure alcalici, obscure salsi, ut tandem subacidi *℔ij.* *℥ij.* humoris primo limpidi, deinde rufescentis, ejusdem odoris & saporis, acidi & subausteri *℔ij.* *℥iij.* *℥v.* gr. vi. humoris rasi, sale volatili copioso imprægnati *℥ij.* salis volatilis urinosi concreti *℥j.* gr. xxxvj. olei ipsi ad instar extracti *℥v.* Massa nigra in retorta residua pendebat *℥vij.* *℥vj.* gr. xlvij. quæ calcinata reliquit cinerum *℥j.* gr. lx. ex quibus lixivio salis fixi partem alcalici *℥iij.* extractæ sunt. Partium jactura in distillatione fuit *℥iij.* *℥v.* gr. liij. in calcinatione *℥vj.* *℥iij.* gr. lx.

Cēpæ Alcalonicæ sale ammoniacalem continent oleo crasso conjunctum & cum spiritu quodam acri tenui conjunctum. Major terræ copia in illis quam in Cēpa vulgari reperitur.

Eadem præstare dicuntur quæ cætera Cēparum genera: Cibi appetentiam excitant. Ab illis qui sitim quærunt summe prædicantur. Vermes intestinorum earum etia necari vulgo creditur. At iidem ac Cēpæ vitii obnoxii sunt.

Cēpula & Cēpa fissilis *Obsionorum*: Cēpa fissilis *Matthioli Lugd.* 1539. *J. R. H.* 382. vulgo, *Giboule*.

Facie tota Alcalonicam refert, nisi quod omnibus suis partibus major spectatur. Bulbi plures ab una tantum radicum coma oriuntur longa tenuique cervice nitentes, Alcalonicæ modo, sed aetidine differentes. In hortis olitorius feritur.

Analysi chymica, ex Cēpularum recentium per retortam distillatarum *℔v.* prodierunt humoris limpidi primo plantæ contusæ odorem & sorem referentis, deinde saporis & odoris debitoris, obscure salsi, obscure acidi & ob-

& obſcure urinoſi lbij. 3vj. gr. xij. humoriſ limpidi ejuſdem odoris & ſaporis debilis, deinde manifeſte acidi, ac tandem auſteri lbj. 3xj. 3iiij. humoriſ ruſceſcentis empyreumatici, ſale volatili urinoſo copioſoſe imprægnati & obſcure acidi 3v. gr. ix. ſaliſ volatiliſ urinoſi concreti 3j. gr. xij olei adipoſi 3vj. gr. l. Maſſa nigra in retorta reſidua pendebat 3j. 3iiij. gr. xlvij. quæ calcinata reliquit cinerum 3vij. gr. xvij. ex quibus ſaliſ fixi mere alcali 3ij. gran. xxvij. lixivio ſunt extracta. Parium jaſtura in diſtillatione fuit 3v. gr. xiiij. in calcinatione 3iiij. gr. xxx.

Cepula ſale ammoniacali & tenuj ſpiritu donatur.

Ea omnia, poteſt, quæ cætera Ceparum genera. Folia minutim incifa pro olere uſurpantur.

Cruda Acetariis admicentur ad ſaporem acutum communicandum; item ſaliſtiſ piſcibus & carnibus bubuliſ. Cocta vero placent in aliis eſculentis ut ovis frixiſ. In ventriculo difficile coquantur, & comedentibus tædium eſt ex eorum halitu & ructibus ingratiſ quos pariunt.

CERASUS.

Plarimæ ſunt arborum, quæ Ceraſia vel Ceraſa proferunt; varietates ex fructu poſſimum forma, colore, & ſapore & magnitudine deſumptæ. Aliæ tamen ſativæ ſunt. aliæ ſylveſtreſ, quæ etiam ratione habitus totiuſ arboriſ aliquantiſper variant. Diſtinguantur pomi figura turbinatiore, longiore, rotundiore, cordiſ etiam figura, alia pediculo longiore, alia breviori, ſinguliſ vel pluribuſ una coeunibuſ. Diſtinguuntur etiam colore albo, ſed rariuſ, partim rubro, partim candicante, quædam pallide rubente, quædam plane cereo, alia rubro, ruſceſcente, nigricante, nigro, & quædam etiam nigerrimo & ſucco ſanguineo labia & manus inſiciente. Diſtinguantur quoque ſapore dulci, acido, auſtero, & ex dulci acido admixto: nonnulla amaritudiniſ quid retinent; alia nimia ſua dulcedine ſatiſtium pariunt; alia ob nimium acoreſm reſpuuntur; alia ob aquei ſucci redundantiã inſipida ſunt: ſimiliſter alia carne ſunt prædura; alia carne molliore & teneriore ſive aquoſa conſtant, & in quibuſdam caro pertinaciuſ adhæret nucleo qui in aliis fragilior & medulla non inſuavi eſt.

Ex hiſ apud noi poſſimum veniunt in uſum Ceraſa acida & vulgariæ, *les Ceriſes ordinaires*; Ceraſa ſativa majora Agronia nonnulliſ, *les Griſettes*; Ceraſa duracena, *les Bigarreaux*; Ceraſa aquea, *les Guignes*; Ceraſa nigra, *les Meriſes* ou *Ceriſes noires*.

Ceraſia acida & vulgariæ fructuſ ſunt arboriſ, quæ dicitur Ceraſuſ ſativa, fructu rotundo, rubro & acido *Iuſt. R. H. 625. Ceraſa ſativa, rotunda, rubra & acida, quæ noſtriſ Ceraſa ſativa C. B. P. 449. Ceraſia ſativa Tab. Icon. 985. vulgo, Ceriſer.*

Arbor eſt haud proceræ nec rectæ, multis brachiata ramis fragilibuſ, caudice mediocriter craſſo, cortice e puniceo nigricante, ligni mæſeicentiuſ ſubnigricante, ad circumferentiã ſubalbida; ſoliſ magniſ, oblongiſ, venoſiſ; ambitu crenatiſ, cæteriſ ſpeciebuſ minoribuſ magniſque rotundiſ. Floreſ pro-

fert

fert rosaceo, plurimis scilicet petalis albidis in orbem positis & aliquot staminibus concoloribus mediis constantes, ex quorum calyce in quinque segmenta recurva diviso surgit pistillum quod abit in fructum longis & tenuibus pediculis adhaerentem, subrotundum, carnosum, carne non admodum dura vel compacta, sed succosa, sapore dum bene maturuit grato, non nimium acido sed quodammodo vinoso: in carnis medietate officulum continetur lignosum, durum, cum nucleo amaricante haud ingrato. Gummi ex se fundit lucidum, flavescens, insipidum & inodorum. In hortis colitur & magna est harumce arborum copia in valle Montmorency.

Analysi chymica, ex carnis Cerasorum maturorum ab officulis separatæ. ℞v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, odoris & saporis expertis, obscure subsalsi ℞j. gr. xxiii. humoris limpidi, sapore aliquantisper subamaricantis, nucleorum Cerasi contusorum amarorem leviter referentis, obscure subacidi ℞j. ℞iij. ℞vij. gr. xxxvj. humoris primo subacidi, subausteri, deinde manifeste acidi, subausteri & amaricantis ℞j. ℞j. ℞vj. gr. xxx. humoris rufescentis, acidi & salis ℞j. ℞j. olei spissi ad instar syrupi ℞j. gr. xxxvj. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℞iij. gr. xxxvj. quæ calcinata reliquit cinerum ℞iij. gr. xlij. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℞j. gr. lvj. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℞j. ℞iij. gr. liiij. in calcinatione ℞iij. ℞iij. gr. lxxvj.

Liquor ex Cerasis expressus & rite fermentatus vinosum præbet liquorem non ingratum, licet non admodum spirituosum ob magnam phlegmatis copiam quo salia & sulphura diluuntur.

Cerasa sativa majora, Agriotta nonnullis, fructus sunt arboris quæ dicitur, Cerasus sativa fructu majore *Inst. R. H.* 625. Cerasa sativa majora C. B. P. 449. Cerasa acida rubella J. B. 1. 221. Cerasa hispanica *Tabern. Icon.* 984. vulgo, *Griottier*.

Arbor est priori haud dissimilis, humilior multo, quarum & minimæ atque ideo paucorum annorum fructum ferre consueverunt. Fructus brevi pendet pediculo, & quam reliquorum fere crassiore. In hortis, pomariis & campis colitur.

Cerasa inter fructus horarios maxime commendantur. Acida corpori succum alibilem tenuem sed laudabilem suppeditant, sitim sedans, humorem biliosum fervidiorem contemperant & jecoris insarctus tollunt. Febrecitantibus utilia censentur & dicitur vulgo febres apud plebem desinere statim atque Cerasa matura fiunt. Bene matura recentia ventrem subducunt, viridia diarrhæas excitant, siccata vero sistunt.

Cerasorum succus aqua dilutus & saccharo edulcatus potum præbet diebus æstivis refrigerantem & stomacho gratum & febricitantibus utilem. Cerasa coquantur ex aqua cum tantillo sacchari: Et esca est non modo sanis per jucunda, sed etiam ægrotantibus & convalescentibus biliosis præsertim perutilis: sapore enim dulci & subacido languentem ventriculum excitat & ciborum appetentiam promovet. Majori vero sacchari copia condita, ut per longum tempus servari queant, secundas mensas subeunt & inter præstantissima dulciaria habentur: nec adeo facile in ventriculo debiliori corrumpuntur ut cruda, imo ventriculum roborant ac firmant.

Qui-

Quibus ventriculus debilior est, aut acidis scatet humoribus, qui diarrhæis obnoxii sunt, ab his fructibus abstinere debent, qui facillime acescunt & alvi profluvia provocant. Cerasa acida sole vel furno exsiccata febricitantibus masticanda conceduntur ad sitis ardorem extinguendam eorumque os refrigerandum. Eorundem decoctum in hypochondriorum affectu summopere valere, imo hoc unico remedio complures convalescere liquido asseverare non veretur Fernelius, *Consl. 43. ad D. de Merigni*.

Ex Cerasis potiones fermentatæ a nonnullis conscribuntur quæ vinum mentiuntur. Si cum carne nuclei contusi fermentescant, vis lithontripica his vinis tribuitur. Ex iisdem vinis spiritus ardens distillationis ope extrahitur qui cum nucleis Cerasorum contusis maceratus blando suo amaro-re palato & ventriculo non est ingratus.

Nucleis Cerasorum vis diuretica ascribitur; unde utiles censentur in nephritide & urinæ suppressione, ad renes ab arenulis & mucagine liberandos. Ex his emulsiones præparantur. Quin etiam oleum ex his nucleis expressum contra eosdem nephriticos affectus a quibusdam commendatur.

Gummi ex arboribus distillans ad eadem valet quibus Gummi arabicum conducit, insuper vi lithontripica donatum censetur. At perperam hæc vis illi tribuitur, siquidem nullum adhuc medicamentum hæc virtute donatum novimus. Revera urinæ ardores demulcere valet mucosis suis partibus urinæ salia involvendo, & urinarias vias magis lubricas efficiendo, sicque urinæ aut mucaginis aut arenularum excretionem faciliorem & se-licio-rem efficit.

Cerasa Duracena fructus sunt arboris quæ dicitur Cerasus major, fructu magno cordato *Raii Hist. 1538. Inf. R. H. 626*. Cerasa crassa, carne dura *C. B. P. 450*. Cerasa duracena, oblonga *J. B. 2. 221*. Cerasia *Pliniana Tabern. Icon. 985*, vulgo, *Bigarotieri*.

Hujus arboris folia majora sunt quam Cerasi vulgaris acidi, ad Castanæ folia quodammodo accedentia, deorsum fere dependentia. Fructus magnus est, oblongus, ad cordis figuram aliquatenus accedens, carne dura solidaque, dulci, coloris ex albo rubelli, nucleo magno. Hæc arbor in hortis satis frequens est: variat fructus colore rubro, albo, nigricante.

Analyti chymica, carnis Duracenorum a nucleis separatæ lbv. per retortam distillatæ, præbuerunt humoris, odoris & saporis expertis, obscure salsi & obscure alcali ℥iij. ℥vij. gr. xlij. humoris limpidi fere inspidi & inodori, obscure acidi ℥ij. ℥viij. ℥iiij. humoris primo limpidi sub finem rufescentis, manifeste acidi, austeri ℥ij. ℥viij. ℥ij. gr. xij. humoris rufescentis, sale volacili urinoso imprægnati ℥ij. gr. xxxvj. olei spissi ad instar extracti ℥ij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥iiij. ℥vj. calcinata reliquit cinerum rufescentium ℥iiij. gr. xlviij. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥ij. gr. xxiiij. sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥iiij. ℥j. gr. liiij. in calcinatione ℥iiij. ℥ij. gr. xxiiij. Duracena itaque sale tartareo multo oleo crasso implicito donantur.

Duracena matura ut plurimum vermibus scatent & facile putrescentia sunt; in ventriculo difficile coquantur, viscidos humores & putrefactioni obnoxios in ventre generant, qui, cum per intestina tardius descendant, facile corrumpuntur & vermium generationem promovent: idcirco ab illis

illis quorum ventriculus imbecillior est, quorum viscera glutinosis humoribus infarcta sunt, rejici debent.

Cerasa Aquea fructus sunt arboris quæ dicitur Cerasus fructu aquoso *Inst. R. H. 626. Cerasa carne tenera & aquosa C. B. P. 450. Cerasia aquea Tabern. Icon. 986. vulgo, Guignier.*

A priori tantum differunt fructu molliori, magis succoso & obscurius rubente.

Analysin chymica, minorem olei portionem quam Duracena suppeditant; unde liquet, sale essentiali tartareo donari multo phlegmate diluto.

Cerasa aquea non adeo ventriculum gravant ut Duracena & facilius digeruntur, sed facilius corrumpuntur quam acida Cerasa.

Cerasa Nigra fructus sunt arboris quæ nuncupatur Cerasus major ac sylvestris fructu subdulci, nigro colore insciente *C. B. P. 450. Cerasus sylvestris fructu nigro J. B. 1. 220. Cerasia nigra Tabern. Icon. 986. vulgo, Merisier.*

Arbor est procera, caudice recto, cortice exteriori spadiceo aut cinereo, maculoso, lævi, interiori virenti, materie firma subrusa, foliis oblongis Pruni foliis longioribus, dense crenatis, splendidis, subamaris. Flores ex eadem quasi vagina plures simul juncti, ex pediculis tenuibus, longis, nonnihil rubentibus pendent cæterorum similes, quibus succedunt fructus rotundi fere, parvi, carne pauca, dulci, aliquantisper amaricante, haud ingrata, succo nigro colore insciente.

Cerasa nigra in morbis capitis, epilepsia, apoplexia; paralyti peculiari-ter proficua censetur. Fructus recentes comedendi offeruntur: vel aqua ex his fructibus non fermentatis distillata exhibetur, vel etiam aqua spirituosâ præparatur, sive recentes fructus cum nucleis contusos vino generoso irrorando & distillando, sive eorum succum expressum novis Cerasis contusis affundendo & rite fermentando donec vinosum saporem adipiscatur, & inde spiritum ardentem distillando. *P. Joan. Faber in balbutie & aliis loquelæ vitiis os hoc spiritu sæpius lavari commendat. Ch. Keslerus in sua Chymia c. de fructibus*, assertit, quemdam apoplecticum, qui loqui non poterat, spiritu Cerasorum hausto loquelam recuperavisse. *J. Rauts* refert, Cerasorum nigrorum aquam stillatitiam valde celebrari, & in frequenti usu esse apud Anglicas Matronas ad motus convulsivos præcipue infantium. In febribus malignis ad motus convulsivos compescendos sæpe a Medicis apud Anglos præscribitur.

℞. Sp. Cerasor. nigrorum, aquæ flor. Lilie ana ℥iij. pulver. de Gut-teta ʒß. M. F. potio. Sumat æger cochlear unum alterumve singulis bivoris. In convulsion. infantum, in epilepsia & paralyti.

Cerasa nigra usurpantur in aq. Cerasor. nigror. comp. *Ph. Batcana*, in aq. paralytica & apoplectica *Ph. Reg.*

C E T E R A C H.

Ceterach, Asplenium, Scolopendrium sive Scolopendria, *Offic. Asplenium sive Ceterach J. B. 3. 749. Ceterach Officinarium C. B. P. 354. Asplenium Dod. Pempt. 468. vulgo, Ceterac.*

Radibus est capillaribus & nigricantibus, ex quibus plurima folia in orbem

orbem sparsa oriuntur tres uncias longa, semiunciam circiter lata, sinuatæ & undulata fere ad costam, superne glabra & viridia, inferne squammulis obducta inter quas erumpunt acervuli capsularum sphaëricarum annulo elastica vi donato munitarum, cujus contractione rumpuntur, seminaque fundunt aurea minutissima. Delectatur maceris & rupibus. In agro Parisiensi sponte nascitur.

Analysi chymica, ex Asplenii foliis plurimum educitur phlegmatis acidi & aucteri, non medicoris olei & terræ portio, parum vero soliditus urinosi. Saporem præbet herbaceum, mucaginosum, aliquantisper asperum seu adstringentem.

Itaque Asplenium mucagine sua humores acres demulcet, adstrictione vero partes roborat, viscerum tonum laxum firmat. Sic expectorationem promover, cæterasque functiones in visceribus restituit. Unde Asplenium pectorale & aperiens habetur. In tussi, asthma, ictero, liene tumido, urinæ suppressione conducit in vino maceratum vel in aqua aut juleulis decoctum. In liene tumido juvat præcipue, non quod splenem absumat ut quidam falsò reputant unde Asplenium dici volunt, sed quod spleni ut cæteris obstructis visceribus ferat opem. In cruenta exspuitione & alvi fluxu creditur prodesse: sed debiliior est illius adstrictio, unde his in affectionibus parum levaminis affert.

Tradit Matthiolus aurei illius pulveris qui invenitur in aversa foliorum parte ʒi. cum albi Succini farinæ ʒß. ex succo Portulacæ aut Plantaginis potam gonorrhæa laborantes mirifice juvare.

Schroderus refert Asplenii folia externe admota mundificare vulnera ac ulcera.

Cæterach cum cæteris plantis Capillaribus in decoctis & juleulis sæpius usurpatur.

Usurpatur quoque in syrupo Capillorum veneris, *Renaudai*.

C H Æ R O P H Y L L U M.

Chærophyllum, Chærephyllon, Chærefolium, Cerefolium, & Gingidium, *Off.* Chærophyllum sativum *C. B. P.* 152. *Inf.* *R. H.* 314. Chærephyllon *J. B.* 3. p. 2. 75. Chærefolium *Dod. Pempt.* 700. Cerefolium *Matthiol*: Gingidium *Fuchs*: vulgo, *Cerfeuil*.

Radice est singulari, alba, fibratâ, subacri: caule sesquicubitali, tereti, striato, inani, geniculis longius distantibus nodoso, glabro & ramoso: foliis Cicutæ similibus sed minoribus, tenuioribus & dilute rubentibus, pediculis sæpe rubentibus, nonnihil hirsutis, saporis & odoris aromatici, Flores summis ramis insident umbellatim digesti, rosacei, e quinque petalis albis, inæqualibus, cordatis, in orbem positis, totidemque staminibus albis compositi, cum calyce abeunte in duo semina oblonga, hinc gibba, inde plana, glabra, per maturitatem nigricantia, rostro aviculæ similia, sapore dulci aromatico. Crescit in hortis, in quibus seritur singulis mensibus ut tenerius sit.

Analysi chymica, ex Chærophylli soliorum & caulicor. ℥v. per B. V. distillatis prodierunt humoris limpidi, odore & sapore Chærophyllum referentis, subtili & obscure acidi ℥ij. ʒxj. humoris manifeste acidi, deinde austeri

Asteri ℞ij. ℥vij. ℥j. gr. lx. Massa residua in alambice exsiccata pendebat ℥xij. quæ per retortam distillata præbuit humoris rufi, epyreumatici, manifeste acidi, subfalsi, austri, & obscure alcali urinosi ℥j. ℥v. gr. lvij. humoris, & fufci, sale alcali urinoso copioso imprægnati ℥ij. gr. xxiiij. salis volatilis urinosi concreti gr. x. olei syrupi ad instar spissi ℥j. ℥vj. Massa nigra in retorta superflua pendebat ℥iiij. ℥ij. gr. xxxvj. quæ per quindecim horas in crucibulo calcinata reliquit cinerum leucoph. ℥j. ℥vij. gr. lx. ex quibus lixivio salis alcali fixi ℥vj. gr. xlvj. extracta sunt. Partium jadura in distillationibus suis ℥iiij. ℥vj. gr. xxvij. in calcinatione ℥ij. ℥ij. gr. xlvij.

Chærophyllum recens odorem herbaceum tenuem ac blandum spargit, saporemque refert subacrem, aromaticum cum quadam adstrictione; nec ingratum: exsiccatum super prunas candentes projectum fulgurationes quasdam nitrosas emitit: unde concludendum est, illud sale essentiali ammoniacali nitroso donari cum oleo subacri aromatico copioso conjuncto.

Olus est familiare suaveolens, & sapidum, ori proinde, & ventriculo gratum. Estur crudum cum aliis herbis in acetanis; dissectum etiam brodia incoquitur solum vel cum aliis oleribus, & eaque palato gratiora reddit: sed propter partium tenuitatem diurnam coctionem ferre nequit. Incidit, attenuat, aperit, urinam movet, menses evocat, calculos pellit, viscerum obstructions recludit, cutaneis affectibus medetur, chronicis morbis opitulatur, grumos sanguinis ex casu vel idu collectos egregie resolvit, tum interne tum externe adhibitur. Succus ex herba recente contusa exprimitur, & levi ebullitione defœcatur: vel herba in vase fictili inclusa furni calentis calori exponitur, deinde succus cum expressione extrahitur. Ad ℥ij. quatuorve propinatur reiterando si opus sit tertia vel quarta quaque hora. Decoquitur etiam in aqua, & decoctum ad ℥v. vel vj. hauritur. A nonnullis infunditur in vino. Ejus succum solum vel cum nitro defœcato, & syrupo de 5. radicibus aperientibus quarta quaque hora assidue sumptum in qualibet hydropisi maxime proficuum expertus sum. Hydropicorum enim urinas fere suppressas restituit, turbidas, & fœculentas defœcati, ardentes, & igneas pallidiores reddit. Diureticum est blandum, nequaquam irritans, imo inflammationes compescens, & sedans. Hoc si medicamento non curetur hydrops, vix alio sanabitur modo. Idcirco illud specificum antihydropicum censeo. Observandum est tamen *Chærophyllum* sale nitroso donari; cujus ope suos effectus exerit, & iidem vitis obnoxium esse; quæ in nitro deprehenduntur. Siquidem ex largio, & diuturniori illius usu tussis excitatur; quapropter tussientibus non adeo convenit utrumque; nec cruenta expuentibus, nisi cum cautione præscribenda sunt. In epozematibus aut jusculis carnum cum aliis herbis, Cancris fluviatilibus, salibus aut aliis medicamentis idoneis incoquitur, præsertim vere novo; humorum enim ferociam, & impetum compescit. Dolens succum *Chærophylli* aut ejus aquam distillatam terque super novam plantam cohabitam sæpius epotam tanquam specificam contra vertiginem commendat. Idem succus febres intermittentes sæpe profigavit copioso sudore prolicito ad ℥vj. epotus paulo ante paroxysmum, & a nonnullis in pleuritide ad sudorem excitandum præscribitur.

Extrinfecus in urinæ suppressione Simon Paulli-ufum Chærophylly, Parietariz & Petroselin in butyro-insulfo simul frictorum, & pectini calide applicatorum proponit. Ettmüllerus ejus decoctum ad dolores internos post partum cedandos, si ex retentione sanguinis grumosi orientur, plurimum valere afferit. Idem decoctum solum vel cum tantillo aquæ viæ inflammationes, & vitia cutis erysipelatoſa demulcet, & mundat. Herba contusa hæmorrhoides cæcæ sanat podici calide appoſita.

2℥. Chærophylly recenter collecti M. vj. carnis vitulinæ valeolarum ſectæ ℞j. Stratum ſuper ſtratum diſponantur in olla ſicili, addendo ſalis Prunell. ℥j. Olla operculo accurate obturata bulliat in carabo aqua repleto per horas quatuor vel quinque. Tunc ſuccus exprimitur, & ad ℥vj. propinetur quarta quaque hora in hydropo. Vel

2℥. Succu Chærophylly defœcati ℥xij. Quo dilue Nitri pori ℥℔. Syr. de ꝑ. rad. aper. ℥ij. Dividatur in quatuor doſes quarta quaque hora ſumendas.

Aqua Charophylli diſtillata ſervatur in Officinis.

C H A M E D R Y S.

Chamædryſ; Off. Chamædryſ minor repens, C. B. P. 248. Chamædryſ repens minor, Dod. Pempt. 43. Chamædryſ vulgaris ſive 2. Cluſ. Hiſt. 35r. Triſſago, Trixago, Quercula Calamandrina, Germanor. vulgo, Germundræe, petit Chene, Chenette.

Radicebꝯ miſe repti fibroſi in ſylvofiſ, caules hinc inde ſpargens ſupinos, quadrangulos, ramoſos, dodrantales, lanuginoſos, in quibꝯ folia bina ex adverſo naſcuntur læve virentia, ſemiunciam longa, duas aut tres lineas lata, baſi anguſta, a media parte ad extremam uſque crenatâ, & amara, aliquântiſper aromatica. In eorum aliſ ſtores naſcuntur monopetali, labiati, purpoſcentes, labio ſuperiori carentes, cujuſ loco ſtamina gerunt incurva cum piſtillo bicorni. Labium inferius præter cervicem in duas appendices acutas abeantem trilobatum eſt. Calyx monoromoſ, cyrtiniſormiſ, & quinquidꝯ quaterna ſemina ſubrotunda continet e piſtillo nata. Folia, & ſtores in uſum veniunt. In ſylva Bononiendiſ agri Papiſienſiſ ſponte naſcitur.

Analyſi chymica, ex hujꝯ plantæ floridæ recentis ℞iij. & ℥x. per retortam diſtillatiſ prodierunt humoris limpidi, ſere inodori, ſubacidi ℥xij. ℥j. humoris manifeſte acidi, ſub ſuam auſteri ℞ij. ℥v. ℥v. gr. xvij. humoris ruſi, empyreumatici, intente acidi, auſteri, ſubſali, deinde tum acidi, tum alcali, & ſale volatili urinoſo imprægnati ℥vj. gr. xlvij. olei adipoſi ℥iij. ℥j. gr. xxiiij. Maſſa nigra in retorta ſuperſiteſ pendebat ℥æ. gr. xvij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥j. gr. xxxv. eaqꝯ quibꝯ lixivio, ſaliſ fixi mere alcali ℥iij. gr. liij. ſunt extracta. Partium jactura in diſtillatione fuit ℥iij. ℥vj. gr. xxxvj. in calcinatione ℥vij. ℥vj. gr. liij.

Hujꝯ plantæ folia amara ſunt, & ſubaromatica. Chartæ caruleæ colorem ruſſo modo mutant. Salem eſſentialens continere videntur ſali mirabili Glauberi ſimilem cum ammoniacali conjunctum, & multo oleo aromatico involutum.

Hu-

Humores crassos, & tenaces incidit, attenuat, laxiorem partium soliditatem tonum firmat, & roborat, urinam, & sudorem potenter movet. Intus assumpta confert in viscerum obstructionibus, ictero, tumoribus lienis, mensium suppressione, febribus contumacibus, hydropse incipiente, scorbuto, & arthritide. Matthioli asserit eam in pestilentia juvare, lumbricos necare, & capitis affectibus frigidis mederi. J. Rajos scribit hanc plantam in agro Cantabrigiensi Theriacam Anglicam nuncupari, procul dubio quia alexipharmaca censetur.

Vesalius in *Epistola de china*, narrat decoctum Chamædryos fuisse commendatum a Medicis Genuensibus Carolo quinto Imperatori pro perpetuo podagræ auxilio, facto decocto sive ex vino, sive ex aqua stillataria. Experientiarum qui vult, inquit C. Hoffmann, eam tamen utiliter decoctis aperientibus utiliter admisceri annuit, & J. Rajus refert in Anglia apud mulierculas idem decoctum creberrime esse usum in mensium suppressione. Idem profert quendam celebrem ob scrophularum curationem exhibuisse decoctionem Chamædryos in vini albi ℥ij , ad ℥ij consumptionem, & sumebat æger cochlearia vi. mane & vespere per mensem. Eius summitates infusæ in modum Theæ ad P. j. aut ij usurpantur in morbis chronicis & viscerum obstructionibus. Ejus pulvis ad ʒj exhibetur, & celebratur apud Ægyptios adversus febres intermittentes, referente Alpino *De Med. Ægypt.* fol. 146. 147. Multi rustici curant febres quartanas ejus pulvere sumpto in jussulis per aliquot dies. Adversus febres contumaces D. Chomel infusum Chamædryos, & Centaurii minoris in vino commendat.

Ejusdem plantæ extractum in Officinis conficitur ad eisdem affectus utile. Exhibetur ad ʒj .

ʒl . Chamædryos, & Centaurii minor. pulverator. ana ʒss . Infunde per noctem in vini generosi cyatho uno. Hauriat æger ante paroxysmum in febribus intermittentibus.

Usurpatur in Theriaca *Andromachi*, hiera *Diacolocynthidos*, syrup. de *Arthemisia Rbasi*, syrup. Chamædryos *Bauderon*, syrupo *Hydragogo*, & aperiente cachectico *Pharm. Regiæ*, Pulvere arthritico *Comiti Mirandolani*, Oleo *Scorpionum* composito *Matthioli*, Ung. *Martiano*, Unguento mundificativo de Apio.

CHAMÆMELUM.

TRes Chamæmeli species in usum medicum veniunt, scilicet Chamæmelum vulgare, Chamæmelum odoratum & Chamæmelum fœtidum.

Chamæmelum vulgare, Chamomilla, *Off.* Chamæmelum vulgare, *Leucanthemum Diofcor. C. B. P.* 135. *Inst. R. H.* 494. Chamæmelum vulgare, amarum *J. B.* 3. 116. Chamæmelum vulgare *Dodon. Pempt.* 257. *Anthemis Matthioli. Cord.* Chamæmelum *Parthenii* 3. species, *Brunfelsii*: vulgo, *Camomille*.

Radicibus est tenuibus, fibrosis, cauleculis tenuibus in alas multas divisis, dodrantalibus aut altioribus: foliis tenuissimis, & dissectis, numerosis. Flores in summis caulibus, & ramulis singulares pediculis prælongis insident radiati, quorum discus ex plurimis flocculis aureis, corona vero ex semiblocculis candidis componitur embryonibus insidentibus, & calyce

sqummofo comprehenfis. Embryones autem abeunt in femina tenuia, oblonga, pappo deftituta, & thalamo infixa. Tota planta odorem fpirat medicatum non adeo ingratum. In agro Parifienfi fponfe nafcitur.

Chamæmelum odoratum, Chamæmelum Romanum, Chamæmelum nobile, Chamomilla Romana odorata, *Off.* Chamæmelum nobile five Leucanthemum odoratius *C. B. P.* 135. *Inft. R. H.* 494. Chamæmelum odoratifimum repens, flore fimplici *J. B.* 3. 118. Chamæmelum odoratum *Dodon. Pempt.* 260. vulgo, *Camomille Romaine*.

Ex radice fibrofa caules profert multos non erectos fed procumbentes, & quafi per terram repentes, folia ut Chamæmeli vulgaris fed majora, & virentiora, flores quoque fimiles. Referunt folia, & flores pergratum ac jucundum cum gravitate quadam odorem, aromaticum. In hortis colitur.

Eft & hujus generis quoddam, femiofculos candidos medium floris ambientes deniffime multiplicans, luteis fofculis in angulum orbem coactis, quod odore & forma præcedenti per omnia fimile alias eft. Dicitur Chamæmelum nobile flore multiplici, *C. B. P.* 135. & *Inft. R. H.* 494.

Chamæmelum fœtidum, Corula fœtida, *Off.* Chamæmelum fœtidum, *C. B. P.* 135. *Inft. R. H.* 494. Chamæmelum fœtidum five Cotula fœtida, *J. B.* 3. 120. Cotula alba, *Dodon. Pempt.* 258. Buphtalmum minus, *Corai*: Parthenium, *Fuchifii*: vulgo, *Camomille puante*, ou *Marouste*.

Ex fibrôfis radicibus caules promittit rotundos, virentes, fragiles, & succulentos, in alas multas divifos: craffiores, & altiores quam Chamæmeli vulgaris, folia fimiliter ampliora in virore nigricantia, flores forma & colore fimiles. Fœtet herba tota, gravemque fpirat odorem. Nafcitur fponfe in agro Parifienfi.

Analylis chymica, Chamæmelum vulgare præter phlegma acidum copiofum, non mediocrem olei tum tenuis feu effentialis, tum craffi, ficut & fpiritus urinoſi quantitatem, & aliquantulum falis volatilis urinoſi concreti fuppeditat. Præterea fucco ſuo chartæ cærulæ rubrum colorem conciliat, & aromaticum eft amarumque. Salem igitur effentialem continet ammoniacalem acido ſaturatum, & ſulphure copiofo tum tenui, tum craſſo involutum. Chamæmelum odoratum multo plus olei effentialis poſſidet. Fœtidum vero Chamæmelum odorem quaſi bituminofum ſpargit. Chartam cæruleam rubro colore leviter admodum tingit, ac proinde fale gaudet effentiali ammoniacali cum multo oleo craſſo ac fœtido implicito.

Utriuſque Chamæmeli, ſcilicet vulgaris, & odorati, floridæ ſummitates, & folia uſurpantur. Digerunt, laxant, molliunt, ſtatus diſcutiunt, dolores mitigant, & nervoſis partibus utiliſſima deprehenduntur. Romanum potentius calefacit, & attenuat, digerit, & rarefacit, remiſſius vero emollit, & dolores mitigat quam vulgare. Utriuſque uſus eſt inſignis in dolore colico ſtultento, in cruciatibus ſpaſmodicis, & convuſſionibus, cardialgia, adverſus calculum, ad febres intermittentes proſtigandas. Interne, & externe uſurpantur. Florum pulvis exhibetur ad ℥ſſ. vel ℥j. ſuccus expreſſus, & deſecatus ad ℥ij. iij. iiijve: inſuſum vel decoctum ex aqua aut vino ad ℥vj. Etmullerus in *Praxi*, p. 1. c. 9. Chamæmelum præ aliis omnibus antiſpaſmodicis

con-

commendat, adeo ut in nephritide, doloribus gravidarum, torminibus puerperarum post partum, aliisque cruciatibus mirabile sit remedium. A Simone Paulli in pleuritide ejus aqua distillata plurimum laudatur ad dolorem discutiendum, intus sumpta, & decoctum calidum in vesica fuit supra latus dolens applicatur. Ad cardialgiam a Foresto & Ettmullero ejus decoctum aut tinctura ex floribus cum spiritu Chamomillæ fermentatæ, vel cum spiritu quocumque carminativo extracta, veluti specificum valde prædicatur.

Nonnulli adversus calculum ejus decoctum propinant: Simon Paulli plurimos nephritide laborantes insigne levamen ex infuso florum Chamæmeli in vino Rhenano percepisse testatur, si præsertim in balneo Avenæ & Artemisæ federent. Illud autem infusum sic præparari jubet.

℥j. Flor. Chamæmeli vulgaris M. ij. Quibus affunde vini Rhenani, vel vini albi generosi ℔ij. Digerantur in cineribus calidis per duas horas. Infusum cum forti expressione coletur, & duobus aliorum florum Chamæmeli manipulis affundatur. Digerantur iterum super cineres calidos per totidem horas: fiat fortis expressio novis adhuc floribus affundenda & pro tertia vice maceranda eodem modo: tandem bulliant leviter & hoc decoctum ultimo coletur. Hujus decocti duo vel tria cochlearia sumat æger cum haustulo vini calido permixta. Sic non tantum mitescunt gravissima nephritica symptomata, sed etiam calculi nonnunquam ejiciebantur.

Hoc infusum adeo salum gustu deprehenditur, inquit S. Paulli, ut si quis degustaret inscius, pugillos aliquot salis culinarii in eo esse liquefactos asseveraret.

A veteribus & neotericis vis febrifuga Chamæmeli valde prædicatur: Richard. Morton refert, febres intermittentes rebelles & Cortici Peruviano haud cedentes pulvere florum Chamæmeli ad ℥j. vel solo exhibitum, vel cum sale Abiynthio & Diaphoretico minerali permixto feliciter curatas fuisse. J. Rajus succi Chamæmeli cochlearia duo vel tria cum guttulis aliquot spiritus Vitrioli in juscule exhibita in febre quacumque intermittente paulo ante accessum instantem paroxysmum sæpe avertere & febrem ipsam sanare scribit. Ejusdem decoctum vel aquam distillatam ad ℥vj. propinatam idem præstare Riverius asserit. Hujus plantæ infusum vel decoctum, annorante Rajo, ad scrophulas felici cum successu propinantur. Forestus decocto florum Chamæmeli & lacte bubulo senem dysuria laborantem curasse testatur.

℥j. Decocti Chamæmeli ℥vj. Syrup. Menth. ʒi. Sp. carminativ. Sylv. ʒ℥. M. F. julapium in colica flatulenta propinandum.

℥j. Flor. Chamæmel. subtilissim. pulverator. ℥j. Diaphor. miner. & sal. Abiynth. ana ℥℥. M. F. pulvis sumendus in haustu vini aut alio liquore idoneo, vel in formam boli cum syrup. Caryophyllor. hortens. q. s. redactus, sexta quaque hora per biddum vel triduum reiterandus.

Externe hæc planta in fomentis & cataplasmatibus emollientibus, res solventibus ac demulcentibus, vel sola, vel cum Melitoto consociata usurpatur. In clysteribus ad intestinorum dolores sedandos, quacumque ex causa procedant, magnopere conducit. Ad duritiem mammarum ex lactis coagulatione, ejus decocto pars affecta lavetur bis die & superponatur

cataplasma ex summitatibus Chamæmeli, foliis Eulæ, Marrubii & semine Lini confusus & axungie permixtis ad emplastri consistentiam.

Oleum Chamæmelinum duplex in Officinis deprehenditur, scilicet vulgatissimum quod per infusionem, alterum elegantissimum quod per vesicam arte chymica paratur, coloris cœrulei elegantia & amœnitate ipsi saphyro non cedens. Primum tumores duros emollit & dissipat, dolores sedat, lassitudinem spontaneam tollit. Idem quoque clysteribus admiscetur, ut omnis generis dolores infimi ventris in utroque sexu leniat & compescat.

Posterior oleum arte chymica ex Chamæmeli Romani floribus calidioribus præsertim in regionibus collectis elicatum & eorum dotibus instructum, illis qui decoctum florum Chamæmeli fastidiunt, cum tantillo Sacchari in conveniente vehiculo contra colicos dolores & calculum propinatum ad guttas aliquot.

Observandum est cum S. Pauli hoc oleum essentiale Chamæmeli florum infuso vel decocto dotibus præstantius non esse, ut quidam volunt. Imo experientia compertum habuit quemdam nephriticum post usum olei essentialis Chamæmeli frustra tentatum tandem ejusdem plantæ infuso suprascripto sanatum fuisse. Idem auctor observat insuper post C. Hoffmannum olea essentialia stillatitia ventriculo esse infesta. Reipsa hæc olea usu diuturno & intempestivo ardorem accendunt in ventriculo & in reñibus, hepatis obstructions pariunt, sanguinem inflammant, in quibusdam suum perpetuam excitant, in aliis cachexiam biliosam, in aliis calidum hydropem inducunt. Quapropter nonnisi maxima cautione eorum usus præscribendus est, & calidis naturis atque biliosis interdicens.

℞. Radic. Alhææ, Calami aromatici ana ℥ij. folior. Malv. Calamenth. Puleg. summitatum Aneth. flor. Chamæmel. & Melilot. ana M. j. Fiat decoctum in aq. commun. q. s. ad ℔ij. addendo sub finem vini albi ℔j. Colatura foveatur abdomen tepide cum lineis crassioribus quadruplicatis, vel pannis laneis, aliquando cum spongiis dicto liquore imbutis & mutatis quoties refrixerint, vel etiam vesicis bubulis aut suillis dicto liquore semiplenis, in colicis doloribus præsertim flatulentis.

℞. Rad. Alh. & Brion. ana ℥ij. Bulbos Lilior. contusor. n. iiii. Radices mundentur & concidantur. Bulliant deinde in f. q. aq. donec insigniter mollescant. Deinde adde folior. Malvæ utriusque, Violar. Acanthi, Mercurialis ana M. j. Caricar. ping. paria vj. Coqu. omnia ad putrilaginem, deinde seraceo trajiciantur. Trajectis adde flor. Chamæmeli & radices Ireos Florentin. pulverat. ana ℥ß. Olei Lilior. ℥ij. F. cataplasma emolliens.

℞. Quatuor farinar. resolvent. ℔ij. Coquantur in lixivio leni carmen-tor. Tum remoto lixivio adde pulver. flor. Chamæmel. Meliloti, Sambuci & radic. Ireos Florentin. pulver. ana ℥ß. cum olei Chamæmelin. f. q. Fiat cataplasma resolvens.

℞. Olei Chamæmelini ℥ij. Ung. de Althæa ℥j. Fiat linimentum in pleoritide quo latus dolens illiniatur.

℞. Folior. Malv. Althææ, Violar. Flor. Chamæmeli, Melilot. Origan. ana M. j. Semin. Fœnicul. P. ij. Fiat decoct. in cujus ℔j. dissolve Diaph.

Diaph. vel Bened. laxativ. ʒi. Mellis anthosar. ʒiſſ. Fiat clyſter. ad ſtatus diſcuriendos in colicis doloribus. Addi poteſt Therebenth. vitello ovi diſſolut. ʒſſ. Olei Chamæmel. ʒij. in dolore nephritico.

Chamæmelum uſurpatur in Ung. Martiario, Empl. de Meliloto, Emplaſtro pro utero *Nicolai*, de ranis, *J. de Vigo*.

Chamæmeli ſcetidi decoctum, auctore Trago, in paſſionibus hyſtericis infeſſu, fomentis & odoratu ſaluberrimum eſt. Adeo acris eſt hæc herba, inquit Marthiolus, ut cutem exulceret alligata. Quo fit, ut qui in campis alvum exonerant, ac deinde hæc herba ſedem abſtergunt, paulo poſt intolerabili vexentur ardore.

C H A M Æ P I T Y S.

Chamæpitys ſeu Iva duplex in Officinis, ſcilicet Chamæpitys lutea vulgaris, ſeu Iva arthritica, & Chamæpitys moſchata ſeu Iva moſchata.

Chamæpitys lutea vulgaris, Iva arthritica, Arthetica, Off. Chamæpitys lutea vulgaris ſive folio trifido, C. B. P. 249. *Inſt. R. H.* 208. Chamæpitys vulgaris odorata, flore luteo, *J. B.* 3. 295. Ajuga ſive Chamæpitys mas Dioſcoridis, *Lobel. Icon.* 382. Peristerona crateræ, *Anguilar*: vulgo, *Ivette*.

Planta eſt vulgariffima in agro Pariſienſi ſponte naſcens, radice exili, fibrata, alba: caulibus ſupinis & humiſiſis, villoſis, in orbem ſparſis & dodrantalibus, in quibus folia ad nodos bina oriuntur unciam ſuperantia, triſariam laciniata, acuta, ex luteo virentia & villoſa. Flores in alis adſunt monopetali, unilabiari, lutei, labio inferiori in tres partes diviſo, quorum media biſida eſt, labii ſuperioris locum occupantibus aliquot denticulis, cum ſtaminibus dilute purpureſcentibus. Calyx clytiniformis, quinquiſidus, villoſus, quaterna ſemina includit triquetra, ſuſca, e piſtillo nata. Herba tota uſitata eſt, odore reſinam piceam aut larnignam reſert.

Analyſi chymica, ex totius plantæ floridæ lbv. per retortam diſtillatis prodierunt humoris limpidi, odoris & ſaporis aromatici, ſubacti ʒxj. gr. xxxvj. humoris primo limpidi, deinde ruſceſcentis ac tandem ruſi & ſub ſinem empyreumatici, manifeſte acidi & aſteri lbij. ʒj. ʒvij. gr. xxxvj. humoris ruſi ſale volatili urinoſo imprægnati ʒij. ʒij. gr. lx. olei craſſi adipoſi ʒj. ʒvij. gr. xij. Maſſa nigra in retorta reſidua penſebat ʒx. ʒv. gr. xj. quæ calcinata reliquit cinerum ʒv. ʒvij. ex quibus lixivio ſalis fixi ſalis ʒi. extracta fuit. Partium jaſtura in diſtillatione fuit ʒiiij. gr. lx. in calcinatione ʒiiij. ʒvj. gr. xij.

Amara eſt & aromatica hæc planta, & ſucco ſuo chartam cœruleam rubro colore inficit. Sale eſſentiali tariaceo aliquantisper aluminoso multo oleo & terra implicito inſtructa videtur.

Chamæpitys moſchata, ſeu Iva moſchata, Off. Chamæpitys moſchata, ſolis ferratis, an prima Dioſcoridis, C. B. P. 249. *I. R. H.* 208. Chamæpitys ſive Iva moſchata Monſpelienſium, *J. B.* 3. 296. Chamæpitys ſpuria prior, ſive Anthyllis altera, *Dodon. Pempt.* 47. Chamæpitys altera & major, *Ceſalp.* 456. Anthyllis Chamæpitides minor, *Lobel. Icon.* 384. Anthyllis altera, *Cluſ. Hiſt.* 166. vulgo, *Ivette moſquée*.

Humi serpit instar prioris Chamæpityos quam tenuibus sed tamen durioribus cauliculis & foliis satis refert : flos similis sed colore purpureus . Semina in singulis calycibus quaternis , nigra , crispa , sublonga , vermiculi instar aliquantulum incurva in utriculis lanuginosis . Totâ hæc herba admodum hirsuta est , sapore amaricante , odore gravi , resinoso prædita , haudquaquam grato , ad moschum nonnunquam accedente præsertim diebus æstivis & calidis in regionibus , ut observat D. Garidel in *Historia Plantarum agri Aquifextionensis* . Circa Monspelium in Occitania & Gallo-provincia sponte crevit .

Iisdem fere principiis donatur ac prior , sed paulo plus olei essentialis continet . Utraque in Officinis fere indiscriminatim usurpantur , cum iisdem virtutibus præditæ censeantur . Inter plantas aperientes , vulnerarias , cephalicas , hystericas & nervinas numerantur . Foliorum & florum infusum , decoctum & pulvis intus sumuntur . In catharralibus affectionibus , doloribus rheumaticis , ischiadicis , artuum tremore & paralyti earum pulvis ad ℥j. solus vel cum pulvere Chamædryos in vino rubro , vel earum decoctum in sero lactis , si vinum minus conveniat , quotidie mane propinatur . A nonnullis in asthma convulsivo , ab aliis in mictu cruento laudantur . A quibusdam earundem decoctum ex lacte vaccino in vesicæ exulceratione commendatur ter die sumptum . A S. Paulli adversus paralysem valde prædicantur pilulæ a Matthiolo præscriptæ in *Commentar. Dioscorid. c. ultimo L. 3.* quarum hæc est descriptio .

℥j. Chamæpityos , Betonic. Stæchad. flor. Rorismarini ana ℥j. Turpethi ℥jß. Agaric. ℥ij. Colocynthid. ℥ß. Zingiber. Sal. gemm. ana gr. x. Rhubarbar. ℥jß. Spicæ indic. gr. vij. pulv. Hieræ simpl. ℥ß. Diacr. ℥j. Omnia in mortario Chamæpityos succo excipiantur & in massam redigantur , e qua catapotia formentur ex qualibet drachma novem . Ex quibus si quotidie tria sumantur a paralyticis , cum se cubitum recipiant , præsentaneum fere sentient auxilium .

Insuper Chamæpityos in ischiadicis & arthriticis affectionibus præcipuè est æstimationis cum Chamædry instar Theæ pota vel in pulverem redacta : Quamquam ex his podagrici nonnisi parum solatii sibi promittere possint , observante Ettmullero .

℥j. Chamædryos & Chamæpityos ana M. j. summ. Centaur. minor. M. ß. Coquantur in aq. ℞ij. ad ℞ij. Propinquetur ad ℞ij. calide quater die in arthriticis & ischiadicis doloribus .

℥j. Chamæpityos M. ij. flor. Salviz & flor. Betonic. ana ℥j. Rad. Pæoniz mar. ℥j. Coqu. in aq. comm. ℞ij. ad ℞ij. Colatura dilue syrup. de Stæchad. ℞ij. Sumatur ℞vj. ter vel quater die in artuum tremore & paralyti .

Hepatis & lienis obstructions referere dicitur & ictero mederi , menses suppressos revocare , sætrem mortuum & secundinas pellere , & adeo potenter , ut usus ejus in utero gestantibus omnino interdicitur , ne abortum faciat .

Ejusdem extractum in Officinis paratum servatur ad eisdem usus . Ad ℞j. exhiberi potest .

Externe abstergione vulnerum & ulcerum solidationem promovent utraque & tumores discutiant .

Chamæpityos lutea usurpatur in Theriaca *Andromachi* , syrupo de Artemisia ,

missa, Pulvere arthritico *Comitis Mirandulani*, Pilulis de Iva arthritica *Nicolai Salernitani*, & Ung. Martiato.

CHELIDONIUM.

Chelidonium duplex in Officinis habetur; majus & minus.

Chelidonium majus, Chelidonia major, Hirundinaria major, Off. Chelidonium majus vulgare, C. B. P. 144. *Inst. R. H.* 231. Chelidonia *J. B.* 482. Chelidonium majus, *Ded. Pempt.* 48. Papaver corniculatum luteum Chelidonia dictum, *Raii Syn. Hist.* 857. vulgo, *Eclaire*, *Chelidoine*, *Felougne*.

Radibus est fibrosis, multo capillitio stipatis, ex uno capite pendentibus, miniati coloris, succo croceo intensiori, acri, turgentibus: folia inferiora ampla sunt, spithamam longa, lobata, superne pulchre virentia, subtus glauca; & villis nonnullis aspersa: lobi subrotundi sunt, auriti, ex adverso quandoque positi; venosi, venis amplis & incisuris distincti, majoresque sunt quo magis a pediculo recedunt. Caulis cubitales sunt & ampliores, nodosi, fragiles, fistulosi, ramosi, foliis alternatim donati, quæ in inferioribus sæpe ampliora sunt; ex eorum alis in summo oriuntur pediculi palmo longiores qui flores velut in umbella sustinent cruciformes, & quatuor petalis aureis confatos, calyce bifolio, & facile decidente. Pistillus florum mutatur in siliquam sesquiunciam longam, teretem, gracilem, bivalvem quidem, sed monocapsularem, glabram, & quasi corrugatam, primum viridem deinde rufescentem, quæ semina effundit nigra, lucida, rotundiora, compressa, semilineam lata. Tota planta graveolens est, & quacumque parte læsa, aut vulnerata croci coloris succum acrem mordacemque ac nonnihil amaricantem fundit. Delectatur locis aquosis & umbrosis. In agro Parisiensi sponte nascitur. Folia & radix usitata sunt.

Analysi chymica ex Chelidonii folior. & stirpium ℥v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, fere insipidi & inodori, subacris, obscure acidi ℥j. ℥xj. ℥ij. gr. xvij. humoris limpidi, manifeste acidi, & obscure austeri ℥ij. ℥xij. gr. xvij. humoris rufescentis, subacris, alcali, urinosi ℥j. ℥vij. gr. xxxvj. salis volatilis urinosi concreti ℥j. olei spissi ad instar extracti ℥iv. gr. xxxvj. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥ij. ℥vij. gr. xvij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥ij. gr. xxxvj. ex quibus salis fixi mere alcali ℥vj. gr. xxvij. lixivio sunt extracta: Partium lactura in distillatione fuit ℥ij. gr. xvij. in calcinatione ℥j. ℥iv. gr. liv.

Tota planta & radix potissimum succo turget amaro, acri, deurente. Chartam cæruleam nonnisi leviter rubro colore tingit, & odore ova putrida aliquantisper refert. Unde conjicere licet hunc succum ad lac sulphuris accedere; ac proinde salem essentialem continere ammoniacalem, vitriolicum oleo bituminoso implicitum.

Chelidonium majus intus sumptum obstructions aperit, urinas & sudores movet, cachexiæ, & hydropi medetur, febrisugum est, & ictero præsertim dicatum. Radicis exsiccatæ pulvis ad ℥ß. vel ℥i. ejusdem recentis ℥j. infusum in vini

in vini ℥ij. vel decoctum ex aqua ad ℥vj. epotum ; succi crocei guttatres vel quatuor in vini haustu vel alio vehiculo idoneo præscribuntur .

Dicunt nonnulli ejus radicem fuisse specificum remedium Helmontii adversus hydropem ascitem .

Pro sudorifero quoque egregio cum aceto decocta in febribus malignis , & pestilentialibus propinata habetur . Radix , inquit Tragus , quantum ejus manus capere potest purgata , in sextario aceti rosacei decocta , ita ut deinceps percoletur , decoctoque adjiciatur Theriacæ ℥ij. cyathique vulgaris mensura exhibitâ a peste correptos liberabit , si in lectum se composuerint & sudaverint . Jul. Palmarius *Traſſatu de Morbis contag.* c. 18. p. 456. ejus succum his verbis commendat . Succus radicis Chelidonii majoris ex vino albo , & aceti rosacei momento expressus nonnullis præsentaneum auxilium attulit , & virus sudore foras depulit .

Garcieres *Traſſatu de Tabæ Angelicæ* , Chelidonium majus multum celebrat in hac tabe , illudque in omnibus pulmonum affectionibus utilissimum & convenientissimum prædicat . At eo in affectu Simon Paulli observat pulmones nonnisi secundario affici , hepar vero primario & in eo viscere præcipuam latitare morbi causam , ut apud auctorem in *Quadr. Botanico* , videre licet : ac proinde Chelidonium tunc tabidos juvasse non tam pulmones quam jecur ab infarctu liberando .

Emmanuel Konig in *suo regno Vegetabili* monet , ne Chelidonium nimia dosi exhibeatur . Si enim radix ad ℥ij. infusa propinetur , eam horrenda inducere symptomata asserit . Lobelius raro intus sumendum esse putat . J. Rajus in eadem est sententia : nec succum , cum acerrimus sit ad oculorum affectus adhibendum esse existimat , nisi eis additis , quæ acrimoniam ejus retundant , cujusmodi est lac muliebre .

24. Folior. Chelidon. major. P. j. cremor. Tartari ℥j. Macerentur in seri lactis ℥vj. Colatura dilue syr. de Cichor. comp. c. Rh. ℥j. Fiat porio mane jejuno ventriculo propinanda in iſtero & in mensium suppressione .

24. Rad. Chelidon. maj. minutim incis. q. v. Affunde vini albi vel Rhenan. ad supereminentiam trium vel quatuor digitor. Digerantur frigide in vase bene clauso per dies aliquot , sæpius agitando , donec tintura extrahatur , quæ per chartam bibulam transcolata servetur usui . Dosis ℥iv. vel ℥vj. mane & quarta pomeridiana in iſtero .

24. Radic. Chelidon. major. M. ij. Baccar. Juniperi M. j. Contund. cum vini Rhenan. ℥ij. Deinde exprimatur succus , cujus capiat æger ℥iv. bis in die .

24. Rad. Chelidon. major. Urtic. urentis , & Aristoloch. rotund. ana ℥ij. Radic. Gentian. ℥ss. summ. Abiynth. roman. & Scord. ana M. ss. semin. Aquileg. & Cannabis contusor. ana ℥ss. flor. Hyperic. Centaurea minor. ana P. j. Croci martis aper. nodulo inclus. ℥ss. salis Tartar. ℥j. Coquantur per semihoram in ℥iv. aq. comm ad medias . Colatura dividatur in 4. doses . Exhibeantur duæ quotidie , una sero circa octavam , altera circa sextam matutinam , addita cuilibet ℥ss. syr. de Præssio albo . In iſtero .

24. Rad. Chelid. major. ℥j. Tinctur. Martis ℥v. albi ℥ij. Digerantur per 24. horas . F. colatura cujus ℥ij. pro singula dosi bis die sumantur . Chelidonium majus externe adhibitum vulnera præsertim vetustiora & ulcera absterc.

abstergit & mundat seu foliis contusis admodum, seu pulvere infuso, seu succo instillato. Croceus ejus succus verrucis applicatus eas tollit. Idem præstat herba trita cum axungia. Cataplasma ex contusis & bis die parti admodum herpetem miliarem efficaciter compescit & sanat.

In oculorum affectionibus Chelidonium plurimum celebratur. Succus ejus luteus ex rupto caule extillans oculis instillatus a nonnullis commendatur ad oculorum ulcera detergenda & pro panniculis aut nubeculis removendis. Sed quia est admodum acris vel diluitur cum liquore quolibet idoneo, vel ejus aqua distillata usurpatur quæ longe mitior est. Fabricius Hildanus *Cent. Epistolar.* 59. testatur extractum Chelidonii non solum in externis nubeculis, sed etiam incipiente fuffatione proficuum esse, veluti sæpissime expertus. At non ultra magnitudinem capitis aciculæ singulis vicibus imponendum esse monet propter acredinem.

In Officiis prostat aqua distillata Chelidon. major, quæ a Rulando, & Quercetano mirum habetur ophtalmicum, si in ea infusum fuerit antimonium crudum vel crocus metallorum. Herba aut radix recens contusa imponitur plantis pedum in tumoribus œdematosis ex febribus intermittentibus pertinacibus aut aliis morbis chronicis oriundis, quos dissipare valet.

Usurpatur in Orvietano *Frideric. Hoffmann.* Ung. mundificativo de Apio, Emplastro Diabotano, Aq. distillata usurpatur in aqua ophtalmica *D. Daquin Pb. Reg.*

Chelidonium minus, Scrophularia minor, Ficaria, Hæmorrhoidum herba *Off.* Ranunculus verus, rotundifolius, minor, *Inst. R. H.* 286. Ranunculus præcox rotundifolius granulata radice, *Moriss. Hist.* 446. Ranunculus lausfolius, *Lugd.* 1036. Chelidonia rotundifolia minor, *C. B. P.* 309. Scrophularia minor five Chelidonium minus vulgo dictum *J. B.* 468. Chelidonium minus, *Dod. Pempt.* 49. Malacocissus minor, *Fuchs. Favagello, Cæsalp.* 546. Strumea, *Plin.* vulgo, *Petite Scrophulaire*, ou *petite Chelidoine*.

Radice est ex multis tenuibus & candicantibus composita fibris quibus adherent aliquot tubercula, granis triticeis magnitudine similia, subrotunda vel oblonga, foris pallida, intus alba: cauliculis palmaribus, tenuibus humi plurima parte procumbentibus: foliis subrotundis, lævibus, glabris, virentibus ac splendensibus, quam Hederæ minoribus. Summo caulicorum fastigio insidet flos unus Ranunculi æmulus rosaceus, ex octo scilicet aut novem petalis aureo fulgore micantibus, cum unguibus Chloris, in orbem positis, staminulis multis croceis medium occupantibus & calyce triphylo compositus. Ex floris meditullio surgit pistillum, quod abit in fructum subrotundum, echinatum, e viridi luteum, cujus placenta multa semina tenuia adhærescunt. Agri Parisiensis incolæ hæc planta in pratis, secus vias in scrobium fossarumque marginibus crescit. Herba integra & potissimum radices tubercula usitata sunt.

Analysi chymica, ex foliorum Chelidon. minor. ℞v. per retortam distillatis, prodierunt humoris limpidi, inodori, at initio seminis Sinapi saporem fere & leviter referentis, sub finem saporis prorsus expertis, primo obscure acidi, deinde manifesti ℞iij. ℞vj. ℞j. gr. xxxvj. humoris limpidi, primo inodori, deinde empyreumatici, austeri ℞j. ℞ij. xlvij. humoris fuscii, empyreumatici, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℞j. salis volatilii urino-

urinosi concreti ℥iij. gr. xxx. olei spissi ad instar syrupi ℥vij. Massa nigra in retorta superstes pendeat ℥j. ℥vij. gr. xxxvj. quæ calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥ij. gr. xvij. ex cineribus lixivio ℥v. gr. ix. salis alcali fixi sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥vij. gr. lxxvj. in calcinatione ℥j. ℥v. gr. xvij.

Radicum recentium ℔v. per retortam distillatæ præbuerunt humoris limpidi, odore tenui sed acuto, sapore Sinapiferè referente, absque ullis acidis aut alcali signis ℔ij. ℥vij. ℥ij. humoris limpidi, odore simili, sapore vero debiliore, primum obicure acidi, deinde manifesti ℔ij. ℥x. ℥ij. gr. xxij. humoris fulci, empyreumatici, acidi, austeri, ac tandem obscure alcali urinosi ℥ij. ℥ij. gr. xxxvj. olei spissi ad instar extracti ℥j. gr. liij. Massa nigra in retorta residua pendeat ℥v. gran. xxx. quæ calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥vj. gr. xxvj. ex quibus lixivio salis alcali fixi ℥ij. gr. lxij. fuerunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥vj. in calcinatione ℥ij. ℥ij. gr. ij.

Chelidonii minoris folia saporem herbaceum referunt: nec in eis ulla acrimonia manifesta gustu deprehenditur. Folia, & radices spiritum quendam acrem, & sinapizantem obtinent, qui in primis phlegmatis portionibus manifestum se præbet. Insuper salem essentialem continere videntur ammoniacalem, vitriolicum, magna olei, & terræ copia implicitum. Folia plus salis ammoniaci seu volatilis urinosi, radices plus salis acidi vitriolici continent. Idcirco folia magis resolvunt quam radices.

Schroderus scribit radices hujus plantæ refrigerare, & humectare; verumtamen distillatione spiritum aciem fundunt tum folia tum radices, ut per analysim manifestum est. Idcirco nonnulli hanc plantam calidam esse potiori jure pronuntiant.

Intra plantas antiscorbuticas temperatas non infimum locum obtinet. Vel folia recentia in acetariis comeduntur, vel infusa in vino, vel condita Saccharo præscribuntur, vel etiam succus expressus usurparur.

Radices ad hæmorrhoides, & strumas tam intrusumptæ quam externe admotæ commendantur. Hæmorrhoides earum succo cum vino aut ægrotantis urina permixto sæpius ablutæ contrahuntur, & dolore sopito rescantur. Nonnulli hæmorrhoidas inungunt unguento ex radicibus recentibus cum butyro recente contusis parato. Sunt etiam qui existimant vel gestatam solummodo herbam prodesse adversus earumdem dolores posse. Neque exterius tantum extingunt dolores, sed & interius conluetum illarum fluxum promovent, auctore C. Hoffmann.

Radices recentes contusæ, & impostæ a Cæsalpino ad scrophulas curandas commendantur, vel etiam comedendæ a Sylvatico præcribuntur. Boyleus radices contusas in axungia porcina incoquit ad radicem siccitatem, his rejectis novas radices cum axungia expressa coquit iterum atque iterum, ut radicum succo axungia imprægnetur; sic præstantissimum obinet unguentum adversus hæmorrhoides, & strumas, quo partes affectæ manent, & sero inungantur.

Tragus herbam ipsam contusam, ejus pulverem, succum, aut aquam distillatam amariscas aut ficos anni curare scribit impositu, collutu, aut infusu.

Succus radicum per nares attractus caput per ipsas nares expurgat.

C I C E R.

Ciceris species plures in hortis coluntur quæ non differunt nisi fructuum vel etiam florum colore. Duæ in primis in usum veniunt tum medicum, tum culinarium, scilicet Cicer sativum seu arietinum, & Cicer rubrum, quæ nonnisi varietates ejusdem plantæ a nonnullis existimantur.

Cicer sativum sive arietinum nigrum, rubrum, vel album, *Off.* Cicer sativum flore candido *C. B. P.* 347. *Inst. R. H.* 389. Cicer arietinum *J. B.* 2. 291. *Dodon. Pempt.* 525.

Cicer rubrum *Off.* Cicer floribus, & seminibus ex purpura rubescentibus *C. B. P.* 347. vulgo *Pois chiches* ou *Pois becs*.

Radix renuis, albida, nonnihil rufescens, fibrosa, & capillacea, caulem promit erectum, patulum, hirsutum; folia conjugata ultimo impari claudente, subrotunda, serrata, villosa. Flores papilionacei sunt in foliorum alis pediculis tenuibus insidentes, colore aut candidi aut ex purpura rubescentes. Calyx villosus, in sex partes acutas divisus. Pistillum abit in fructum tumidum, vesicam referentem, unciam pene longum, & in sulum tenuem abeuntem, in quo semen adest unum vel alterum Piso majus, subrotundum, angulosum, unico angulo acuto præditum colore albedo, aut subrubro, & fere capitis arietini forma. Semina seu Cicera rubra præ aliis seliguntur ad usum medicum: cetera inter legumina esculenta recensentur. Seruntur in arvis in plurimis Gallicæ meridionalis provinciis, ut & in Italia, & Hispania.

Analysi chimica, Cicera præter phlegma acidum, salsum, & subausterrum, plurimum olei, nec mediocrem salis volatilis urinosis quantitatem præbent. Salem itaque essentialem ammoniacalem continent multo sulphure implicitum.

Legamen est statuosum, copiosi nutrimenti; sed crassi, alvo movendæ habile, ciendæ urinæ idoneum. A quibusdam non tantum maturum sed etiam viride, non solum coctum, sed etiam crudum estatur, ut Pisa, & Fabæ. Sed difficile concoquitur in ventriculo, nec nisi rusticis, utpote valentioribus ac robustis convenit, non vero delicatioribus hominibus.

Veteres Medici illud inter potentiora lithonriptica numerabant. Eorum sane promissis delusi Empyrici nonnulli calculum frangere ejus decocto promittunt, sed sæpius malis ægri rebus. Sæpius enim Cl. Tournesortius comperit habuit decoctum Ciceris dolores atroces afferre, si revera in vesica vel renibus calculus adsit. Abstergit enim, & urinas crassas, limosas ac turbidas educit, dum remanet letalis calculus mucagine sua denu-datus. Ideo caute eo utendum est.

Apud nos ejus decoctum solum usurpatur in urinæ suppressione a mucos copioso vel tenaci vias urinarias fere occludente. Monent autem practici, ne usurpetur frequentius ab illis, in quibus illæ partes exulceratæ sunt. Idem decoctum ad vermes enecandos, & ejiciendos a nonnullis prædicatur, menses etiam promovet, & lochias.

2℥. Cicerum rubror. ʒj. Carnis vitulinæ ℔ss. Coq. in q. s. aq. cothm. Fiat jucu-

jusculum in urinæ suppressione, vel ad mucum & arenulas ex vesica vel renibus expellenda.

2. Semin. Cicer. rubr. Ꝟß. Stipitum Fabarum crematar. M. j. Rad. Gramin. Petrosel. ana Ꝟij. Coq. in aq. comm. Ꝟijj. ad medias. P. decoctum diureticum, cui adde Syrup. de Thäco Ferpel. Ꝟij.

Externe Cicer rubrum vi pollet resolvendi, atrenuandi, emolliendi & abstergendi. Ejus farina in cataplasmate pitoras & lichenes detergit, tumores mammarum ac testium discutit.

Ulutpatur in syrupo de Althæa Fernelii.

CICHORIUM.

Cichorium sylvestre, Cichorium erraticum, Chicorea sylvestris, Off. Cichorium sylvestre sive officinar. C. B. P. 125. Infl. R. H. 479. Cichorium sylvestre, Pictis Dodon. Pempt. 635. Cichorium sylvestre J. B. 2. 1007. Setis Picris Dioscoridis, Amarugo Theophrasti, Hippochazris Dalec. Lugd. 563. Hieracium latifolium Gerard: Cichorium Intybus erratica Tabern. Icon. 170. vulgo, *Chicoree sauvage*.

Radix pedem longa, pollicem crassa, obliqua & fibrosa, succo lactescente prægnans, caulem profert firmum, hirsutum, tortuosum, sesquicubitale, ramulosum, cum foliis Dentis leonis, foliis similibus sed majoribus, piliis hirsutis & obscure virentibus. Flores in foliorum supremorum alis nascuntur semisfoculosi, plurimis scilicet semisfoculis cæruleis constantes, embryoni insidentibus & calyce comprehensis, qui deinde contrahitur & in capsulam abit seminibus fortam angulatis, brevibus, pappo catentibus. Diffluit ex caule, foliis aut radice vulneratis albicans & amarus succus. Amari vero saporis folia & radices sunt. Non modo hic in hortis feritur, sed etiam secus vias & in locis incultis nascitur, ac potissimum folia habens profundioribus incisuris lacinara, quod & reliquis amarius est. In usum veniunt radices, folia, flores & semina.

Analysi chymica, ex foliorum tenerorum recentium lbv. per B. V. distillatis prodierunt humoris limpidi, saporis & odoris herbacei, obscure acidi lbj. Ꝟxij. humoris limpidi, manifeste acidi, lbj. Ꝟvij. Ꝟij. Massa siccata in alambice residua pendebat Ꝟx. Ꝟvij. quæ per retortam distillata præbuit humoris rufescentis, empyreumatici primo acidi austeri, deinde sale volatili urinoso copioso imprægnati Ꝟij. Ꝟv. gr. xxxvj. salis volatilis urinosi concreti Ꝟj. gr. xl. olei adiposi Ꝟj. Ꝟiiij. gr. vj. Massa nigra in retorta superflua pendebat Ꝟiiij. quæ calcinata per vij. horas reliquit cinerum nigricantium Ꝟj. Ꝟvij. gr. xlvij. ex quibus salis fixi mere alcali Ꝟvj. gr. lx. lixivio sunt extracta. Partium jactura in prima distillatione fuit Ꝟvij. in secunda distillatione Ꝟij. Ꝟij. gr. lxij. in calcinatione Ꝟj. gr. xxiiij.

Radicum tenerarum recentium lbv. per B. V. distillatæ præbuerunt humoris limpidi, odoris & saporis herbacei, obscure acidi lbj. Ꝟxij. humoris manifeste acidi lbj. Ꝟiiij. Ꝟv. Massa siccata in alambice superflua pendebat Ꝟxij. Ꝟvj. ex qua per retortam distillata prodierunt humoris rufescentis, empyreumatici, acidi, austeri & sub sinem alcali urinosi Ꝟiiij. Ꝟvj.

gr. lxxij. olei adiposi ℥vj. gr. lxxvj. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥iij. ℥ij. quæ per decem horas calcinata reliquæ cinerum fulcorum ℥j. ℥ij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥vj. lixivio fuerunt extractæ. Partium jactura in primâ distillatione fuit ℥j. ℥v. in secunda ℥ij. ℥vj. gr. xliij. in calcinatione ℥ij.

Planta & radix moderate amara sunt cum aliqua stypticitate, flores minus amari sunt, & saporem glutinosum referant. Radicum & foliorum succus chartam ceruleam colore rubro vix tingit. Folia salem essentialem continere videntur salum, vitriolico ammoniacalem, multo sulphure involutum. Radices minus salis volatilis urinosi continent, ac proinde majore stypticitate donantur.

Frequentior est Cichorii sylvestris usus in pharmacopoliis quam in culinis. Crudum & viride in acetariis a nonnullis comeditur. Alii vero ob insignem amaritudinem ab ejus usu abhorrent. At olitorum cura ac diligentia, maxima ex parte amaritudinem deponit, eximium candorem & luavem ténacitatem adipiscitur, quo fit ut ab omnibus fere in acetariis cum oleo, sale & aceto, aut cum saccharo & succo Citriorum vel Aurantiorum sumatur. At vero Cichorium sylvestre toto suo amaro atque virore stipatum tanquam polychrestum cum alimentis, tum medicamenti loco variis in morbis laudatur, præcipue ubi resolvendum, abstergendum & temperandum est. Humores crassos attenuat, glutinosos resolvit, spissos fluidiores efficit, solidas partes aliquantisper constringit & roborat, secretiones omnes promovet, elegantioresque faciei colorem reddit, calidam viscerum intemperiem temperat, oriendam nempe ab obstructionibus & ab acrim humorum stagnatione. Hinc in incipientibus hepatis, & viscerum obstructionibus, in ictero, cachexia, melancholicis affectionibus, faucium, pectoris, vel aliarum partium inflammationibus feliciter adhibetur, sive foliis recentibus crudis aut coctis comestis, sive succo ad ℥ij. quatuorve, sive aqua stillatitia aut decocto ad ℥vj. hausto, sive foliorum exsiccatorum pulvere ad ℥j. assumpto. Solum etiam, vel cum aliis plantis idoneis confociatum, sive folia, sive radices, sive tota planta in apozematibus & jusculis alterantibus & aperientibus incoquitur. Nec pabel sunt qui pro potu solito utuntur levi decocto vel infuso foliorum Cichorii in calida viscerum intemperie & in affectionibus melancholicis & cachecticis. Blando enim suo amaro laxiores ventriculi fibras firmat, appetitum excitat, ciborum concoctionem juvat, vias urinarias expurgat, sæpe etiam diaphoresim aut expectorationem promovet. Commendatur etiam in febribus. Novi qui solo usu foliorum Cichorii sylvestris assidue in acetariis comestorum diuturnas & contumaces febres intermittentes profigunt, plurimis febrilibus antea frustra tentatis. Usum radicis Cichorii sylvestris in febre hectica insigniter laudat Crato ab experientia edoctus. In febribus inflammatoriis & malignis succus defocatus inter juscula, tertia vel quarta quaque hora, propinatur ad ℥iij. solus, vel cum succis Borraginis, Charophylli, & cum syrupo Violarum aut alio conveniente confociatus. Idem succus in hepatis, lienis vel viscerum obstructionibus cum tinctura Martis vel cum sale quocumque digestivo utiliter quoque præscribitur.

Ex Spigelio & Simone Paulli ejus folia vere novo collecta exsiccare, in

in pulverem redacta & bis die ad ℥i. assumpta mane & sero, podagræ præsertim biliolam levant. A Joanne Rhodio adversus melancholiam hypochondriacam juscula Cichoracea plurimum laudantur.

Ex Cichorio sylvestri præparantur in Officinis aqua & extractum. Aqua ex floribus cæruleis distillata inflammationibus & caligini oculorum medetur; cardiaca etiam censetur.

Extractum ad omnia usurpatur quibus Cichorium convenit, solum vel cum aliis extractis amaris & aperientibus, necnon martialibus conjunctum, in electuariis aperientibus, ad ℥ss. aut ℥i.

℥i. Succo desecati Cichor. sylvestr. ℥iij. Tinctur. Martis ℥ss. Syrup. de quinque radic. aper. ℥ss. F. potio bis terve die reiteranda in cachexia & viscerum obstructionibus.

℥i. Extracti Cichor. sylvestr. ℥ij. Extractor. Gentianæ, Centaur. minor. Fumar. Nasturt. Corticis Peruviani & Rhabarbar. Croci Martis aper. & cremor. Tartar. ana ℥i. Salis Martis River. ℥i. Syrup. de Absinth. q. s. M. F. Electuarium. Dosis ℥i. bis terve die. In cachecticis & melancholicis affectionibus, mensium suppressione, & viscerum infarctu.

Folia nomen dederunt syrupo de Cichor. simpl. *Codic. Parisiensis*, & syrupo de Cichor. composito cum Rheo *Pb. Regia*.

Semina inter quatuor semina frigida minora numerantur, scilicet Cichorii, lathybi, Laducæ, Portulacæ.

CICUTA

Cicuta, *Off.* Cicuta major *C. B. P.* 160. & *Inst. R. H.* 306. Cicuta *Dod. Pempt.* 461. & *J. B.* 2. 175. Cicutaria vulgaris *Clas. Hist.* 200. *Tragi* 474. vulgo, *Cigue*.

Radice est pedali, digitum crassa, multifida, priusquam caulem ferat, solida, cortice tenui flavescente, carne alba, fungosa, odoris gravis, saporis subdulcis, quando caulem facit interius cava, caule fistuloso, striato, tres cubitos alto, inani, lævi, dilute virenti, nonnullis tamen subrubentibus veluti serpentum maculis resperso: foliis alatis multifariam partitis, glabris, atrovirentibus, graveolentibus, ad Apium hortense accedentibus. Flores umbellatim congesti fastigia occupant, roseti, quinque scilicet petalis constantes candidis, cordiformibus, inæqualibus, in orbem positis & calyci insidentibus, qui ab initio fructum fere globosum, ex duobus seminibus compositum exiguis, hinc gibbis & striatis, inde vero planis, pallide virentibus. Ingratum, gravem virosumque tota planta odorem spirat. Agri Parisiensis incolæ in umbrosis vulgo nascitur.

Analysi chymica, ex foliorum & caulium tenerorum ℔v. per retortam distillatis prodierunt humoris primo albicantis & turbidi, deinde limpidi, odore & sapore Cicutam reserentis, aliquantisper acris, obscure subasali, obscure acidi ℔j. ℥viij. ℥iij. gr. xlvij. humoris limpidi, ejusdem odoris & saporis acidi & obscure austri ℔ij. ℥xv. ℥ij. gr. xxj. humoris rufescentis, sale

fale volatili urinoso copioso imprægnati ℥j. ℥j. gr. xxxix. salis volatilis urinosi concreti ℥j. gr. xx. olei ℥j. ℥j. gr. xxxvj. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥ij. ℥ij. gr. xvij. quæ rite calcinata reliquit cinerum nigricantium & fuscorum ℥j. ℥ij. gr. xij. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥vj. gr. lvj. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥j. gr. xliij. in calcinatione ℥j. ℥vij. gr. vj.

Totius plantæ sapor herbaceus salus est, odor narcoticus, fœtidus. Succus chartam cœruleam rubro colore perparum inficit. Unde conjicere licet, Cicutam sale ammoniacali donari cum multo oleo & terra permixto.

Cicutam intus sumptam venenum esse, & publica Atheniensium pœna invisam præcipueque morte Socratis celebrem, fere inter omnes constat. Kircherus *Tr. de Peste* gravia & admiranda symptomata, ex radicibus Cicutæ pro Petroselinii radicibus a duobus religiosis viris comestis excitata refert. Vix enim in ventriculum descenderat cibus, statim virulentam ac mortiferam suam virtutem explicat, caput utriusque tam horrendis fuliginum exhalationibus opplevit, ut uterque protinus mente caprus, alter in vicinum lacum se præcipitaverit, in anatem se transmutatum existimans, alter, omnibus spoliatis disruptisque vestibus, in publicum prorumpens, nihil nisi flumen ad intestini incendii vehementiam extinguendam appetens, in anatem se transformatum sine aquis vivere non posse clamaret. Paulo post totum corpus livore perfusum apparuit. Tandem diversis admoris remediis mortem quidem effugerunt, sed paralytico membrorum tremore afflicti nonnisi languidam & miseram vitam per triennium adhuc protraxerunt; denique ambo summis doloribus cruciati extincti sunt. Unde conjicere licet Cicutam non adeo frigidam esse, sicut nonnulli existimaverunt. Nec semper noxia est hæc planta, imo salutifera quandoque deprehenditur, siquidem J. Rajus in *bislor. plantarum* asserit post observationes Doct. Bovvle pulverem radicum Cicutæ ad grana viginti in febribus malignis & quartana ante paroxysmum exhibitum omnibus Diaphoreticis antecellere. Et Renealmus in *observationibus* 3. 494. intus hunc pulverem a ℥j. ad ℥ss. in vino, vel ejusdem infusum a ℥j. ad ℥j. idque felici cum successu in scirrhis hepatis & lienis ut & pancreatis gravissimis exhibuit. Caute tamen tali medicamento utendum esse censemus. Qui vero ab eo abstinere, prudentior est.

Inter Cicutæ antidota commendantur Acerum, Absinthium, Daucus, Gentiana, Urtica, Tragus refert, quamdam mulierem, cum inter Pastinacas Cicutæ radicem decoctam forte comedisset, ebriam quasi ac insana redditam fuisse, ut in altum scandere ac subvolare conaretur, cui haustu aceti subventum est, ut ad mentem rediret. Sennertus folia Absinthii vel radices Gentianæ aut semina Dauci vel Urticæ in pulverem redacta & ex vino generoso hausta, vel eorundem decoctum in vino factum proponit.

Externe frequentior est ejus usus. In primis Cicutæ succus expressus, vel ipsa contusa planta, aut cum decocto applicata mammarum incrementum coercet, duras & parvas reddit, auctore Ettmullero: verum hanc applicationem temerariam & periculo plenam esse Dodonæus existimat. Sunt qui non inepte ad nimium lactis proventum mammis puerperarum quæ

Geoffroy Tom. II.

M

lacta-

lactare nolunt, vel sub metu coagulationis lactis coerciti & indurationis mammarum, plantam hanc contusam & in lacte vel aqua Caprifolii vel in aqua & aceto decoctam, sub forma cataplasmatidis, vel succum cum aceri tantillo temperatum applicant.

Henricus ab Heer *in observ.* 7. magnopere commendat Cicutam ad inflammationem & tumorem lienis ex nimia venere, discutit enim & tumorem resolvit. Cicuta nempe folia si recentia, contusa, si exsiccata, macerata vel decocta in aqua florum Sambuci cum tantillo Camphoræ immittantur intra præputium.

Eadem folia in lacte cocta commendantur ad dolores podagricos & hæmorrhoidales mitigandos; cataplasma ex foliis cum Cochleis & quatuor farinis resolventibus plurimum laudatur adversus hydrocelem & dolorem ischiadicum. In emolliendis tumoribus, tam lienis & hepatis, quam etiam partium externarum duris, nempe schirrosis, strumosis, grumosis, folia & radices potissimum, quocumque modo applicentur, remedia sunt egregia.

2℥. Folior. Cicutæ M. ij. Contund. cum limacibus terrestribus n. 24. sensim addendo farinar. resolv. ʒij. F. cataplasma in tumoribus testiculorum vel mammarum.

In Officinis emplastrum de Cicuta præparatur quod ad strumas & omnes tumores duros & schirrosos emolliendos & præsertim lienis aut hepatis schirrum resolvendum plurimum laudatur, si cum oleo Succini subigatur.

Cicuta usurpatur in empastro Diabotano *D. Blondel.*

Alia est Cicutæ species, quæ huic in officinis nonnunquam substituitur & dicitur,

Cicuta minor, *Off.* Cicuta minor, Petroselino similis *C. B. P.* 160. Cicutaria Apii folio *J. B.* 3. 2. 279. Cicutaria fatua *Lobel. Icon.* 280. Petroselini vitium *Tragi.* 459. Sed viribus priori longe debilior est.

CINARA.

Cinara vel levis est, nullis neque in foliis, neque in capite spinis seu aculeis armata, vel aculeata seu spinosa; unde duo Cinaræ genera exsurgunt quæ plurimas species seu varietates sub se continent. Dux potissimum ad culinarem cupedias coluntur.

1. Cinara hortenſis, *Off.* Cinara hortenſis, foliis non aculeatis *C. B. P.* 383. *Inf. R. H.* 442. Carduus sive Scolymus sativus non spinosus *J. B.* 3. 48. Cinara *Dodon. Tempt.* 724. Scolymus non aculeatus *Tab. Icon.* 695. vulgo, *Artichaut.*

Radice nititur crassa, firma, non insuavi, folia promit pedem & sesquipedem longa, semipedem sere lata, in lacinias latas subsectas divisa, incano & cinereo tomento obsita, potissimum parte prona, spinis carentia aut omnino paucis obsita. Caulis cubito altior, striatus, tomentosus, ramis aliquot donatus, in singulorum cacumine caput gerit hic turbinatum seu in gracilescenſem metam productum, ille magis compressum & rotundum, squamis magnis, glaucis, carnosissimis, acumine obtuso, ungue infimo trassulculo, tenero, velco, albicante compactum. Caput illud squamosum seu calyx sensim divullis squamis superius lateſcit & se

pandit, tandemque in medium profert strobiliformes flores plurimos scilicet strobiliformes ex subcæruleo colore eleganter purpureis, quinquefariam divisis, & embryoni insidentibus, qui abeunt deinde in semen oblongum, tumidiusculum, lævi cortice obiectum cinereo, pappis candicantibus & lanuginosis instructum. Floris seu calycis ima pars seu placenta seminum carnosa est esculenta.

2. Cardones, Off. *Cinara spinosa* cujus pediculi esitaneur C. B. P. 383. I. R. H. 342. Scolymus aculeatus *Tabern. Icon. 696. Cardones Casalp. 526. vulgo, Cardoni.*

Hæc a priore non differt, nisi quod hujus foliorum omnes anguli & calycis squamæ duris, pungentibus spinis armentur. Caules seu foliorum costæ terra obruuntur, qua ratione mirum candorem contrahunt, teneritudinemque; sicque demptis utrinque foliosis costarum lateribus in cibos vel pretiosos lautioresque transeunt. Utraque planta in hortis colitur.

Analysi chymica, ex placentarum carnosarum *Cinarae tenerarum* & recentium lbv. per retortam distillatis, semotis squamis & seminibus papposis, prodierunt humoris limpidi, odoris & saporis herbacei, satui, obscure acidi lbj. ℥iij. gr. xxxvj. humoris primo limpidi, acidi manifeste, sub fine intentæ acidi, austeri, rufescentis, empyreumatici, lbj. ℥xj. ℥. ij. gr. ix. humoris empyreumatici rufi, primo intentæ acidi, deinde subfalsi & sale alcali urinoso copioso imprægnati ℥ij. ℥iij. gr. lx. olei ad instar syrupi ℥iij. gr. xlviij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥v. ℥v. gr. xxxvj. quæ per decem horas calcinata reliquit cinerum ℥j. gr. xxxvj. ex quibus salis fixi mere alcali ℥iij. gr. xvij. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥xj. ℥iij. gr. xxvij. in calcinatione ℥iij. ℥v.

Carnosa hæc substantia saporem obtinet subdulcem, austum & vitrioli solutionem nigro colore tingit. Salem igitur essentialem continet tartareum cum terra adstringente copiosa & oleo subdoli conjunctum.

Cardones ab hac carnosa substantia plurimum differunt. Cum phlegmate copiose plurimum salis volatilis urinosi præbent, mediocrem olei & terræ portionem, acidi vero perparum.

Cinara cruda estur plerumque cum adhuc tenera est cum sale & pipere. Sic stomacho grata & amica est, ciborum appetentiam dejectam recreat, potatoribus vero vini potum suaviorem efficit. Ubi vero grandior evasit, coquitur, rejectis squamarum duriore parte & laugine intus contenta, & ex butyro liquato, aromatis, aceto vel omphacio parata comeditur, vel ex pingui carni jure elixa, vel per frustula secta & in sarragine frixa additis sale & Petrolielino, vel ex oleo & aceto supra cineres cocta. Asservantur quoque placenta illæ carnosæ in hiemem, si insoleniur vel in fumo exsiccantur; atque in loco sicco reponantur, ne situm contrahant, & ad intestus & carniū condimenta usurpantur.

Quocumque modo præparetur aut coquatur *Cinara* parum nutrit & succi est crassi & stultenti, qui fit ut quidam eam venerem stimulare existiment. Concoctu tamen facilis est in ventriculo, si moderate comedatur, ratione stypticitatis suæ qua ventriculi fibræ roborantur. Urinam ciere præcipue traditur, eamque turbidam ac puridam, quem tamen effectum Rayus ipsi denegat.

Foliorum costæ & caules teneri & candidi difficilis coctionis dicuntur , quod verum deprehenditur , nisi ab illis qui eos butyro saturant .

Radices Cinaræ urinas potenter provocant . In decoctis & juleculis diureticis usurpari possunt . A quibusdam earum decoctum ad urinas ciendas in enematibus præscribitur .

CITREUM ET LIMON.

Citreum , Citrum & Malus Medica , *Off.* Citreum vulgare *Inf.* R. H. 621. Malum Citreum vulgare *Ferrarii besperid.* 61. Malus medica C. B. P. 435. Medica Malus sive Cidromela *Advers.* Lob. Icon. 143. vulgo , *Citronier* .

Arboris modus nostratibus in hortis modicus est . Radix ramosa , alte lateque diffusa , lignosa & corticosa , foris lutea , intus albicans : truncus gracilis , ligno albo duroque , cortice coloris e viridi pallentis : ramus numerosi , proluxi , tenues , ductilique lentitia obsequentes : ex his vultuosiores diluto virore flaventes , pallidisque aculeis armati , recentiores vero læta viriditate nitidi : summa ramorum foliorumque teneritas rubente virore fusca . Folium ad Juglandis folii magnitudinem accedens , persæpe obtusum , interdum etiam acuminatum , triploque fere in longitudinem quam in latitudinem porrectius , supina parte quam prona viridius ; oris leviter incisus serratum , fibris a medio crassiore nervo excurrentibus venosum , nonnunquam corrugatum & veluti bullans , spisso ambitu ramos convestiens & tota hyeme exornans , bene odoratum , gustatu amarum , soli si obijciatur instar foliorum Hyperici foraminibus vel potius punctulis translucidis undique respersum : spina foliorum plerisque superne contigua , gemmæque finitima , acuminè subrubens , cætero viridis , apice prime rigida & satis longa . Flores confertim summis ramulis velut odorarium in fasciculum frequenter coherentes , rosacei , petalis carnosus , persæpe quinque per ambitum resupinatis , foris interfulis robore , cæterum candidis , in orbem positis , ex caliculo viridi , quinquifido emergentibus constantes , albenibus flavo sub apice , flaminibus numerosis bene capillati , languide olentes , gustu primo subdulces , mox amari , parvis frugiferi , existente inter flamina longulo pistillo fructus rudimento , parvis citra hoc indicium infœcundi , & hi quidem cito decidui , at illi tenacius hærentes . Fructuum figura sæpius oblonga , nonnunquam globosa , fastigio alias mucronato , alias retuso , superficie rugosa tuberosaque , longitudine non raro dodrantaali , imo quandoque majori ; magnitudo enim varia , pondusque diversum , siquidem nonnulli ad sex , novem , imo ad triginta usque libras proveniunt : cortex exterior coriaceus , tenuis , amarus & fervidus , colore primum viridi , in maturitate vero aureo seu citrino , odore fragranti : cortex interior seu caro crassa , veluti cartilaginea , firma , candida , subdulcis , aliquantisper acida & leviter odorata ; intus divisa in varia loculamenta succi acidi vesiculis membranaceis contenti plena : denique semina cuique pomo complura , aliis cui quinquagena supra centena in medullæ vesicularis sinu inclusa , oblonga , semiuncialia , utrinque fere acuminata , duriuscula & membranacea

amara; foris flava, striataque cute vestita, nucleo duplici, candido; amaricante cum quadam admixta dulcedine referra. In eadem arbore sæpe visitur eodem tempore tempestivum, & pulchre confusum floriferum ver cum pomifero autumno, pomis aliis cadentibus, aliis maturiscentibus, aliis subnascentibus. Sed per autumnum proventus uberior. In Gallo-provinciæ hortis colitur hæc arbor ab Assyria, & Media primum in Græciam, & inde in meridionales Europæ regiones translata. Unde fructus Mala Medica, Mala Assyria dicuntur. Fructus partes omnes, cortex exterior seu flavedo Citri, cortex interior seu caro, pulpa seu succus, & semina eximii usus sunt in medicina.

Analysi chymica, ex corticis exterioris Citri ℔v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, odorati, & sapidi, primo obscure salsi, deinde obscure acidi, cum oleo essentiali limpidio flavescente, odoratissimo, ℔iij. ℥ij. ℥i. gr. xvij. humoris limpidi, citrei odoris saporisque grati, manifeste acidi, & austeri, cum oleo essentiali limpidio, flavescente, graro, sub sinem rufo ℥xv. ℥iij. gr. xxxviij. humoris rufi, empyreumatici, intense acidi, austeri cum levi acrimonia ℥ij. ℥vij. olei tum tenuis, & essentialis, tum crassi, & empyreumatici ℥i. gran. liij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥v. ℥vij. quæ calcinata reliquit cinerum ℥i. ℥i. gr. xxxvij. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥iij. gr. xxxiiij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥iij. ℥ij. gr. xxxvj. in calcinatione ℥iij. ℥v. gr. xxxv.

Ex succi Citrei recenter expressi ℔v. prodierunt humoris limpidi, saporis, & odoris fere expertis, obscure subsalis, & obscure acidi ℔ij. ℥v. ℥iij. gr. vj. humoris limpidi saporis, & odoris expertis, neque manifeste neque obscure acidi. ℥xij. ℥iij. gr. xxxv. humoris primo obscure acidi, deinde manifeste acidi, austeri, subsalis ℔ij. ℥vij. ℥ij. gr. xxx. humoris rufi, leviter empyreumatici, intense acidi, austeri, cum acredine quadam, obscure subsalis, & alcali ℥vj. gr. xij. olei spissi ℥ij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥ij. ℥vij. gr. xvij. quæ calcinata reliquit cinerum ℥iij. gr. lxj. ex quibus salis fixi mere alcali ℥ij. gr. xxiiij. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥vj. gr. xlij. in calcinatione ℥ij. ℥ij. gr. xxix.

Itaque cortex Citrei mali plurimum olei continet, cum sale essentiali ammoniacali subadstringente conjuncti. Econtra medulla seu succus olei portionem exiguam, & salis acidi evoluti plurimum obinet.

Citrea mala mensis non tam ut alimenta, quam condimenta apponuntur. Saporis, & odoris gratia in taleolas concisa multis ciborum veneribus intermiscuntur sola, vel sacchari polline conspersa. Succo eorum carnes irrorantur: ejus enim aciditas appetitum languentem excitat, & ciborum concoctionem juvat, modo modicus sit illius usus. Cortex exterior propter duritiem in ventriculo difficile concoquitur, quemadmodum & cortex interior seu caro alba.

Commendantur integra contra venena febresque malignas, & pestilenciales: & a pluribus Medicis Theriacæ, Mitridatio, & confectionibus quibuscumque alexiteriis in ipsa pestilentia potiora, & magis proficua censentur. Insuper insigni donantur antiscorbutica virtute, ita ut pro hujus morbi specifico remedio habeantur. Equidem solo succo Citri vel malorum

Citreorum esu scorbutici etiam gravissimi sanantur. Eorundem succo scorbuticorum gingivæ exulceratæ læpius collatæ citissime absterguntur. Batavi certe post diuturniores navigationes in India orientalem, aut alia absita loca, ubi scorbutum sæpissime contrahunt, statim atque Lusitanicas oras attingere possunt, & mala Citria vel Aurantia obtinere, ab eo citissime liberantur. In febribus ardentibus & malignis plurimum conferunt ad sitim extinguendam, bilis aut sanguinis æstum & effervescentiam coercendam, vires prostratas restituendas. His nominibus in potum frustulatim secta conjiciuntur. Succus cum saccharo aqua diluitur, & potum præbet refrigerantem, palato gratum, sanis & ægris saluberrimum. Præterea succus Citri diureticus est, arenulas pellit, & ad affectus nephriticos commendatur: vomitiones cohibet, quas biliosi humores mover: affectionibus melancholicis, & hypochondriacis opitulatur: cordis palpitaciones spasmodicas sistit: languores quos utriusque bilis fervidi vapores faciunt, dilucit.

Externe quoque hæc Mala valde prædicantur in peste, & morbis contagiosis ad contagium arcendum. Pomum Citri solum vel Caryophyllis aromaticis confixum manu assidue gestant, identidem naribus admovent, & interdum morcant. Equidem hoc modo non tam arcetur contagium, quam compescuntur nausæ, & vomitiones, vel ex pravis ægotantium halitibus, vel ab imaginatione læsa oriundæ, quibus ventriculus debilitatur, & ciborum concoctio depravatur.

Exterior cortex flavescens valde odoratus est, & aromaticus, quod vesiculis constet innumeris oleo essentiali repletis. Masticatus oris halitum emendat, amaro ventriculum roborat, vermes necat. Ipsi exsiccat vis cardiaca, & alexiteria tribuitur. Flatus potenter discutit, humores crudos in ventriculo aut in intestinis contentos concoquens, ac digerens. Exsiccatum cardiacum vel alexiterium habetur præstantissimum. Saccharo conditus inter bellaria mensis secundis infertur. Electuariis etiam cardiacis admiscetur adversus morbos contagiosos, vel ad ventriculum roborandum, necnon etiam electuariis, & medicamentis purgantibus ad purgantium medicamentorum vehementiam temperandam.

Ex eodem cortice flavo oleum essenziale extrahitur duplici ratione: vel corticis exterioris recentis tæniæ tenuissimæ inter digitos exprimuntur super vitrum latum vel infundibulum vitreum, in quod ros oleosus cadit qui sensim in olei essentialis summe volatilis, penetrantissimi, & suavissimi guttas majores coalescit, & in aliud vas recipiens stillat: vel iidem cortices ærea vesica cum magna aquæ copia, ignis ope distillantur, ut cætera olea essentialia dicta. Ex his oleosaccharum conficitur quod utiliter julapiis cardiacis, stomachicis, vel extractis purgantibus admiscetur. Sed cavendum est ne immodicus sit horum oleorum essentialium usus, ut jam diximus. Alia est oleosaccharum conficiendi ratio compendiosior, & faciliior; affricantur nimirum integra Citrea, poma durissimo, & siccissimo sacchari frusto tamdiu donec inde extimus flavescens cortex oleosus plane abrasus sit. Saccharum flavo, & oleoso hoc succo imbutum cultro abraditur, & in vase probe clauso reservatur ad usum.

Syrapi tum ex succo acido, tum ex cortice flavo Citri conficiuntur. Ille dicitur syrupus e succo Citri: potenter refrigerat seu sanguinis æstum compescit, bilis effervescentiam coerct, & urinas promovet. Hic syr-
pus

pus flavedinis Citri nuncupatur, & inter cardiaca, & stomachica numeratur. Nonnulli etiam syrupum totius Citri præparant qui utriusque virtutes in seipso retinet.

Coriex interior seu caro alba rarioris est usus in medicina, & difficile coquitur in ventriculo. Nonnulli tamen vim diureticam, imo lithomripticam ipsi tribuunt, sed illam cæteris diureticis valentioribus consociant. Saccharo rite condita inter dulciaria locum tenet.

Ex pulpa Citri seu medulla acida conditum præparatur quod inter alexipharmaca, & antiscorbutica medicamenta annumeratur.

Semina alexipharmaca existimantur. In quibusdam compositionibus alexiteriis usurpantur. Ventriculi, & intestinorum vermes enecant, menses provocant, status discutiunt, humores viscidos attenuant, & dividunt. Ex his emulsiones conficiuntur vermifugæ, & cardiacæ, in morbis mali moris, & pestilentialibus.

Etiamsi in prædictis morbis acida utiliter usurpentur, quia insignem vim habent refrigerandi, aperiendi, pituitam crassam incidendi, putredini resistendi, inflammabilitatem humorum, & eorum acrimoniam demulcendi; advertendum tamen in pleuride, peripneumonia, hæmoptoe, phthisi, cæterisque pulmonum affectionibus, ventriculi, & intestinorum inflammatione, dysenteria, sanguinis mictum, renum, & vesicæ ulceribus, plurimum nocere. Tunc igitur ab illis abstinendum est. Tussim enim provocant, ventriculi, & intestinorum tormina pariunt, diarrhæas aut hæmorrhagias provocant. Speciatim vero de succo Citri, & Limonum Rivierus observat cautum esse debere illius usum; quia frequentius aut nimia copia exhibitus apthas facit in ventriculo, & excoriationes, unde lienteria succedit.

24. Crystall. mineral. ℥j. Sacchar. albi ℥iiij. Coccinillæ gr. xvj. Bulliant in aq. comm. ℔ijß. ad despumationem. In decocto per subdilatam purgato & per inclinationem a fecibus separato ac refrigerato mali Citrei succo exprimat, & sæpius de vase in vas transfundatur liquor pro potu palato grato, in febribus ardentibus, biliosis, malignis, & pestilentialibus peruvili.

25. Folior. or. ℥ijß. Mann. Calabr. ℥ij. Sal. vegetabil. ℥jß. Liquiritiæ rasæ & contus. ℥j. Coriandr. ℥ß. Folior. Pimpinell. Mij. Malum Citreum unum taleolatum sectum. Affund. bull. ℔ij. Macerentur per noctem. Fiat colatura, & erit prisana laxans distribuenda in quatuor doses tertia vel quarta quaque hora sumendas.

26. Radicis Raphani rusticani recens, & minutim concisæ ℥ij. Folior. Cochlear. P. j. Passulas exacinas n. vj. Liquir. rasæ, & contus. ℥ß. Dimidium Citri cum cortice taleolatum concisi, vini, albi, & aq. comm. ana ℔j. Macerentur frigide per 24. horas in vase vitreo rite clauso, identidem agitando. Sit pro potu ordinario in scorbuto.

27. Spir. Cochleariæ, & Sp. vini ana ℥j. Sacci Citri ℥ij. Aq. Nasturtii ℥iiij. Fiat gargarisma in scorbuto ad gingivarum exulcerationes abstergendas.

28. Conserv. Cochlear. ℥ij. Conserv. Lujulæ ℥j. Pulver. Ar. comp. ℥vj. Syrup. e Succo acido Citri q. s. F. electuarium de quo sumat æger ter die ad magnitudinem nucis moschatæ in scorbuto, servatis servandis.

M 4

29. Aquæ

℞. Aquæ Parietar. stillatit. ℥iij. quibus dilue syrup. e succo Citri vel Limonum ℥i. Adde olei Amygdalar. dulc. ℥j. F. posio oleosa in doloribus nephriticis perutilis.

Observabunt Tyrones in julapiis cardiacis, & diaphoreticis Stibii præparationes diaphoreticas cum acido succo Citri vel Limonum permiscendas non esse, ne emeticæ fiant. Caveant pariter ne acida emulsionibus commisceant: quippe substantiam lactescentem facile præcipitant.

Cortex Citri tum conditus, tum sciscus usurpatur in opiata *Salomonis*, electuar. de Citro solutivo, Tabellis contra vermes laxativis *Penicher. colledan. Pharm.* Pulver. lætificante, & digestivo *ejusdem*. Semina ulurpantur in diamargarito frigido *Codicis Paris.* Tabellis contra vermes, Pulver. Pannonico *Charas*, confectione, & Hyacinthis, & opiata *Salomonis*.

Limon, mali Limonia *Off.* Limon vulgaris *Ferrarii besperid.* 193. *I. R. H.* 621. Malus Limonia acida *C. B. P.* 436. Limonia malus *J. B.* 196. Limones *Lobel. Icon.* 143. vulgo, *Limonier* cujus fructus *Limon*.

Citro congener est malus Limonia quam ea de causa hic adjungimus. Arbor enim satis procera, nec tamen admodum plerumque ramosa: oblongo Citri folio, sed brevior: crebris sæpe aculeis, at minoribus, & venenatis: languidi odoris flores propemodum æquali, fructu in ovatam figuram conglobato sed contractiore, remissius flavente, ac levius odorato Citrum ex parte repræsentat. Ab eo tamen distinguitur fructu minore, cortice carnosio seu interiore tenuiore, copiosiore pulpa, & succo uberiore, ut interdum nihil fere nisi succum contineat, eoque magis acido quam quæ mandi facile queat. In hortis Galliæ meridionalis colitur. Poma in ulum veniunt, & medicum, & culinarium.

Limonia mala, cum Aurantiis, & Citreis sint gustu acidiora, ideo magis refrigerantia esse verisimile est. Valent ad eisdem usum atque Citrea; ad venena tamen ut minus efficacia, ita ad æstuentes morbos valentiora habentur. Cortices Limonum saccharo condiuntur pro bellariis. Fructus integri parvi, & virides condiuntur quoque, & inter stomachica recensentur. Quidam Mala hæc taleolatim secta, alperfo multo saccharo, comedunt, sicque appetitum languentem excitant, sitim potenter extinguunt, & febrilem ardorem compescunt. Succus Limonum admodum efficax in dissolvendis calculis, & detergendis viis urinariis censetur. Sed ne quid nimis.

Syrupus de succo Limonum in officinis præparatur commendatus ad calculum, & obstructions renum: item ad sitim, & æstum in febris ardentibus: cordi, & ventriculo robur addit, & bilis effervescentiam compescit; ideoque haud infeliciter imbecillitates, hypothyrias, vomitus, & singultus febris ardentibus supervenientes curat.

Succus Limonum tinctoribus utilis est ad colores multos transmutandos, aut fixiores efficiendos. Quæ hoc succo exarantur super chartam litterarum occultarum, igni admotæ manifestæ fiunt.

C I T R U L L U S.

Citrulus, & Anguria, *Offic.* Anguria Citrullus dicta C. B. P. 312. *Inst. R. H.* 106. Citrullus folio Colocynthis secto, semine nigro, quibuldam Anguria J. B. 2. 235. Anguria, Cucumis, Citrullus *Dod. Pempt.* 664. Cucumber, vel Cucumis Citrullus *Fuebf.* vulgo, *Citroville*.

Radices habet tenues, rectas, fibratas, capillatasque, spargit per terram sarmenta fragilia, hirsuta, foliis vestita amplis, in profundas lacinias dissectis, asperis, & hirtis, e quorum sinu exeunt capreoli, necnon pediculi, flores sustinentes luteos, campaniformes, patentes, quinquifidos, quorum alii steriles sunt, alii fecundi seu insidentes embryoni qui deinde abit in fructum magnum, & rotundum, quem vix anibabus ulnis ambias: cortex duriusculus sed lævis, nullis tuberculis inæqualis, atro-viridis, dilute virentibus maculis aut albicantibus perfusus: caro Cucumeris vulgaris, alba vel subrubra, firma, grati saporis. Semen fungosum medullulium occupante substantia immergitur oblongum, latum, compressum, rhomboideum, flavescens aut subrubens, rugosum, duriusculo cortice præditum, sub quo medulla alba elui grata ut Cucurbitarum. Hortos olitorios locupletat. Caro edulis est, & semen e numero quatuor frigidorum majorum.

Analyti chymica, ex carnis Citrulli ℔v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, saporis, & odoris herbacei, obscure subfalsi, ℥vij. ℥vij. gr. xlvij. humoris limpidi, obscure subacidi ℔ij. ℥v. ℥ijj. gr. xliij. manifeste acidi ac tandem intensi ℔ij. ℥ij. gr. lxxvj. humoris rufescentis, alcali, urinosi ℥v. olei spissi, & gravis ℥ij. gr. xxxvj. Massa nigra in retorta superstes, & jam semi-calcinata pendebat ℥vij. gr. lxxij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥ijj. gr. xij, ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥ij. gr. xxvj. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥j. gr. xxxiiij. in calcinatione ℥ij. gr. l.

Citrullus plurimum phlegmatis continet, mediocrem salts essentialis tartarei, & ammoniacalis portionem, olei vero aliquantulum a sale essentiali ita divisum, ut liquorem aliquantisper mucaginosum constituat. Hic liquor fermentatione saporem nonnihil vinosum adipiscitur, evolutione nempe salis acidi, & olei, sed multo phlegmate obrutorum.

Citrulli caro, quæ cortici subest, a nonnullis cruda, sed frequentius cocta comeditur. Nutrimentum autem confert exiguum, sanguinemque producit aquosum, qui internarum partium inflammationes mitigat, & bilis acrimoniam ac fervorem contemperat. Infinitis modis culinæ eam parant, elixant, fringunt, assant; butyro, lacte, sale, cepis, aromatis, & saccharo condiunt. Imo & Citrulli pulpæ admixta triticea farina, panis conficitur qui flavescit, sapit suaviter, & in refrigerium salubriter assumitur.

Semina refrigerant, & eam ob causam inter semina frigida majora recensentur. Urinas movere dicuntur, vel potius urinarum acrimoniam demulcent, & sanguinis effervescentiam compescendo ejus feri secretionem per renēs juvant. Eapropter emulsionem ex his parantur cum decoctis vel aquis

aquis convenientibus in febris ardentibus, dysuria, ischuria, ardore urinæ, calculo, renum aut vesicæ exulceratione, arthritidis doloribus; & cum aliis feminibus frigidis consociari solent. Cum medicamentis purgantibus nonnunquam admiscuntur ad eorum vehementiam retundendam.

Oleum ex feminibus expressum cutim emollit, ejus inæqualitates laxigar & vitia delet, in pomatis cosmeticis sæpe usurpatur.

24. Seminum Citrulli. & Melonum ana ʒi. Semin. Papaver. alb. ʒß. Contunde in mortario marmoreo sensim affundendo aq. Lactucæ, Portulacæ, vel Papaver. rhæad. ana ʒvj. Colatura cum expressione facta dilue syrup. de Nymphæa, vel Diacodii ʒvj. F. emulsio hora somni propinanda ad sanguinis æstum coercendum & somnum conciliandum.

24. Semin. Citrulli. Cucumer. Cucurbitæ & Melon. ana ʒi. Amygdalar. dulc. decorricatar. paria vj. Contundantur sensim affundendo decocti Hord. vel aquar. Lactuc. Portulacæ lbij. Expressione dilue syrup. de Althæa vel Neuphar. ʒij. F. emulsio. Sumat æger per cyathos inter juscula, in febris ardentibus, renum aut vesicæ affectionibus.

24. Quatuor semin. frigidior. major. ʒß. Semin. Card. bened. ʒi. Decoct. Scorsonner. vel aquar. Ulmar. Scabios. aut Bugloss. ʒxij. F. emulsio qua dilue syrup. Caryophyllor. hortens. vel syrup. flavedin. Citri ʒj, pro duabus dosibus. Unicuique addi potest Diaphor. mineral. ad gr. xv. aut conf. Alkermes ad ʒß. in febris malignis aut pestilentialibus.

Usurpantur semina Citrulli in pulvere Haly Pharm. Lond. Pulvere Diatraganthi frigidi, Charas, Electuario Diapruno, El. de Psyllio & El. de succo Violar. Charas.

24. 4. S. Semin. frigidior. major. ʒj. Contusa insuantur in ventre pulli gallinacei & coquantur in aq. communis lbij. ad lbij. Aqua Pullastri dicitur, quæ per cyathos propinatur in juscula.

COCHLEARIA.

Cochlearia, Off. Cochlearia folio subrotundo, C. B. P. 110: *Inf.* R. H. 215. Cochlearia, J. B. 2. 942. *Dodon. Tempt.* 594. Cochlearia major Batavica subrotundo folio, *Moriss. H. Oxon.* Britannica, *Gesner.* vulgo, *Herbe aux Cuilliers.*

Radice est candida, crassiuscula, recta, fibrata & capillata: foliis multis, satore virentibus, rotundioribus, auritis, unciam longis, cochlearis sere in modum nonnihil cavis, succi plenis, crassis & pediculis palmariibus insidentibus, acribus, pungentibus, amaricantibus, odoris nidorosi ingrati: caules ramosi sunt, supini, cubitales, glabri, foliis onusti magis laciniatis, longioribus & sine pediculis, floribus ornati tetrapetalis, cruciformibus, candidis, cum calyce quadrifolio & pistillo abeunte in fructum membranaceum, sphericum, duas lineas longum, bicuscularem, in quo semina continentur parva, subrotunda, rufa. Nascitur in Pyrenæis & in ora maritima Belgii. Planta integra usu est.

Analysi chymica, Cochleariæ floridæ lbv. demptis radicibus præbuerunt

sunt humoris primo albicantis, deinde limpidi, 'saporis acris,' linguam pungentis, odoris penetrantis, Cochleariam crudam referentis, tandem saporis minus acris & acidi lbj. ℥xliij. ℥iij. gr. lx. humoris primo limpidi, deinde rufescentis, acidi, empyreumatici, postea acidi austeri lbj. ℥x. gr. lx. humoris rufescentis, sale volatili urinato imprægnati ℥vij. gr. xxiiij. olei spissi adiposi ℥vj. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥iij. ℥j. gr. liiij. quæ calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥vj. gr. vj. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥vj. gr. xlvij. extracta sunt. Partium iactura in distillatione fuit ℥ij. ℥j. gr. xliij. in calcinatione ℥j. ℥iij. gr. xlvij.

Phlegma quod primum in distillatione prodit, turbidum est ab oleo quodam tenui, acri, pungente & summe volatili, a quo plantæ odor & sapor acris præcipue pendebat. Præterea sale essentiali ammoniacali donatur hæc planta copioso phlegmate diluto. His principiis Cochlearia humores lentos & crassos incidit & attenuat, illisque morbis medetur quibus hoc humorum lentore originem ducunt, in primis vero scorbuto, cujus peculiare seu specificum, ut vocant, medicamentum est, unde & Germanice & Anglice inde nomen sumpsit. Usurpari solet a nonnullis in jure carniū lacte aut vino decocta. Verum quia partes illæ, in quibus præcipua vis & utilitas hujus herbæ consistit, admodum volatiles sunt, & coctione facile evanescent; J. Raius multa cum ratione satius esse putat succum herbæ expressum aut ejus infusum exhibere quam decoctum.

Herba recens leviter contusa vel potius incisa cerevisiæ, vino vel aquæ infusa in vitro probe obturato, intra tres quatuorve dies totam suam vim antiscorbuticam seu spiritum volatilem eis communicat. J. Raius experientia fretus cerevisiam sic præparatam pro potu ordinario scorbuticis commendat. Minus proficua est, observat idem auctor, in qua Cochlearia diu infusa fuerit: nam diuturna infusione partes terræ & fixiores herbæ eliciuntur & cerevisiæ communicantur, partesque volatiles vel avolant, vel cum fixioribus complicatæ vim suam amittunt. Herba exsiccata nil vel parum habet virtutis. Extractum a nonnullis laudatur, sed in eo parum energię deprehenditur: diuturna enim evaporatione spirituosæ hujus plantæ partes avolaverunt.

Licet autem in scorbuto curando Cochlearia apud septentrionales populos primum ducat, attamen non omnibus naturis conducit. Nam illis, qui phlogosi vagæ, observante Ettmullero, rubori faciei, palpitationibus cordis, hypercatharsi, cephalalgis, & aliis symptomatibus sunt obnoxii, acria hæc non conducunt, sed potius nocent; nisi cum Acetosa, Acetosella, Beccabunga, vel lacte, vel sero lactis aut vino propinentur, ut ita temperetur acrimonia eorum volatilis. Unde iis qui laborant febre intermittente scorbutica, cujus norma est typus erraticus, medicamenta antiscorbutica præscribit in sero lactis quod egregie abstergit.

Joannes Junckerus in *Medicinæ conspectu*, pro variis naturis varias antiscorbuticorum classes constituit. Temperamentis phlegmaticis acriora & penetrantiora, Cochleariam scilicet, Nasturtiorum genera, Raphanacea Armoraciam, Sinapi, Cæpas, Allium proponit: melancholicis amara, scilicet Beccabungam, Fumariam, Trifolium fibrinum, Chelidonium minus, Cichorium, Chærophyllo assignat: sanguineo-cholericis acida vel sola

fola vel cæteris confociata, qualia sunt Acerofa, Oxytriphylum, fuccus Citri, Limonum, Ribium, Berberum, &c. præfcribit. Verum quamplurimi & magni nominis Medici acerbis medicamentis antifeorbuticis acida confociare amant. Ufu Felici Th. Sydenham cum Cochleariæ condito Majorum Citreorum vel Aurantium pulpam adjungit; Martinus Lifter *Exerc. de Scorbuto*, acidis omnes fructuum succos, acetum & ipsum vitrioli spiritum; Simon Paulli mixturam simplicem ad ℥j. cum succo Cochleariæ permilcet; & Groenlandi populi diuturna experientia edocti ad scorbutum curandum Cochleariam & Acerofam promiscue apud eos sponte nascentes usurpant. Reipfa in scorbuto incipiente sanguis & lymphæ spiffiora sunt, motu circulari per artus lente admodum circumferuntur, & vitali fere destituuntur fermentatione, ac proinde acerbis & spirituosius medicamentis indigent, ad torpidas fibrarum solidarum oscillationes concitandas, ad humorum lentorem dissolvendum, & eorum motus tum circularem, tum fermentativum concitandum; verumtamen in scorbuto jam confirmato humores stagnatione & mora quamdam susceperunt putredinem, qua sales in illis contenti urinosam indolem contrahunt, & evolvuntur, ut in sanguine, sero, & urina putrescentibus observare licet, & sui juris fiunt. Tunc autem urinosi sales, si spirituosius & actuosius antifeorbuticorum medicamentorum partibus concitentur, & agitentur, sulphureas humorum partes carminant & dividunt, spiffam & viscidam humorum crasim destruunt coagula dissolvendo, partes solidas corrodunt, unde tot scorbuti symptomata. At vero acidorum subtilium & volatilium ex vegetabili potissimum desumptorum intramissionem hi sales urinosi a speculis acidorum irretiuntur, & ex amborum confociatione exsurgit sal salus non amplius reformidandus, qui ut plurimum per vias urinarias blande & placide secernitur. Actuosius vero partibus quæ inter acida vegetabilium spicula latent, vel quæ cum illis a prudente Medico confociantur, spiffior humorum crasis diluitur, & blanda vitalisque fermentatio restituitur. Illis, qui hujus succum fastidiunt, S. Paulli Cochleariæ essentiam liquidam proponit in Germania celebratam, quam eo parant modo.

℥j. Cochlear. recentis contusæ q. v. Assunde ejusdem plantæ succum in quo tantillum fermenti vel fœcis cerevisiæ solutum sit. Irrofa, consperge raro sale. Hæc probe mixta reponantur vase optime operculato ramdiu in locum subterraneum usque dum acriorem odorem spirent. Tunc distillantur per alambicem in balneo M. & obtinebitur spiritus Cochleariæ. Postea

℥j. Recentia Cochlear. folia. Contunde & torculari valido ex iis succum exprime, eumque in vase aut vitro optime lutato defœca & per chartam bibulam philtrea.

Hujus hac arte depurati succi tribus partibus affunde partem unam spiritus Cochleariæ supra descripti. Digere, & circula l. a. Quibus si addideris paululum Sacchari, essentia Cochleariæ parata est. Dosis ℥j. aut ℥ij. Adhuc præstantior erit, si mixturæ simplicis distillæ aliquot guttulæ ad ℥j. pro dosi remisceantur.

Spiritus antifeorbuticus præstans præparatur ex aliquot manipulis foliorum Cochleariæ contusarum & totidem uncis radicis Raphani rusticani rasæ simul mixtis, succo Cochleariæ irroratis, per 24. horas maceratis ac tandem blando ignis calore distillar. Hujus spiritus unum aut alterum cochlear jusculis vel potionibus antifeorbuticis affunditur.

Spī-

Spiritus Cochleariæ, annotante J. Junkero; concitat facile sanguinem, infert anxietates, æstuosam cephalalgiam, & maculas nimium expellit. Major in *Chirurgia infusoria*, p. 270. observat spiritum Cochleariæ quibusdam cephalalgiam concitare. Ideo cum acidis liquoribus hunc spiritum semper miscendum esse Ettmullerus existimat.

24. Radicum Raphani rusticani, Scrophular. minor. Helenii, & Acetosæ ana ʒß. Folior. Fumariz, Becabung. Nasturtii aquatici, ana M. j. Summitatum Pini & Abietis, florum Centaur. minor. & Genisti, ana P. j. Seminum Erucæ & Aquilegiæ, Bacchar. Juniper. contus. ana ʒj. Coquantur in aq. comm. ℥vj. ad ℥v. addendo sub finem folior. Sempervivi minor. P. ij. Cochlear. M. j. Apozema colesur ad usum. Dosis ʒvj. cum syr. Limon. ʒß. quater die in scorbuto.

25. Aquar. stillatitiar. Raphan. rusticani, Nasturtii, Becabung. ana ʒij. Succu Cochlear. ʒj. Mixtur. simplicis gutt. xxx. Syr. Limon. ʒß. F. julap. in scorbuto.

26. Folior. Cochlear. Becabung. Nasturtii Cichor. sylvestr. Oxytriphyll. & Acetosæ rotund. ana M. j. cum frustulo carnis vitulinæ. Fiat jusculum in baln. Mariæ in vase probe obturato.

27. Rad. Raph. rusticana ʒj. fol. Cochlear. & Nasturtii contusor. ana M. ij. Passular. excinatar. ʒvj. Fiat infusio ex vini albi vel seri lactis ℥ij. De qua capiat ʒiv.

Externe in scorbuticis oris affectionibus, tumore cruentato gingivarum. earumdem inflammatione, exulceratione, dentium vacillatione, Cochleariæ succus vel ejus spiritus apprime conducunt. His humectetur lintheum, quod postmodum affricetur gingivis & partibus oris scorbuto affectis. Vel etiam in gargarismatis recipiuntur. Quidam in succo Cochleariæ aluminis ossi tantillum dissolvunt & sic parant gargarisma in excrefcentia gingivarum scorbutica egregium.

Cochleariæ succus cum herba contusa & imposita faciei maculas intra breve spatium tollit: postea vero decocto sursuris abluenda est.

Cochleariæ conditum & aquam distillatam in Officinis præparant ad scorbutum & in viscerum obstructionibus perutilia.

COLCHICUM.

Colchicum vulgare, Off. Colchicum commune, C. B. P. 67. *Inf. R. H.* 348. Colchicum, *J. B.* 2. 649. *Dodon.* 460. Colchicum Anglicum purpureum, & Anglicum album, *Prakins*, & *Gerard.* vulgo, *Colchique*.

Paulo ante autumnum æquinoctium flores erumpunt, nullis jam apparentibus foliis, liliacei, monopetali, ab ipsa radice emergentes sub rubi tenuissimi, tenerioris, albicantis forma in sex partes sensim ampliati. Croci stoculis, & forma, & colore assimiles, dilutius tamen cærulei, staminibus internis pallide luteis & pistillo e floris fundo surgente, & in capillamenta tenuia desinente. Postquam unum aut alterum diem duravetint, flaccescunt. Deinde post sequentis veris initium folia profert terna aut quaterna, oblonga, lata,

lata, lævia, pinguis, Liliū albi foliis, & forma & lævore satis similia: inter quæ medii in brevibus pediculis exeunt duo, tres aut quatuor instar filiorum, quarum folliculi triangulares, crassi, oblongi, in tria loculamenta divisi, & per maturitatem in tres sese explicantes partes, semine pleni rotundiusculo, & rufo colore nigricante, quo maturo folia una cum cauliculis intercidunt.

Radice nititur bulbo simili, turbinata, ab una parte in planum compressa, rimam sive sulcum cum floret habente, reliquo tempore non apparentem, tunicis convoluta nigricantibus & fibris aliquot inferius donata. Bulbus ipse carnosus, candidus, lacteo succo manans dum quidem viret & recenter e terra erutus: siccatus etenim rugosus, & foris intusque nigricat, aut obscure rubescit. Sapore autem est dulci, amaritudinis: tamen exiguum salivam eliciens subsequitur. Odorem vero omnes partes gravem & nauseabundum spirant. In pratis agri Parisiensis sponte nascitur.

Medici veteres & Neoterici unanimi consensu Colchici radicem venenatam esse & in cibo acceptam necare pronuntiant. Ferunt eos, qui Colchici radicem comederunt, pruritu per totum corpus affici, in internis partibus morsum, & circa stomachum cum multa gravitate æstum percipere: invalescente vero affectione per alvum cruenta cum ramentis admixta excernere. D. Ludovici narrat unicum Colchici radicem rustico cuidam robusto exhibitam validissime & ad necem usque purgavisse. Petrus Garidel in *Hist. Plant. Aquiseiensis*, refert quosdam rusticos tres quatuorve Colchici flores febri intermittente laborantibus comedendos offerre & sæpe felici cum successu. At ipse quamdam vidit ancillam quæ hocce a rusticis acceptum remedium sumperat, diris anxietatibus circa præcordia & ventris torminibus per tres dies vexata, quæ tandem post triduum intesti. Legitur apud Historiæ Lugdunensis auctores, Turcas Colchici floribus uti cum inebriari volunt: eos enim vino macerant, quo epoto adeo stupidi redduntur, ut in ekstasim abeant. Unde liquet hanc plantam omnibus suis partibus deleteriam esse.

His, qui Colchici bulbum sumperunt auxilium ferendum non per vomitum, per clysteres ex decoctis demulcentibus foliorum & radicum Althææ seminis Lini, &c. deinde lac quodcumque calidum magna copia propinandum est.

Externe vero non nocet, imo juvat. J. Bauhinus refert, quemdam Medicum ad verrucas anni Colchici bulbos rufos cataplasmatibus modo superligare: quo remedio excidunt: eundemque ad pediculos latos pudendorum eorumdem decocto ex aqua locum affectum abluere.

At præstantiorem hujus radiciis energiam Georg. Volfgangus Vvedelius peculiari dissertatione nuperrime promulgavit sub hoc titulo *Experimentum curiosum de Colchico veneno & alexipharmaco simplici, & composito*. Græna 1718.

Celebris ille Medicus & summa eruditione & diuturna felicitque praxi clarus narrat se ab anno 1668, in hunc usque annum 1718, hanc radicem pro amuleto collo appensam semper gestasse & optimo quidem cum successu, neque seipsum solum, sed & alios plurimos, neque solum in peste, sed etiam in morbis epidemicis quibuscumque, dysenteria, febribus malignis, variolis, morbillis, & similibus.

Qc;

Occasione qua hoc amuletum sibi ipsi innotuit sic refert. Cum anno 1668. in urbe Gothana strages dysenterica sævire incipiebat, qua minimum quadringenti ipsi curandi incumbabant homines malignis symptomatibus affecti, cum petechiis, deliriis, faucium inflammationibus decumbentes & quotidie invifendi per duos menses & ultra, ipsi occurrit dissertatio, quædam antiloimica de peste universali anno 1637. grassante cum quibusdam remediis & arcanis. Auctor nomine Caspar narrat, quemdam præfectum militum in bellis Hungaricis suos milites solo hoc amuleto a sævienti peste immunes semper fecisse, quod a rusticano didicerat, qui asserbat omnes vicini cuiusdam pagi incolas ab eodem præfecto hic degente eodem amuleto præmunitos, pestifera lue effectos non fuisse, dum in pagis, & urbibus vicinis dire sæviret. Laudata experientia inducti Vedelius, & socii appendere cœperant radicem, & nullus eorum contagiosa hac pestilente dysenteria affectus fuit.

Cum ante aliquot annos, addit Vedelius, in urbe Hamburgensi grassaretur pestis, illustris Magistratus a facultate Medica nostra desiderabat duos Medicos pestilenciales, quos illuc mandabamus divinæ tutelæ commissos, & hoc amuletum ipsis appendendum suadebamus. Bene gesta re, liberata urbe, salvi utrique & incolumes redierunt.

Grassantibus variolis ejusdem amuleti efficaciam deprehendisse testatur. Data enim essentia præservativa interne, & amuleto hoc munito corpore vel non correpti sunt quamplurimi, vel levius affecti feliciter evasere.

Huic bulbo idem auctor Plantaginis majoris radicem sæpius adjunxit pro amuleto antipestilentiali valde commendatam. Has radices suo tempore collectas, exsiccatas, & coctas cum tantillo pulveris Lavandulæ admixto, ut res coletur, & sacco inclusas distribuere solebat & Arcanum duplicatum catholicum nominabat. Hoc tandem comprobata quinquaginta annorum experientia publici juris facere non dubitavit velut alexipharmacum pestis, febrium ardentium, malignarum, variolarum, morbillorum purpuræ simplicis puerperarum, dysentericæ & similium: ita ut vel non corripiant homines, vel minori copia, minori molestia, & periculo.

Attamen Vedelius observat legitimam dietam insuper requiri, vitando noxia & moderationem servando in rebus dictis sex non naturalibus, ære, cibo & potu, somno, motu, & vigiliis, & quiete, excretis & retentis, & animi pathematibus.

Colchici bulbi colligi debent circa festum Sancti Michaelis seu autumnale æquinoctium, dum flores marcescere incipiunt. Tunc enim radix succo turget. Taleolarum concisi in umbra exsiccantur. Cum uno Colchici bulbo crassiuscule contuso radicis Plantaginis majoris seu latifoliæ exsiccatæ, & contusæ ℥j. permiscetur. Sacculo sericeo incluso de collo suspenduntur, ita ut circa cordis scrobiculum pendeant. Nonnulli his radicibus Camphoræ tantillum addunt: post tres menses amuletum renovandum est.

Jacobus Vvolffius Medicinæ Professor Jenensis in tractatu cujus titulus est *Curiosus Amuletorum scrutator*, testatur hoc amuletum a plurimis laudatum & commendatum fuisse variis temporibus in Germania grassante peste.

peste . At exemplum deficientis hujus amuleti refert in quodam Theologo insigni in Thuringia qui hoc amuleto præmunitus nihilominus febre maligna correptus fuit & interiit . At non ideo omnis virtus huic amuleto deneganda . Non ideo enim medicamentum rejiciendum est , & reprobandum quod una aut altera vice inefficax deprehendatur , modo sæpius profecerit . D. Aug. Quirinus Rivinus *Tractatu de Peste Lipsienfi anno 1680.* de hoc amuleto sibi ipsi communicato mentionem facit tanquam certissimo contra pestem : & postea suam de his amuletis mentem aperit : & non alium esse eorum usum , nisi quod his confisi præsidii plebei præsertim magnanimi reddantur , minusque contagium perhorrescant , existimat . Omnes autem norunt quid valeat terror , quantum pestilentia vires adauget .

CONSOLIDA.

Plantæ plurimæ Consolidarum nomen acceperunt propter virtutem vulnera consolidandi , quæ ipsis tribuitur . Sex septemve in Officiis usitatæ sub hoc nomine prostant : scilicet Consolida major , seu Symphytum : majus consolida media , quæ duplex ; Bugula una , altera Bellis major sive Leucanthemum ; consolida minor quæ etiam duplex ; Brunella & Bellis minor : Consolida rubra sive Tormentilla ; denique Consolida Sarracenica quæ Virga aurea . De Bugula , Brunella , Ballide majori , & minori suo loco jam egimus : de Consolida rubra differemus sub nomine Tormentillæ , & de Consolida Sarracenica sub nomine Virgæ aureæ . Hic vero Consolidam majorem tractabimus . Alia consolida in hortis sæpius colitur ad ornamentum , quæ Consolida regalis seu regia , sed nullius fere usus est .

Consolida major , Symphytum majus , *Off.* Symphytum , consolida major , C. B. P. 259. *Inst.* R. H. 138. Symphytum magnum , J. B. 3. 593. *Dod. Pempt.* 134. Consolida major , *Trag.* 240. Symphytum Alum seu Alus . *Lobel. Icon.* 338. vulgo , *Grande Consolide* , *Oreille d'âne* .

Radicibus est crassis , multifidis , carnosis , foris nigris , intus albis , viscidis , & glutinosis : caulibus sesquicubitalibus , inanibus , hirsutis , asperis , & alatis folia duas spithamas longa sunt , aspera , hirsuta , obscure virentia palmam lata , mucronata . Flores in summis ramulis & caulibus oriuntur multi , eleganti serie dispositi , antequam aperiuntur caudæ scorpij in modum revoluti , penduli , monopetali , albi , aut purpurascetes , infundibuliformes oblongi & quasi campaniformes , quatuor lineas longi , leviter quinquepartiti , cum calyce quinquifido & pistillo longo flori concolori e centro calycis oriundo abeunte , in quaterna semina caput viperinum referentia , nigricantia & splendentia . Agri Parisiensis incolæ nascitur in pratis , & secus rivulos . Folia , flores ; sed radix potissimum in usum veniunt .

Analysi chymica , ex radicum recentium Symphyti majoris hæc per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi , saporis , & odoris herbacei , obscure subalsi ℥ix. ℥j. gr. xij. humoris subacidi ℔j. ℥xij. ℥vij. gr. xlij. humoris limpidi , sub finem rufescenti , acidi , subausteri ℔j. ℥xij. ℥vij. gr. xlviii. humoris rufescentis , empyreumatici , intense acidi , subacris ac tandem urinosis , & sale

sale volatili urinoso, parco tamen imprægnati ℥iij. ℥vj. gr. xxiiij. olei spissi, gr. lx. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥vj. ℥iij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥v. gr. liij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥v. gr. xxx. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥v. gr. xxx. in calcinatione ℥iij. ℥v. gr. xviii.

Ex foliis pariter plurimum phlegmatis subacidi extrahitur, olei portio exigua, aliquantulum spiritus urinosi, nullus sal volatilis urinosus concretus; remanet vero terra copiosa cum mediocri salis alcali fixi quantitate. Succus foliorum & radicum satius est & mucaginosus, chartam cœruleam levissimo colore rubro tingit. Tournesortius salem hujus plantæ essentialem sali Coralliorum comparat cum aliquanta salis ammoniaci portione conjuncto. Ex eorum & pauci olei miscela compositum exsurgit mucaginosum, unde ejus vires præcipue emanant.

Radix crassiore mucagine pollet quam Althæa cum qua convenit. Speciatim vulnerarium est, antidyentericum & antihæmopticum. Adstringit autem, consolidat, incrassat, & egregie temperat, serum salsum & acre corrigit. Pulvis radice exhibetur ad ℥j. In infuso vel decocto præscribitur ab ℥ss. ad ℥j. Condritum quoque ex ea paratur in Officinis, ad ℥ij. vel ℥ss. sumendum. Observandum est decoctionem hujus radiceis mediocrem esse debere, ne decoctum mucilaginofum fiat & nimis glutinosum ac proinde palato & stomacho ingratum & noxium. Eadem radix in ulcere pulmonum & in aliis eorum affectionibus quæ a tenui, subtili, acri, & calida materia eveniunt, commendatur; sanguinis creatum & fluxorem sistit, renum & vesicæ exulcerationibus medetur, dysenterię prodest tam per os sumpta, quam sub enematis forma injecta. Externe & interne exhibita enterocelas cohibet, ossibus fractis mederi dicitur, vulneribus consolidandis efficax est. Florum decoctum ex vino bis in die sumptum in cruenta urina optimum scribit Camerarius.

24. Radic. Symphyt. maj. taleolarim sectæ ℥j. Orizæ lotæ ℥ss. Liquir. ras. & contrul. ℥j. Coq. in aq. fluv. ℔iij. ad ℔iij. F. persana in hæmoptoe.
24. Pulmonis vitulini dimidiam partem minutim sectam, Orizæ cochlearia duo, radice Symphyti maj. ℥ij. fol. Urtic. urentis & Plantag. ana M. j. Coq. in aq. comm. q. s. F. juicula duo in sputo cruento. Vel
24. Pulver. ad. Symph. major. Terræ japonic. ana ℥j. Succin. pp. Mastiches pulver. ana ℥ss. syr. Corallior. q. s. M. F. opiata. Dosis ℥j. ter quaterve die.
24. Pulver. Symph. major. & Tormentill. ana ℥j. fol. Alchimill. Plantag. ana M. j. flor. Hyperic. M. ss. Coq. leviter in aq. comm. ℔j. Colatura dilue syrup. de Symph. Fernel. ℥j. F. tres doses quarta quæque hora sumendæ in hæmorrhagiis.
24. Rad. Consolid. major. ℥j. radice Tormentill. & Bistortæ ana ℥ss. folior. Pyrol. Alchymill. & Sanicul. ana M. j. Coq. in aquæ Chalybeatæ q. s. Colaturæ adde olei Hyperic. ℥j. F. enema antidyentericum.

Externe admota Symphyti radix vulnera conglutinat, dolores compefcit, fracturas ossium consolidat, herniis & luxationibus confert, atque potenter adstringit. In luxationibus & fracturis ossium Ertmullerus commendat cataplasma factum ex radice Symph. major. contusa, permixta

cum pulvere osteocollæ, vel etiam cataplasma ex radicibus Symphyti & foliis & radicibus Geranii rubri seu sanguinei. Parkinsonus & Rajus radices recentes minutim concisas, tulas & impositas ad dolores podagricos leniendos & ulcera serpentina aut etiam gangrænas compescendas plurimum laudant. Cataplasma sequens a Paulo Hermanno ad quamvis herniam recentem ex laxato peritoneo commendatur.

24. Semin. Nasturtii horrenf. ʒß. Gummi. Carann. Mucaginis ex rad. Symph. extract. ana ʒi. F. cataplasma.

Ex Symphyti radicibus paratur (syrupus de Symphyro simplex, seu syrupus Boyleanus a celeberrimo Roberto Boyle plurimum laudatus pro hæmoptoicis. Sic autem conficitur.

24. Radic. Symphyt. major. ʒiiij. folior. Plantag. M. xij. Contusis exprimatur succus cui adde Sacchari pondus æquale & fiat syrupus s. a.

Ulsurpatur insuper radix Consolidæ in pulvere *Bauderoni* ad puerorum enterocolem, Balsamo polychresto *Ejusdem*, Aqua vulneraria *Lemery*, Unguento mundificativo de Apio, Emplastro ad herniam *Charas*, Emplastro pro fracturis & luxatione ossium *Ejusdem*, Emplastro Regio ad herniam, vulgo, *du Prieur de Cabrieres*.

C O R I A N D R U M.

Coriandrum, Offic. Coriandrum majus, C. B. P. 158. *Inf. R. H.* 316. Coriandrum, *Lobel. Icon.* 705. *J. B.* 3. 2. 89.

Radice est tenui, candida, simplici, nonnullis fibris stipata: caule simplici, gracili, tereti, glabro, medulla sarcto, sesquicubitali, ramoso: foliis inferioribus quasi conjugatis, rotundioribus, pulchre incisís, superioribus multifidis ac profunde dissectis. Flores in summis ramulis adsunt in umbellam digesti rosacei, ex albo purpurascens, ex quinque petalis inæqualibus & bifidis constantes, cum calyce in duo semina abeunte quæ simul juncta sphaeram integram complent primo viridem, deinde pallide flavescentem. Odor totius plantæ aromaticus sed vehemens, gravis & ad cimum odorem accedens. Semen odor progressu temporis miscet & suavior fit, gratusque sapor. In arvis circa Parisios colitur. Semen solum in usum venit.

Coriandri semen dum recens est, habet odorem gravem, aliquantisper virosum, caput tentantem, qui tamen per exsiccationem & progressu temporis evanescit & in gratum ac suavem odorem convertitur. Oleum essentielle tenue, odorum, & aromaticum analysi chymica suppedirat, cum phlegmate acido & aliqua spiritus urinosi portione.

Magna de Coriandri facultatibus inter auctores agitur controversia. Plerique Arabes & Græcorum nonnulli Coriandro trigidam facultatem, narcoticam, stupefacientem aique deleteriam tribuunt. His adstipulatur Matthiolus, qui asserit semen in ciborum aut medicamentorum usum nunquam admitti debere, nisi prius triduo aceto fuerit maceratum. Tragus etiam, qui monet seplasiarios, ne semen cuiquam nisi prius dicto modo præparatum vel cum Saccharo vendant, nisi venenum loco remediî exhiberi velint.

His

His adversantur Lobelius & Alpinus, qui afferunt herbæ etiam virentis usum in cibo esse apud omnes Ægyptios familiarissimum. Hispani quoque, auctore Amaro, frequentissime illa utuntur & pro cordiali habent. Nihilominus tamen experientia docuit, monachos in Mesuem propter hunc usum Hispanorum plurimos esse fatuos, ob quorum curam iam frequenter a sunt valetudinaria publica. Malignitatem arguit fœtor plantæ digitis comminutæ terribimus. Utcumque hoc medicamento propter malignam vim quæ ei a multis dubio procul non absque experientia tribuitur, præsertim non temere utendum censet J. Bauhinus. Verum Zvvelferus existimat noxiam seminis Coriandri qualitatem, si qua inest, a cruda ejus & excrementitiâ humiditate & immodico usu dependere. Si quidem semen viride virosfum quid spirat quod evanescit dum siccatur. Quapropter utrum hæc noxia qualitas rectius aceto affuso, an vero sola & simplici exsiccatione corrigatur, inquit: ac tandem concludit hanc qualitatē nocivæ, crudæ, excrementitiæ correctionem melius arescentia quam aceti maceratione & iterum exsiccatione perfici, quia vis seminis Coriandri carminativa & balsamica sic non destruitur, imo conservatur & augeor; olea enim essentialia in quamplurimis aromatis exsiccatione magis evolvuntur. Aceto autem potiore sua virtute spoliatur, dum acetum partes oleosas volatiles ac spirituosas figit, & in aliud compositum traducit, ut experientia quemvis edocere potest. In eadem sunt sententia S. Paulli, Fredericus Hoffmannus, Ettmullerus, Paulus Hermanus quotidiana experientia edocet, quandoquidem populi plurimi Coriandrum tanquam gratissimum aroma cibis admiscunt.

Laudatur autem semen Coriandri tanquam carminativum & stomachicum singulare. Viscidos incidit ventriculi succos & inde status ructusque enatos dissipat. Commendatur maxime illis quibus ex sympathia ventriculi caput dolet. Habet etiam aliquid adstrictionis qua ciborum concoctionem juvat, & in hæmoptisi, nimis menstruus & ventris fluxibus conducit. Insuper strumas discutere creditur. Externe in statulentis herniis laudatur.

2℥. Semin. Coriandri, Anisi, Fœnicul. ana ʒʒ. Cinnamom. acut. ʒj. Macis ʒj. Flavedin. cortic. Citr. ʒij.

2℥. Semin. Coriandr. ʒʒ. Anisi, Fœnicul. ana ʒi. Nuc. mosch. ʒʒ. Cinnamom. ʒj. Piper. long. ʒʒ. Sacchar. alb. ʒj. M. F. pulvis post passum sumendus ex vino. Dosis ʒj. ad ciborum concoctionem perficiendam, ructus, flatus, & colicos dolores discutiendos.

2℥. Semin. Coriandr. ʒʒ. semin. Cumin. Anis. ana ʒij. Alum. rup. ʒʒ. Vini rub. Aq. chalib. ana ℔ʒ. Coq. & applica decoctum in foru herniæ statulentæ.

Semen integrum Saccharo obduci solet. Usurpatur in Clareto, vulgo dicto. *Rossolis des six graines*: aqua Melissæ composita H. R. pulvere digestivo Charas.

C O R N U S.

Cornus & Cornus mas seu sativa, Off. Cornus borrensis mas; C. B. P. 447. *Inst. R. H.* 641. Cornus sativa seu domestica, J. B. 1. 210. Cornus, *Clus. Hystor.* 12. *Camerar. Epitome* 159. vulgo, Cornouiller, Cornier: cujus fructus Cornum, Cornouilles dicitur, aut Corne.

N 2

Ar-

C O R Y L U S.

Plurimæ sunt Coryli species ratione fructuum five nucularum inter se diversæ. Sunt enim vel domesticæ ac cultæ, vel sylvestres. Ex domesticis quibus hortorum pergulæ ornantur aliæ sunt oblongæ, & additæ latent in calycibus longis, callosis, herbaceis, in extremo sumbriati: aliæ rotunditate insignes, & calycem exteriorē breviorē, & magis patulum habenter. Inter longiores, quæ membrana rubente obvelantur, sunt præstantiores. Sylvestres seu calvæ dictæ parvæ admodum sunt, minus gravæ, & in sepibus, dumetis, & sylvis passim nascuntur. Harum innumera fere in figura, magnitudine putaminum, crassitie, nucleorum sapore, maturascendi tempore differentiæ sunt. Duas tantum considerabimus apud nos magis usitatas quæ colliguntur ex arbore pumila quæ dicitur *Corylus*.

Corylus, *Nux Avellana*, *Off. Corylus sativa fructu albo minore*, five vulgaris, *C. B. P. 417. Inst. R. H. 581. Corylus sativa, J. B. 1. 266. Corylus, Cusf. Hist. 11. vulgo, Noisetier.*

Corylus sativa, fructu rotundo maximo, *C. B. P. 418. Inst. R. H. 581. Avellana Lugdunensis major, Camerar. Hort. vulgo, Aveline*, quarum fructus; *Nuculæ Avellanæ*, *Nuces Ponticæ*, *Nuces Prænestinæ*, *Nuces Heracleoticæ*, *Avelines*, *Noisetes*.

Corylus arbor pumila est, radice crassa, alta, nodosa, late diffusa, crassis caudicibus in multis ac robustis stolones divisis, virgæque lentas, enodes, obsequiosas, cortice, ubi annosi fuerint, incano, & lævi obductis, materie candida, molli: foliis latis, majoribus, rugosioribus quam Alni, modice serratis, colore virentibus, averta parte albidioribus. Flores oblongi, tenues, compactique, Juli cum quibusdam coccineis filamentis pro floribus dependent primum virides, deinde flavi, plurimis foliis constantes axi squamatis affixis, quibus singulis subsunt denso agmine apices flavescentes. Fructus in eadem arbore a floribus separati nascuntur aliquot simul juncti, involucri callosis, succosis, herbaceis, barbatis, hirsutis, adstringentibus, & acidis obsepti, magnitudine dimidio minores ut plurimum Juglande, oblongi, vel globosi, putamine umbilicato per maturitatem flavescere aut rufi, lævi, ligno, & duro satis: cui subest pellicula in domesticis quibusdam coccinea, in aliis subrufa, nucleum obvelans albidum, firmum sicut Amygdali nucleus, ejusdemque sapore dulci, lacteam remittentem succum. In Avellanis nucibus antequam nucleus formetur aut perficiatur, ambiens pulpa est candicans, fungosa, saporis acidi. Domesticæ habentur in hortis, vineis, & viridariis. Sylvestres vero ubique proveniunt, in sylvis, & secus itinera. Fructus usu sunt.

Analysi chymica Avellanæ nuces mediocrem phlegmatis tum acidi tum viscosi portionem continent, plurimum olei tum tenuis tum spissi, & resinosi plusquam dimidiam partem, parum terræ, & salis fixi.

Alimentum copiosius præbent Avellanæ quam Juglandes, sed crassum. Potissimum expetuntur recentes, nondum perfectam maturitatem assecutæ, quo tempore magna humiditate excrementitia donantur; tunc palato gratiores

Geoffroy Tom. II.

N 3

sunt,

sunt, sed nullo modo concoquuntur in ventriculo. Bene maturæ, & per aliquod tempus asservatæ salubriores sunt. Incrustantur Saccharo, & inter tragemata accensentur. Quidam scribunt novem vel decem Avellanas perpurgas, ante passum per aliquod tempus comestas, a nephriticis doloribus liberare. Bechicam quandam vim obtinent ob copiosum earum oleum dulce, nec ineptè medicamentis thoraci dicatis admiscetur, aut ex his lac exprimitur Avellanatum dictum, non solum tussientibus, sed etiam celiacis & dysentericis prodesse fertur. Adstringentis enim quid obtinent.

Nuces Avellanas stomacho infestas esse, & difficulter concoqui, necnon caput gravare, præsertim largius sumptas Medicorum veterum, & recentiorum communis est sententia. Si quis post cibos illas edat, sitim, & inflationem molestem percipiet. Vulgaris est opinio nuces Avellanas pinguedini corporis conferre: ac etiam anhelosos, & asthmaticos efficere ad satietatem eis vescentes vulgo persuasum est. Quod alvum sistant, & dysentericis prosint, nonnulli scribunt: alii, & verius dysentericæ aut diarrhææ obesse potius quam prodesse tradunt, ideoque in ejusmodi morbis ab iis omnino abstinendum. Intestinis infestas esse experientia docere conatur Tragus. Pueri namque, inquit, si Augusto mense Avellanas nuces avide devorant, facile in dysentericam morbum incidunt. Ad dysenteriam etiam pestilentialem nocuas esse vulgo persuasum est.

Oleum ex Avellanis nucibus per expressionem extrahitur, quod ad tussim veterem, & distillationes utile Tragus scribit. Hoc oleo mulierculæ infantium caput inungunt, ut capilli majori copia crescant.

Avellanarum juli, torrices exteriores virides, & putamina adstringere, & ventris fluores sistere affirmat qui, de illis scripserunt. Putaminum pulverem cum pulvere seminis Anisi mixtum Ettmullerus ad fluorem album commendat.

Ligno Corylino vis sudorifera & diuretica a nonnullis tribuitur. Sed præstantiora habemus ligna sudorifera in Guaiaco, & Sassafras. Ex hoc ligno oleum per distillationem extrahitur quod sæpius super calcem vivam distillatum, aut ut ajunt, rectificatum, amittit odorem empyreumaticum, colorem limpidum aureum adipiscitur, & est oleum Heraclinum a Rulando Medico Casareo magnopere decantatum ut antiepilepticum, anodynum & anthelminthicum. Dosis a guttulis ij. ad x. cum tritica panis vel in quolibet condito idoneo. Ad epilepsiam infantium etiam commendatur a nonnullis spiritus acidus qui in eadem distillatione cum oleo prodit.

In Corylo viscum nonnumquam nascitur quod epilepticis alitque capitæ affectibus obnoxiiis Querno longe utilius a nonnullis habetur: a ʒss. ad ʒij. ratione ætatis ejus pulvis exhibetur. Illud autem certo tempore collectum, nempe luna crescente, inter duos dies B. Mariæ expostulatur. Nam tale viscum amuleti instar tollo appensum contra epilepsiam, paralytim, & morbos ab incantatione ortos plurimum valere credunt. Ex eodem parant unguentum ad veneficiorum infringendam vim mirabile, cujus descriptio apud Henricum ab Heer *L. primo Observ. octava* videri potest; sed has nugæ ne dicam imposturas aniculis delirantibus relinquimus. Eiusdem farinæ est virgula divinatoria qua vulgus metallicorum ad venas metallorum inquirendas utitur, & ex ligno Corylino parat.

Lignum Corylinum ad varios usus mechanicos utile est.

COTO.

COTONEA MALUS.

Plures sunt hujus arboris species, quæ quidem inter se nonnisi fructus magnitudine, & forma differunt. Harum duo genera constituuntur potissimum, sativa, & sylvestris; sativa duplex, fructu nempe majore, & minore.

Cotonea malus fructu majori, *Off. Cydonia fructu oblongo læviori, Inf. R. H. 632.* Malus Cydonia fructu oblongo, & læviori. *H. R. P. Mala Cotonea majora, C. B. P. 434.* Cydonia majora, *Raii Hist. 1453.* Cotonea malus, *J. B. 1. 27. vulgo, Coignier femelle.*

Cotonea malus fructu minori, *Off. Cydonia fructu breviori, & rotundiore, Inf. R. H. 633.* Malus Cydonia fructu breviori, & rotundiore. *H. R. P. Mala Cotonea minora, C. B. P. 434.* Cydonia minora, *Raii Hist. 1453. vulgo, Coignier femelle.*

Cotonea malus sylvestris, *Off. Cydonia angustifolia vulgaris, Inf. R. H. 633.* Malus Cydonia angustifolia vulgaris, *H. R. P.* Cotonea sylvestris, *C. B. P. 434. vulgo, Coignassier.*

Arbor est humilis sæpiusque tantum instar fruticis assurgens, radice copiosa, fusco cortice vestita, alias recta, alias oblique acta, e cujus summo multi stolones virgati sese exerunt: ligno contorto, intus pallente, & albicante, firmo satis & æquabili, cortice obrecto mediocri, non rimoso nec valde scabro, inferna parte subfusco, superne subcinereo, lævior atque glabro, foliis Malo vulgari æqualibus, subrotundis mucronatis, nulla in ambitu crena incisuravo dissectis, prona parte cana lanugine uberitè obstitis, supina vero viridantibus, & lævibus fere, rarius, & nonnisi tenellis foliis lanuginosis, quæ lanugo facile affricu digiti deraditur. Flores non multi simul ut in Malis, sed in surculis singulares, rosacei, Rosis sylvestribus persimiles, quinque petalis subrotundis ac semiuncia latioribus, carneo colore præditis, in orbem positis constantes in quorum medio stamina multa purpurascencia, apicibus luteolis, calyci insident composito ex quinque foliis ex viridi canescentibus, villosis, quæ postmodum fructus *Idæum* seu umbilicum foliatum efficiunt, & embryone tumido, oblongo, lanuginoso, qui cadentibus florum petalis incrementum capescit donec fructus perficiatur magnitudine Mali, figura varius, turbinatus, modo circa pediculum, modo circa umbilicum angustior, alias subrotundus, & torulis (*Gordon*) eminentibus tuberosus, parvos, magnos, mediocres, densa lanugine rasili obducta, carne firma, melina, odora, adstringente, & subacida. Semina in ipso pomi centro quinque cellulis distincto continentur, cortice spadiceo, medulla alba, Pyri seminibus non multum dissimilia, viscido quodam lentore lubrica, quem in aquam dejecta deponunt, & ipsam mucilaginosam reddunt: fructus odorem gratum quidem sed vehementem spargunt, & qui quorundam capita ita percellit ut ipsis dolorem moveat, præsertim si conclavi inclusi habeantur. Arbor in hortis, & viridariis passim colitur. Ex usu sunt fructus, & semina.

Analysi chymicæ, ex pulpæ malorum Cydoniorum rasæ lbv. per vaporarium distillatis prodierunt humoris limpidi, saporis, & odoris tenuis ma-

℥. Mucilaginis femin. Cydonior. & sem. Psyllii extractæ cum aqua rosarum ana ℥ij. albumin. ovi dilutissime agitati, & aq. Plantag. ana ℥j. Camphoræ gr. iij. F. collyrium in ophthalmia.

℥. Mucilag. sem. Cydonior. Psyllii & Hormin. cum aq. Semperviv. vel Plantag. extract. ana ℥ij. Pulpæ malor. Cydonior. sub ciner. coctior. & pomor. dulc. ante ignem coctior. ana ℥iij. Camphor. ℥j. sacchar. saturni ℥ß. F. cataplasma ad ambusta, oculorum contusiones & ophthalmias.

Succus Cydoniorum malorum usurpatur in syrupo de Absynthio & syrupo Emetico *Chbaras*, & semina in syrupo jujubino *Ejusdem*.

C R U C I A T A.

CRuciata & crucialis, *Off.* Cruciata hirsuta *C. B. P.* 335. *Inf.* *R. H.* 115. Cruciata *Dod. Tempt.* 357. Gallium latifolium, Cruciata quibuldam, flore luteo, *J. B.* 3. 717. vulgo, *Croisette*.

Radice plurimis fibris subluteis, e geniculis emissis capillata reptat. Caules profert plures, pedales interdum & longiores, quadratos, hirsutos, tenues, infirmos, crebris geniculis interceptos: ad quorum singulos folia quaterna cruciatim disposita, decussata, hirsuta, paulo latiora quam Aparines, mucrone obruto, absque pediculis cauli adnata. Flores ex alis foliorum egrediuntur verticillatim. Non tamen, si curiose observes, e foliorum omnium sinubus egredi advertes, sed ex oppositis duobus tantum, tres fere ex uniuscujusque folii sinu surculos pluribus floribus exiguis, monopetalis, campaniformibus, patentibus, quadrifidis, flavis onustos. Eorum calyx abit deinde in fructum siccum ex gemellis seminibus subrotundis & sub cortice tenui, hirsuto reconditis constantem. Ad sepes & in dumetis frequens nascitur. Herba usu est. A Callio & Aparine differt solo foliorum numero, quæ quaterna tantum decussatim ad caulium nodos oriuntur.

Analysi chymica, ex totius plantæ recentis floridæ, dempta radice ℔v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, saporis & odoris fere expertis, seu aliquantisper herbacei, obscure subacidi ℥xj. ℥iij. humoris primo acidi manifesti, deinde intensi & austeri, postea rufescentis, ac tandem fusci, empyreumatici, intense acidi, austeri ℔iij. ℥j. ℥j. gr. xxx. humoris rufescentis, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥j. ℥j. gr. xxiiij. olei spissi extracti ad instar ℥j. ℥iij. Massa nigra residua pendebat ℥vj. ℥j. gr. xxxvj. quæ calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥j. gr. liiij. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥vj. gr. xij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥iij. ℥iij. gr. liiij. in calcinatione ℥iij. ℥j. gr. xxxvj.

Hæc planta salem continet essentialem, aluminosum cum aliqua portione salis ammoniacalis & multo oleo involutum.

Cruciata inter plantas vulnerarias dictas numeratur. Siccat enim & adstringit tum interne sumpta, tum externe adhibita. Dicunt, ramices hæc curari posse, decocto ejus aliquot diebus epoto, herba vero ipsa loco imposita. Jungken ejus solum in schirro hepatis commendat. Joannes Cruso in suo medicamentorum euporiston *Thesaur*o affirmat se rusticum, qui sal-

ce superiorem manus partem vulneraverat, hac planta inter duos lateres trita & cataplasmaris forma vulnere admota feliciter curavisse, sine ulla alia applicatione.

CUCUMIS.

Cucumis aut sativus est, aut sylvestris, qui etiam asininus nuncupatur.

Cucumis vel Cucumer, & Cucumer sativus seu esculentus *Off.* Cucumis sativus vulgaris maturo fructu subluteo *C. B. P.* 310. *Inst. R. H.* 104. Cucumis vulgaris viridis *J. B.* 2. 245. Cucumis vulgaris *Dod. Pempt.* 662. Citreolus vulgo, *Casalspin.* 199. vulgo, *Concombre*.

Ex radicibus rectis, multisque candidis capillamentis fibratis, hirsuta lamenia, crassa, longa, ramosa per terram huc illuc reptant, quibus alternatim adnascuntur folia palmi unius aut alterius amplitudine, angulis hederaceis caesa, ambitu ferrata, tactu aspera, e quorum alis exeunt capreoli & flores monopetali, campaniformes, patentes, quinquepartiti, seminuncia majores, ex luteo pallentes; ex quibus alii steriles sunt nulli embryoni adhærescentes; alii sæcundi insidentes embryoni qui deinde abit in fructum semipedem & amplius longum, teretem, utrinque turbinatum sæpius incurvatum, angulosum, verrucosum, primo viridem, deinde flavescens vel albicantem, carnosum, cortice tenuiore, carne firma, translucida, candida, succosa, sapore non ita grato ac Melonum, sed peculiari quodam & agresti, in terna vel quaterna loculamenta divisum, medullosa quadam & laxa carne repleta quæ semina continet copiosa, oblonga, plana, Melonum seminibus fere similia, paulo tamen angustiora, & ab illis pusillo apiculo subtus protenso distincta, medulla lactescente, suavi. Seritur in hortis. Fructus crudus vel coctus edulis est. Semina officinis multi sunt usus.

Analysi chymica, ex hujus fructus nondum bene maturi lib. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, odore & sapore primo herbam viridem, deinde Cucumeris fructum referenti, obscure acidi libij. ℥vij. ℥iij. gr. xvij. humoris limpidi, manifeste acidi, subausteri, lib. ℥v. gr. xvij. humoris rufi, sale volatili urinoso imprægnati ℥v. gr. lxxv. olei fluidi ℥ij. gr. xvij. Massa nigra in retorta superflua pendebat ℥j. ℥ij. gr. xxij. quæ calcinata reliquit cinerum ℥iij. gr. xlviij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥ij. gr. xxxvj. lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit fere nulla; in calcinatione ℥vj. gr. xlviij.

Salem essentialem tartareum obtinet parcum multo phlegmate viscido dilutum.

Cucumeres exiguum & aquosum corpori præbent nutrimentum. Crudè licet bene maturi difficile coquantur in ventriculo, ejus fibras viscido suo succo laxant, & ad cæterorum alimentorum concoctionem perficiendam inhabilem eum reddunt. Virides & parum ventricosi vulgo *Cornichons*, licet gula erudita suaviore judicet, nullo modo coquantur, imo sæpe ventriculum lædunt, si præsertim aceto vel muria conditi fuerint. Facile autem Cucumeres in ventriculo & intestinis corrumpuntur, & ex eorum esu assiduo pravi congeruntur succi, qui exiguum ad putrescendum occa-

occa-

occasione nacti febres accendunt contumaces, ut in seipſo Petrus Gonterius expertus eſt, referente eodem *lib. de ſanitate tuenda*. Attamen J. Rajus reſert ſemeripſum per multos annos Cucumeres copioſe comediſſe, quamdiu tempeſtivi, & eſui idonei erant, nec tamen ullam vel leviſſimam noxam aut incommodum inde percepſiſſe, licet ſexagenarium. Narrat inſuper cum Florentiæ in Italia ſebri laboraret, præſcribente quodam Medico Anglo ibi degente, pulpam Cucumerum juſculis incoctam non ſine inſigni ſolatio, & levamine eſiſtaſſe.

Verum crudi cum comeduntur, cortice cartilagineo reſecato, in orbiculos tenues conciſos, & ſale aſperſos duplici paropſide exceptos, eo uſque exagitare convenit, inquit Rajus, donec humor aqueus copioſus eliciatur, & extillet; quo effuſo, aceto, oleo, & pipere condiendi ſunt; quo modo, & palato, & ventriculo gratiſſimi evaſunt, & certe non inſalubres. Alii Cucumeres in taleolas ſectos, manibus atterunt, deinde contritam pulpam ſucco madentem per noctem ſervant, poſtea ſuccum exprimunt, pulpamque oleo, ſale, aceto, & pipere conditam non ſolum innoxiam, ſed etiam calidioribus naturis, & æſtuantibus viſceribus utilem aſſerunt. Revera quadam inchoata fermentatione, agreſtis, & viſcida pulpæ ſubſtantia inciditur ac dividitur, ac proinde coctioni fit magis apta.

Quandoquidem autem viſcida hæc ſubſtantia coctione melius quam ullo alio modo reſolvitur, multos Cucumerum coquendorum modos culinæ inveniunt. Cortice mundati, & per fruſtula ſecti, cum aliis oleribus in carniū jure elixantur. Quandoque cum aliis herbis, & ſpeciebus aromaticis ſaporati in offas apparantur. Alias elixati, & aqua expreſſa, in ſartagine fringuntur ex butyro multo. Inſarciuntur quoque purgati ſeminibus. Farctura cum carne vituliſſa, ſuilla, caponum, perdicum, aut alia quacumque, lardo inſuſlo, medulla bubula, ovis, & aromatis omnibus conciſis paratur: jure carniū inſarcti coquuntur, & offis immixti apponuntur. Quia etiam illud ſarcimen ex carniſus piſcium quorumlibet butyro conditis concinnantur, tum cum multo butyro coquitur, & nutritur jure ex carniſus reſiduis, capitibus, ſquamis, pelliculis, ſpinis parato.

A nonnullis commendatur Cucumerum uſus internus in affectibus renum, & veficæ, maxime calculoſis.

Externe Cucumerum caro capiti applicata in pleuritide multum laudatur a Borello. Bartholetus in *Traſtatu de Reſpiratione*, in ſervida maxime phrenitide commendat carnem Cucumeris aut Cucurbitæ tulam, niveque refrigeratam, abraſis capillis capiti impoſitam.

Semen Cucumeris inter ſemina quatuor frigida majora reſertur, adeoque ſolet ingredi emulſiones refrigerantes, quas vocant, in febribus ardentibus, nephritide, urinæ ardore. Minus tamen refrigerat quam fructus ipſe.

Cucumis agreſtis, Cucumis aſininus, Cucumis ſylveſtris, Off. Cucumis ſylveſtris, aſininus dictus C. B. P. 314. Inſt. R. H. 104. Cucumis ſylveſtris ſive aſcinus J. B. 2. 248. Cucumis ſylveſtris Dod. Pempt. 663. Cucumer elaterii ſylveſtris Adverſor. Lobel. Icon. 646. vulgo, *Concombre ſauvage*.

Radiceſ habet duas treſve uncias craſſas, pedem longam, in varias fibras diviſam, albam, carnoſam, amaricanſem, & nauciſiam, ex qua caules oriuntur humi ſuſi, aſperiuſculi, craſſi, in quibus ſolia naſcuntur

ex rotundo acuminata, palmo longiora, ad basim aurita. Ex eorum assis emergunt flores monopetali, campaniformes patentes, semiunciam superantes, in quinque partes profunde divisi, flavescentes cum venis virentibus. Fructus sesqui unciam vel duas uncias longi sunt, cylindriciformes, bullis asperiusculis echinati, divisi in tria loculamenta tenuibus septis distincta, succi amari plena: qui maturi levissimo tactu virosum succum cum lubrico semine violenter ejaculantur. Semina lata sunt, lævia, & nigricantia. In meridionalibus Galliæ provinciis sponte secus vias, & in ruderalis nascitur: hic in hortis colitur. Ejus succus expressus, & inspissatus, quod elaterium dicitur, in usum venit.

Analyti chymica, ex totius plantæ floridæ, & cum aliquot fructibus lib. per retortam distillatis, prodierunt humoris primo aliquantisper turbidi, flavescentis, saporis, & odoris subacris, deinde limpidi, saporis, & odoris expertis, obscure salis lib. 3vij. 3vj. gr. xlvij. humoris limpidi, acidi lib. 3xj. 3iiij. gr. lx. humoris rufescentis sale volatili urinoso copioso imprægnati 3vij. 3iiij. gr. xvij. salis volatilis urinosi concreti gr. xij. olei spissi extracti ad instar 3j. gr. liij. Massa nigra in retorta superstes pendebat 3iiij. 3vj. gr. xxxvj. quæ calcinata reliquit cinerum 3ij. 3j. gr. liij. ex quibus salis fixi mere alcali 3vij. gr. lxij. lixivio sunt extracta. Piritium jactura in distillatione fuit gr. lx. in calcinatione 3j. 3iiij. gr. liij.

Hæc planta igitur abundat sulphure tum tenui, & acri, tum crasso; ac sale ammoniaco cum mediocri quantitate salis nitrosi. Tota planta exsiccata, & prunis injecta fulgura quasi nitro copioso turgida, & odorem foetidum spargit, ab illo oleo crasso.

Omnes plantæ partes catharsim vehementer movent. Radicum vis cathartica major est, quam foliorum, minor vero quam fructuum. Ejus succus expressus, & inspissatus a veteribus græcis Elaterion dicitur, quo nomine non solus hic succus, sed omne per inferiora purgans designatur medicamentum. Græci eo frequentissime ceu valido aquas, pituitam bilemque superne ac inferne evacuante medicamento, usi sunt; rarius vero neoterici.

De duplici elaterio mentionem faciunt auctores, viridi, & albo. Viride ex pulpa fructus leviter expressa, & per cribrum adacta; album vero ex liquore albicante, & seroso ex fructu frustulatim secto sponte sua exsiliante, absque ulla pressura fit. Viride elaterium minorum virum est; minusque violenter sursum deorsumve purgat quam album. Hujus enim vel granum unum liquore aliquo solutum in corpore teneriore potenter operatur. Imo Parkinsonus, narrante Rajo, testatur, dimidium granum medicamento cuidam cathartico inditum, ad illud acuendum, ventriculum conturbasse mirum in modum, vomitus crebros excitasse, & postea per sedem violenter purgasse. Fructus ad elaterii præparationem eligendi sunt non immaturi; succum enim tunc dant virosum, qui hypercatharsim, & dysenteriam inducit, sed pene maturi, non vero ad hunc maturitatis gradum eo usque perducti ut ad primum contactum distillant: sic enim perirer, quod ad purgandum validissimum est.

De quodam elaterio ex semine contuso, & expresso veteres mentionem faciunt, nunc ignoro.

Elaterium purgat pituitam, & interdum bilem, si vacuari parata est, ferociori.

rososque humores etiam evulso contumaces vomitu & dejectione dejicit atque etiam e juncturis mirifice trahit; adeo ut tunicas etiam intestinum erodat, & vasorum oscula aperiat. Movet menses, sæptumque expellit: unde rarus ejus usus, præcipue cum nec malignitate carcat. Hinc sæptum ut multis annis, ejus usus evanuerit. Masaria tamen observat, si quando contingit ut aqua thermarum pota in corpora detineatur, nullum præstantius hoc medicamento repertum iri.

Veteres elaterium exhibebant a gr. vj. ad xxx. hodie longe parcius dosi præscribitur a gr. ß. ad gr. ij. quæ stimuli loco tantummodo cum aliis extractis purgantibus admiscetur, licet Mercurialis *Tom 3. consultation. 75.* scribat, elaterium facilius erumpere & evacuare si paulo plus illius, quam paulo minus exhibeatur, aut viscosis gummatibus misceatur. Populi enim sub calidis climatibus viventes vehementiora purgantia facilius ferunt quam qui sub frigidis degunt. Non utimur autem eo, utpote stomacho & intestinis venique mesenterii valde infesto, nisi stomachicis corrigatur. Attamen ex recentioribus nonnulli in hydrope illud commendant. S. Pauli narrat se in contumaci hydrope, viribus constantibus, uni & alteri hydropico aquas elaterio eduxisse, moxque eosdem roboratis visceribus pristinae sanitati restituisse: sed nihilominus medicinae candidatos commonefacit tam ex Colocynthis quam ex Cucumere asinino parata medicamenta, ceu canem caveant; nec his nisi irritis benignioribus iisque tutioribus unquam utantur, Acerrimi quoque sunt elaterii patroni Sydenhamus, & Lyster utriusque apud Anglos Medici spectatissimi: ille palmarium illud vocat hydragogum in hydrope: hic elaterio tribuit vim calefacientem, digerentem & exedentem, ac citra inflammationem, & sitim. Mercurialis & Heurnius elaterium laudant in illius hydropis specie, quæ Anasarca dicitur sub duabus conditionibus; 1. modo multa sit aqua: 2. modo non adsit febris: ab illis dissentientes qui illud in ascie usurpant, ubi, momente Vvillisso, sæpius ad patientis noxam quam emolumentum cedit.

Egregiam adhuc illius operam laudat Saxonia in fluore albo, & Etmullerus in hydrocele. Verum Capiavaccius frequentiori in usu elaterium habuit. Elaterio utebatur incipiens a gr. ß. postea exhibens grana duo, tria, ad quinque, sed sensim, nec augendo dosim, nisi evacuanda materia posset & vires ferant: formula talis est.

℞. Elaterii gr. ij. vel iij. &c. Pilular. alcephanginar. ℞j. cum succo Iridis. F. pilulæ.

Hydropicis vero qui elaterium admittere non poterant, idem ipsis radicem vino maceratam exhibebat. Dosis radice a gr. xv. ad 3ß. in pulverem redactæ.

℞. Radic. Cucum. asinin. exsiccatæ & pulveratæ 3ß. Vini Malvatici vel Hispanici ℞xij. Macerentur per triduum. Vinum hoc cum pulvere tribus partitis vicibus per dies continuos mane, jejuno ventriculo propinetur. Deinde tribus aliis vel quatuor intermissis diebus, rursus aliud vinum hydragogum per tres alios dies exhibeatur. Sic citra molestiam plurimos hydropicos Capiavaccius sanavit.

Michaelis ex hac radice Tincturam extrahit cum spir. vini tartarizato, quam speciatim in hydrope uteri commendat: eam a 3j. ad 3ij. exhibet cum oleo Cinnamomi vel alio quocumque temperatam.

Suc-

Cucurbitæ caro vel pulpa quam veteres Medici aquam coagulatam esse dixerunt, frigidum, humidum & exiguum corpori præbet alimentum, stomachum relaxat, & omne bibendi desiderium restringit. Ideo calidis naturis utilis est, frigidis noxia. Cito per alvum secedit. At quoniam insuavis est, fatua & insipida, raro nostris mensis apponitur. Cæterum ut hæ plantæ valde sunt affines, Cucumer, scilicet, Melo, Cucurbita, & Citrullus, ita viribus non multum differunt. Semina ex illis collecta, quæ a Medicis quatuor frigida majora appellantur, adversus febres morbosque ab humorum æstu vel acredine oriundos usurpantur. Ex his emulsiones præparantur quæ urinæ acrimoniam contemperant, eandemque mediocriter provocant, somnum conciliant. Ex his oleum per expressionem elicitur, ejusdem cum aliis seminum frigidorum majorum virtutis & energię.

C U M I N U M.

Cuminum, Cuminum, *Off.* Fœniculum orientale, Cuminum dictum *Inf.* R. H. 312. Cuminum semine longiore C. B. P. 146. Cuminum sive Cuminum sativum J. B. 3. 22. Cuminum Dioscoridis *Lobel. Icon.* 742. vulgo, *Cumin.*

Planta est umbellifera, annua, vix pedem assequens, radice tenui, alba, fibrata; foliis paucis, raris, capillaribus, Fœniculi similibus, sed longe minoribus, nisi, quod lacinie crassiores sint. Flores candidi, rosei, exigui & in umbellis parvis rotundis congesti, quibus semina oblonga, angusta striata, e cinereo spadicea, longitudine quartam fere uncie partem æquante, ex duabus partibus composita, una parte gibbis, inde vero planis, saporis subamari, aromatici, acris, ingrati, odoris admodum gravis, & vehementis, non insuavis, columbis maxime grati. In Melita Insula copiosè seritur. Semen usum est.

Analytichymica, semen Cumini plurimum præbet olei phlegmatis cum acidi, cum urinosi. Salem igitur essentialem obrinet ammoniacalem, oleum, aromaticum.

Cumini semen ciborum concoctionem juvat, status discutit unde utiliter a quibusdam pane incoquitur & caseis inditur. Utile est in colica flatulenta, tympanite & vertigine a prava digestionem oriunda, tam interne quam externe. Ad usum internum tamen semen Carvi, Cumini semini utpote minus grato & vehementiori anteponitur, externe vero Cuminum potius adhibetur.

℞. Semin. Cumini contusi q. l. Sacculo involv. & irroretur cum vino calido aut aqua viæ & ventriculo statibus dissentio vel abdomini contra tormina admoveatur.

Oleum essentiale arte chymica extrahitur quod hisdem viribus donatur, quibus oleum Carvi, sed præstantioribus. Ad guttas tres præscribitur tantum. Confert affectibus flatulentis præsertim uterinis. Ejus guttæ aliquot affunduntur pani tosto, qui statim calide umbilico imponitur.

C U P R E S S U S.

Cupressus duum est generum, mas alterum, alterum femina. Hæc fastigatio est culmine; illa ramos in latum spargit. De cæteris conveniunt. Cu-

Cupressus *fœmina* *Offic.* Cupressus meta in fastigium convoluta, quæ fœmina Plinii *Inst. R. H.* 587. Cupressus *Dod. Pemph.* 856. vulgo, *Cypres femelle*.

Cupressus *mas*, *Off.* Cupressus ramos extra se spargens, quæ mas Plinii *Inst. R. H.* 587. Cupressus *Matthioli* 119. vulgo, *Cypres male*.

Utraque procero, recto crassoque caudice surgit, cortice fere spadiceo, ligni materiæ solida, compacta, pallida aut rubescens, undulis nonnihil crispata, saturationibus, vehementer ac suaviter odorata, Santalorum fere modo. Supra medium in ramos abit fœmina metam acuminatam concursu suo effingentes, mas in larum undequaque sparsos. Foliis virescens perpetuis, Sabinæ bacciferæ, aut Tamarisci proximis; quæ furculi sunt brevissimis veluti squamis tori convestit. Flores amentacei sunt plurimis scilicet fotiolis seu squamis constantes, sed steriles: in earum alis adsunt apices pulverem tenuissimum effundentes. In aliis ejusdem arboris partibus fructus nascuntur subrotundi, confragosi, sapore acerbi, rimas agentes, in plura clavata tubera dehiscences, inter quarum commissuras semina continentur rufa, sublonga, altera parte rotunda, altera acuminata, semiculmo latiora, medulla donata. In Creta insula, & in plagis orientalibus sponte nascitur: hic in hortis colitur. Calidis in regionibus resinam fundit, sed modicam odore haud ingraro. Fructus fere soli usitati sunt; nuxes Cupressi, Pilulæ Cupressi, Galbuli, & Gallulæ in officinis nuncupantur.

Analysi chymica, ex nucum Cupressi recentium lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, odoris resinosi, terebinthinati, subacidi, deinde rufescentis, odoris, & saporis aliquantisper empyreumatici, intense acidi, austeri lbj. ℥xv. ℥v. gran. xxiv. humoris rufescentis, sale volatilî urinoso copioso imprægnati ℥iij. ℥iij. olei partim fluidi & flavescens, aquæ supernatantis, partim adiposi, aqua gravioris ℥iij. ℥v. gr. xxxv. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥xiv. ℥vj. gr. xxxvj. quæ calcinata reliquit cinerum ℥ij. gr. xvij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥j. gr. xlix. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥vij. ℥vij. in calcinatione ℥xij. ℥vj. gr. xvij.

Cupressi fructus seu Galbuli inter adstringentes sunt celeberrimi usus. In dysenteria, alvi fluxibus, hæmorrhagiis, eorum pulvis vel decoctum exhibetur. Insuper vis febrifuga ipsis tribuitur. Eorum pulvis ad ℥i. in vino maceratus propinatur in febribus intermittentibus, vel etiam in quartana, eandem dosim quarta quaque hora reiterando.

Externe conveniunt ubi porulorum occlusionem & fibrarum laxatarum constrictionem opus est. Recentes virentesque fructus herniosos magnopere juvant, si eorum decoctum ex vino paratum quotidie biberint trium unciarum pondere: interim tamen folia Cupressi trita testiculis illinantur. Est enim hoc auxilium multis experimentis comprobatum, auctore Matthiolo.

Lignum cupressinum ex hoc maxime laudatur quod neque vetustatem, neque cariem sentiat, & bonum semper odorem spirat.

C U S C U T A.

Cuscuta duplex in officinis occurrit, major, & minor.

Cuscuta major, Cassutha major, & Cassyrha, *Off.* Cuscuta major C. B. P. 219. *Inst.* R. H. 653. Cassuta sive Cuscuta J. B. 3. 266. Cassutha *Tabern. Icon.* 901. Androfaces vulgo Cuscuta *Tragi* 810. Cassuta *Do-don. Pempt.* 354. Cassitha *Quorumdam*: vulgo, *Cuscute*, *Goute de lin.*

Cuscuta minor, Cassutha minor, Epithymum, *Off.* Cuscuta minor I. R. H. 353. Epithymum sive Cuscuta minor C. B. P. 219. Epithymum *Ta-bern. Icon.* 357. vulgo, *Epithym.*

Cuscuta seu Epithymum est planta singularis quæ radicibus suis nititur, cum primum erumpit e semine, ut Fuchsius observavit. Hæ vero aridæ sunt, & pereunt cum capillamenta Cuscutæ plantas vicinas ample-xantur: foliis enim plane destituitur, nec aliud proferr nisi cirrhos (seu capillamenta) subrubentes, fidibus testudinum, non absumiles, saporis acris, & subadstringentis, qui tuberculis quibusdam veluti coryledonibus radicum vicem obinentibus ita figuntur in corticem cæterarum planta-rum, ut vasa succum nutritium deferentia lacerent: quo plane modo He-deræ vulgaris rami facere solent: idcirco inter plantas parasiticas recen-deri debet. Flores in capitulum nascuntur hinc inde per capillamenta digesti, monopetali, albi vel subrubentes, campaniformes, urceolis similes, in quatuor vel quinque segmenta divisi, atque in fundo perforati, qua parte excipiunt pistillum, quod decidentibus floribus abit in fructum subrotun-dum: trigonum aut tetragonum, monocapsulare, transversum in duas partes hiantem, quarum superior inferiorem longe superat, semina autem continet minutissima, fusca. Cuscuta e semine in terram deciduo se quo-rannis renovat. Cum tamen adoleverit, radix penitus marcescit. Si semen in fictili seratur, emergit quidem plantula, sed brevi radicitus pe-rit, si non sint in propinquo surpes, quibus irrepat, unde alimentum suum exsugit.

Cuscuta proprie dicta ea est quæ Lino adhæret; quæ autem aliis plan-tis adnascitur, ab iisdem suam appellationem desumit: sic Epithymum, Epilavandula, Epimarrubium, prout has plantas amplectitur, dici solet. Ab illis proinde temperamentum, & vites mutare existimatur pro varia plantarum a quibus alimentum recipit, natura. Hic super diversas plantas nascitur. Sed Cuscuta nostras rejicitur. Veneunt in officinis duo Cuscutæ seu Epithymi genera, Creticum, & Venerum. Creticum longioribus constat capillamentis, Veneti juniores sunt citri, odoratiores, & quasi crispati.

Analysi chymica, ex Cuscutæ recentis floridæ lbv. prodierunt humoris limpidi, fere insipidi, deinde subacidi, obscuro lbj. ℥iij. ℥iij. humoris mani-feste acidi, & austeri lbj. ℥xiv. ℥vij. gran. lx. humoris primo rufescentis, intense acidi, deinde rufi, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥iij. gr. xxx. olei adiposi extracti ad instar ℥j. ℥iij. gr. xxxvj. Massa nigra in retor-ta superstes pendebat ℥vij. ℥j. quæ per horas octo calcinata reliquit cinerem nigricantium ℥i. ℥ij. gr. xij. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali fuerunt extra-

Geoffroy Tom. II.

O

da

aa Zijij. gr. l. Partium iactura in distillatione fuit Zij. gr. xvij. in calcinatione *3v. 3vj. gr. lx.*

Cuscuta itaque abundat sulphure & sale essentiali tartareo subadstringente.

Cuscuta, Epithymum purgandi vim adeo debilem obtinent, ut eorum usus plane obsoleverit. Rectius inter aperientia medicamenta quæ affectibus melancholicis, & hypochondriacis conveniunt, sicut & scorbuticis, a Cl. Tournefortio reponuntur. Ab auctoribus in obstructionibus lienis & hepatis, ictero, scabie, utilia dicuntur.

Plantarum quibus Cuscuta innascitur temperamentum participare aliquatenus creditur. Sic humidior est quæ Lino implicatur, quæ Genistam superat. urinas potentius movet, adstringendi facultatem admixtam habet quæ Rubiæ insidet, quæ in Urtica nata est urinis potenter eliciendis efficacior dicitur, adnotante Lobelio, & post eum Parkinsono. Præscribitur a pugillo uno ad duos vel tres.

2l. Epithymi P. ij. Quinq. herbar. capill. M. j. Infunde per noctem supra cineres calidos in aq. font. q. l. In colaturæ *3vj.* dissolve extract. Rhabarbar. *2j.* Syrup. de pom. c. *3j.*

2l. Epithymi P. iij. cortic. Cappar. & Fraxin. ana *3ß.* folior. Marrub. & Meliss. ana M. j. Coquantur in aq. comm. q. l. Colatura dissolve Tartar. chalybeati solut. *3vj.* F. apozema pro tribus dosibus in chlorosi aut in viscerum obstructionibus.

Usurpatur Epithymum in pilulis tartareis *Quercetani*, Pulvere lætificante *Renædei*, Electuario de Psyllio, El. sennato, confectioe hamech, & syrup. cachectico *Charar*. Semina Cuscutæ adhibentur in syropo de Cichor. comp. *Charar*, in syropo de Fumaria *Mesue*.

C Y A N U S.

Cyanus; *Off.* Cyanus segetum flore cæruleo, *C. B. P.* 273. *Inst. R. H.* 446. Cyanus hortensis flore simplici *C. B. P.* Cyanus flos *Dodon.* *Tempt.* 251. Cyanus *J. B.* 3. 21. Lichnis agria, & flos frumenti *Brunfelsii*: Baptifecula *Tragi* 506. Papaver heracleum quorundam *Chomeli*: vulgo, *Bleuet*, *Aubisoin*, *laveole*, *Peroole*, *Barboau*, *Casselinette*.

Cyano lignosa est multisque fibris capillata radix: caules plures cubitales, & sesquicubitales, angulosi, cavi, lanugine incani, ramosi: folia infima, acutis laciniis sinuata, Scabiosæ aut Dentis leonis more alia longa, culmum lata, per longitudinem nervosa, cæcia albicantiave: capitula in summis cauliculis fastigiis turbinata & in angustis se contrahentia, ex multis parvis veluti squamis non aculeatis, sibi invicem impositis, conallicujus exigui modo composita, ex quibus flores erumpunt flosculosi; plurimis scilicet flosculis sed dissimilibus constantes: alii enim qui medullium floris occupant cæteris minores sunt, in quinque lacinias æquales, divisi, cæteri vero ad circumferentiam positi majores sunt magisque conspicui, veluti bilabiati, & in extremitate profundius serrati: utriusque colore communiter cæruleo, & ut nomen loquitur, Cyaneo, alias albo, alias puniceo aut purpureo, embryoni insident, qui abit deinde in semen parvum & forma

forma oblongum, læve, splendidum, superiore parte pappi instructum, Centaurii majoris semini simile, sed minus, & candidus, quod in ipsis capitulis seu calycibus, inter eos qui in ipsis gignuntur molles pilos recon- duntur. Nascitur in agris frumentariis una cum Triticis, Secali, Hordeo, & aliis frugibus. Seritur & in hortis, ubi culturæ mangonio non tantum flores edit cæruleos, albos, purpureos, carneos, aut variegatos, sed etiam multiplices seu plenos. Flores fere soli in usum veniunt.

Analyti chymica, flores Cyani præbuerant plurimum phlegmatis acidī, subausteri, aliquantulum spiritus urinosi, non medicorem olei ipsi ad instar extracti portionem, nonnihil salis alcali fixi, & terræ. Flores perperam odoris spirant, & sapore subadstringente donantur: unde salem essentialem vitriolico-tartareum obtinere videntur multo cum oleo per- mixtum.

Plurimæ, & fere contrariæ inter se facultates huic plantæ tribuuntur, verbi gratia, æstus febiles extinguere, adversus venenatarum bestiarum moriūs, & puncturas prodesse, putredini resistere, contagium arcere, in palpitatione cordis, in suffocatione uterina prodesse, iis qui ex alto delapsi sunt aut confusi, & quacumque de causa sanguinem concretum intus habentibus utiliter exhiberi, viscerum obstructions tollere, & aquas pur- gare; quæ quidem virtutes admodum incertæ sunt. Florum aqua distillata a plurimis commendatur in oculorum inflammationibus, rubedine, lippi- tudine, necnon etiam ad visum acuendum, & roborandum. Unde *Eau de Casseluneite* a plebe nancupatur, quæ sic conficitur.

4. Florum Cyani cum propriis calycibus collector. & contusor. q. l. Cum nivis vel aquæ nivis q. l. horis viginti quatuor macerentur, deinde simul igne arenæ moderato distillantur, & aqua servetur ad oculos pluries die abluendos.

Pulvis ex floribus una cum capitibus factus, ad ʒj. in vino per aliquod tempus assumptus adversus morbum tegium a nonnullis commendatur. Rajus eundem pulverem erysipelati inspersum utilem dicit, & eorundem florum expressum succum ulcera putrida sanare.

Aqua stillatitia in officinis servatur.

C Y C L A M E N.

Cyclamen, Cyclaminus, Panis Porcinus, & Arthanita, Off. Cyclamen orbiculato folio inferne purpurascens, C. B. P. 308. *Inst. R. H.* 154. Cyclaminus folio rotundiore vulgatio J. B. 3. 551. Cyclaminus orbicularis rotundifolius Dod. *Pempt.* 337. Panis porcinus, & Artanita, Rapum terræ *Lobel. Icon.* 604. Cyclaminus minor, & umbilicus terræ *Tragit* vulgo, *Cyclamen* ou *Pain de porceau*.

Est globulari radice crassa, carnosa, & aliquantulum depresso, foris nigricante, intus candida, nigricantibusque fibris prædita, saporis acris, pungitivi, exurentis, ingrati, inodora, multa circinata propemodum rotunditatis profert folia; palmaribus plus minus pediculis hærentia, Asari foliis haud multum dissimilia; non adeo tamen crassa superne atro- virentia, aspersis subinde maculis, lacteis, inferne purpurascens, nonni- hil per margines sinuata. Flores longis, & tenellis inhærent pediculis,

deorsum nutantes, monopetali, rotati, globosi, in quinque partes sursum revolutas divisi, coloris vel dilutius vel saturatius purpurascens, odoris suavis. Ex calice quinquifido surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, quod marcescente flore, & deciduo, pediculo eui insidet in multas spiras circumactis convolvitur, donec terram attigerit, cui incumbens paulatim augetur in fructum fere globosum, membranaceum, multifariam dehiscens, seminibus sætum oblongis, angulatis, ex fusco fulvescentibus, placentæ affixis. Semen terræ commissum in germen non abit, sed in tuberculum aut radiculam convertitur, præter reliquorum seminum naturam, unde postea foliola promit. Sub æstatis finem aut autumnii initium flores emittit, deinde folia, quæ postquam tota hyeme persistunt, sub Aprilis finem aut mense Majo amittit. Hic in hortis colitur. Radices usitatæ sunt.

Analysi chymica, radicum recens effossarum lbv. præbuerunt humoris limpidi, primo fere insipidi, odoris non ingrati, obscure salsi, deinde sub finem subacidi lbj. ℥ij. ℥vj. gr. xij. humoris primo rufescentis, manifeste acidi, subausteri cum quadam acredine, qualis est panis rustici sapor, & odor, deinde fuscæ, odoris, & saporis empyreumatici, intenni acidi, & austeri, lbj. ℥ij. gr. xix. humoris rufi, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥j. ℥ij. gr. xxxvj. olei spissi extracti ad instar ℥j. ℥ij. gr. xij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥vij. ℥j. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥j. gr. xlvij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥iij. gr. xxxvij. lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥j. ℥ij. gr. lxx. in calcinatione ℥v. ℥vij. gr. xxiiij.

Radix recens valde acris est; ubi vero exsiccata est, nulla acredo percipitur. Salem essentialem obtrinet tartareum cum oleo tum tenui, & acerrimo, tum crasso conjunctum.

Cyclaminis radix inter purgantia vehementiora refertur. Bilem, & serum educit. Licet cum summa violentia humores expurget, tardioris tamen est operationis propter particulas terrestres quibus donatur. Plebeji robustiores ejus pulverem ad ℥j. in decocto vero ℥ss. usurpant. Aromaticis stomachicis corrigitur, & Alaro, Diacrydio aut cremore Tariari stimulat. Sed parum tutus est illius usus internus: faucium enim, ani, ventriculi, & intestinorum inflammationem excitat. Externus crebrior, & minus noxius est. Potenter enim incidit, resolvit, abstergit. Contusæ radices recentes utiliter scirrhis durisque tumoribus, & strumis, lienis duris aut tumentibus admoventur sub cataplasmati forma. Succus radices abdomini illius ventrem subducit, aquas hydropicorum per alvum, menses suppressos movet, sætum nonnunquam expellit, & vermes necat. Idem succus valet ad scirrhus, & tumores duros emolliendos, & resolvendos, item ad scrophulas, strumas, & tumores partium externarum. Unde gummi ammoniaci inspissatur, & coquitur a nonnullis ad emplastri consistentiam: & plurimis in emplastris, & unguentis emollientibus, & resolventibus recipitur.

Ex hoc succo celeberrimum illud conficitur unguentum de Artanita dictum ad scirrhusos lienis præsertim tumores emolliendos, & aquas hydropicorum educendas commendatum externe abdomini admovent. Hoc unguentum ventriculo impositum vomitum excitat, abdomini catharsim, renibus

ribus urinas promovet, si præsertim oleum ex granis Tilli expressum admisceatur.

Matthioli aquam e Cyclaminis radicibus distillatam, si naribus excipiat, fluentem inde sanguinem sistere refert, eandemque poram sex unciam pondere, addita sacchari uncia, manantem ex pectore, ventriculo, jecinore sanguinem mirifice cohibere testatur.

Radices Cyclaminis usurpantur in Empl. Diabotano *D. Blondel*, & Empl. ad ganglia *Charas*.

C Y N O G L O S S U M.

Cynoglossum, *Off.* Cynoglossum majus vulgare *C. B. P.* 257. *Inf.* *R. H.* 139. Cynoglossum vulgare *J. B.* 3. 598. Cynoglossum *Dod.* *Pempt.* 54. Cynoglossa major *Brunfels*: *Lycopsis Lacuna*: vulgo, *Langue de chien*, *Cynoglosse*.

Cynoglossi radix recta est, crassa, Rapam exiguam representans, foris ex atro rubens, intus albida, odore gravi, aliquid fœtidi canis redolente, narcotico, sapore mucoso, qui dulcedinem nonnullam satuam linguæ offert: caules cubitales aut bicubitales, ramosi, vetustate concavi, multa lanugine obstiti: folia longa & latiuscula primo anno, secundo ubi caulem fert, stricta, acuminata, incana, mollia, lanuginosa, odore gravi, viroso, alternatim cauli adnata absque pediculis. Flores monopetali, infundibuliformes, in quinque segmenta divisi, colore sordide rubentes, calycibus insident hirsutis, quinquepartitis. Pistillum ex calycis fundo surgit intimæ floris parti ad instar clavi infixum quod deinde abit in fructum ex quatuor capsulis constantem nonnihil compressis, hispida, quæ pertinaciter vestibus adhærescunt, placentæ pyramidatæ & quadrilateræ affixis, semine sere plano fœtis. Agri Parisiensis incolæ est. Radix & folia in usum veniunt.

Analysi chymica, ex folior. Cynoglossi excicator. *℥v.* prodierunt humoris limpidi, odoris & saporis herbacei, obscure salis & alcali *℔iij. ℥iij. ℥vij.* gr. viij. humoris limpidi, subsalis, subacidi *℥vij.* gr. xvi. humoris rufescentis, acidi, subsalis *℥vij.* gr. xvi. humoris rufi, sale volatili urinoso copioso imprægnati *℥i.* gr. v. salis volatilis urinosi concreti gr. lxxvj. olei adiposi *℥j.* gr. xl. Massa nigra in retorta residua pendebat *℥vj.* gr. lxxij. quæ post calcinationem reliquit cinerum *℥iij.* gr. xli. ex quibus salis fixi mere alcali *℥v.* gr. xliij. lixivio extracta sunt. Partium lactura in distillatione fuit *℥ij.* gr. j. in calcinatione *℥iij.* gr. xxij.

Radici cortex subamarus est, salus, stypticus, glutinosus: chartam cœruleam rubro colore tingit: salem essentialem videtur obtinere ammoniacalem multo phlegmate, terra & oleo fœtido temperatum.

Cynoglossum vi narcotica & anodina pollet; qua ratione ad catarrhos cohibendos commendatur. Præterea adstrictio quædam in eo deprehenditur, qua silendæ aivi profluviis, fluori albo, gonorrhææ & hæmorrhæis utilis est. Nonnulli illud narcosis virulentæ suspectum habent & caprope: illius usum reformidant, sed immerito, ut *J. Rajus* observat; quandoquidem inestato suam posse arguunt pilulæ de Cynoglossi quarum frequens &

laudabilis est usus . Radix ad ℥j. folia ad M. j. in aqua vel iusculis decocta utiliter præscribuntur in catharris , tussi , diarrhæis , dysenteria & hæmorrhagiis .

℥. Folior. Cynoglossi. M. iij. Hyssop. Capillor. vener. Tussilag. ana M. j. Rad. Clycyrrhiz. ℥ij. Oriz. ℥j. Coq. in aq. comm. ℔vj. ad ℔iij. Sub finem adde Mell. Narbon. ℥ij. F. spozema per cyathos propinandum in tussi serena .

Externe tumores emollit & resolvit , ad omnis generis vulnera & ulcera conducit , ubi in cataplasmatibus & emplastris magno cum successu adhibetur . Hieron. Tragus unguentum ex illius succo cum Melle & Therebintina paratum ad ulcera antiqua maligna & fistulosa valde extollit . In strumis & scrophulis Cynoglossi radix tum intus in decocto , tum extra in caraplasmatibus forma a quibusdam commendatur . At J. Rajus refert mulieris cuiusdam pauperculæ puerulum , cujus caput & vestes pediculis scatebant , suspensas Cynoglossi radices circa collum gestasse ad scrophulas quibus afficiebatur sanandas , pediculos quidem radicum scrotores exosos procul aufugisse , at scrophulas obstinate restitisse .

Pilulæ de Cynoglossio præstantissimæ sunt ad catharros tenues sistendos , tusses serenas sedandas , epilepticos puerorum insultus compescendos , somnum conciliandum & omnis generis dolores placandos . A gr. iij. ad gr. x. exhibentur .

D A U C U S .

Semina duo sub Dauci nomine in Officinis occurrunt , scilicet , Dauci Cretici & Dauci vulgaris .

Daucus Creticus , Off. Myrrhis annua semine striato villosa incana , Merissan. Umbellif. 67. Inf. R. H. 315. Daucus foliis Fœniculi tenuissimis , C. B. P. 150. Daucus Creticus semine hirsuto , J. B. 3. 2. 56. Daucus Creticus , Tabern. Icon. 75. vulgo , *Daucus de Candie* .

Radice est longa , digitum crassa , fibrata , sapore Pastinacæ Germanicæ simili ; dodrantali aut altiore caule , tereti , striato , hirsuto ; foliis lanuginosis , cinereis , minutissime dissectis , nonnunquam , observante Rajo , penitus glabris atrovirentibus . Umbella mediocris magnitudinis summo cauli , extremisque ramis insidet florum exiguum , rosaceorum , pentapetalorum , candidorum , quorum calyx ab initio fructum e duobus seminibus compositum oblongis , striatis , superiori in parte acutioribus , hinc gibbis , inde vero planis , incanis , villosis , acribus , aromaticis , odoris debilis . In Creta insula & Germanicis Alpibus sponte nascitur . Semen in usum venit quod ex Creta insula nobis affertur .

Daucus vulgaris , Off. Daucus vulgaris , Clus. Histor. excviii. Inf. R. H. 307. Pastinaca tenuifolia sylvestris Diolcoridis , vel Daucus Offic. C. B. P. 151. Pastinaca sylvestris , sive Staphylinus Græcor. J. B. 3. 2. 62. vulgo , *Chyrouis* , *Carotte sauvage* .

Pastinacæ sativæ similis , radice est minore & acriore : caules profert altitudine pares , sesquicubiales scilicet , striatos , hirsutos , medulla farctos , in alas divisos : folia minutim dissecta ; atrovirentia , adversa parte hirsuta : flores in umbellis magnis consimiles , rosaceos scilicet , quinque petalis constantes candidis , cordiformibus , inæqualibus , in orbem pos-

positis & calyci insidentibus. Flosculus umbellæ medius interdum purpurea rubet. Umbellas autem obvallant folia in angusta, longa, acuta segmenta divisa. Delapsis floribus succedunt fructus subrotundi Dauco Creuico breviores, latiores, ex duobus seminibus compositi cinereis, striatis, circa marginem utrinque villo instructis & cinctis, saporis Dauco Cretico debiliori, odoris fragrantis: tum vero convoluta umbella cavitatem seu aviculæ nidum in medio efficit. In agro Parisiensi sponte nascitur. Semen in ulum venit & pro Dauco Cretico substituitur.

Dauci utriusque semina sale oleoso aromatico pollent uberrimo & oleum essentielle copiosum in distillatione fundunt. Carminativa, diuretica & uterina censentur. Humores lentos & crassos attenuant & incidunt: status discutunt, obstructions aperiunt, menses & urinas provocant.

Semen Dauci in cerevisia tenui infusum & bibitum ad stranguriam & calculum renum ac vesicæ miris laudibus effertur nonnulli. Verum de ejus vi lithontripica nihil nobis constat, quiddid dicat Helmontius de quodam Consiliario lithiasi afflicto, qui ejus usu seminis ab hoc affectu liber per plures annos vixit.

Dauci Cretici semen in uterinis doloribus & affectionibus commendatur, in tussi chronica, singultu & colica flatulenta. Seminis ℥ij. vino albo infusæ & potæ hysterici paroxysmis medentur.

Dauci semen inter quatuor semina calida minora recensetur cum Ammeos, Apii & Petroselinii seminibus.

Creticum usurpatur in Theriaca, Mithridatio, Triphera magna, Electuar. de Baccis Lauri, Philonio magno, Aurea Alexandrina *Nicolas Alexandri*, Syrupo de Calamintha *Mesue*, & Syrupo de Prassio.

Radix Dauci vulgaris primo vere comeditur & plebeis non injucundum alimentum præbet.

DENS LEONIS sive TARAXACUM.

Dens Leonis & Tarxacum, *Off.* Dens Leonis latiore folio, *C. B. P.* 126. Hedypnois sive Dens Leonis Fuchsi, *J. B.* 2. 1035. Dens Leonis, *Dodon. Pempt.* 636. Aphaca Theoph. *Plinii*: Hedypnois major Fuchsi. *Dalechamp Lugd.* 564. Caput Monachi, Rostrum porcinum & Ambubeja, *Nonnullis*: vulgo, *Dent de Lion*, *Pissenlit*.

E radice digiti fere minimi crassitudine, lætescente, folia promit oblonga, acuminata, utroque margine profundis incisuris veluti per lacinias divisis, sylvestris Cichorii æmula, sed læviora, humifusa: caule caret, sed pediculos habet nudos, fistulosos, teretes, palmares & plusquam dodrantes, non ramosos, aliquando hirsutos lanugine facile cedente, subrubentes, quibus insident singulis singuli flores semisflosculosi, patuli, lutei, exterioribus foliis prona parte ex fusco rufescentibus, calyce glabro multifido, extra quem quatuor, aut quinque folia viridantia reflexa conspiciuntur. Semisflosculus unusquisque embryoni insidet, qui, calyce debiciente & circa pediculum reflexo, abit in semen rasum vel citrinum pappis instructum. Semina per maturitatem decidunt & avolant, nudumque thalamum porosa pellicula calvitiæ senile quodammodo imitante obductum relinquunt; unde & nonnullis Caput Monachi dicitur.

In agro Parisiensi frequens ubique nascitur, & in hortis colitur. Omnibus suis partibus amarus est & succo lacteo turget. Radix & folia usitata sunt.

Analyti chymica, ex Taraxaci floridi folior. ℥v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, fere inodori & insipidi, primo obscure salsi; deinde obscure acidi ℥ij. ℥iiij. ℥v. gr. lx. humoris primo limpidi, manifeste acidi, deinde rufescentis, sabaufteri ℥ij. ℥xiiij. ℥ij. gr. xvij. humoris rufi, empyreumatici, primo obscure acidi, subsalsi, austeri; ac tandem sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥ij. ℥v. gr. xij. olei fluidi ℥j. ℥ij. gr. xxxij. Massa nigra in retorta superstes pendeat ℥vij. quæ rite calcinata reliquit cinerum rufescentium ℥ij. ℥vij. ex quibus salis fixi salsi aliquantisper alcali ℥ij. gr. xxxvj. lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. gr. xxx. in calcinatione ℥ij. ℥j.

Ex radicem Taraxaci recentium ℥v. prodierunt humoris limpidi, odoris & saporis debilioris ad herbaceum accedentis, obscure acidi ℥x. ℥v. gr. xlv. humoris primo limpidi, manifeste acidi, sabaufteri, deinde rufescentis, intense acidi & austeri ℥ij. ℥xiiij. ℥ij. gr. xxxij. humoris rufi, tum intense acidi, tum alcali & sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥ij. ℥iiij. gr. xxxvj. olei spissi extracti ad instar ℥j. ℥ij. gr. lxij. Massa nigra in retorta superstes pendeat ℥ix. ℥vj. gr. ix. quæ calcinata reliquit cinerum rufescentium ℥ij. ℥iiij. gr. vij. ex quibus lixivio salis fixi salsi ℥j. gr. xxxix. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥x. ℥ij. gr. xxxix. in calcinatione ℥vij. ℥ij. gr. ij.

Intense amara sunt hujus plantæ folia, & chartam cœruleam rubro colore leviter tingunt: radices colorem rubentem magis intensum efficiunt: amaræ sunt & adstringentes. Sal essentialis hujus plantæ ad salem mirabilem Clauberi accedit; cum ammoniacali sale & oleo confociatur. Sal acidus in radicibus superior est & magis evolutus quam in foliis.

Dens Leonis hepatis & viscerum obstructions aperit, urinas movet, vulneraria & febrifuga censetur. Infusum vel decoctum ad ℥iiij. vel vj. usurpatur. Succus recentior expressus & defœcatus ad ℥iiij. iijve præscribitur. Succus in morbis chronicis hepatis & mesenterii obstructioni adscriptis, item in febribus intermittentibus & febribus putridis inveteratis ab Ettmullero commendatur. Laudatur quoque in curanda pleuritide, & sanguine grumoso solvendo, necnon etiam in aliis partium internarum inflammationibus cum febribus acutis conjunctis. Thomas Fuller succum defœcatum commendat in cutaneis affectionibus ad ℥iiij. vel vj. ter vel sæpius die exhibitum. Radices in pituitis & apozematibus aperientibus usurpantur. Universæ plantæ decoctum potum morbo regio laborantibus auxiliatur.

Externe succus in affectibus oculorum commendatur. oculis instillatus leniter morficat quidem & pungit, attamen pro visu acuendo & roborando, & pro delendis maculis, nebulis & albuginibus oculorum, & abstergenda cornea, lacteus hujus plantæ succus ab Ettmullero prædicatur sive solus, sive propter acrimoniam cum aqua Fœniculi dilutus. Linthea eodem succo madentia ad vulnera quoque & ulcera quæcumque mammillarum, aliaque putrida manantia & sordida pudendorum ac tibiarum abstergenda optime conveniunt; succum enim hunc post Nicotianam omnibus præferendum idem Ettmullerus censet.

Aquam distillatam magnopere commendat Tragus in apozematibus & febri-

Febribus ardentibus, trium aut quatuor cochlearium mensuram singulis vicibus sumptam, ex qua & optima collyria adversus oculorum maculas fieri asserit. Verum dum succus obtineri poterit, longe majoris erit efficacie. Extractum ex totius plantæ succo defœcato præparatur ad eadem perutile. Ad 3j. exhibetur.

Folia teneriora in acetariis comeduntur, ventriculum roborant, appetitum excitant, ciborum concoctionem juvant, alvum nimis fluentem sistunt, & urinas provocant.

Taraxacum usurpatur in apozemate aperiente *D. De Lorme*, vulgo dicto *Bouillon rouge*, & in syr. de Cichorio comp. *Pharmacop. Regia*.

D I G I T A L I S.

Digitalis, *Off.* Digitalis purpurea, *J. B.* 2. 812. *Dod. Pempt.* 169. *Infl. R. H.* 165. Digitalis purpurea folio aspero, *C. B. P.* 243. Campanula sylvestris, *Tragi* 889. Aralda Bononiensis, *Cesner*: Virga regia major flore purpureo, *Casalp.* 348. Digitalis purpurea vulgaris. *Parkinsoni*: vulgo, *Digitale*, & *Gants de Notre-Dame*.

Ex radicibus multis, tenuibus, fibrosis, amaris, caulem promit cubitalem & bicubitalem, pollicem crassum, angulosum, hirsutum, subrubentem, concavum: folia oblonga, acuminata, hirsuta, in ambitu serrata, superne atrovirentia, inferne incana, Verbaci quodammodo similia, quæ ad radicem sunt, longis nituntur pediculis; quæ in caulibus, nullo ordine posita, crebra. Flores in thyrsi longioris morem, frequentes, ab uno caulis latere penduli, brevibus, hirsutis pediculis, quorum singulis est appositum foliolum acuminatum, innixi, monopetali, anomali, tubulati, utrimque patentes & quasi bilabiati, dactylothecis propemodum similes, colore foris coccineo, excepta inferiore parte, quæ propter admixtam nonnullam albedinem carneo est, intrus vero similiter purpurei, inferiore parte, (quæ & longis pilis obsita est) versicolore, albis maculis nigro guttatis: floribus basi penitus adnascuntur stamina alba aut purpurascencia contorta, quæ apices didymos, croceo guttatos sustinent. Ex calyce plerumque quinquefolio surgit pistillum tenue, purpurascens, posticæ floris parti ad instar clavi infixum, cujus basis crassior, oblonga, hirsuta ab ita fructum seu testam e rotundo acuminatam, bifariam dehiscentem, in duo loculamenta divisam & seminibus særam exiguis, quodammodo angulosis subrufris: variat interdum coloris flore albo. Agri Parisiensis incolæ ob florum elegantiam in hortis colitur. Tota planta in usum venit, licet rarius.

Analysy chymica, ex Digitalis foliorum recentium ℥v. per retortam distillatis, prodierunt humoris primo rufescentis, inodori; deinde, limpidi odoris, & saporis herbacei, subacidi, ℔j. 3vj. 3vij. gran. lx. humoris limpidi, inodori, intense acidi, austeri ℥iij. 3ij. 3vij. humoris rufi, empyreumatici intense acidi, austeri, & subfalsi 3ij. 3v. gran. xij. humoris rufi, sale volatili urinoso copioso imprægnati cum salis volatilis concreti granis aliquot. 3j. 3ij. olei spissi syrupi ad instar 3j. 3j. gr. xij. Massa nigra in retortâ residua pendebat 3v. 3iv. gr. xxx. quæ calcinata reliquit cinerum 3ij. gran. xxxvj. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali 3ij. gran. lx. lixivio extracta sunt... Quæ facta sunt jactu.

jactura partium in distillatione non percepta est: imo substantiarum extractarum pondus herbæ sumptæ distillatæ quantitatem superavit ꝑv. ꝑij. gr. xlij. Partium jactura in calcinatione fuit ꝑv. ꝑj. gr. lxxj.

Digitalis folia amara sunt. Salem essentialem obtinent austerum, ammoniacalem, similem fere vitriolico ammoniacali, cum multo oleo conjunctum.

Digitalem emericam esse Rajus profert. Dodonæus refert quosdam cum placentas ex hujus plantæ & aliarum herbarum foliis cum ovis factas gustassent atque edissent, mox sese male habuisse & ad vomitionem excitatos fuisse. Lobelius in *Observationibus*, narrat Somerfeti Angliæ rusticam turbam hujus decocto febricitantibus purgationem & interdum superpurgationes & vomitiones humidioribus alvo moliri. Parkinsonus efficacem contra epilepsiam affirmat, si duos ejus manipuli cum ꝑiv. Polypodii quercinæ in cerevisiæ q. s. decoquantur & decoctum propinetur; quod bis in hebdomada iterandum. Qui enim, inquit, sex & viginti annos hoc morbo laboraverant, ut singulis mensibus, bis terve caderent, hujus decocti usu penitus liberati sunt, & saltem per integros sexdecim menses, ne unum quidem paroxysmum senserunt. Verum J. Rajus observat medicamentum hoc robustioribus tantum convenire, siquidem violenter admodum purgat & vomitiones immanes excitat.

Parkinsonus externe strumosis conducere tritam & impositam, succumve ejus in unguento experientia compertum esse affirmat. Novi plures, (inquit Rajus post D. Batesium) qui in strumosis tumoribus Digitalis floribus valde confidunt, quos quidam in butyro majali, quali quot possunt immitigentes curant infuldando per æstatem. Alii cum adipe suillo miscent, & sub terra defodiunt per quadraginta dies: utrinque flores cum unguento reservant, una cum lintheis inducunt & tumoribus applicant. Hosce tumoribus discutiendis vel maturandis, ulceribus detergendis vel exulandis sufficere ferunt se expertos. Quinto & sexto quoque die Diacarthamo purgant, interim continue herbæ Robertianæ decoctum præbent. Pars ulcers rubens parte unguenti tenuiore illinatur: pars autem crassior unguenti linteamini imponatur, quod nunquam mutetur. Sunt, qui novella & primo erumpentia plantæ germina accipiunt, eorumque succum expressum in butyro coquunt ad succi consumptionem, atque novo succo addito bis terve repetunt.

Not. 1. Oportet ut paretur sufficiens quantitas unguenti eo anni tempore, quo flores haberi possunt, cum nonnumquam integer annus aut amplius ad curam perficiendam requiratur. 2. Quamvis ulcera primo majora fiant, ne metuas; siquidem unguentum postquam humores omnes absumperit & exsicaverit, ea demum sanabit & cute obducet. 3. Unguentum hoc in scrophulis humidis & pure manantibus utile est, in siccis parum valet: sed ad Basilicum & Præcipitatum confugiendum est.

Vetus apud Italos adagium hoc quidem est: *Arada che tutte piaghe fonda*, hoc est, Digitalis quæ omnia vulnera sanat.

DIPSACUS.

Dipsacus sativus & Carduus Fullonum, Off. Dipsacus sativus; C. B. P. 385. J. B. 3. 73. Infr. R. H. 466. Carduus Fullonum sive Dipsacus sativus.

*fativus, Lobel. Icon. 17. Labrum vener. Matthiol. Lugdunens. vulgo, Char-
dno a Bonnetier ou a Fouton.*

Duorum aut trium cubitorum, aut etiam majorem altitudinem assequitur, caule pollicari, recto, recte rigido, multis alis concavo, striato, spinulis quibusdam horrente: folia bina apposita ita circa caulem conjuncta sunt, ut concavum labrum excipienda roris vel pluviae aquae efficiant, ampla, longa, dilute virentia, marginibus spinosa, dorso vero eminente durioribus etiam spinis rigentia: scaporum fastigia oblonga occupant capitula quae pugnam implent, composita ex plurimis foliis imbricatis squamarum instar positis, cum mucronibus rigidissimis hamulorum instar reflexis, & axi medio savi æmulo affixis, & quorum alis surgunt flosculi multifidi, candidi aut albo purpurascentes, embryonis parti supremæ coronatæ insidentes & abeuntes, deinde in semina striata veluti Fœniculi, gustu amaricantia. Inabescunt per vetustatem capitula, ac in ipsis per medium sectis subinde parvuli quidam vermiculi reperiuntur. Radice nititur lævi, candida, mediocris longitudinis. Agri Parisiensis incolæ in agris feritur, cujus echinata capitula utilia ad rudes pannos depestandos & exfoliandos habentur, & exporantur. Radix & folia in usum veniunt medicum.

Scrophulas sanare dicitur Carduus Fullonum. Omni putredini resistit. Coctus in vino purgat per urinam non secus ac Asparagus. Phthisicis etiam quodammodo delperatis, experimento Guidonis Helidei & Henrici Stromajerii, Achilles Gasserus in *Obs.* mire proficuum comperit radicem tufam, & melle exceptam.

Radice decoctæ in vino usus in rhagadibus anni consolidandis commendatur & in verrucis abigendis.

Aqua quæ in foliorum concavo reperitur caliginosis & rubentibus oculis prodesse creditur. Eadem maculas faciei emendat & exterit.

DRACUNCULUS.

TRes plantarum species diversæ in Officinis occurrunt sub Dracunculi nomine, scilicet Dracunculus major seu *Serpentaria*, Dracunculus pratensis seu *Prarmica*, & Dracunculus esculentus seu *Tarchon*.

Dracunculus major, Dracontium, Dragonæa, & *Serpentaria*, *Off.* Dracunculus polyphyllus, *C. B. P.* 195. & *Inst. R. H.* 160. Dracunculus major vulgaris, *J. B.* 2. 789. Dracontium, *Dod. Pempt.* 329. Arum polyphyllum, Dracunculus & *Serpentaria* dictum, caule maculato; majus & elatius *Hort. Lugd. Batav.* Exva de sancta Maria, sive Dracunculus major *Tifonis* 240. Anguina, Dracontia, & *Serpentaria Colubrina*, *Lob. Icon.* 600. vulgo, *Serpentaire*.

Dracunculo majori profunde in terram depacta radix est, perennis, fere orbiculata, volam implens, bulbo similis, multis candidis capillamentis stipata, candida, tenui cortice flavescente induta sapore fervido, cujus lateribus parvi bulbi plures, quibus se propagat, nasci consueverunt. Caulis unicus rectus, pollicaris & crassior, sesquicubitalis & altior, teres, levis, versicoloribus lituris veluti *Serpentum* maculis resperfus, e tunicis convolutis constans. Ipsa vero folia pediculis dodrantalibus, fungosis donata, in segmenta digitata, sena, septena vel plura, oblonga, angusta, lævia, splen-

splendentia, glabra, funduntur; e quorum medio eluctatus scapus vix digiti minimi crassitiem æquat, cujus fastigium occupat vagina oblonga, pedalis, coloris foris herbacei, intus in purpura rubentis, odoris fœtidi admodum, quæ evoluta florem constituit monopetalum anomalum, auris asinæ vel leporinæ forma, e sinu suo pistillum promens nigricans longum, crassum, Ari majus, & in mucronem acutiorem desinens, ad basim plurimum apicum congerie & plurimis embryonibus stipatum, qui singuli deinde abeunt in baccas fere globosas, succosas, racematim dispositas, primum virentes, deinde rubentes, ferventi ac mordaci gustu, uno vel altero semine fœtas subrotundo, duriusculo, quodammodo rugoso. Calidarum regionum incola hic in hortis colitur. Radix & folia ex usu sunt.

Principia, quæ ex *Serpentaria* analysi chymica extrahuntur, ab Ari principis parum differunt: salem essentialem ammoniacalem multo acido saturatum continent & sulphure acri copioso implicuntur.

Radix & folia *Dracunculis* Ari vires obtinent, ita ut unum pro altero substitui possit. Nos tamen Simon Paulli movet mitius esse Arum *Dracunculo* remedium; quare ubi forius aliquantulum extergere animus est, *Dracunculus* anteponendus est. Eandem ob causam frequentius in externis usurpatur.

Interne ut Arum usurpatus venenum a corde pellere dicitur. Crassos ac lentos humores, in pulmonum & viscerum glandulis hærentes incidit; & expurgat, obstructions aperit, menses & urinas movet. In asthma pectus, mensium suppressione, affectibus chronicis & cachexia a lymphâ tenaci & inspissata utiliter usurpari potest. Radix exsiccata & pulverata ad ℥j. aut ℥ij. præscribitur. Alvum nonnumquam subducit. Ex ea radice sæcula seu gerla sicut ex Aro præparatur.

Externe radix optimum est remedium contumacium ulcerum, quæ caethe nuncupantur. Expurgat enim abstergitque strenue. Folia quoque utpote simili facultate instructa ulceribus vulneribusque recens insillitis accommodata sunt; & quanto minus fuerint sicca, tanto magis conglutinant: nam quæ sicciora viribus sunt acrioribus, quam ut vulneribus conveniant. Venenatorum animalium moribus imposita recentia venenum extrahunt, ac brevi tempore partes affectas sanant. Fructus valentior est non foliis tantum, sed & radice: proinde & cancos & polypos eliquare creditus est. Succum quoque ejus oculorum vitia expurgare dicunt. Recens radix ferventi cinere tosta & imposita dolorificas, & tumentes hæmorrhoidas curat, scirrhosos tumores resolvit, strumas & lienis duritiem emollit. Supposita menses remorantes trahit. Eadem absterguntur cuius maculæ quæcumque.

Radix *Serpentariæ* pulvis recipitur in celebri ad cancerum pulvere cuiusdam Antonii Fuchsi, de quo mentionem faciunt Rodericus a Castro L. 1. *De morbis mulierum*, & Daniel Sennertus T. III. fol. 748. Pulvis Benedictus a Fuchso dicebatur: sic autem ab illis describitur.

24. *Sandaracæ* græc. vel *Arsenici* albi subtilissime pulverat ℥j. Per quindecim dies de die tertio in tertium affundatur aqua vitæ ad supereminentiam unius transversidigiti, identidem agitando. Post triduum aqua vitæ abijciatur, & nova affundatur. Post quintam affusionem pulvis exsicceretur. Tum adde radicis *Dracunculi* majoris menſe Julio vel Augusto collectæ, in taleulas scissæ, exsiccatae, & pulveratæ ℥ij. Fuliginis camini splen-

splendidi Zijj. Redigantur omnia in subtilissimum pulverem super lapidem marmoreum, & servantur in vale vitreo bene clauso per longum tempus, saltem anni unius integri. Rodericus a Castro refert, Fuchsum hunc postquam suum pulverem inspersisset, si intra triduum tumor non exacerbaratur, sed in melius tendebat sanari posse prædixisse, cum procul dubio conjiceret cancri radices non admodum alte esse infixas, nec humorem valde adustum: atque tum in usu pulveris ad 30. diem persistisse, quo termino, ut referebat, radices extinctæ per se cadebant, ac si quid adhuc hæreret, scalpello præscindebat.

Pulverem autem hunc ita applicabat. Mane ipse jejunos sputum super bombacem apponebat: si cancer exulceratus, absterse prius vulnere ab omni sanie, aspergebat pulverem, adeo ut totus cancer tegetetur, & cum illa supra scripta bombace tegebat. Cum adhæret numquam cadit, nisi una secum radices tollat. Solet ut plurimum inferre dolorem non continuum sed interpolatum, quando humor acris & mordax non potest purgari per ulcus. Et aliquando fit magnus tumor, quando ille acris humor purgatur per ulcus: eo tempore neque removendum medicamentum, neque aliud supra apponendum, sed circum circa oleum illinendum rosaceum & postea dimittendum usquedum per se cadat. Postea purgandum sicut alia ulcera. Ipse Fuchsius usus est pulvere incarnativo & mundificativo hoc.

℞. Thuris, Sarcocollæ, Mastiches, Mirrhæ, Aloes, Mumie, Aristoloch. rotundæ ana Zijj. Mercurii præcipitati Zijß. F. pulvis subtilissimus. Digestivi loco solum usus est unguento ex Terebinthina & vitello ovi.

Dracunculus usurpatur in emplastro Diabotano D. Blondel *Collegian. Pharm. Penicberi*.

Dracunculus Pratenfis, Parmica, Off. Parmica vulgaris, folio longo serrato, flore albo, J. B. 3. 147. *Inst. R. H.* 496. Dracunculus pratenfis, serrato folio C. B. P. 98. Draco sylvestris, sive Parmice, *Dod. Pempt.* 710. Pyrethrum, *Brunfels*: Mentha sarracenicæ Myconi, *Lugd.* 672. Tanacetum album seu acutum, *Trag.* 159. vulgo, *Herbe a cernuer*.

Hæc planta cubitalis est, nonnumquam bicubitalis & tricubitalis, radice oblique æta & velut geniculata, fibris majusculis & longissimis donata, sapore acri & fervido: caule singulari, tereti, glabro, fistuloso, gracili, satis tamen rigido: cui alterno aut potius nullo ordine posita adnascuntur folia forma & magnitudine Oleaginis similia, sed ab imo ad summum arguris aspersiusculisque denticulis circumquaque serrata, atro virore splendentia, sapore fervido, Pyrethri mitiore. Summus scapus nonnihil angulosus & subhirsutus in surculos aliquot dividitur, qui umbellarum fere flores gestant candidos, radiatos, Millefolii terrestris duplo vel triplo majores, odore non dissimili sed remissiore: quorum discus ex plurimis flosculis arcte stipatis & in quinque segmenta acuta divisus, corona vero ex semisflosculis componitur trifariam divisus, embryonibus insidentibus & calyce squamoso brevioris quam in Millefolio comprehensis. Embryones autem deinde abeunt in semina tenuia. Agri Parisiensis incolæ in pratis udis & palustribus Julio mense floret. Radix & folia in usum licet minus frequentem veniunt.

Plantarum sale essentiali oleoso acri donatur. Plantæ siccæ pulvis naribus inditus sternutamenta movet, unde ei nomen. Verum raro usurpatur, nec nisi cum aliis generosioribus capiti appropriatis remediis destituatur. Radix commansa caput purgat & dentium dolores mulcet pituitam eliciendo. Dicunt quoque contusa ipsius folia viridia, contusionibus imposita dilecture livorem. Adduntur nonnullis Lactucis aliisque acetariis hujus folia, quorum frigiditatem veluti Eruca & Draco, corrigunt quoque ac. temperant.

Dracunculus esculentus sive Tarchon, *Off.* Abrotanum Lini folio acriori & odorato, *Inst. R. H.* 459. Dracunculus hortensis, *C. B. P.* 98. Dracunculus hortensis, sive Tarchon, *J. B.* 3. 148. Draco herba, *Dod. Pempt.* 709. Tarchon Avicennæ & Sehi, *Gesner. Herbor.* : vulgo, *Estragon.*

Fruticola promit duorum cubitorum & ampliora virgulta, dura, gracilia, nonnihil angulosa, inconditis ramis divisa : foliis primo orientibus divisis, ubi vero adolevit, foliis onusta Lini folia æquantibus aut Hyslopi, atrovirentibus, splendidis, omnis divisionis ignavis, sapore acri, aromatico, cum quadam dulcedine grata, Anisum conditum æmulante. Flores eo ordine per summos ramos quo in Abrotano, in corymbum digesti, flosculosi, sed exigui & vix conspicui, plurimis flosculis constantes tubulosi, in summitate quinquefariam divisi, embryoni insidentibus & calyce squamoso comprehensis. Embryo autem abit deinde in semen minutum, pappi nequaquam instructum. Radix perennis novam singulis annis stolonum sobolem emittit. In olitoriiis hortis colitur.

Planta tota insigni acrimonia prædita est, & sale essentiali oleoso aromatico donatur. Valenter incidit, aperit, digerit, appetentiam excitat, flatus dissipat, urinam & menses ciet, obstructions expedit, mania pituitam ducit & salivam instar Pyrethri, hinc dentium dolores mulcet & humidum cerebrum purgat. Frequentissimus est apud nostrates usus ejus in acetariis ad temperandam & corrigendam aliarum herbarum quibus admiscetur frigiditatem & cruditatem. Prodest Tarchon, scribente Matthiolo, iis quibus ventriculus frigidior. Vehementer excalefacit : ad pestis contagia maxime & primæ laudis est ejus aqua stillantia apud Anglos, auctore Lobelio : quæ tamen virtus J. Raio prorsus ignota fuit.

DULCAMARA.

Dulcamara, Amaradoleis, Solanum Scandens ; *Off.* Solanum scandens seu Dulcamara, *C. B. P.* 167. Glycypheros sive Amaradoleis, *J. B.* 2. 109. Dulcamara, *Dod. Pempt.* 402. Salicaltrum, *Plin.* : Cucæa, *Adversar. Lobel.* 104. Vitis sylvestris, *Camerar. Epitom.* 986. Solanum lignolum sive Dulcamara, *Parkinson. Raii Hist.* 672. vulgo, *Morrelle, Douce amere.*

E radice modica, fibrosa, sarmenta lignosa, fragilia, tenuia, tres, quinque vel sex pedes longa, vicinis sepibus aut fruticibus scandendo te circumvolventia emittit. Cortex novellorum ramulorum viret, sed vetustiorum ipsorumque caudicum asperior cipericeo subeandicat colore, extrinsecus quidem, nam intrinsecus pulchre etiam viret. Lignum fragilem medullam intus sanguisam habet. Folia alternatim nascuntur oblonga, lævia mucronata, Smilacis minora, atrovirentia, duabus pinis nonnumquam in parte aurita, pediculo circiter unciali. Flores in mucariis exiguis foetidi,

sed pulchelli, monopetali, rotati, in quinque segmenta angusta, acuminata, exteriorum reflexa partiti, caeruleo-purpurei, quandoque candidi, in quorum medio apices lutei in umbonem compositi. Ex floris calyce surgit pistillum medius floris parti ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum mollem seu baccam succulentam per maturitatem coccinei coloris, sublongæ formæ, lenti & ingrati saporis, parvis granulis compressis, albescentibus repletam. Aquosa & figuâ amara. Tota planta usitata est.

Analysi chymica cum Solano officinali sere convenit. Chartam caeruleam folia rubro colore vix tingunt: sapore saturo & odore narcotico dominantur. Fructus vero vinosum saporem refert & chartam caeruleam rubro tingit colore. Saleem essentialem continet ammoniacalem qui in foliis multo sulphure crasso narcotico involvitur, in fructibus vero hujus salis pars acida magis evoluta est. Unde fructus magis refrigerant & reperiunt, folia vero magis resolvunt & absterunt.

Intus sumpta efficax censetur ad hepatis & lienis obstructions resolvable. Urinam ciere dicitur, & contra hydropem utiliter exhiberi. Fertur a ruptis & ex alto præcipitatis aut etiam cæcis succum utiliter bibi. Creditur siquidem concretum alicubi in visceribus sanguinem dissolvere & partium læsarum sanitatem procurare. Parkinsonus scribit quoties ex Medicorum præscripto illum exhibuit, se compesisse satis violenter purgare. Et Prævotius *L. de Med. Pauperum*, ligno Dulcamaræ decocto inter bilem benigne evacuantia principem locum tribuit. Tragus hujus ligni decoctum præferibit in morbo regio præsertim inveterato.

24. Dulcamaræ ligni lbj. ac minutim in frustula tali ludieri instar concisam cum mensura vini albi in novam ollam, eamque operculo exiguo foramine in medio pertuso probe connectam & massa farinacea oblitam reponas, superque carbonibus lento igne decoquito ad tertias, demumque his utare. Hæc potio mane una hora antequam surgas, & vespere cum lecto te committere velis, cyathi vulgaris mensura sumpta, morbi regii causam, bilem nempe viscidam lenites per alvum & urinam exigit.

25. Caulium virid. Solani lignosi concisor. ℥iij. Coccinill. ℥j. vini albi ℥viij. Infunde calide in vase clauso per noctem. Colaturæ adde Symp. Heder. terrestr. ℥iij. Theriac. Androm. ℥ss. M. Dosis ℥iij. vel vj. bis terve die.

Hæc traumaticum insusum a Th. Fullero singulariter commendatur ad easum ab alto; & contusiones. Cruorem quippe extravasatum & grumescens mire dissolvit, in massam sanguinis intra vasa majora circulantis demum propellit; atque illinc partim per diaphoresim, per diuresim, partimque nonnumquam per catharsim exterminat. Tam potenter & specificè, inquit, operatur, ut aliquando (non sine stupore) notaverit ab ejus usu urinam (propter grumos solutos absorptos, & sero commixtos) plane nigrescentem reddi.

Externe viri anodyna & resolvende plurimum valet. Sebizio viridem Dulcamaræ confusam & cataplasmatibus forma applicatam ait mitigare mammarum dolores, emollire earum duritiem, atque dissolvere in iis grumescens lac. J. Raius refert cataplasma ex foliorum Dulcamaræ concisor. manipulis quatuor cum ℥iij. seminis Lini pulverati decoctor. in vino moscha-

ſcato cretico aut larido porcino , calide applicatum , unius noctis ſpatio tumorem capitis humani magnitudine reſolveſſe , & contuſiones deploratas muſculorum ſanaviſſe.

Mulieres in Hetruria , narrante Matthiolo , Acinorum ſuccum uſurpant ad faciei nitorem , & lentigines , maculaſque delendas.

EBULUS.

EBulus , Sambucus humilis , Sambucus herbacea , Chamæaſte , Off. Sambucus humilis , ſive Ebulus , C. B. P. 456. Inſt. R. H. 606. Ebulus ſive Sambucus herbacea , J. B. 346. Ebulus , Dodon. Pempt. 381. Chamæaſte , Dioſcorid. vulgo , Yebſe.

Hæc planta herbacea Sambuci æmula , raro hominis altitudinem aſſequitur , ſæpius ſeſquicubitalis : ex radice longa , digitalis craſſitudinis , non hignofa , carnoſa , albida , late ſparſa , ſaporis amaricantis , ſubacris & nucleofi , caules herbaceos promit , ſtriatos , anguloſos , ac frequentibus articulis geniculatos , Sambuci ritu medulloſos , hybernis menſibus contabefcentes . frondes ordinatius diſpoſitas , e tribus quatuorve conjugationibus ad creſſum , nervoſum pediculum annexis , imparique extremo folio compoſitis , quarum ſingula folia Sambucinis longiora , acutiora , ambitu ſerrata , odore graviore . Flores in umbellis naſcuntur parvi , numeroſi , odorati , & neſcio quid nucleorum Perſicorum , magmatibus ſpirantes , ſed eſu vix ferendi , candidi , monopetali , rotati , quinquepartiti , cujus medullarum a mucrone calycis tanquam a clavo perſoditur inter quinque ſtamina candida & toiidem apices ferrugineos . Floribus deciduis calyces abeunt in fructus ſeu baccas , per maturitatem nigras , torulis multis anguloſas ante maturitatem & pene triangulas , poſt vero magis rotundas , ſucco ſuo manus rutila quadam purpura inſcipientes , ſeminibus ſætas oblongis , ternis , altera parte gibbis , altera anguloſis . Ad vias publicas & in agrorum limitibus non raro occurrit . Cortex radicis , folia , baccæ uſitata ſunt .

Analyſi chymica , ex folior. & ſummitatum Ebuli recentium lbv. per retortam diſtillatis prodierunt humoris limpidi , ſub ſinem ruſcentis , odoris & ſaporis ingrati , primo obſcure acidi , deinde remiſſioris ac tandem ſubſali lbj. ℥iij. 3v. gr. xlviij. humoris ruſcentis , primo leviter alkali , urinoſi , ac tandem intenſi lbj. 3v. 3vij. gr. xxxvj. humoris ruſi , ſale urinoſo copioſo imprægnati 3vij. gr. xlviij. olei 3j. 3iij. gr. xxiiij. Maſſa nigra in retorta reſidua pendebat 3vj. 3ij. gr. xxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum 3ij 3v. ex quibus ſalis fixi leviter alcalini 3ij. gr. ij. lixivio extracta ſunt . Partium jaſtura in diſtillatione fuit 3xij. 3j. gr. xxiiij. in calcinatione 3j. 3vij. gr. xxxvj.

Baccarum maturarum recentium lbv. per retortam diſtillatæ præbuerunt humoris limpidi , odoris & ſaporis ſaui , ingrati & obſcure ſali , deinde obſcure ſubacidi 3ix. 3vj. gr. xlviij. humoris ruſi , odoris & ſaporis ingrati , primo ſubacidi , deinde acidi , ſubſali & auſteri 3vij. 3j. gr. xvij. humoris limpidi , ruſcentis , acidi , alkali , urinoſi & auſteri ſimul 3xj. 3ij. gr. xxxj. olei 3xiiij. 3iij. gr. xxxvj. Maſſa nigra in retorta reſidua pendebat. lbj. 3ix. 3vij. gr. xxxvj. quæ rite per 12. horas calcinata reliquit
cine-

cinerum albicantium ꝑij. ꝑij. ex quibus salis falsi talcosi ꝑj. gr. xxx. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ꝑx. ꝑvij. gr. xlij. in calcinatione ꝑj. ꝑvj. ꝑijij. gr. xxxvj.

Folia Ebuli amaricantia sunt, baccarum vero magis intensus est amaror, cum quadam adstrictione: chartam cœruleam earum succus non mutatur. Sale essentiali ammoniacali cum oleo copioso, baccæ præsertim donantur tum tenui, tum crasso.

Ebulo facultas purgandi per alvum eximia & valida tribuitur: radices ad hunc scopum efficacissimæ sunt ac præsertim cortex ejus. Alii sumunt medianum stipitis corticem. Post radices sunt baccæ & semina. Asparagi seu turiones & folia mitiora censentur. Radicis substantia lignea interior adstringit potius, & propterea in fluore albo & nimio mensium fluxu ex vino sumpta a P. Hermans & Friderico Hoffmanno laudatur. Folia digerendi & discutiendi potentia præstant. Educunt autem cortices non modo pituitam, sed & aquosos potissimum humores: utiles idcirco prædicantur ad hydropicorum purgationes; sed tamen correctæ & ubi vires suffecerint. Purgant enim cum molestia, ventriculum subvertunt, vomitum nonnunquam promovere, interioraque viscera omnia perturbant. Male omnibus usus earum succedit, quibus hepar obduruit, ut quando morbo regio ascitæ successit. Quamobrem nec temere nec nisi valde robustis & viribus adhuc integris ex Ebuli corticibus medicamentum aut potio danda.

Succus, cui vis purgandi valida, elicitur vel e radice vel e mediano stipitis cortice confuso, affuso Hordei vel uvarum passerum decocto cum Cinnamomi vel Nucis mosch. momento & Saccharo. Infusum corticum radicis Ebuli, non adeo violentum est, decoctum vero minus. Coctura, auctore Fernelio, vis ejus purgandi perit & exsolvitur. Succus exhibetur ad ꝑj. Cortex in vino maceratur vel decoquitur ab ꝑß. ad ꝑij. si causa morbi frigida, si febris abût: alias pro affectus natura potio temperanda est.

Semen in pulvere præscribitur ad ꝑj. Seminum Ebuli ꝑß. in vini albi ꝑvj. maceratur per noctem & colatura hydropicis propinatur. Vel etiam ex eorumdem seminum ꝑvj. confusis in aq. florum Parietaræ emulsio hydragoga conficitur. Fridericus Hoffmannus radicem, dempto cortice, tempore vernæ rubicundam collectam & pulverizatam a ꝑß. ad ꝑij. exhibitam nimio mensium fluxui mederi scribit. Ex baccis Rob conficitur ad aquas hydropicorum in robustioribus subjectis educendas ab ꝑß. ad ꝑj. exhibitum.

Flores Ebuli sicut flores Sambuci interne sudores movent.

Ex Ebuli seminibus in aqua calida maceratis & foriter expressis oleum aquæ supernatans obtinetur quod externe dolores podagricos demulcet & tumores optime resolvit.

Aqua stillatitia radicem Ebuli commendatur a D. Duval Medico Paris. in doloribus, inflationibus & obstructionibus lienis: propinatur ad ꝑijij. per decem aut duodecim dies mane, jejuno ventriculo.

Folia cocta ad cataplasmatum formam sopiendis podagricorum doloribus conferunt. Eadem tumores aquosos & herniam in specie aquosam discutiendo ac resolvendo tollunt. Contusa & imposita ambustæ parti eam persanant. S. Paulli *Quadrup. Botanico* ingentem testium & scroci inflam-

mationem in puero, cataplasmate ex foliis Ebuli & Agrimoniz partibus æqualibus & vino rubro coctis curavit. Cortex radicum potenter discutit & emollit, unde externe in inflammationibus & erysipelate admoveatur. Ad tumores pedum oedematosos resolvendos, aut dolores podagricos, rheumaticos sedandos, foras foliorum Ebuli, Tanacetii, Salviz in aqua vel vino coctorum commendatur.

24. Cortic. radicum Ebuli ℥j. Baccar. Juniper. ℥j. flor. Sambuc. P. j. Maceantur in vini q. s. Colatura detur ad aquas per urinam & alvum educendas.

25. Fol. Ebuli recentium ℔ij. Contunde & misce cum butyri majalis ℔j. Coq. ad herbæ siccitatem. F. colatura & unguentum erit efficacissimum ad tumores resolvendos, arthriticos dolores sedandos.

Radix & semina Ebuli usurpantur in hydragogo eximio *Renodei*. Radix adhibetur in syrupo hydragogo *Pharmacop. Regiæ*, & in emplastro de Ranis cum Mercurio *Ejusdem*. Folia vero in extracto panchymagogo *Crollii*, & in ung. Martiatio, *Pharmacop. Regiæ*.

E L A T I N E.

Elatine & Veronica fœmina, *Off. Linaria segetum*, Nummulariæ folio villosa, *I. R. H. 169. Rair Hist. 759.* Elatine folio subrotundo *C. B. P. 252.* Elatine mas, folio subrotundo *J. B. 3. 372.* Veronica fœmina Fuchsi sive Elatine *Dod. Pempt. 42.* Verbasculum quorundam, *Lugd. 1301. vulgo, Veluste ou Veronique femelle.*

Radix alba, simplex, tenuis, paucis fibris donata, recta in terram descendit. Caulis tenuis, rotundus, vix palmum altus: verum flagella quæ ad latus supra terram spargit, longitudine non raro spithamam excedunt. Folia quam Alfinæ mediz majora, rotundiora, pallide viridia & canescentia, hirsuta & ad tactum mollia, circa margines plerumque æqualia, interdum tamen obiter dentata, pediculis brevissimis sulcata, situ alterno. Ex alis foliorum emergunt pediculi singulares, longi, tennes, singulos flores sustinentes Linariæ similes, parvos, monopetalos, anomalous, personatos, posterius in caudam seu calcar tenue, incurvum. desinentes, antèrius in duo labia divisos, quorum superius colore pullo, bifariam, inferius vero, ex herbido flavescent trifariam secatus. Ex calyce pentaphyllo surgit pistillum posticæ floris parti infixum, quod deinde abit in fructum seu testam membranaceam, subrotundam, septo intermedio in duo loculamenta divisam, seminibusque pluribus minuris, subrotundis fœtam. Usu herba est quæ in sylva Bononiensi sponte crecit.

Analysi chymica, ex totius plantæ recentis ℔v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, inodori, sub finem subacidi ℥xij. ℥iij. gr. xxxvj. humoris primo limpidi, magis ac magis acidi, deinde rufescentis, intense acidi & austeri ℔ij. ℥ij. ℥v. humoris rufescentis, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥j. ℥j. olei ℥vj. gr. xliij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥ix. gr. xliij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ponderosorum & terræ similium ℥vj. ℥j. gr. xxxvj. ex quibus salis fixi salis ℥ij. gr. xxxvj. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥iij. ℥vj. gr. xvij.

Elatines folia intense amara sunt, subadstringentia, & aliquid oleosi spi-

spirant. Salem essentialem continere videntur Tartareo.aluminosum medicri olei portione involutum.

Summe vulneraria est, temperans & detergens, aperit & resolvit. Ejus infusum, decoctum vel aqua distillata usurpari solent ad ʒiij. vel ʒvj. Succus vero ab ʒij. ad ʒv. bis terve die potus. Laudatur in cancro, podagra, imperigine, lepra, hydropse, scrophulis. Pena & Lobelius narrant, quendam misellum barbitonforem, cum perdocti Medici complures nasum ejusmodi ægotantis abscindere decrevisent, hoc remedium a quopiam suo hero edoctum, amputationem dissuasisse, & hujus plantæ succi litu & potu sic effecisse, ut nasus non abscinderetur & ut reliquo corpori in lepram prono mederetur. Ejus extractum præparatur & ad ʒ. exhibetur. Externe admota planta, vel succus effusus ulcera fordidâ & cancroâ abstergere, cohibere & sanare dicitur. Unguentum ex ea conficitur à Tournefortio ad ulcera, hæmorrhoides; scrophulas, cæcæque cutis vitia prædicatum.

24. *Elatines floridæ* q. v. Contundantur & macerentur per 24. horas in vini albi q. s. ut herba tegatur. Tum fiat colatura cum forti expressione. Coquatur ad tertias & affund. adip. porcini q. s. F. unguentum. Utiliter quoque a nonnullis in enematum decoctis adversus alvi profluvia & dysenteriam usurpatur.

ENDIVIA sive INTYBUS.

Endivia sive Intybus Cichorii species est. Intybum tamen a Cichorio J. Rajus distinguit foliis brevioribus, non laciniatis & quod annua planta sit, cum Cichorium petennet. Tres Endiviæ species usitatæ sunt, Endivia latifolia, seu vulgaris, Endivia angustifolia, seu Scariola vulgaris, & Endivia crispa seu Romana.

Endivia latifolia, Endivia vulgaris, Intybus sativa, Intybum latifolium, Scariola latifolia Seriola, Off. Cichorium latifolium, sive Endivia vulgaris *Inf. R. H.* 479. Intybus sativa, latifolia, sive Endivia vulgaris *C. B. P.* 125. Intybum sativum latifolium *J. B.* 2. 1011. Intybus major sativa, Cichorium domesticum *Taberna. Icon.* 173. Seris domestica *Dioscoridis*: Cichorea sativâ *Tragi* 273. Intubus *Turn.* Intubum latifolium sativum *Fuchs.* *Dod.* Scâriola Arabum, interpretibus: Gallice *Endive commune* ou *Chicoree blanche*.

Radix est fibrosis, lacte prægnantibus: foliis per terram sparsis antequam caulescat, longis, latis, Lactucæ foliis similibus, in ambitu subinde crenatis, subamaris: foliis quæ in caule sunt quasi hederaceis, minoribus: caule cubitali & sesquicubitali, lævi, striato, inani, multis ramis brachiaro, tortuoso, vulnere lac fundente; floribus e foliorum alis nascentibus, cœruleis, Cichorii sylvestris, seminibus quoque consimilibus.

Endivia angustifolia seu minor, Intybus angustifolia, Scariola vulgaris seu angustifolia, Seriola & Endiviola: Off. Cichorium angustifolium, sive Endivia vulgaris *Inf. R. H.* 479. Intybus sativa, angustifolia *C. B. P.* 125. Intybum sativum, angustifolium *J. B.* 2. 1011. Serium, Cichorium lativum minus *Taberna. Icon.* 174. Intybum sylvestre *Gerard.* Intybus sive Endivia minor angustifolia *Parkinson*: vulgo, *Petite Endive*.

Foliis est angustioribus, sapore amariore, caule ramosiore; in reliquis cum priore convenit.

Endivia crispa, seu Romana, Intybus crispa, Off. Cichorium crispum *Inf. R. H.* 479. Intybus *C. B. P.* 125. Intybum sativum crispum *J. B.* 2. 1011. Intybus crispa, Endivia crispa *Tabern. Icon.* 173. Seris seu Intybus crispa *Adv. Lobel:* vulgo, *Chicoree frisée*.

Foliis est quam Endivia vulgaris majoribus, ubique in ambitu crispis ac sinuatis: caule cæteris majore, crassiore, teneriore, semine nigro: cætera similis.

J. Bauhinus hortulanorum mangonio Intybum crispam effici opinatur. J. Rajus Intybum crispam a sativa specie differre existimat. Seritur Intybus in hortis olitorius, ad usum culinarium. J. Rajus observat quod vere sata celeriter adulescat, & ipsa æstate florens semina proferat & deinde intercidat: Julio vero sata in hyemem refect, Septembri aut Octobri terra obruta, colligatis prius foliis, nivis instar candida reddatur, ac deinde mensibus hybernis, aliorum acetariorum loco, mensis inferatur palato sapida & grata.

Analysi chymica, totius Intybi sativæ majoris recentis cum radicibus *lv.* præbuerunt humoris limpidi, deinde limpidi, saporis & odoris herbacei, obscure salis, obscure acidi, tandem manifeste acidi *lbiij.* *℥ij.* humoris limpidi, manifeste & magis ac magis acidi, sub finem rufescentis, atque saporis odorisque leviter empyreumatici, austeri *lbi.* *℥x.* *℥vj.* gr. xvij. humoris fulci, odoris & saporis vehementer empyreumatici subacidi, acris & salis, sub finem rufi, sale volatili urinoso copioso imprægnati *℥i.* *℥v.* olei spissi ad instar extracti *℥v.* gr. lx. Massa nigra in retorta superflentes pendebat *℥iiij.* *℥v.* gr. viij. quæ rite calcinata reliquit cinerum *℥ij.* *℥ij.* gr. xxxv. ex quibus salis fixi mere alcali *℥j.* *℥j.* gr. xxxvii. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit *℥ij.* gr. lvij. in calcinatione *℥ij.* *℥ij.* gr. xliij.

Ex Intybi sativæ candidæ foliorum recentium & a radicibus separatorem *lv.* prodierunt humoris limpidi, primo inodori & insipidi, obscure salis, deinde subacidi *lbiij.* *℥iiij.* *℥iiij.* humoris limpidi, subfalsi, urinosi *℥v.* *℥ij.* gr. xiv. humoris fulci, empyreumatici, sale volatili urinoso copioso imprægnati *℥ij.* *℥ij.* gr. xxiiij. olei *℥v.* gr. xxiiij. salis volatilil urinosi concreti gr. circiter xx. Massa nigra in retorta residua pendebat *℥vij.* gr. xlij. quæ rite calcinata reliquit cinerum *℥vij.* ex quibus lixivio salis fixi mere alcali *℥ij.* gr. viij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit *℥j.* gr. xx. in calcinatione gr. xlij.

Intybi viridis junioris foliorum recentium *lv.* per retortam distillatæ præbuerunt humoris limpidi, rufescentis, odoris & saporis herbacei quasi lixiviosi, sobfalsi *lbi.* *℥xv.* *℥j.* gr. vj. humoris rufescentis, subtrubidi, ejusdem saporis & odoris *lbi.* *℥ij.* *℥iiij.* humoris flavescens, limpidi, saporis & odoris lixiviosi, subfalsi & aliquantisper urinosi *lbi.* *℥iiij.* *℥j.* gr. liij. humoris turbidi, rufescentis, odoris & saporis empyreumatici; sale volatili urinoso copioso imprægnati *℥j.* *℥j.* gr. xxij. salis volatilil urinosi concreti nidi *℥j.* gr. xxiiij. olei spissi ad instar extracti *℥v.* gr. xij. Massa nigra in retorta superflentes pendebat *℥ij.* *℥ij.* quæ rite calcinata reliquit cinerum *℥j.* *℥ij.* gr. lx. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali *℥iiij.* gr. xlvij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit *℥v.* *℥vij.* gr. xxvj. in calcinatione *℥vj.* gr. xij.

En-

Endiviæ viridis folia recentia salem effentialem continere videntur nitroso-ammoniacalem cum olei tenuis, & paululum terræ permixtum. Nullum acidi signum præbuerunt in tentaminibus ob maximam salis urinosis copiam.

Endiviæ folia colligatione dealbata aliquantulum acidi exhibuerunt; minus vero salis volatilis, & terræ: succus eorum, dum colligantur ut dealbescant, quamdam fermentationem intus suscipit, qua salia volatilia in hac planta copiosa, & evoluta satis, partim avolant, remanente acida portione, & aqua: Terra autem eadem fermentatione attenuata cum cæteris principis intimius miscetur.

Folia dealbata teneriora sunt, & palato magis sapida virentibus, ob acidi portionem magis evolutam, & cum alcalinis, & oleis intimius permixtam; virentia amarescentia sunt ob molecularum salinarum crassitiem, & diversam cum oleo, & terrâ miscelam.

Endiviæ virentes apud nos raro escantur, sed angustifolia, & crispâ cera olitorum qui illas terra vel arena in hortis vel in cellis subterraneis obrunt, candidæ factæ, & dulciores, in acetariis crudæ in mediis frigidioribus sicut lactucæ in æstate frequentissime comeduntur. Usitatæ sunt etiam in jusculis carniûm, & ex jure coxæ vervecinæ, in quo sensim elixantur, & tabescunt, dum caro assatur, saporatæ, ut artis est, cibum præbent & gratum, & salubrem.

Nec minus notæ sunt in officinis pharmaceuticis quam in culinis, ubi & virides, & dealbatæ in usum veniunt. Folia præsertim frequenter usurpantur, semina raro, fere numquam radices.

Endiviæ omnes refrigerant, abstergunt, & aperiunt: sale suo nitroso ammoniacali, subtili, multo phlegmate diluto, sanguinis fervorem sedant, biliosorum humorum orgasmum compefcunt, acres sanguinis sales nimis evolutos, & nimis evecta sulphura sibi consociant, & per urinas aut per secesum abducunt: viscera maximeque jecur infarctû liberant, emolliunt, & diluunt collectam in illis bilem viscidam, & quasi resinofam factam, serum glutinosum seu pituitam crassam dividunt: icterum sanant, febribus biliosis ardentibus, & inflammationibus quibuscumque conducunt: hæmorrhagiis medentur. In jusculis, & apozematibus temperantibus, refrigerantibus, & aperiuntibus usurpantur: earum succus desecatus sæpius die, ad ℥iij. vel decoctam pro potu solito propinatur.

Simon Paulli *Quadr. Botanico* 322. folia exsiccata commendat, quæ decoctionibus hepaticis permixta, ad præparandam bilem, quæ icterum invenit, additis Fragariæ foliis, valde prodesse asserit.

Semen Endiviæ inter quatuor semina frigida minora numeratur, ex quibus æque ac ex majoribus emulsiones præparantur.

Externe Endiviæ virentis folia in inflammationibus, & tumoribus erysipelaceis admoventur contusa. Usurpantur in enemaribus refrigerantibus, & emollientibus, & in pediluviis pro concilianda quiete, & somno, vel tempore æstivo vel in ardoribus febrilibus.

℥. Radicum Gramin. Fragar. & Asparag. ana ℥j. Folior. Cichor. sylvestr. cum toto, folior. Endiviæ vulgar. Scariolæ, Pimpinell. & Agrimon. ana M. j. Coquantur in ℔ij. ad ℔ij. aq. comm. Colatura dilue sal. amar. *Gessroy Tom. II.*

cathartic. ꝑ℞. Syrup. de pom. simpl. ℥ij. F. apozema ad bilem crassam incidendam in ictero, & hepatis-obstructiones referandas. Propinetur per cyathos statis temporibus.

Ꝛ. Radic. Cichor. & Nenuphar. ana ℥j. Folior. Endiviz, Scariol. Bugloss. Borrag. Lactuc. & Portulac. ana M. j. Semin. Melon. Citrull. Endiv. & Althææ ana ℥j. Passular. Jujubar. ana ℥j. Orizæ contusæ P. j. Coq. in aq. fluviatil. ℔ij. ad ℔ij. F. apozema ad pituitam tenuem, & fassam in catharris contemperandam, & demulcendam.

Ꝛ. Pullum gallinac. exenteratum, excoriatum, capite, & pedibus resectis. Coquatur in aq. ℔vj. ad ℔ij. Sub finem coctionis adde folior. Intybi utriusque, Cichor. Sylvestr. Chærophylli, Borrag. Bugloss. Lactuc. Pimpinell. & Agrimon. ana M. j. Per cyathos calens propinetur 3. vel 4. quaque hora ad refrigerandum, aut humorum æstum compescendum in febris biliosis.

Ꝛ. Fol. Intybi utriusque, Lactuc. Cichor. Sylvestr. Borrag. Bugloss. Acetos. rotund. Scolopendr. Fumar. Agrimon. ana M. j. Contrundendo affunde sensim feri lactis ℔ij. F. colatura cum forti expressione. Colatura descicata, dissolve Syrup. de Cichor. simpl. ℥ij. F. serum medicatum refrigerans, & aperiens ad temperandum vicerum æstum & obstructions aperiendas.

Endivia utraq̃ue usurpantur in syrupo de Cichoreo simplici, & composito *Colledancor. Pharm. Penicberi.*

ENULA CAMPANA.

Enula Campana, Helenium, Inula, *Off.* Alter omnium maximus; Helenium dictus, *Inst. R. H.* 483. Helenium vulgare, *C. B. P.* 276. Helenium sive Enula campana *J. B.* 3. 108. Helenium *Dod. Pempt.* 334. Elenion *Tragi* 170. Panax Chironium Theophrasti *Anguill.* Inula *Gesner. hortor.* vulgo, *Aunée, Enule campane.*

Radice est crassa, carnosâ, multifida, foris fusca, intus alba; sapore acri, aliquantisper amaro, & aromatico, odore etiam, præsertim cum exsiccata fuerit, suavi, & grato: folia cubitum æquant & sæpius superant, spithamam pene lata, superne pallide virentia, subtus incana, per ambitum crenata, utrinque acuta, ad radicum mollia; caulis ad tres vel quatuor cubitos assurgit, rectus, villosus, striatus, ramosus, flores sustinens radiatos, aureos, amplos, cum seminibus longis, angustis & papposis. Agri Parisiensis incolæ delectantur locis pinguibus & udis. Nulla hujus plantæ pars præter radicem odorata sit. Radix sola fere totius plantæ pars usitata autumnæ, & nonnumquam Aprilis, & Majo mensibus legitur.

Analysi chymica, ex radicem Enulæ recentium ℔v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, odoris, & saporis radicem referentis, cum quadam amaritie, primo obscure salsi, & obscure acidi, deinde subacidi, austeri ℔j. ℥xj. gr. xij. humoris limpidi, ejusdem odoris, & saporis, cum exigua olei essentialis adiposi, & granulatim concreti, cineracei portione, magis ac magis acidi, austeri ℔ij. ℥ij. 3v. gr. vj. humoris rufescentis, odoris,

odoris, & saporis empyreumatici, intense acidi, austeri ℥ij. ℥iij. gr. xx. humoris sulci, empyreumatici, obscure acidi, & sale volatili urinoſo copioſo imprægnati ℥ij. ℥v. gran. xij. olei ſpiſſi ſyrupi ad inſtar ℥j. ℥j. gr. xij. Maſſa nigra in retorta reſidua pendebat ℥vij. ℥j. gr. xxvij. quæ nite calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥iij. gr. xx. ex quibus lixivio ſalis fixi mere alcali ℥iij. gr. lvij. extracta ſunt. Partium jactura in diſtillatione fuit ℥iij. ℥vj. gr. lv. in calcinatione ℥v. ℥v. gr. vij.

Ex radicem Enulæ recentium, minutim inciſarum, & contuſarum ℔x. & ℥v. cum aqua communis ℔xl. per tres dies maceratis, & per refrigeratorium ſimul diſtillatis, prodierunt humoris turbidi, lacteſcentis, radicis odorem, & ſaporem referentis, ſine ullo acido aut alcali manifeſto ℔xx. cum olei eſſentialis cineracei in diverſæ magnitudinis flocculis concreti, partim in aquæ ſuperficie fluctuantis, partim fundum perentis ℥v. deinde humoris limpidi, odorati, obscure acidi cum tantillo ejuſdem olei ℔viii.

Cineraceum illud oleum concretum in vaſe idoneo igne eliquatum, & poſtea refrigeratum in humorem ſpiſſum, reſinoſum, Terebinthinæ inſtar concrevit colore fuſcum, & radicis Enulæ odorem referentem.

Humoris illius lacteſcentis primo diſtillati ℔xx. oleo ſemoto, per refrigeratorium ſerpentino canali inſtructum iterum diſtillatæ præbuerunt humoris lacteſcentis, radicis odorem, ſaporemque referentis cum quodam amaro ℔vj. Humor ille per tempus limpidus evaſit, ſupernante olei hujus eſſentialis, cineracei, concreti, portione exigua, & flocculis aliquot candidis oleoſis, nivis flocculorum ad inſtar, ex plurimis lamellis tenuiſſimis compoſitis liquoris inſimum petentibus, illi flocculi ſalino-oleoſi Camphoræ ſpecies videntur ſeu ſal eſſentialis oleoſus haud multum diſcrepans a Benzoini floribus, niſi quod majori olei copia ſcateat. Liquor in alambice reſiduus odoris, & ſaporis expers repertus fuit, attamen obscure acidum in quibuſdam reſtaminibus ſe præbebat.

Radix Enulæ campanæ acris eſt, amaricans, aromatica, nonnihil glutinoſa: exſiccata odorem gratum ſpirat ad Iridem aliquantiſper accedentem. Chartæ cœruleæ colorem in ſubrubrum mutat. Multum reſinæ continet hæc radix cum aliqua ſalis vitriolico-ammoniacalis portione permixtam.

Radix Enulæ campanæ ad multa maxime utilis eſt tum recens, tum exſiccata. Bechica eſt, ſtomachica, diuretica, uterina, aperiens, necnon alexipharmaca, & ſudoriſera. Prodeſt adverſus reſpirandi difficultatem, aſthma humidum, incidendo nempe, & attenuando craſſos, lentos ac pertinaces humores, qui in thorace, & pulmonibus hærent. Phthiſicorum ulcera pulmonum abſtergit. In juſculis, & ſpozematibus bechicis ab ℥ſſ. ad ℥j. recens præſcribitur, vel ex ea cum ſaccharo conditum paratur ad ℥j. exhibendum. Exſiccata, & pulverata ad ℥j. vel ℥ij. intus ſumitur, vel in vino aut alio liquore idoneo; vel cum melle Narbonenſi, aut extracto ſeu Rob Juniperi fit electuarium crebriori uſu ad humores glutinoſos ubicunque hærentes incidendos, & expellendos, ſeu per expectorationem, ſeu per urinas; vel Tabellæ cum ſaccharo conſciuntur. Extractum ejus quoque præparatur ad ℥ſſ. vel ℥j. exhibendum.

Stomacho etiam commoda, & ſalubris eſt, unde tritum illud adagium:

Enula campana reddit præcordia ſana.

Apud Germanos Salgamarii magnam hujus radicis copiam condiunt, & a Platero dicitur aroma Germanicum, quo cibi utiliter condiuntur, & maxime laudatur præ Zingibere, & aliis Indicis aromatibus. Revera ciborum concoctionem promovet, laxatum nimis fibrarum ventriculi tonum restituit, & firmat, & viscidam saburram qua non solum ventriculus, sed etiam intestina infarciuntur; incidit, & expellit sæpe per secessum, unde alvum fluxiliorem reddere dicitur. Eadem ratione colicos dolores flatulentos compescit: renes expurgat, & arenulas pellit; uterî obstructions reserât, & menses suppressos provocat, humores nempe spissos, tenaces & mucosos his in partibus concretos dividendo.

Valeat ad venena, non modo quæ corpus inficiunt humanum, sed & reliquorum animantium præsertim quadrupedum. Data enim ovibus, referente Renodæo, cum vino aut aceto, eas servat, & sanat a peste quadam cui sunt obnoxie, quam vulgus *Clavelatum* vocat. In peste contagiosique morbis plurimum laudatur tum ad arcendum contagium, tum ad luen sanandam. Et ex ea vinum præparatur Enulatum dictum, radicem cum musto fermentando, vel eam solummodo macerando in vino. Illud vinum largiter haustum sudores movere dicitur. Urinam ciet, catculos, & arenulas pellit, & nephritidi medetur, si per tres dies, decresciente Luna, haustus hujus vini mane, jejuno ventriculo, sumatur. Ejusdem vini haustus mane, jejuno ventriculo, epotus vitum mirabiliter acuit, referente J. B. His qui usi sunt mercurio nimio in lue venerea, aut qui ex mercurialibus halitibus artuum tremores patiuntur, decoctum Helenii, & Fœniculi potum Ettmullerus commendat, expectando sudorem, ut mercurius per cutis poros e corpore propellatur.

Enula vino decocta, aut ejus succus vino infusus & potus lumbricos & tineas ventris enecat.

Externe potenter resolvit, & abstergit. In scabie plurimum valet. Radix in taleolas dissecta ramdiu in aqua coquitur, ut digitis conterî queat: tunc conteritur in mortario, & pulpa per setaceum trajecta cum butyri insulsi parte æquali miscetur, & fit unguentum, quo pars affecta scabie ungitur. Ejus decocto scabiosorum manus, & pedes eluuntur. Idem decoctum tum intus sumptum tum externe admodum, a Parkinsono, aliisque ad spasmodum, contusiones, & dolorem ischiadicum commendatur.

Ex radice exsiccata per spiritum vini resina extrahitur, in qua vis plurima concentrata videtur, quæ in uterî ruptura ex partu difficili specifice audit, referente Paulo Hermannò.

24. Rad. Helen. exsiccata. ʒß. Infunde per noctem in vini albi ʒvj. Colaturam capiat mane.

24. Enulæ campanæ ʒij. Coque in aq. flav. ad ʒij. F. ptisana.

24. Enul. camp. ʒjß. Ireos Florentin. ʒß. Sem. Cymin. ʒij. Piper. long. ʒß. Mellis despumati ʒj. F. Electuarium tussientibus, & asthmaticis perutile. Dosis a ʒij. ad ʒijj. mane, & sero.

24. Rad. Enul. exsiccata. & pulver. ʒj. Mellis Juniperinî q. s. M. F. bolus ad ventriculum roborandum, renes a muco in hærente liberandos, & arenulas expellendas, necnon etiam ad expectorationem promovendam.

24. He-

24. Helen. Bardan. Fœniculi ana ʒj. F. ex aqua comm. decoctum ad ℥ij. contra tremores artuum ex mercurialibus halitibus.

24. Refinæ. Helenii ʒij. Terebinth. Venet. ʒijj. Olei Hyperic. ʒijß. Myrrh. Sang. Dracon. ana ʒj. M. F. balsamum quo inungantur pu- dendorum rupturæ post partum.

24. Radicum Enulæ campanæ & Lapathi sylvester. ana M. j. Incidan- tur & coquantur in aq. comm. ℥ijj. in vase clauso ad ℥j. Colatura laventur partes scabie affectæ, vel alio cutis vitio. Vel

24. Earumdem radicum pulpæ per setaceum trajectæ ʒv. axungię porc. ℥ß. Flor. sulphuris ʒij. F. unguentum in scabie.

Enulæ radix usurpatur in syrupo de Artemisia, syrupo hydragogo *Pb. Reg. Charas*, syrupo antiasthmatico *ejusdem*, Looch sano & Looch pecto- rali, Opiata Salomonis *Jouberti*, Electuar. Catholico simplici *Fernelii*, Unguento martiario, Emplastro J. De Vigo, *Renodæi*, & Empl. Diabo- tano D. Blondel, *Penicher*.

EQUISETUM SIVE HIPPURIS.

Equisetum, Hippuris, Cauda equina, Herba equina : vulgo, *Presle* on *Queve de Cheval*. His sub nominibus duæ plantarum species in officinis cognitæ sunt, scilicet Equisetum majus, & Equisetum minus.

Equisetum majus, *Offic.* Equisetum palustre longioribus setis *C. B. P. 15. & Inst. R. H. 533.* Equisetum majus aquaticum *J. B. 3. 728.* Hippu- ris *Lobel. Icon. 793.* Hippuris *Dioscoridis* : Cauda equina *Tab. Icon. 251.* Polygonum femina *Fuchs*.

Pro radicibus sunt creberrimæ, tenuissimæ nigricantesque fibræ, longe & caulium geniculis demissæ. Asparagos primum protrudit palmares & cu- bitos altiores, internodiis & pixidata insertione distinctos, simbria nigri- cante, geniculum cingente, striatos, inanes, quorum summo fastigio cla- varum insidet capitulum veluti nucamentum, plurimis scilicet staminibus apice fungiformi, ex fusco albibo, donatis constans, spicatum & sterile. Fructus enim Equiseti speciebus innascuntur, quæ staminibus carent, grana nempe nigra, aspera & sarcta. Procedente tempore caules sunt bi- cubitales & interdum altiores, minimi propemodum digiti crassitie, tere- tes, concavi, albicantes plerumque, læves aut striis vix conspicuis exa- rati, crebris geniculis pixidarum cohærentibus intercepti. Singulos genicu- los ambiunt folia seu setæ plurimæ, prælongæ, tenues, asperæ, striatæ, virides, non ramosæ, octo, novem & amplius, nonnumquam ad trigin- ta usque, pluribus aut paucioribus internodiis pixidarum articularis com- positæ. Cum veterascere incipit caulis in colorem, spadiceum aut atroru- bentem & latere soli obverso non raro mutatur. In palustribus & aquis nascitur.

Equisetum minus : *Off.* Equisetum arvense longioribus setis *C. B. P. 16.* Equisetum minus terrestre *J. B. 3. 730.* Hippuris minor *Dodon. Pempt. 73.* Equisetum segetale *Gerard*.

Radice est gracili, nigra, articulata & serpente, fibris nigricantibus & ge- niculis exortis capillata, quæ vere hand secus ac Equisetum majus aspa- ragos.

ragos emittit, sed gracilioribus, longioribus & laxioribus, sîmbriatis, nigricantibus cotyitis tubulos excipientibus, nucamenti æmulum capitulum apicibus albis confertum sustinentes. Deinde caules frequentes sequuntur pedales, geniculis distincti, picidarum inserti, cavi, aliquantisper scabri. Ex geniculis prodeunt folia seu setæ radiatim enatæ, pauciores ad singulos caulis nodos quam in priori, quatuor sulcis profunde striatæ, tortuosæ, e geniculis interdum folia seu setas secundarias emittentes. Inter segetes solo humidior & arenoso non raro invenitur. Utraque in ulum venit: hæc autem viribus præstantior censetur.

Analysi chymica, ex herbæ Equiseti majoris ℥v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, odoris & saporis herbacei, subfalsi ℥iij. humoris limpidi, subfalsi & obscure austeri ℥j. gr. xlvij. humoris rufescentis, turbidi, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥j. ℥vij. gr. liij. olei ℥iij. gr. xlvij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥vij. ℥ij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥iij. ℥iij. ex quibus lixivio salis fixi falsi ℥iij. gr. xv. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥j. gr. lxxv. in calcinatione ℥iij. ℥vj.

Equisetum saporem herbaceum subalsum refert: chartam cæruleam viæ mutat. Sale ammoniacali donari videtur cum multa terra adstringente & exigua olei portione permixto.

Equisetum adstringit valide; hinc ad sanguinis rejectionem, ad profluvium muliebrem, potissimum rubrum, mictum cruentum, & ad dysenterias reliquosque ventris fluxus strenuum & generosum est remedium vel herba ipsa aut ex aqua aut ex vino epota, vel pulvis ℥j. pondere, aut decocti in vino ℥iij. mane & vespere propinatæ, vel succus ejus ad ℥ij. vel aqua ejus stillatitia, si cochlearia tria duobus tribusve diebus bibantur. Sistit hæmorrhagias quascumque: item exulcerationes & vulnera renum, vesicæ tenuisjque intestinorum sanasse auctores annotarunt. S. Pauli in sua *Flora Danica* singularem refert historiam vulneratæ puellæ, punctum culiro ad oram ossis pubis in pectine ita percussæ, ut ei post insistentem plagam urina per aliquot dies ex vulnere vesicæ effluerit: quæ illo ipso articulo temporis, quo plaga insista est, tam dissenta fuit ab urina, ut prominuerit ultra modum dictum os. Quæ tamen, parvo intermisso temporis spatio, porionibus, decoctis ac clysteribus vulnerariis rite administratis, quibus Equisetum remixtum erat, præter spem pristinæ valetudini restituta est. Ad sanguinis sputum exhibe radicis Equiseti exsiccatæ & pulverisatæ ℥j. cum succo Granatorum acidorum. Ad pectoris pulmonumque ulcera decoctum Equiseti in aqua mane & vespere calide potum ad ℥iij. vel ejus succi ℥ij. in phthisi pulveris Equiseti ℥j. cum aquæ Plantaginis ℥iij. mane & vespere aliquot diebus sumpra commendatur. In diuturnis febribus, etiam malignis, miracula secisse cum aliis, se comperisse scribit C. Hoffmannus.

Diutina experientia compertum est, inquit Ammonius *Medic. herbar.* p. 95. scabiei vesicæ mederi. Nam unico hoc medicamine testatur lithotomum insignem hanc scabiem penitus profligasse, decoctiones illius ægroto propinandas porrigendo.

Notatu vero dignum quod Pechlinus *Observationibus medicis* refert, Equisetum adstringentem & aluminosam herbam, ubi inter gramina a bo-

bus

bus decerpitur, succo fermentante alvum vehementer turbare, pinguedinemque vel detrahare vel prohibere.

Equiseti asparagus, auctore Matthiolo, in Hetruria, modo defectu melioris cibi, modo in dysenteria aliisque alvinis fluxibus comedunt Hetrusci, quibus alvus nonnumquam adeo stringitur, ut inde coli cruciatus facile excitentur.

Gonorrhææ conducit, auctore Emanuele Konig. & prostaticarum laxitatem maxime corrigit.

Extrinsecus foliis tritis & admotis, vulnera glutinantur, etiam ubi nervi læduntur.

ERUCA.

Inter plures Erucæ species duæ potissimum usitatæ in officinis prostant, scilicet Eruca sativa & Eruca sylvestris.

Eruca sativa, Off. Eruca latifolia, alba, sativa Dioscoridis C. B. P. 98 & Inst. R. H. 227. Eruca major, sativa, annua, flore albo, striato J. B. 2. 859. Eruca sativa Dod. Pempt. 708. Sinapis alterum genus Fuchs. Sinapi hortenise Lugd. hiflor. 646. vulgo, Roquette.

Alba, lignosa, tenui & restibili radice est donata, sapore acri; caulibus cubitalibus & selquicubitalibus, subhirsutis: foliis Sinapi albi, longis, angustis, utrimque profundis incisuris lacinariis, teneris, glabris, ejusdem cum radice saporis: floribus in caulium cacumine cruciformibus, quatuor scilicet petalis constantibus, e luteo albidis, striis nigricantibus pictis, cum calyce hirsuto, ex quo surgit pistillum, quod deinde abit in siliquam brevi pediculo innixam, glabram, qualem in Sinapi siliqua glabra, sed longiorem, septo intermedio, cui valvæ utrimque adhærescunt, in duo locula-menta divisam, seminibusque sætam multis flavis, majoribus quam Sinapi jam dicto, minusque rotundis. Odor hujus plantæ validus & ingratus, nec minus sapor, quamvis nonnulli, & Itali præsertim, eo delectentur, & acetariis gustus gratia Erucam admisceant. In hortis passim seritur. Folia & semen usitata sunt.

Eruca sylvestris, Off. Eruca tenuifolia perennis flore luteo J. B. 2. 861. Inst. R. H. 227. Eruca sylvestris vulgarior, Parkins. Eruca sylvestris Gerard. Dodon. & Rasi hiflor. 307. Sinapi sylvestre Lugdunens. 646. vulgo, Roquette sauvage.

Radice hæret alba, crassa, satis longa: ex qua multi prodeunt caules crebris alis, concavi, striati, villosi porius, quam hirsuti. Folia crebris incisuris Dentis leonis divita, atrovirentia, glabra, sapore fervido sativæ, cujus & flores, sed colore præditos luteo, serie simili dispositos gerit odoratos: siliquis succedentibus longioribus, angulosis, erectis seminibus Sinapis sylvestris similibus, acris & amarisculis repletis. Odor totius plantæ fœtidus & ingratus.

Analysi chymica, ex Erucæ sylvestris floridæ & v. demptis radicibus, per retortam distillaris, prodierunt humoris odore & sapore plantam referentis, subacidi ℔j. ℥ij. gr. liij. humoris primo limpidi, ejusdem odoris, manifeste acidi magis ac magis, deinde flavescens & rufescentis, empyreumatici, acidi, salii, austeri ℔ij. ℥v. gr. lxxij. humoris rufi, odoris

ris valde empyreumatici, saporis acris, austeri, & sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥ij. Zij. salis volatilis urinosi concreti gr. xvij. olei spissi ad instar extracti ℥i. Zij. gr. xlij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥iij. Zvj. gr. lxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum Zij. gr. lxij. ex quibus salis fixi falsi Zvij. extractæ sunt. Partium jacturam distillatione fuit Zij. Zvj. gr. liij. in calcinatione Zij. Zvj. gr. iij.

Eruca sylvestris saporis est acris, urentis cum quadam amaritudine in recessu. Chartam cæruleam rubro colore tingit, & odorem refert oleorum foetidorum super calcem vivam rectificatorum. Saleem igitur essentialem continere videtur acrem ad ammoniacum accedentem, cum oleo tum tenui essentiali, tum crasso foetido, & terra copiosa conjunctum.

Erucae sativæ odor & sapor remissiores sunt, sicut & virtus debilior; unde in alimoniam sæpius defumitur: illa vero pro medicamentis præstantior est.

Eruca diversæ proflus est a Lactuca naturæ: idcirco veteres in cibis illas confociare solebant, ut nimio frigori par servor temperamentum æquet. Itali etiam nunc dierum acetariis Erucae tantillum admiscunt, forte viribus potius quam sapore illis commendatæ. Eruca enim non Medicorum tantum, sed & poetarum testimonio conciliatrix veneris videtur. Sic Martialis:

Et venerem revocans Eruca morantem.

Columella: *Excitat ad ventrem tardos Eruca maritos.*

Et Ovidius: *Nec minus Erucae jubeo vitare salaces.*

Omnes Erucarum partes comestæ appetitum excitant, ciborum concoctionem promovere, viscidam saburram in ventriculo immorantem dissolvunt, quapropter in anorexia & aepsia commendantur. Urinam provocant, quam acriorem reddunt, ac proinde levi titillatione partes & urinæ & seminis secretioni & evacuationi dicatas afficiunt. Eapropter in compositionibus languenti veneri sollicitandæ dicatis usurpantur. At biliosis aut calidis naturis minus conveniunt, nec illis, quorum stomachus æstuat.

In scorbuto & chronicis morbis Eruca conducit, sive herba cruda comedatur, sive succus solus vel cum vino hauriatur, sive in jusculis aut apozematibus decoquatur. Observandum tamen has plantas acres antiscorbuticas levi coctione indigere, alioquin & sale suo volatili & oleo essentiali tenuissimo spoliantur, & simul sapor & præcipua virtus earum avolat. Semina eisdem obtinent virtutes, imo ab Ettmullero præstantiora censentur, qui tempore hyemali hanc antiscorbuticam mixturam commendat.

℥. Pulver. stomachal. Quercetan. Zij. Semin. Cochlear. Nasturt. Erucae ana ℥i. Aloes Succotrin. & Myrrh. elect. ana ℥ij. M. F. pulvis. Dosis ℥i. bis die cum conserva Lujulæ, vel syrup. acetosistris Citri q. s. in scorbuto, vel conserv. flor. Anthos in apoplexia & paralyfi.

Præter vim antiscorbuticam, in præcavenda apoplexia semina Erucae aut Sinapeos plurimum laudantur. Sunt, qui pro certo affirmant, senes plurimos per multos annos ab apoplexia, soporosis affectibus & paralyfi immunes perstitisse, Erucae semina ad grana xv. vel xx. sola vel cum seminis Cymini parte æquali mixta quotidie matutino tempore masticando. Mathiolus refert foliorum Erucae decoctum cum saccharo propinatum tussim infantum sanare.

Semen

Semen masticatum, non secus ac Sinapi, acri suo stimulo copiosum phlegma salivale ex ore eliciunt, unde in apophlegmatismis usurpantur. Commendantur quoque sub nomine Sinapisimi sola vel cum fermento mixta & cuti imposita ad rubefaciendum & ad vesiculas excitandas.

2. Seminum Erucæ, Sinapi & Baecar. Juniper. ana p. æq. Contusis affunde sp. vini camphorati ad supereminentiam unius transversi digiti. Liquorem decanta quo foveatur pars paralytica, & postea masticata residua eidem admoveatur.

Semen Erucæ usurpat in Eleſtuar. de satyrio Pb. Reg. & in tabellis magnanimitatis ejusdem.

ERYNGIUM.

Eryngium, Off. Eryngium vulgare C. B. P. 386. Inf. R. H. 327. J. B. 3. 85. Eryngium campestre Dod. Pempt. 790. Eryngium mediterraneum sive campestre Parkinson. Advers. Lobel. Icon. 22. Carduus Lepusculus & Carduus volutans Rusticorum: vulgo Chardon roland, Chardon a cent tetes Pancaut.

Radice[m] habet pedem longam, pollicem crassam, mollem & teneram, cum nervo in medio solidiore, exterius nigricantem, internus candidam, sapore dulcem: caule[m] striatum, cubitalem, medulla fungosa, alba plenam, in ramos parulos orbiculatim divisum: folia alternatim posita, lata, rigida, glabra, glauca, aliquantisper aromatica, utrumque in lacinias profundas divisa, quæ inciduntur ærenis in spinas minaces desinentibus. Flores in capitulis rotundis copiose nascuntur rosacei, e quinque petalis albis & minimis, toridemque flaminibus concoloribus conflati. Calyx oblongus & quinquecuspidatus abit in duo semina qua se tangunt plana, altera vero parte gibba & striata. His capitulis subiecta sunt folia seu potius spinæ longæ striatæ, mucrone & marginibus spinosæ, in orbem positæ. Copiose provenit in satis & secus vias. Planta integra marcescens, vi ventorum evellitur, & per medios agros volutatur, ita ut currentem Lepusculum diceret. Plantæ partes omnes usitatæ, & præsertim radix.

Analys[is] chymica, ex radicem Eryngii succulentarum lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, saporis & odoris herbacei, subacidi lb. 3v. 3v humoris primo limpidi, deinde sub finem rufescentis, intense acidi & austeri lbj. 3vij. 3ij. gr. xxxvj. humoris rufi, tum acidi, tum alcali, & sale volatili urinoso copioso imprægnati 3ij. 3v. gran. xxxvj. olei lyropi ad instar spissi 3j. gran. lx. Massa nigra in retorta superstes pendebat 3vij. 3j. gran. xxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum 3ij. 3j. gran. xxiv. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali 3ij. gran. xlij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit 3v. 3vj. gran. xlviij. in calcinatione 3v. 3j. gr. xij.

Nonnihil acredinis in Eryngio masticando deprehenditur. Charta cærulea a foliorum succo aliquantisper rubescit, multo magis a radicem humore Sale essentiali donatur tartareo ammoniacali, cum multo sulphure, & terræ adstringentis portione non mediocri conjuncto.

Eryngium humores crassos ac tenaces, quibus viscera infarciuntur, incidit, & co-

& eorum obstructions aperit. Hinc hepaticum dicitur, uterinum, diureticum; & nephriticum. Ictero medetur, urinam ciet, renum & vesicæ saburram, & arenulas abstergit, & foras amandat, mesenterii obstructiones referat, mensesque provocat.

Eryngii vis potior in radice vel etiam in radice cortice, qui non facile in pulverem teri potest nisi exsiccatus, sed tum fere omni virtute oritur, observante P. Hermans; hinc in decocto secens ad ℥j. pro singulis decoctis libris, vel conditus usurpari debet. In numero quinque, radicum aperientium minorum collocatur, & sunt radices Graminis, Capparis, Rubiæ, Ononidis & Eryngii. Majores vero sunt radices Apii, Alparagi, Foeniculi, Petroselinii, & Ruscii. In jusculis & apozematibus diureticis & aperientibus usurpari solet. S. Paulli Eryngii radices insigni menses moderate ducendi virtute præditas agnoscit: & ideo in sequiori sexu eas in decoctis aperientibus & materiam peccantem præparantibus, dum menses tardiusculæ & inordinate excernuntur, præ aliis commendat. Non igitur incongruum est earum usu prævio martialibus medicamentis viam sternere. In morbis chronicis earundem decoctum assidue potum ab Etzmüllero commendatur. Veneris quoque blandum est incentivum: & hac ratione radices vel recentes vel conditæ in pluribus adversus virilem impotentiam medicamentis usurpantur. A nonnullis tamen hac in indicatione femina radicibus anteponuntur.

Eryngii radices melle aut saccharo conditas maxime conferre gonorrhææ Velschius refert. *Sylloge observationum Marcelli Cumani obs. 44. p. m. 64.*

Externe Simon Simonius Medicinæ Professor Lipsiæ affirmabat, referente Raio, multis in Italia cum successu, familiarissimum remedium esse ad prohibendum abortum, radicem Eryngii, cataplatimatis modo ventri sub umbilico impostam. Eandem Emanuel König in *regna vegetabili*, cum vino coctam & impostam ad abortum præcavendum proponit.

In nimio menstruum fluxu J. Raius decoctum radices Eryngii ex vino commendat, quo lavetur ægrotans mane & vespere; linteis calidis post ablutionem impositis. Initium vero ablutionis fieri debet ponsæ, tum in cervice, hinc per totam spinam usque ad os sacrum, postea foveantur illa. Nonnullæ intra triduum hoc remedio sanatæ fuerant. Aqua ex junioribus foliis Eryngii distillata, vel sola vel cum aqua Nucum assatim pota febrem fugat & depravatam sanguinis crassemendat.

℥. Radic. Eryng. vulgar. & Gramin. ana ℥j. Coquantur in aq. comm. ℔iij. ad ℔ij. F. ptisana aperiens.

℥. Rad. Eryngii & Lapathi acuti ana ℥ij. Folior. Agrimon. & Veronicæ ana M. j. Coquantur in aq. comm. ℔iij. ad medias. Colatura dilue syrup. de s. radic. aper. ℥ij. & arcani duplicati ℥ij. F. apozema aper. in quatuor doses propinandum.

℥. Rad. Eryngii, Ononid. ana ℥ss. Baccas Alkekengi contusas n. ℔iij. Coquantur in aq. ℔iij. ad ℔ij. Colatura contund. semin. Eryngii & Melon. ana ℥ss. F. emulsio diuretica qua dissolve syrup. de Ibisco ℥j.

Radix Eryngii usurpatur in syrupo hydragogo & in syrupo antiscorbutico Ph. Reg. Syrup. de Ibisco Cod. Paris. Electuar. de satyrio P. R.

Eryn-

Eryogonum marinum, *Off. Eryngium maritimum* C. B. P. 386. *Inf. R. H.* 327. *Eryngium marinum* J. B. 3. 86. *Dad. Tempt.* 730.

Radices huic sub sunt longissimæ, circumquaque profunde vagantes, digitum aut pollicem crassæ, aliquot locis nodosæ, candicantes, sapore dulces, & gratæ, aliquantisper odoratæ: folia plurimum pullulantia ex longis pediculis, interdum palmum lata, subrotunda, malvaceis fere similia, sed marginibus angulosa, durisque spinis circumsepta, crassa sive spissa, e castio candida, gustu aromatico: caulis crassus, cubitalis, valde ramosus, inferius subinde nonnihil rubescens, cacuminibus vero capitula proferens spinosa, ac globosa, Nucis fere magnitudine tenis ut plurimum spinosis foliolis, cauliculi fastigium orbiculariter ambientibus incumbenzia, quæ una cum capiculis æruteo nitenti colore: flores autem *Eryngio* vulgari similes, albicantes. In maritimis septentrionalibus, cum mediterraneis oris frequens sponte nascitur.

Licet *Eryngii* marini radices rarius hic usitatæ sint, attamen a pluribus *Eryngio* vulgari anteponuntur, velut viribus præstantiores. Præter virtutes cum vulgari communes, J. Rajos eas utiles etiam adversus pestem, & aeris contagionem, saccharo conditas & mane jejuno ventriculo sumptas; insuper tabidis & macilentis valde proficuas esse, ac tandem sui veneræ mederi scribit.

ERYSIMUM.

Erysimum vulgare, & *Irio*, *Off. Erysimum vulgare* C. B. P. 100. *Inf. R. H.* 228. *Erysimum Tragi*, flosculis luteis juxta muros proveniens J. B. 2. 863. *Erysimum*, *Irio* 1. *Tab. Icon.* 448. Hierobotano fœmina *Brunfels*: *Verbena* fœmina, & *Sinapi* 7. *Trag.* 102. *Cleome* *Ostavi*, *Anguill*: *Eruca hirsuta*, siliqua cauli appressa *Erysimum* dicta, *Raii Hist.* 810. vulgo, *Velar* ou *Tortelle*.

E radice simplici, minimam digitum vix crassa, alba, lignosa, acri & Rapæ sapore, caules profert duos cubitos superantes, rotundos, firmos, asperos, & ramosos: in quibus folia ad exortum nascuntur plurima; palmo longiora, hirsuta, in plura segmenta quasi trigona utrumque divisa, quorum supremum amplius & trifidum. Flores pusilli longissima serie in ramis digeruntur cruciformes, e quatuor petalis luteis compositi, cum calyce retraphyllo & hirsuto. Pistillum mutatur in siliquam semincia longiorem, teretem, cornicularam, in duas distinctas capsulas, in quibus semina continentur exigua spadicea, & gustu ferventia. In maris & ruderibus, & ad sepes non raro invenitur. Herba integra in usum venit.

Analysi chymica, ex foliorum & summitatum *Erysimi* vulgaris *liv.* per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, odoris & saporis herbacei, obscure salis & alcalini *liv.* *3iij.* *3ij.* gr. xvij. humoris salis, alcalini, urinosi *3j.* *3ij.* humoris rufi, sale volatili urinoso copioso imprægnati *3j.* *3iij.* gr. xlvij. olei *3vj.* gr. xlvij. Massa nigra in retorta residua pendebat *3iv.* *3v.* quæ rite calcinata reliquit cinerum *3ij.* *3v.* gr. xlii. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali *3j.* gr. xvij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit *3iij.* *3iv.* gr. xxx. in calcinatione *3ij.* gr. xxx.

Eryg-

Erysimi foliorum sapor herbaceus est, subfalsus, & aliquantisper glutinosus. Chartam cœruleam succus rubro colore tingit, licet analysi chymica parum acidi præbeat. Salem essentialem continere videtur ammoniacalem cum multo phlegmate, sulphure, & terra involutum.

Vires ejus sunt egregiæ in resolvendo muco viscido, canales bronchiorum, & vesiculas pulmonum investiente, fauceque occupante. Tenuibus enim, volatilibus, & acribus suis particulis crassum hunc ac tenacem mucum incidit, resolvit, & abstergit, illum per expectorationem evacuando. Unde in asthma, pulmonum affectionibus, tussi chronica, raucedine, & aphonia a materia crassa, non inelegans est medicina, & a Lobelio, & Pena commendata. Rhoncos plurimos tum juvenes, tum ætatis provectæ ferme jam amissa voce, unius Erysimi ope a Rondeletio qui primus illius usum monuit, paucis diebus fuisse restitutos asserunt. Ex eo paratur celebris ille syrupus de Erysimi Lobelii, seu pro raucedine, qui vulgo Syrupus Cantatoris, *le Syrop du Chantre*, nominatur. Viribus tamen inferior non est syrupus de Erysimi simplex ex Erysimi succo expresso cum Melle confectus, quo diu, & assidue utendum, corpore prius purgato. Dos. ℥j. in decocto pectorali.

Herba incisa vel contusa ad M. j. aut M. ij. per aliquot horas in aqua vel hydromel. maceratur, & colatura tepens propinatur.

Nec solam pituitam viscidam in pulmonibus aut faucibus hærentem, sed etiam in ventriculo aut intestinis cumulatam dissolvit, unde colicis doloribus ab hoc muco oriundis convenit. Multos, colico dolore laborantes Erysimi decocto Riverius curavit. Ejus infusum ex vino efficacious adhuc remedium est. Scire licet non fort. aut diuturna coctione Erysimum indigere, sicut de plantis antiscorbuticis jam monuimus; ignis enim partes ejus volatiles secum abripit, ac proinde vim, & energiam destruit.

Vi antiscorbutica instruitur hæc planta, & præsertim semen ejus, sicut Erucæ, & Sinapis semina, quibuscum sapore etiam convenit. Idem semen ab Etmullero in ischuria seu suppressione urinæ commendatur ad ℥j. exhibitum, & a Lobelio ad ulcera pulmonum abstergenda.

Extrinsecus utile est Erysimum in cancro non exulcerato, tumoribusque senitentibus.

Alia est Erysimi species quæ Erysimi vulgaris defectu huic substituitur, & dicitur

Erysimum latifolium majus glabrum, C. B. P. 101. & *Inf. R. H.* 228. Irio Apulus alter, lævi Erucæ folio, *Col. p.* 1. 265. Sinapi sylvestre Monspessulanum, lato folio, flosculo luteo, minimo, siliqua longissima, *J. B.* 2. 858. Erysimum Monspessulanum Sinapeos foliis, *Raii Hist.* 812. In agro Parisiensi quoque nascitur, nec a prioris virtutibus multum discrepat.

ESULA:

Sub Esulæ nomine Pharmacopœi diversis in regionibus diversas exhibere solent. Tithymali species, & eam selegunt, quæ frequentius apud ipsos occurrit. Alii enim usurpant radices Tithymali Cyparissæ, alii radices Tithymali

mali foliis Pini, alii utuntur radicibus Tithymali palustris fruticosi, nonnulli Tithymali Helioscopii radicibus: nec in eo vituperandos Cl. Tournefortius existimat, quandoquidem iisdem facultatibus pollent, eodemque modo præparari debent. Hic vero duæ stirpes sub *Efulæ* nomine in Officinis occurrunt, altera *Efula* proprie dicta seu *Efula* minor, altera *Efula* major.

Efula, *Efula* minor, *Off. Tithymalus* *Cyparissias*, *C. B. P.* 291. *Inf.* *R. H.* 86. *Tithymalus* *Cupressinus* sive *Humipinus*, *Lobel. Icon.* 356. *Efula* *Officinarum*, *Cæsalp.* 374. vulgo, *Efulæ*, ou *petite Efulæ*.

Radice est minimo digito crassiori, lignosa, fibrosa, nonnunquam serpente, saporis acris, pungentis & nauseosi: caulibus cubitalibus in summo ramosis: in quibus folia densissime nascuntur, primo *Linarix* forma, mollia, postea vero tenuiora multo & capillacea, cum in ramos dividitur. Flores in summis ramulis, veluti umbellati, monopetali, urceoli forma, virescentes, in quatuor partes distincti quasi circinatas. Pistillus mutatur in fructum trigonum & tricapsularem, in quo semina subrotunda tria continentur. Tota planta lacte turget. Nascitur ubi vis secus vias & in sylvis. Ab eadem quoque radice exsurgunt cauliculi, quorum folia breviora multo, pinguiora, subrotunda, adversa parte plurimis punctulis seu stigmatibus rufis notata, in quibus ramulis nullum florem. J. Bauhinus observavit. Hos furculos pro abortu J. Rajus habet, licet a nonnullis pro privata specie proponantur. Hinc patet quid sentiendum sit (inquit J. Bauhinus) de Tithymalo *Styckophyllo Thalii*, idest *Cyparissia* foliis punctis croceis notatis *C. B.* & foliis maculatis *Parkins.* Hic *Tithymalus* pro anni tempore, & ætate insigniter variat: non raro enim verno tempore coma rubente aut flava exit. Ex his varietatibus quas Cl. Tournefortius ipse in hac planta in nemore Bononiensi nata observavit, non mirum est Botanicos de ea tam confuse & obscure scribere. Vix enim intelligi potest, quid sibi velint & quo titulo illam proponant, ut J. Rajus & Cl. Tournefortius illud observaverunt. Ab aliis speciebus tamen discretu facilis est, annotante Rajo, radicibus reptatricibus, statura humili, foliis oblongis, angustis, virentibus, mollibus, & teneris, in caule creberrimis, *Linarix* adeo similibus, ut obiter intuentem pro iis fallant; verum succo lacteo facile distinguuntur, secundum vulgarem illum versiculum:

Efula lactescit, sine lacte Linaria crescit.

Nascitur ubique secus vias & in sylvis. Radix fere sola in usum venit.

Efula major, *Off. Tithymalus* foliis Pini, foris *Dioscoridis* *Pithyusa*, *C. B. P.* 292. *Inf.* *R. H.* 86. *Tithymalo* *Cyparissia* similis. *Pithyusa* multis, *J. B.* 3. 665. *Tithymalus* *Pinea*, *Lobel. Icon.* 357. *Tithymalus* *Pineus*, *Gerard.*

Nascitur in arvis, radice pollicem æquante, acri, pedem longa, & parum fibrosa. Caules cubitales sunt, ramosi, foliis *Linarix* vulgaris similibus, flores lunati, fructus trigonus & tricapsularis. Tota planta lactescit. J. Rajus suspicatur hanc plantam ab auctoribus descripiam cum priori unam & eandem plantam esse. Hæc enim a *Cyparissia* differre videtur sola radice longiore, crassiore, minusque fibrosa, quod quidem varietas prioris esse potest. Eas tamen Cl. Tournefortius & in *I. R. H.* & in *Materia Medica* codicibus distinguit: quem secuti sumus.

Geoffroy Tom. II.

Q

Ana.

Analysi chymica, ex Tithymali Cyparissiae recentis lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, cum levi odore & sapore herbaceo & quadam acredine, primo obscure salis & alcali, urinosi, deinde debilitate admodum alcali lbj. ℥iij. ℥iij. gr. xlii. humoris limpidi, primo obscure & leviter alcali, deinde acidi, manifesti magis ac magis lbj. ℥iij. ℥iij. gr. liiij. humoris rufi, magis ac magis acidi, intensi, sub finem salis, austeri ℥x. ℥v. gr. lxxvj. humoris rufi, tum acidi, austeri, tum alcali & sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥iij. gr. xxxvj. olei ℥iij. ℥vij. gr. xviii. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥vj. ℥ij. gr. xij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥v. gr. xviii. ex quibus salis fixi mere alcali ℥iij. gr. xviii. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥j. ℥vij. gr. lxx. in calcinatione ℥iij. ℥iij. gr. lxxvj.

Tithymali Cyparissiae folia saporem habent magnatis Amygdalarum ex quibus lac expreßum fuit, aliquantisper stypticum, sed abique amarore aut acredine: chariam cœruleam levi rubore tingunt, radices intensiori rubore illam inficiunt, eundemque saporem primo referunt, sed postea in faucibus insignem relinquunt acredinem urentem. Salem essentialem tartareum, aluminosum continere videtur hæc planta cum sulphure resinoso, in foliis parco, in radicibus copioso permixtum. Quæ quidem mixtura magisterio Jalapæ vel Scammonii seu eorum resinæ phlegmate dilute optime comparari potest.

Omnia Tithymalorum genera validam per inferiora purgandi vim obtinent, in primis vero lacteus eorum succus, etiam in exigua quantitate sumptus, quare raro citra noxam sumi potest.

Eulæ immoris radix, ejusque cortex potissimum, pituitam validissime, præcipue per inferiora purgat, sed ventriculum vehementer conturbat & interna viscera inflammat. Si enim ejus corticis tantillum deglutitur, urentem ardorem non solum in faucibus & in œsophago, sed etiam in ipso ventriculo accendit. Eam ob causam prudentes Medici ab ejus usu abstinere solent, aut saltem nonnisi mitigatam vel aliquo modo temperatam atque præparatam exhibere.

Cortex radiceis Eulæ sic in Officinis corrigi solet. Cortex recens per horas 24. in aceto acerrimo, omphacio, succo Cydoniorum, Limonum aut Berberidis maceratur & postea exsiccat. Hac ratione præparata pulvis a ℥j. ad ℥j. exhiberi potest, vel in infuso ad ℥j. Magnam feri copiam extrahit & evacuat; hydropicis, cæcheticis, & febre quartana, aut intermittente quæcumque contumaci laborantibus utiliter præscribitur, ubi cetera remedia magis temperata nihil profecerunt. Nec solus exhibendus est, sed cum aliquibus medicamentis ejus violentiam temperantibus, tum stomachicis, tum mucilaginosi consociatus.

24. Cortic. rad. Eul. pp. ℥j. Cremor. Tartari ℥ss. Elæosæchar. Citri vel Absinth. ℥ss. Pulv. Cassiæ recentis, vel Conserv. flor. Aurantior. q. s. F. bolus hydragogus.

24. Cortic. rad. Eul. pp. ℥iij. Macis, Galang. ana ℥ij. Glycyrrhizæ pulver. ℥j. Gummi Tragacanth. & Bdell. ana ℥iij. M. F. pulvis; cujus dosis a ℥ss. ad ℥j. in morbis contumacibus.

24. Cort. rad. Eul. pp. ℥ij. Crem. Tart. ℥ss. Mercur. dulcis ℥ss. Balsam. Peruv. putt. v. Conserv. Absinth. q. s. F. bolus purgans in cæcheticis affectionibus.

Ca-

Cavendum tamen ne hæc medicamenta exhibeantur in visceribus delicatioribus, vel æstuantibus.

Extractum ex tota planta præparatur cum vino generoso, vel Spiritu vini diu macerata, cum additione olei Anisi vel Cinnamomi. Dosis ℥j. aut ℥ss. Nonnulli folior. ℥ij. coquant in lacte & colaturam præstant ad serum educendum. Semina Eulæ N. x. vel xij. intus sumpta vehementem catharsim movent, nec nisi rusticorum visceribus utilem.

Cortex radicum Eulæ præparatus usurpatur in extracto Catholico & Chologogo *Rosfinæ*, Benedictæ laxativa, hydragogo eximio *Renouelii*. Parantur etiam pilulæ de Eula *Fernelii*, quarum dosis a ℥j. ad ℥ij.

EUPATORIUM.

Eupatorii nomen in Officinis tribus diversis plantis assignatur, scilicet Eupatorio vulgari seu Cannabino, Eupatorio Mesue seu Agerato, & Eupatorio veterum seu Agrimoniz. De his duobus suo loco sub Agerati & Agrimoniz nominibus jam actum est, nunc de illo differendum est.

Eupatorium Cannabinum, Eupatorium vulgare, *Off. Eupatorium Cannabinum*, C. B. P. 320. *Inst. R. H.* 455. Eupatorium adulterinum, *J. B.* 2. 1065. Vulgare Hepatorium, *Dod. Pempt.* 28. Eupatorium Avicennæ creditum, *Gesner*: Herba sanctæ Kunigundis, *Tragi* 491. Cannabina aquatica, sive Eupatorium mas, *Lobeli Icon.* 528. vulgo, *Eupatoire d'Avicenne*.

Radice est oblique acta, plurimis fibris majusculis, albicantribus stipata: caule duos treise cubitos alto, recto, tereti & tomentoso, & in viridi purpurascente, medulla alba pleno, gratum & aromaticum odorem dum inciditur spirante: foliis in caule crebris, adversis, in eodem pediculo ternis, Cannabis folia nonnihil referentibus, oblongis, acuminatis, per ambitum serratis, sapore amaro: floribus velut in umbellas digestis, flosculosis, seu compositis ex plurimis flosculis tubulosis, in summitate quinquifariam divisis, purpurantibus, cum longis capillamentis seu pistillis bifidis, embryoni insidentibus, & calyce longo, tereti ac squamoso comprehensis: seminibus oblongis, sub pappo delitescens. A quota & loca aquis vicina amat. In agro Parisiensi sponte nascitur. Ulus est herbæ integræ.

Analysi chymica, ex foliorum Eupatorii Cannabini recentiorum lib. per retortam distillatus prodierunt humores limpidi, odore & sapore non ingrato, obliques acidi ℔j. ℥ij. gr. xij. humoris magis ac magis acidi, manifesti, obliques subausteri ℔j. ℥ij. Zinj. humoris subtrubidi, deinde rufescentis, odore & sapore leviter empyreumatico, acidi, subtilis, & subausteri ℥ij. ℥v. gr. xvij. humoris rufi, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥j. ℥j. salis volatilis urinosi concreti, ℥j. gr. viii. olei adiposi ℥ij. gr. xxx. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥ij. ℥v. quæ rite calcinata reliquit cinerem ℥j. ℥vj. gr. xxiiij. ex quibus lixivio salis fixi salis ℥ij. gr. lx. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥ij. gr. xi. in calcinatione ℥ij. ℥vj. gr. xlvij.

Folia Eupatorii amara sunt, chartam cœruleam non mutant. Salem essentialem nitro similem continere videntur cum multo sulphure, & terra copiosa permixtum.

Hepaticum est, aperiens & vulnerarium. Usus præcipuus est in cachexia, ubi massam sanguineam lentescentem dissolvit & hepatis viscerumque tonum roborat & restituit. Catharris & tussi medetur, urinam & suppressa menstrua provocat, cutis vitia emendat. Folia & summitates ad M. j. in seri lactis vel aq. comm. ℥j. levi ebullitione cocta potum constituunt perutilem ad viscerum infarctus & obstructions, quæ morbis diuturnis superveniunt, febribus præsertim intermittentibus, cum ægotantes œdematosi fiunt & ad hydropem proclives. Neenon etiam in hydrope ascite proficuum est illud decoctum post paracethesim celebratum. Eodem tempore œdematosi ægotantium pedes herbæ decocto ex vino fovendi sunt, addito tantulum Camphoræ. In jussulis etiam incoquantur; foliorum siccatorum infusum Theæ instar sæpius die propinatur. Succus solior. ad ℥iij. præscribitur. Extractum quoque ex hoc succo paratum ad ℥j. exhibetur. Ad scabiem, cutaneos affectus, hepaticas maculas, iterum, Eupatorium cum Fumaria confociatum commendatur.

℥. Folior. & summitatum Eupatorii Cannabin. M. ij. Fumar. M. j. Coquantur leviter in seri lactis ℥ij. Colatura per cyathos debitis intervallis propinetur. In hydrope incipiente, & cutaneis affectibus.

Externe folia & summitates floridæ in vino cocta & tumoribus œdematosis admota eos resolvunt; scroci præsertim tumores aquosos & hydrocelem absque punctione sanant.

Radibus vim purgantem inesse Gesnerus in seipso expertus asserit his verbis: „Eupatorii aquatici, vel Avicennæ quorundam, radices fibras in vino nuper decoxi, bibi colarum; unde per horam post alvus, „urinaque copiose motæ sunt, & vomitus postea duodecies fere, pituita quamplurima evacuata multo tutius & facilius quam ab Helleboro fiat.

Nihilominus tamen D. J. B. Chomel refert in *Plantar. usualium Historia*, decoctum ℥j. radicum in vini ℥viij. hydropicis propinasse absque ulla per vomitum vel secessum evacuatione. Unde, quæso horum experientorum diversitas?

EUPHRASIA.

Euphrasia, Off. Euphrasia Officinarum, C. B. P. 233. *Inst. R. H.* 174. Euphrasia, *J. B.* 3. 432. *Dod. Pempt.* 54. Eufragia, *Matthioli Casalp.* 339. Opthalmica sive Ocularia, *Eric. Cordi.*

Radice est simplici, exili, tortuosa seu huc illuc reflexa, fibris paucis majusculis donata, lignosa, alba; cauliculo palmari vel sesquipalmari, tereti, subhirsuto, subnigricante, nunc ramoso, alias nudo, cum foliis tres aut quatuor lineas longis, subrotundis, glabris, nitidis, rugosis, cristatis, obscure virentibus, binis ex adverso nascentibus sine pediculis & conjugationibus sese intersectantibus, sapore pingui, subamaro. Ex eorum alis nascuntur flores in summo, monopetali, anomali, personati, albicantes, purpureis tamen ac luteis lineis intus striati, in duo labia distincti, labio superiore surrecto, fornicato, bifido, obtuso, crenato lacinula aliquot occultante, inferiore vero trifido segmentis quasi cordatis. Calyx sessilis, cytiniformis, quadrigidus pistillum involvie po-

posticæ floris parii infixum, quod deinde abit in fructum seu capsulam tres lineas longam, compressam, fuscam, in duo loculamenta distinctam, in quibus adsunt semina plura minutissima, oblonga, cinerea. Agri Parisiensis incola frequens nascitur in montanis, herbidis & sylvosis. Herba florida in usum venit.

Analysi chymica, ex totius plantæ floridæ recentis *℞v.* dempta radice per retortam distillatis distillaverunt humoris primo limpidi, fere inodori, saporis herbacei, obscure acidi, deinde manifeste acidi magis ac magis, sub fine rufescentis, odoris & saporis empyreumatici ac tandem austeri *℞iij. ℥j. gr. lx.* humoris rufescentis, sale volatili urinoso copioso imprægnati *℞ij. gr. xxiiij.* olei pissimi ad instar extracti *℞i. ℥j. gr. lx.* Massa nigra in retorta superstes pendebat *℞vj. ℥v.* quæ rite calcinata reliquit cinerum cerulefcentium *℞j. ℥vj. gr. xxiiij.* ex quibus salis fixi mere alcali *℞iij. gr. l.* lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit *℞iij. ℥j.* in calcinatione *℞iij. ℥vj. gr. xlvij.*

Euphrasie folia amara sunt, eorum succus chartam cœruleam colore purpureo leviter tingit. Salem essentialem obtinent tartareo ammoniacalem cum sulphure copioso & multa terra conjunctum.

Euphrasia humores lentos & glutinosos, serosos, præsertim in cerebro concrecentes, potenter discutit & ad circuitionem habiles reddit, aliquantisper etiam subadstringit, & laxum fibrarum tonum in glandulis cerebri firmat & restituit. Quare cephalica dicitur & ophthalmica. Si quidem quoquomodo sumpta, seu in pulverem redacta, & cum vino aut aqua Verbenæ vel Fœniculi pota, seu per se sola aut cum alimentis masticata & deglutita, seu succus ejus expressus visionem mirifice roborat & adauget, debilem aut amissam reparat & restituit. Fabricius Hildanus, auctor in primis celebris & fide dignissimus *Centur. Epistol. 103.* tantam esse ait Euphrasie in imbecillitate visus vim & efficaciam, ut ejus usu septuagenarios quosdam, propter vigilias & studia plurima amisso visu, in decrepita ista ætate eum recuperavisse observaverit. Fuchsius in cataractis & suffusionibus eam commendat. Datur autem commodissime in pulverem trita a *℞i.* ad *℞iij.* Additur non raro Fœniculi semen pari pondere, & nonnihil Maceris, cui Sacchari tantillum additur. Exhibetur mane jejuno ventriculo, & quidem per continuos non modo dies, sed & menses & annos. Alii hujus pulvis *℞i.* ter die præscribunt, mane scilicet jejuno ventriculo, paulo ante prandium & cenam. Fit & ex Euphrasia vinum vindemiæ tempore, cujus usu senum etiam oculi rejuvenescere feruntur, auferrique omne oculorum impedimentum visusque defectionem, præsertim pituita crudisque humoribus redundantibus, ut auctor est Arnoldus Villanovanus. Attamen S. Paulli post Lobelium, Camerarium, Cl. Hoffmannum & alios, non promiscue vino Euphrasia utendum esse nos admonet; non enim curat quamvis caliginem, ait Camerarius, sed illam, quæ est a frigiditate, neque hanc omnem, sed positive a pituita. Imo notat Lobelius socium ac commilitonem suum, ex trimestri tantum hujus vini potu in Helvetia, pene ambobus orbatum fuisse oculis & fluxionibus modo non oppressum, cum antea dumtaxat levi cataphora & lacrymatiunculis laboraret. Hinc idem sciscit tutiorem esse pulveris Euphrasie usum.

Emmanuel König in *Regno Vegetabili* hunc pulverem, si cum Millepedum

dum pulvere confocietur, efficaciorē esse cenſet. Non ſolum ad viſus læſionem valet Euphraſia, ſed etiam ad capitis affectiones a nimia lymphæ viſciditate, aut fibrarum cerebri laxitate plurimum commendatur. Schroderus memoriā debilitatā ab illa reſtitui ſcribit. Eandem ſcoromiæ mederi J. Rajus reſert: & Fridericus Hoffmannus in *Clavi Pharmaceutica*, Euphraſiam præſertim flore albo in vino decoctā contra iſterum flavum utilemprehendiſſe aſſerit.

Inflammationibus & caligini oculorum herba recens ruſa & impoſita, aut ſuccus ejus oculis inditus, vel etiam aqua diſtillata plurimum conferunt.

24. Euphraſ. exſiccatur. & pulver. ʒij. Macis pulver. ʒß. M. F. pulvis ſubtilis, de quo cochlear medium ſeu ʒj. ante cibum mane & ſero deglutitur ex aq. Verbenæ, Fœniculi, aut vino.

25. Euphraſ. pulver. ʒj. Semin. Fœniculi dulcis ʒß. Macis ʒi. Sacchar. cand. in tenuiſſimum pollinem redacti ʒj. M. F. pulvis qui non ſolum viſus debilitati medetur, ſed etiam eximie valet ad capitis dolorem, ſi quoridie ſub ingreſſum in lectum ſumatur cum hauſtulo vini, obſervante Th. Fuller in ſua *Pharmacop. extemporan.* qui cephalica medicamenta opportuniuſ & ſœliciuſ hora ſomni quam ullo alio tempore exhiberi pronunciat.

26. Euphraſ. pulver. ʒj. Semin. Fœnicul. & Milleped. pp. ana ʒß. Syrup. Stæchad. q. ſ. M. F. bolus bis die ſumendus, in oculorum caligine, glaucomate aut cataracta.

27. Euphraſ. pulver. Cran. human. pulver. ana ʒß. Rad. Pæon. mar. Semin. Fœnicul. dulc. pulver. & Cinnabar. Antimon. ana ʒij. Syrup. de Stæchad. q. ſ. M. F. electuar. Doſis ʒj. bis terve die in capitis affectionibus, paralyſi & comatoſis affectionibus a pituita viſcida.

28. Euphraſ. M. j. in vaſi idoneo impoſitæ affunde aq. bullientis ʒijß. & poſt unam aut alteram ebullitionem, macerentur per horæ quatuordecim. Liquor clarus Theæ modo ſumatur per cyathos debitis intervallis. In viſus imbecillitate

Aqua Euphraſiæ diſtillata in Officinis ſervatur pauci effectus.

F A B A.

Faba, Faba major hortenſis, Off. Faba flore candido, ſtirpis nigris conſpicuo, C. B. P. 338. I. R. H. 391. Faba cyamos, J. B. 2. 278. Faba major recentiorum, Lobel. Icon. 57. Bona ſive Phaſelus major, Dod. Tempt. 713. Faba major hortenſis, Gerard & Parkinſ: Faba, Raii Hiſt. 909. vulgo, *Fève de maretz*.

Radice partim eſt recta, partim ſerpente, ſtrumofa & fibris donata; ex qua caules ſurgunt bicubitales & altiorem, quadrangulares, inanes, cum coſtis plurimis ex intervallis adnaſcentibus, in mucronem, deſinentibus, quibus annexæ ſunt foliorum conjugationes non exactæ, tres, quatuor, quinque, vel plures ex oblongo rotundorum, ſubpinguium, cœſorum, venoſorum, glabrorum. Ex coſtarum aliis flores naſcuntur complures, ex uno tantum pediculo ſeriatim & eodem latere appenſi, papi-

papilionacei, quorum vexillum ungue purpurascens albidum, striis purpurantibus pictum est: alæ in medio nigrae, in ambitu albæ, carina colore est ex albo herbaceo. Ex calyce autem viridi, quinquifido surgit pistillum quod deinde abit in siliquam longam, crassam, carnosam, hirsutam, surrectam, seminibus seu Fabis fœtam tribus, quatuor, quinque, raro pluribus, oblongis, latis, planis, compressis, quasi renitioribus, maximis, dimidiam drachmam interdum pendentibus, colore plerumque albo, interdum rubente, hilo in summa parte quæ siliquarum commissuris adhærent, longo, nigro. Putamen hujus Fabæ densum est & veluti coriaceum, interior substantia exsiccata, dura solidaque, in duas partes facile finditur, & ab uno latere germinationis principium evidens seu plantulam habet. Postquam semen dedit, radicitus exarefcit. Stipites, folia, flores, siliquæ & Fabæ in usum medicum veniunt. Fabæ virides & maturæ exsiccatae inter edulia mensis apponuntur. Colitur in suburbis hujus civitatis & agris palustribus magna copia.

Analysi chymica, solorum & stipitum recentium lbv. per vaporarium distillatæ præbuerunt humoris limpidi, inodori & insipidi: mere phlegmatici ℥x. humoris limpidi, inodori & insipidi, obscure acidi lbj. ℥viij. ℥iij. humoris limpidi, manifeste acidi ℥x. ℥iij. Massa sicca in alambice residua per retortam distillata præbuit humoris rufescentis, intense acidi, aliquantisper alcali, urinosi ℥iij. ℥vj. gr. xxxvj. humoris limpidi, rufi, empyreumatici, sale volatili urinoso imprægnati ℥j. ℥j. gr. xxiiij. olei syrupi ad instar spissi ℥j. Massa nigra in retorta superites pendebat ℥v. ℥vi. quæ rite in crucibulo per 8. horas calcinata reliquit cinerum albicantium ℥ij. gr. xij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥j. gr. l. lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥vj. ℥iij. gr. xij. in calcinatione ℥iij. ℥v. gr. lx.

Stipites seu caules recentes absque foliis distillati minorem olei quantitatem præbuerunt quam folia, plus massæ nigrae, quæ calcinata majorem salis fixi alcali quantitatem, minorem vero terræ portionem exhibuit.

Ex Fabarum virentium recentium lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris leviter rufescentis, saporem odoremque decocti Hordei referentis & obscure salis ℥xiiij. gr. lx. humoris limpidi, ejusdem odoris & saporis, primo obscure salis & obscure acidi, deinde subacidi ac tandem manifeste acidi lbj. ℥x. ℥iij. gr. xxviij. humoris primo subrubidi & rufescentis, ejusdem saporis & odoris, obscure acidi & subsalis ℥iij. ℥iij. gr. xvj. humoris rufi, odoris & saporis empyreumatici, salis, urinosi, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥v. ℥iij. gr. xxiv. salis volatilis urinosi concreti ℥iij. gr. xij. olei spissi ad instar extracti ℥j. gr. xv. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥iij. ℥vj. gr. xxxvj. quæ calcinata reliquit cinerum ℥vj. ex quibus salis fixi alcali ℥iij. gr. xij. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥iij. ℥j. gr. xxxiiij. in calcinatione ℥iij. gr. xxxvj.

Ex Fabarum maturarum & exsiccatarum lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, inodori, & insipidi, obscure subsalis ℥viij. ℥vij. gr. viij. humoris rufescentis, acris, salis, urinosi lbj. ℥j. ℥vj. gr. xv. humoris rufi, empyreumatici, acerrimi, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥viij. ℥vij. gr. viij. salis volatilis urinosi ℥j. gr. lxviij. olei ℥v. ℥vj. gr. xlviij. Massa nigra in retorta residua pendebat lbj. ℥iij. ℥iij. gr.

gr. xxxj. quæ calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥j. gr. lxxj. ex quibus salis fixi mere alcali ℥j. ℥j. gr. xxxij. lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥xv. ℥vij. gr. xl. in calcinatione lbj. ℥ij. ℥ij. gr. xlvij.

Foliorum Fabæ succus chartam cœruleam rubio colore tingit, non item Fabarum recentium viridium succus. Salem essentialem folia continent tartaro haud dissimilem cum mediocri sulphuris & terræ portione conjunctum. Fabæ virides essentialem obtinent salem ammoniacalem cum sulphure copioso, terra & magna phlegmatis copia sic permixtum, ut mucaginem simul constituent. Ac vero cum maturæ sunt & aliquantisper asservatæ & exsiccatae, quadam intus sulcepta fermentatione, mucago illa dissolvitur, principia magis ac magis evolvuntur, acidi sales nova & diversa cum sulphure & terra mixtione in sales urinosos volatiles aut alcalinos fixos convertuntur; unde major horum salium volatiliū copia in Fabis maturis deprehenditur, & nihil fere acidi salis in distillatione fundunt.

Faba legumen primum fuisse quo homines usi sunt, Ildorus L. 17. *Origin.* C. 4. asserit: & Plinius quoque Fabæ honorem inter legumina fuisse maximum testatur, & ex ea etiam tentatum esse panem. Ex Faba farinam conficiebant Latini quæ Lomentum teste eodem dicebatur, sicut ea quæ mola leviter tantum contracta, Faba fressa (a frendeo, frango) nuncupabatur.

Verum an Faba nostra sive Bona quorundam recentiorum sit veterum Faba non levis est inter Botanicos controversia: ut videre licet apud Tragus, Dodonæum, J. Bauhinum, Casp. Hoffmannum, Melchiorum Sebizium &c. Certe veterum Faba parva fuit & rotunda, ut patet ex pluribus locis Theophrasti, Dioscoridis, & aliorum. Econtra tamen cerie vix credibile est legumen adeo vulgare & quotidiani usus in consuetudinem abiisse, aut nomen mutasse; in ejus locum nomenque Boonam successisse nemine conficio. Hæc enim nobis pro Faba, & Faba latinis pro *χουμ* unanimi consensu tradita est. Quod tamen non est impossibile.

De Fabarum natura & facultate auctores non inter se conveniunt. Vulgaris est opinio Fabas nostras statulentas esse & difficilis coctionis & tanto magis quo viridiores, ac proinde crassum & excrementosum alimentum præbere corpori. J. Rayus cum Trago eas recentes innoxias esse asserit; nec probat sententiam Dodonæi aridas & exsiccatas recensibus præferentis, uspotè minus statulentas, sed potius cum Trago eas rusticis & operariis relinquit. Nec video, inquit, cur Porcos, aliaque animalia saginenti, non æque homines. Præterea Mundyus *De Esculentis*, p. 121. se novisse scribit rusticum quemdam pauperem, qui in gravi annonæ difficultate Fabis solis elixis, nec ulla alia re, liberos aluit. Pueris tamen ita pastis melius coloratos aut habitiores vix alios videres. Unde constat copiose nutrire Fabas aridas, postquam ventriculus eas ferre assueverit.

Verum enimvero non ex brutis ad hominem valet Raii conclusio. Fœnum enim & palea optima sunt Equorum edulia, hominibus parum proficua. Neque omnibus omnia alimenta æque accommodata sunt. Rustici & duris laboribus assueti illis indigent cibis, quæ multum & crassum præbent nutrimentum, quibus delicatioribus & otiolam vitam ducentes læduntur. Pertiores Medici fere omnes pronuntiant Fabas quocumque modo,

ac

ac ratione apparatus atque conditas difficilis esse coctionis, & status parere, obstructions in visceribus, mesenterio, meatibus urinarys creare, propter status, quos gignunt, maxime virides, ventrem distendere, colicam gignere, ructus & crepitus causare, caput gravare, mentem turbare, visum hebetare, viresque ingenii enervare sæpius & immoderatus. Esitatas. Quapropter vitandæ sunt delicatulis, & illis qui calculo, colicæ passionis capitis dolori, & alvi constipationi sunt obnoxii. Declinandæ quoque otiosi, litterarum studiis addictis, & quibus ventriculus est debilior, visusque hebetior. Revera hujus cibi statulentia condimentis status discutientibus, Cæpis, Porris, Apio, Petroselino, Satureja, Pipere, aromatis, non parum emendatur.

Cæterum viridis ac recens summo pere a nostris Parisiensibus commendatur in re excaria, expetitque avidissime lautiorum mensis & procerum gulæ. Alias juncula ex iis parantur, alias in sartagine ex lardo, aut butyro, aut oleo aliore pingui frigunt quibus Saturejam, Piper aut alia ejusmodi adjiciunt. Hæ autem cum durescere incipiunt & ad maturitatem properantes, delibrantur ac decorticantur, sicque delicatiores ac teneriores eduntur. Siccæ vero coquantur, trajiciuntur, & quasi puls conficitur, quæ ex butyro vel lardo frixo coquitur. Itali recentes cum siliquis crudas esistant cum & sine sale: Verum lapidum & gulæ placens magis quam valitudini conducens edulium præbent.

De adstringente facultate farinæ Fabarum, ejusque proinde usu a nonnullis in dysenteria commendato Medici quoque inter se dissentiunt. Cl. Hoffmannus a farina Fabacea, seu Faba fressa veteribus dicta, & Lomento Fabæ, quæ paratur sine cortice, non oportere ait ullam expectare adstrictionem, quæ corticis est, non autem substantiæ: ac proinde in errore versari illos, qui hac farina vel in aceto solo, vel in aceto & aqua decocta utuntur in alvi fluxibus ex fibrarum intestinalium laxitate; nisi enim totæ decoquantur, nihil fit. Dodonæus contra Fabam cum puraminibus descendere ait nec omnino facile, nec omnino tarde: absque his autem alvum constringere. Huic assenti videtur J. Rajus, rem tamen experientia determinandam relinquendo. Hanc litem S. Paulli dirimeret experientia in suo *Quadrupartito* allata, nisi illud Hippocratis essetum, *Experientia fallax*, sæpius nimis verum deprehenderetur. Narrat, quemdam cruenta alvi excretionem jugi, seu diarrhæa cruenta, absque signis hepatico fluxui, & dysentericæ propriis, tres quatuor menses integros laborasse, cum antehac nullum levamen pensasset a medicamentis præscriptis, præter omnem spem, integre pristinam valetudinem fuisse consecutum solo usu Fabarum & præsertim rubrarum non contritarum, ex lacte pulmenti in modum coctarum, quod a Gregorio cive Hafniensi quodam velci jussus erat, mane jejunos, & vespere cubitum iturus. Hic enim ægrotans recuperatam bonam valetudinem fortasse non tam fabis debuit, quam lacti quo incoquebantur. Sed ad externum, certiorum earum usum progrediamur.

Pulvis seu farina Fabarum ex Fabis decorticatis per trituram parata inter quatuor farinas resolventes numeratur, Hordei scilicet, Oro, Lupinorum, & Fabarum. Externe in contusionibus & inflammationibus partium glandulosarum discutendis, & resolvendis vel ad suppurationem perducendis

dis plurimum confert : quibus cum aqua vel lacte cocta sub cataplasmatibus forma applicari solet . In testium inflammationibus , & tumoribus a contractione violenta , casu , contusione , suppressione seminis , & similibus a Rilverio & Ettmullero cataplasma ex ea sola cocta cum oxycrato , seu aqua simplici & aceto , vel cum dimidio pulveris seminis Cymini , calide applicatum velat egregium discutiens & resolvens commendatur . Quod si acrius videatur cataplasma , addito pauco Lithargyrio , acrimonia aceti frangi , & ita pro mitigandis & resolvendis inflammationibus idoneum reddi potest . Idem cataplasma valet etiam ad tumores scroteri duos & scirrhusos , ad mammarum tumores .

24. Farinæ Fabar. ℥ij. Semin. Cumini pulv. ℥j. Lithargyrii P. j. aceti acerrimi ℥ij. aq. comm. q. s. M. f. a. Coq. ad cataplasmatibus consistentiam .

Inter cosmetica eadem farina Fabarum refertur , si nempe cum aquis cosmeticis v. g. florum Fabarum aqua distillata , vel sigillt Salomonis , permixta forma pulvis liquidæ , faciei lentiginibus , item oculis suffusus applicetur .

Dux in Officinis aquæ distillantur : prima ex Fabarum floribus . Inter cosmetica non infimum locum obtinet . Lentigines , & faciei maculas detergit . Altera ex corticibus seu conchis Fabarum elicitur , urinas pellit , & adversus nephritidem & calculos a Thoma Bartholino plurimum commendatur propria experientia edocto , *Epistolar. Centur. 1. p. 238. Epist. 55.* Salem quoque ex stipitibus , & siliquis Fabarum combustis & calcinatis lixivio extrahunt , potens quidem diureticum . Ettmullerus hunc salem ex cineribus cum vino eluendum esse suadet . Nonnulli sinum columbinum cineribus in calcinatione admiscunt , sicque salem obtinent diureticum & antihydropicum potentissimum . Ad gr. viij. vel x. præscribitur in haustu liquoris convenientis cum syrupo de Althæa edulcati ; & pro lubitu pluries die reiteratur .

Cæterum pro immundo edulio Ægyptii Fabas habuisse dicuntur . Ab illis eorum Sacerdotes abstinerebant , teste Herodoto . Has etiam damnasæ Pythagoram quidam putarunt : sed contra alii nullo legumine sæpius usum fuisse ruerunt , qualis est Aristoxenus apud Aulum Gellium *L. 4. n. 4. c. 11. Inss. R. H.* At vero Pythagoricum illud symbolum *Κυβισμός* , a Fabis abstinet , varie interpretantur veteres & recentiores . Alii de Fabis simpliciter accipiunt , a quibus ideo abstinere Pythagoras præcipit , quia sunt sturulentæ , veneris incentivæ , mentis tranquillitati contrariæ , insomniacque turbulenta efficientes : vel ut alii volunt , teste Plinio , quia mortuorum animæ sunt in illis , & quia in floribus earum literæ lugubres reperiuntur . Alii *Κυβισμός* , Fabas symbolice & ænigmatice testiculo appellatos ajunt , quia sunt *ἐπὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς* , auctores fecunditatis seu generationis . Unde non a Faba comedenda , sed a rei veneræ proluvio voluisse philosophum homines deducere . Tandem alii , ut Plutarchus ipse , a muneribus reipublicæ tractandis abstinendum interpretantur . Nam veteres vice calculorum in magistratibus eligendis Fabis utebantur .

F A G O P Y R U M.

Fagopyrum , Fagoriticum , Frumentum Sarracenicum , *Off. Fagopyrum vulgare , erectum , Inss. R. H. 511.* Erysimum Theophrasti folio Hedera .

deraceo, C. B. P. 27. Fagotriticum, J. B. 2. 993. Erysimum Theophrasti, Lobel. Icon. 63. Ocymum veterum, Tragi 648. Ocymum cereale, Clus. Pan. & Tabern. Icon. Fagopyrum, Dod. Pempt. 512. & Rati Hister. 182. Tragopyron, Gerardi Emaculati, & Parkinsoni: Frumentum Sarracenicum, Matthioli, Lugd: vulgo Bled noir ou Bled sarrasin.

Radice nititur furculosa, plurimis fibrillis capillata: caule surgit cubitali & altiore, simplici, tereti, glabro, solido, viridi, sed in apricis purpureo ramoso, ramulis alternatis e foliorum sinubus exeuntibus. Folia ima pediculis duas uncias longis insident, superiorum in caule pediculi sensim breviores sunt, donec tandem in summo immediate adnascantur, hederacea, glabra, atro-virentia, per margines æqualia, sapore satuo. In summis caulibus & ramulis ex alis foliorum egrediuntur furculi seu pediculi unciales, tenues, flores sustinentes in spicas habitiores seu muscaria congestos, pulchellos, apetalos, plurimis staminibus rubentibus constantes, e calyce quinquepartito, ex albo purpurascente surgentes. Pistillum autem abit deinde in semen oblongum, triquetrum, sordido colore nigricans, in capsula quæ calyx floris fuit reconditum, farinam intus continens candidissimam, inspidam. Ajunt Africanæ originis esse. Apud nos in arvis se-ritur, nec ullum fere solum refugit. Gaudet imbris, cito provenit & celeriter maturefcit. Seminis farina usitata est.

Analyti chymica, Fagopyri semen præter liquorem acidum copiosum, plurimam olei mediocre spiritus volatilis urinosi portionem, parum verò terræ & salis fixi præbuit. Vulgare est in hocce regno Frumentum Sarracenicum dictum, quo solo vel cuiuspiam alteri mixto rura sæpissime utuntur, cum præsertim per annonæ gravitatem non alia frumenta superunt. Tritico, Secali & Hordeo minus nutrit, plus tamen quam Milium & Panicum. Panis ex eo confectus ater est, gustu non insuavis & hordeaceo multo sapore antecellit: humidus est, citiusque descendit ac flatulentius plus obtinet quam ex Secali coctus. Accommodum est edulium hominibus laboribus & exercitiis addictis.

Potest ex eo parari crassior farina, cujus erit usus ad pultes, offas, placentas cum lacte, vel butyro, vel oleo & sale, vel carniurn jure: nec est injucundum edulium, & quamquam flatulentum, Milio, Pisiss, Fabis anteponendum. Pulmentaria atque placentæ ex ejus farina confectæ facile concoquuntur, cito descendunt, alimentumque corpori afferunt, exiguum quidem, non tamen malum aut vitiosum. A Petro Pavio Medico Amstelodamensi celeberrimo & S. Pauli in Quadr. Botanico, senibus quorum alvus nimis est contracta maxime commendantur.

Ejus farina in cataplasmatibus resolventibus & emollientibus utiliter usurpari potest. Optime resolvit, digerit & maturat.

Herba viridi priusquam semen maturoerit, boves & jumenta pascuntur. Semine gallinaceum genus cibatur, eoque cito facileque pinguescit.

Furfuræ ex hujus leminis farina extracto hortulaniad cellas, quibus hyberno tempore plantæ reconduntur, ab humiditate præservandas feliciter utuntur. Tabulata lignea duorum triumve pollicum intervallo a muris remota construuntur, & vacuum illud inter muros & tabulata spatium hoc fursure accuratissime repletur.

FILIPENDULA.

Filipendula, *Off.* Filipendula vulgaris, an Molon Plinii, C. B. P. 163. I. R. H. 293. Filipendula J. B. 3. p. 2. 189. *Dod. Pempt.* 56. *Oenanthe*, *Fuchsi*, *Cordi*, *Lobel. Icon.* 729. vulgo, *Filipendule*.

Radix est torosa, nigricante, in plurima extenuata filamenta, quæ versus extrema in nodulos aut bulbos extuberant olivares aut longiores minusque ventricosos, Alphodeli more, foris ex rubro nigricantes, intus albescentes, acrimoniam quamdam cum adstrictione, dulcedine & levi amaritudine gustu referentes: Folii ad radicem plurimis, multifariam pinnatis, Pimpinellæ saxifragæ fere modo, angustioribus, profundius laciniatis, atro-virentibus: caulis plerumque unicus, erectus, dodrantalis, aut etiam pedalis & altior, striatus, ramosus, paucis foliis vestitus, flores in fastigio sustinet velut in umbellæ formam dispositos: rosaceos, sex petalis candidis, exterius subrubentibus, in orbem positis, leviter odoratis constantes, plurimis staminibus & apicibus luteis, & calyce monophyllo, multicuspidi, ex quo surgit pistillum, quod deinde abit in fructum fere globotum, compositum ex undecim, duodecim aut pluribus seminibus asperis, compressis, rhombi irregularis figura, radiatim in capitulum dulioli æmulum collectis. In sylvis circa Lutetiam Iponte crescit. Radices, & folia usalia sunt.

Analysi chymica, ex Filipendulæ radicem recentium ℔v. cum ℥iv. prodierunt humoris limpidi, subavescentis odore, & sapore radices referentis fubacidi ℥xij. ℥iv. humoris rufescentis, limpidi, ejusdem odoris, saporis austeri ℔ij. ℥iv. humoris rufescentis, cum acidi austeri, cum salis, urinosi, empyreumatici ℥vij. ℥vj. gr. xxxvj. olei adiposi ℥vij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℔j ℥i. quæ calcinata reliquit cinerum ℥iv. ℥v. ex quibus salis fixi salis ℥v. lixivio extractæ sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥x. ℥ij. gr. xxxvj. in calcinatione ℥xij. ℥ij.

Filipendulæ folia sapore sunt adstringente, subsalio, odorata, glutinosa & chartam cæruleam rubro colore tingunt. Rubro magis intento radices inficiunt. Stypticæ sunt & subamaricantes, & salem essentialem continere videntur tartareum, aluminosum cum copioso sulphure conjunctum. Folia vero, quæ plus acidi humoris, & spiritus urinosi fundunt, salem essentialem ad ammoniacalem magis accedentem continere videntur.

Tota planta humores crassos incidit, attenuat, & per urinas pellit. Inter diureticas plantas locus haud infimus ei a S. Paulli conceditur. Ejus usus a plurimis laudatur in nephritide, ad stimulandum calculum, renes abstergendos, ac vesicæ sabulum, aut mucum viscidum rudimentum calculorum expellendum. Verum quod speciali vi lithontripica polleat, ut nonnulli opinantur, vix sperandum. Radices magis quam folia subadstringunt. In albo mulierum profluvio, & in nimio lochiorum fluxu, usus sunt eximii, teste D. Needham apud Rajum. Pulvis radicem Filipendulæ celebratur in fluore albo mulierum ab experimento a S. Paulli allato in *Quadripart. Botanico*, qui narrat, quamdam Dauci vulgaris decocto, in quo ℥i. pulveris radicem Filipendulæ sibi ipsi pro:

propinarat, profluvio albo muliebri intra paucos dies vindicatam fuisse; plurimis alius medicamentis incaſum propinatis. Hermannus Corbæus quod apud Dolæum L. 5. C. 4. 5. 20. pro experimento habet quotidie ʒi. radicis Filipendulæ virentis cum vino nigro exhibere in eodem fluore. Dyſenteriam læpius a ſe curatam notavit in *adverſariis ſuis* exhibito ʒi. pondere, ex vino aut ovi vitello, ejuſdem radicis pulvere; quem ante ipſum Lut. Mercatus L. 1. *De recto præſidiorum uſu*, c. 14. ſecreti loco commendaverat. Eſt ſane huic plantæ adeo inſignis vis adſtringendi, ut hernias quoque ejuſdem uſu curatas Thomas Cartheuſius obſervaverit, ut videre licet in *Obſervationibus Hieronymi Veſſchii*, 33.

Pulverem, radices, ejuſve ſuccum adverſus morbum comitialem commendant nonnulli. Alii Filipendulam proxime accedere qualitatibus ad Pæoniā ſcripſerunt; hinc epilepticis & vertiginofis Filipendulæ radices conferre Lobelius retulit. Medentur etiam anhelofis, ſuſpirioſis, ventriculi inſtationibus cum ſemine Fœniculi.

Sennertus hanc radicem adverſus ſcrophulas commendat. Ettmullerus aſſerit hanc radicem ſcrophularum materiam incidere & reſolvere, eamque per urinarias vias educere.

Exhibetur ſola vel cum Scrophulariæ & Ruſci radicibus admixta in decoctis & pulveribus contra ſcrophulas.

24. Radicum Scrophulariæ, Filipendulæ, Ruſci ana ʒß. Folior. Agrimon. Pimpinellæ ana M. j. Flor. Roriſmarin. P. ij. Digerantur vaſe clauſo in vini albi ʒxvj. Colatura dulcoretur Saccharo pro tribus doſibus.

F I L I X.

PLurimas inter Filices, quas orbis uterque nobis offert, tres potiſſimum in Officiis uſitatæ ſunt, ſcilicet, Filix mas ſeu non ramoſa, Filix ſæmina, ſeu ramoſa, & Filix florida ſeu Osmunda regalis.

Filix mas dicta, Filix non ramoſa, *Offic. Filix non ramoſa dentata C. B. P.* 358. *Iuſt. R. H.* 536. Filix vulgo mas dicta ſive non ramoſa *J. B.* 3. 737. Filix mas *Dod. Pempt.* 462. *Dryopteris Matthiæ, Lugdunens.* 1227. Filix mas vulgaris *Parkins. Raii Hiſtor.* 143. Filix mas non ramoſa, pinnulis latis, denſis, minutim dentatis *Gerard. Emacul. vulgo, Fougere male.*

Ex radice craſſa, ramoſa, fibroſa, foris nigricante, intus pallida, multis appendicibus involuta, & implexa, ſaporis primum ſubdulcis, deinde amariuſculi, ſubadſtringentis, odoris nullius verno tempore multos promit aſparagos, primo exortu inflexos, cano capillitio obductos, qui progreſſu temporis abeunt in frondes amplas, bicubitales, crebras, rectas, frangi faciles, diluto colore virentes, quæ ex alis ſeu tarſis (a) aut foliis componuntur mediæ coſtæ muſco ferrugineo leviter obductæ alternatim adnaſcentibus, non conjugatim, nec paribus intervallis in pinnulas ſeu criſtas latas, & laia baſi nervo tarſi medio adnaſcentes obruſas, circa margines dentatas diviſis. Linea nigra nervum uniſcoſiſque alæ medium ſuperne producta notat. Singulæ pinnulæ ſupina parte venulis inſignes

(a) Tarſis, alarum productio ſeu expansio.

infignes sunt, prona duplici ordine punctorum ferrugineorum. Hæc puncta fructus, reipsa sunt, ut apud Cl. Tournesortium I. R. H. videre licet, compositi ex numerosa congerie vesicularum fere ovararum, minutissimarum, annulo elastica vi donato munitarum & membrana communi involutarum. Per maturitatem corrugatur aut dilaceratur exterior illa communisque membrana, exsiccat & contrahitur annulus elasticus, in binas partes dissiliunt vesiculæ, seminaque fundunt minutissima. Floribus carere videtur hæc planta, aut si qui sint, nondum detecti fuerunt. In agro Parisiensi ubique fere nascitur.

Filix scœmina, Filix non ramosa, Filix vulgaris, Off. Filix ramosa, major, pinnulis obtusis, non dentatis C. B. P. 357. 1st. R. H. 536. Filix major & prior Trago, sive ramosa repens J. B. 3. 735. Filix scœmina Dod. Pempt. 462. Gerardi bist. 149. Thilypteris Filix scœmina Cord. in Dioscori. vulgo *Fougere commune*, *Fougere femelle*.

Huic radix est digitum subinde crassa, foris nigricans, intus albida longe lateque importuno reptatu terram occupans, odore gravi, sapore amaricante succoque glutinoso prædita, quæ summa parte oblique aut etiam transversim secta bicipitis aquilæ speciem quamdam exhibet. Caulis seu viderius pediculus tres quatuorve cubitos altus rigidus, ramosus, solidus, lævis & aliquatenus angulosus: frondes pinnatæ seu elatæ in tarsos primo, deinde in pinnulas, seu foliola angusta oblonga, acutiuscula, obiter interdum densata, alias æqualia, dissectæ, superne virides, inferne canescentes. Fructus seu vesiculæ ovaræ fructiferæ, fructibus Filicis maris similes non eodem modo in adversa foliorum parte disponuntur, sed in marginibus pinnularum elongatis & reflexis reconduntur. Nam autumnopinnularum margo circumcirca plerumque producit, incurvatur, & complicatur, sinusque subtus format quosdam, in quibus fructus nascuntur. In pascuis sterilibus ubique fere luxuriat. Utriusque Filicis radices, in primis scœminæ, in usum veniunt.

Analysi chymica foliorum & stipitum Filicis scœminæ lbv. per retortam distillatæ præbuerunt humoris limpidi, primo saporis, & odoris fere expertis, deinde subacidi lbj. ℥viij. ℥iv. gr. xxxvj. humoris limpidi, acidius magis ac magis intensi austeri lbj. ℥ix. ℥vj. gr. xxx. humoris rufi odoris, & saporis empyreumatici, intense acidi, subsalsi & intense austeri ℥vj. humoris rufi, sale volatili urinoso imprægnati ℥j. ℥vij. olei spissi ℥j. ℥ij. gr. xxxvj. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥v. ℥vij. gr. xxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum cærulescentium ℥j. ℥v. gr. xxiv. ex quibus lixivio salis alcali fixi ℥iv. gr. lxij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥vj. gr. vj. in calcinatione ℥iv. ℥ij. gr. xij.

Filix mas eadem principia distillatione fundit, sed tamen paulo plus olei terræ & salis fixi præbuit.

Ex radicibus Filicis scœminæ recentium lbv. per retortam distillatis prodierant humoris limpidi, odoris, & saporis fere expertis, obscure subacidi ℥xij. ℥iv. humoris primo limpidi, acidi magis ac magis intense, sub finem rufescentis, odoris, & saporis leviter empyreumatici, ac tandem austeri lbij. ℥iv. gr. lxvj. humoris rufi tum intense acidi, & austeri, tum salis & sale volatili urinoso leviter imprægnati ℥vj. ℥ij. olei ℥ij. gr. xlvij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥ix. ℥j. gr. xxxvj.

quæ

quæ rite calcinata reliquit cinerum albicantium ℥ij. gr. xxx. ex quibus salis fixi salis ℥j. gr. xx. lixivio extracta sunt. Partium iactura in distillatione fuit ℥iiij. ℥vj. gr. xxx. in calcinatione ℥vij. ℥j. gr. vj.

Radix Filicis maris haud dissimiles substantias analysi chymica præbet. Fœmina minorem olei fluidi quantitatem suppeditat, at plus olei condensati in capite mortuo retinet, quam mas dicta; minorem quoque salis fixi, plus vero terræ.

Filicis fœminæ radix glutinoso succo primo subdulci, amaricante, & subadstringente, fastidioso donatur, qui chartæ cœruleæ colorem mutare nequit. Salem essentialem continere videtur sali coralliorum proximum, ut Cl. Tournefortius opinatur, quodam involutum muco composito ex acido, oleo, terra adstringente, & copioso phlegmate, quorum specialis commixtio ab igne facile destruitur.

J. Rajus narrat pilas seu globulos effici apud Anglos ex utriusque Filicis cineribus cum aqua in massam coactis, & in sole exsiccari, quorum usus est loricibus ad linteamina mundanda, saponis aut lixivii loco. Antequam iis utantur in ignem luculentum immittunt, donec candescant, tunc enim calcinati facile in pulverem fatiscunt.

Utraque Filice exsiccata, ligni aut straminis inopia, ad furnos calefaciendos rustici utuntur. In Suffexiâ etiam Angliæ provincia, referente eodem Rajo, ad calcem coquendam adhibetur: est enim ejus flamma vehemens admodum, & huic usui valde idonea. Filix utraque iisdem virtutibus donatur. Marem tamen Filicem J. Rajus rachitidi morbo vulgo dicto peculiariter convenire scribit. Pro cæteris fœmina præ mari sæpius eligitur. Tota planta una cum radice apud antiquos in frequenti admodum fuit usu in morbis chronicis ex melancholia natis, in affectionibus hypochondriacis, præsertim in quibus splen simul affectus fuit, in tumoribus, & scirrhis lienis, & pancreatis. In decoctis, jusculis, potionibus aperientibus, & antispasmodicis præscripta reperitur, nec absque fructu adhibita fuit. Sed cum hodierno tempore delicatioris sint palati homines, & ad eiusmodi decocta diu continuanda nauseant, rarius hodie præscribitur. Forestus tamen valde commendat decoctum radicis cum Cuscuta in vino seu arcanum expertum in splenis affectionibus. Ettmullerus, & alii commendant singulariter sequens decoctum in affectibus melancholicis, & dicunt expertum esse ad lienis tumorem, & duritiem. Quod quidem operatur tum sale suo essentiali concretos humores solvendo, sed multo magis terreis suis particulis, & oleosis adstringentibus fibras partium solidas firmando, & constringendo.

℥. Herbarum Filicis cum sua radice, Sabinæ, Absinth. ana q. l. Coquuntur in q. l. aq. comm. vel aquæ ferrarior. sapor. ad tertiam partis diminutionem, vel macerentur in vino: addendo si libet Pafusar. minor. contus. q. l. pro grato sapore, de quo sub ingressu lecti unus habitus bibatur.

Flix autem gravidis insensa censetur, ut quæ abortum faciat.

Hujus radix in pulverem redacta, & pondere ℥j. duarum vel trium ex aqua multa sumpta lumbricos enecat, imo lumbricorum latorum, quæ latinis Tænia, & solum dicuntur, præsentissima pestis est, teste S. Pauli, eamque inter secretissima sua secreta, inquit, habent, & venditant agyræ.

℥. Rad.

24. Rad. Filic. sæmin. pulver. ʒj. Mercur. dulc. gr. vj. M. F. bol. cum syr. de Absynth.

24. Rad. Filic. sæmin. Rhei pulv. & summitat. Tanacet. ana ʒj. Cortic. Mor. arbor. & Corallinæ ana ʒij. Æthiop. mineral. ʒiv. M. F. pulvis. Dosis a ʒß. ad ʒij.

Singulare quoque est in Filice experimentum, quod ex Antonio Batto refert de ejus virtute adversus ambusta, si sequenti ratione subigatur.

24. Radicum Filicis sæminæ q. s. Ex confusis succum exprime, vel in defectu recentiam radicum, sume exsiccatas, & confusis affunde aquam rosaceam vel aquam communem. Tunc per expressionem succus mucilaginosus exprimitur. Hic præ omnibus aliis remediis mirifice prodest.

Tragus idem de hujus radicis succo mucoso confirmat.

Notum est, quosdam populos in frugum inopia e radice Filicis panem confecisse. Cl. Tournefortius in *historiam plantarum circa Lutetiam nascentium* refert seipsum vidisse panes ex hac radice confectos, qui annis 1693. & 1694. ex Arvernâ Lutetiam allati fuerant. Saporis erant pessimi, & coloris rufi, similes fere panibus ex quemeo confectis cortice, qui ad coria inficienda inservit: vulgo, *Mottes a bruler*. Notum est quoque Filicum cineribus nitri loco injectis laxa colliquefcere in vitrum colore viridi & subobscur.

Filix florida, & Osmunda Regalis, Off. Osmunda vulgaris & palustris. *Inst. R. H.* 547. Osmunda Regalis, siye Filix florida *Parkinson. Theatr.* 1038. Filix floribus insignis *J. B.* 3. 736. Filix ramosa non dentata florida *C. B. P.* 357. Filix palustris *Dodon. Tempr.* 436. Filicis majoris alterum genus, *Trag.* 543. Filificarum nonnullis, & Lunaria major *Chimæstorum quorundam*: vulgo, *Osmonde*, ou *Fougere fleurie*.

Ex uno perplexarum radicum, longarum nigricantium cespere, caules attollit complures, bicubitales & altiores, virides, glabros, striatos, ramis parulos. Hinc inde alæ exoriuntur, pinnatis octo vel novem conjugationibus foliorum impari uno alam claudente constantes. Singularia autem folia omnia sursum spectant, cum quatuorve unciarum longitudine, semiunciam lata, ex principio latiore sensim exuata, in obtusum mucronem desinentia, a nervo per longitudinem decurrente exporrectis in margines haudquaquam sectos infinitis oblique venulis. Caulis scapus in furculos aliquot divisus racemulos unciales in singulis furculis multos sustinet fructiferos. Floribus enim carere videtur. Flores herbarii dicti, inquit *J. Rayus*, nihil aliud esse videntur quam folia, ob semina adnascencia, non explicata, sed ad margines reflexa. Fructus vero velut in uvam collecti capsulæ sunt sphaericæ, Filicum cæterarum capsulis similes, quæ fibrarum contractione rumpuntur, seminaque fundunt minutissima, ut microscopii ope observatur. In quibusdam agri Parisiensis locis sponte nascens reperitur; herba & radix in usum veniunt. Vis præcipua in fructiferis racemis & radicis medulla albicante consistit.

Osmunda analysi chymica a Filice parum differt. At sapore est minus amaro, & adstringente. Minus adstringens, & magis temperata censetur.

Ejus

Ejus radix ad hernias, & ulcera exploratissimi commodi esse scribit Lobelius; quin etiam colicis, & splenicis plurimum conferre. Ejusdem radicis mucaginem ad curandam herniam in pueris extra applicatam, ut probatissimum remedium, Paulus Hermans commendat.

Pars illa radicis media subcandida efficacissima censetur non modo vulneratis, sed etiam cæsis, ruptis, ex alto deturbatis, decocta vel etiam tusa, & cum idoneo liquore sumpta. Sunt qui tantam ejus potentiam esse existiment, ut sanguinem alicubi intra corpus hærentem ac concretum dissolvere queat, & foras etiam per vulnus expellere.

Rachitidi morbo dicto remedium præstantissimum, & quasi proprium ac specificum a J. Raio, & Paulo Hermanno prædicatur hujus radix cui percurando vel sola sufficiat. Doctor Bovles in rachitide proponit conservam asparagorum seu germinum teneriorum Osmundæ, & Filicis maris, vel etiam Asplenii, & Phyllitidis, prospero successu.

℥. Summitatum fructiferar. Osmund. M. j. Coq. cum lactis vacc. ℞ij. Colatura hauriatur sing. diebus contra rachitidem.

℥. Radicis medull. subcandicantis ℥ij. Capillor. vener. M. j. Coquantur ex aq. ℞ij. F. decoctum contra rachitidem.

F Æ N I C U L U M.

Fœniculi semen duplex est in officinis, vulgare, & dulce.

Fœniculum vulgare, *Off.* Fœniculum vulgare, minus, acriori, & nigriori semine *J. B. 3. p. 2. 2. Inst. R. H. 311.* Fœniculum vulgare, Italicum, semine oblongo, gultu acuto *C. B. P. 147.* Fœniculum sive Marathrum vulgatus *Adversar. Lobel. 347.* Fœniculum vulgare, Germanicum *C. B. P. 147. & Inst. R. H. 311.* Fœniculum *Dod. Pempt. 297.* vulgo, *Fenouil commun.*

Ex radice vivaci, & in plures annos restibili, digitali aut majore recta, alba, sapore cum quadam dulcedine aromatico, caulis surgit tres aut quatuor cubitos altus, rectus, teres, striatus, geniculatus, lævi, tenui ac virente cortice circumvestitus, fungosa interiori medulla candida farctus, in alas crebras circa fastigium divisus. Pediculi veluti quadam vagina caulem, & ramos complectuntur, quibus folia insident ampla, ramosa, in tenuissima segmenta dissecta, atrovirentia, sapore dulci, odore suavi, quorum singula segmenta teretia sunt, extrema vero capillamentorum instar tenuia. Umbellæ latæ in cacuminibus cauliculorum, & ramulorum eminent rotundæ ac in orbem circinatæ. Flores rosacei, pentapetali, lutei, odorati, calyci insident, qui abijt in fructum ex duobus seminibus compositum oblongis, crassiusculis, hinc gibbis, & striatis, inde vero planis, nigricantibus, sapore acriori aut minus dulci. Sponte nascitur in locis saxosis, & calidis in regionibus, ubi cultura semen dulce evadit, & planta aliquantisper variat; hinc quarundam Fœniculi specierum varietas. Hic in hortis colitur. Radices, folia, semina in culinis, & officinis usitata sunt.

Fœniculum dulce, *Off.* Fœniculum dulce majore, & albo semine *J. B. 3. p. 2. 4.* Fœniculum dulce *C. B. P. 147.* Fœniculum sive Marathrum vulgatus, dulce *Lobel. Icon. 775.* vulgo, *Fenouil doux.*

Geoffroy Tom. II.

R

A vul-

A vulgari radicibus, foliis, caulibus, & flore vix differre videtur, nisi forte caule minus protero, & graciliore ac foliis minoribus. Semina quidem multo sunt majora, striata, albida, dulcia magis, & minus acris. Hæc Fœniculi species post unum aut alterum annum, iterata satione seminis hic producti, inquit J. Raius, in hortis paulatim degenerat, & in vulgare transit, nec in nostris tantum, sed in Germanicis arque etiam Italicis, ut testatur Cæsalpinus. Unde autumat J. Raius semina ejus ex ulterioribus adhuc meridiem versus regionibus asseriri; ex Syria forte ut Lobelius scribit, aut ex Insulis Azoticis, ut alii.

Analysi chymica, Fœniculi folia recentia plurimum humoris acidi, odorati, mediocrem olei tum essentialis tenuis, tum crassi portionem, modicum salis fixi alcalini, teræ, & perparum spiritus urinosi exhibuerunt. Semina eadem principia præbent, sed oleum essenziale majori copia tundunt, cui eorum virtus præcipue tribuenda est; subtile enim illud oleum & sal acidus tenuis ac volatilis simul permixta sese invicem temperant, & compositum constituunt ad spiritus acidus dulcificatos chymicorum aliquantisper accedens.

Fœniculum spissorem sanguinis crasum blande dissolvit, lympham viscidam incidit, & fluidiorem efficit. Aperiens est hæc planta, diuretica, sudorifera, stomachica, pectoralis, & febrifuga.

Apud nonnullos specificum audit contra variolas, & morbillos. In febris putridis, quibus adjuncta est malignitas, S. Paulli vix ullam plantam Fœniculo secundam reperiri asserit, sive ad aperiendum, sive ad discutendum; hinc variolis, & morbillis laborantibus decocto Fœniculi vel seminis vel radicum nihil salubrius esse dicit.

Radix est primaria ex radicibus quinque aperientibus majoribus. Ab Emmellero veluti antinephriticum egregium, & in renum doloribus stranguriisque polychrestum proponitur.

Ad quaranam, & alias febres intermittentes surcus radicum Fœniculi ad ℥iij. cum saccharo eduleatus, & jejuno propinatus in aurore decem diebus continuis eas fugat. Zacus qui facil, sed utile illud remedium vocat, observat plurimis in lecto bene cooperitis sudores plurimum moveri, aliis lentæ pituitæ secretum, aliis ructus foetidos, & crepitus. Omnes Fœniculi partes ventriculum roborant, ciborum concoctionem juvant, laxiorem nimis fibrarum ventriculi torum restituunt, & firmant, viscidum mucum parietibus hujus visceris in hærentem dissolvunt; semen præsertim, unum e quatuor seminibus calidis majoribus. Utiliter usurpatur quando post pastum adfuerint ægritudo, nausea, ructus, gravitas, tensio, inflatio ventriculi, item segnities, somnolentia, capitis dolor, & cætera id genus coctionis læsæ, & male peractæ signa a pituita mucaginosa in ventriculo collecta. Eam enim incidit, attenuat, rugas ventriculi blande detergit, spiritus influos recreat. Eodem modo quoque in intestinis operatur; quare in colicis flatulentis ejus usus est egregius: flatus enim sursum & deorsum expellit, unde tritum illud adagium:

Semen Fœniculi referat spiracula culi.

Pulvis ejus cum saccharo in vino a ℥ss. ad ℥j. ante vel post pastum bauritur, vel semina integra saccharo condita comeduntur. Attamen C. Hoffmannus has doses de semine siccò solum accipiendas existimat. Tantum abest enim, inquit, ut juvet

ut juvet concoctionem aliorum semen aut herba viridis, ut ipsa potius ad jutorio opus habeant. Confert quoque idem semen ad lactis generationem, chylum fluidiorem efficiendo, & lympham aut chylum in mammarum glandulis concrefcentem resolvendo. Radicis decoctum solum, vel etiam floribus Sambuci aut Lumbricis sociatum ad lactis abundantiam promovendam ab Ettmullero, & Helidæo de Padoanis commendatur: Idem præstant foliorum decoct. umaquosum, vel vinum, in quo herba vel semen macerata fuerunt.

Fœniculi semen medicamentis thoracis admixtum æsthmaticos juvat, veteri tussi, & contumaci medetur.

In oculorum vero affectionibus herba tota ejusque semen est commendatissima, illis in primis quorum visio lucubrationibus nocturnis admodum debilitata fuit. Seminum pulvis cum saccharo quotidie mane jejuno ventriculo sumitur. Arnaldus Villanovanus semen hoc aceto infusum, exsiccatum, cum Cinnamomi, & sacchari momento permixtum commendat ad visionem integram conservandam, debilem, & jam fere extinctam etiam in octuagenariis restituendam. Ad caliginosos oculos nihil hoc semine efficacius, inquit H. Tragus. Idem præstat succus foliorum aut radicis, & aqua distillata, tum intus sumpta, tum oculis indita. J. Crato Medicus-Celareus, referente Raio, quemdam vidit ex suffusione curatum facillis mo remedio, radicibus nempe Fœniculi in vino coctis, & decocto oculi sæpius applicato.

Seminum pulvis cum pulveribus solventibus utiliter miscetur in cataplasmatis, & fomentis solventibus.

Oleum essentielle ex seminibus exsiccatis aqua maceratis distillatur vi carminativa insigni præditum. Guttæ sex, decem vel duodecim saccharo exceptæ, & ex vino sumptæ dolores colicos flatulentos disentiunt, ciborum concoctionem promovent, & perficiunt: ex lacte aut decocto pectorali, tussientibus, & æsthmaticis conferunt.

Aquam ex tota planta distillatam servant officinæ ad collyria utilem. Herba tota juleculis, & sorbitionibus incocta ad corpus obesum extenuandum utilis esse perhibetur.

Semen adhibetur sæpissime ad corrigenda purgania.

24. Radic. Fœniculi ʒij. Lenticum excorticatar. ʒß. Caricas ping. n. iij. Coq. in aq. comm. ℥iiij. ad ℔ij. Sub finem coctionis adde fol. Scordii, M. s. semini. Fœnicul. ʒj. Fiat colatura pro potu in morbillis & variolis ad exanthematum eruptionem promovendam.

24. Rad. Fœnicul. ʒij. Semin. Fœniculi ʒß. Flor. Sambuc. M. j. Coq. in aq. comm. ℥iiij. ad ℔ij. F. decoctum pro potu solito in lactis immixtione. Vel

24. Sem. Fœnicul. dulc. pulver. ʒß. Pulver. Lumbr. terrestr. ʒj. Fiat pulvis jejuno ventriculo sumendus.

24. Rad. Helenii ʒj. Semin. Fœnicul. contus. ʒß. Passular. ʒß. cum. aq. f. q. F. decoct. in tussi & asthmate.

24. Mucaginis gumm. Tragacanthæ cum aq. Hyssop. extract. & ad syrupi consistentiam redact. ʒij. Syrup. de Erysim. ʒß. Olei amygdalar. dulc. ʒj. Olei essential. Fœnicul. gutt. x. F. Lohoch. in asthmate.

24. Fœniculi dulcis ʒj. Anisi ʒß. Olei distillati Fœniculi gut. j. Sacchar candi ʒß. M. F. pulvis contra tormina.

R 2

Fœni-

Fœniculi viridis comæ acetariis dum adhuc tenellæ sunt permixtæ suavitatem addunt. Pisces sive asserventur muria conditi, sive elixentur, sive craticula assentur, Fœniculi foliis involvuntur a nonnullis ut durent, & ut sapidiorez fiant.

Germina Fœniculi teneriora, antequam caulescant, cum superna radicis parte recisa, cum oleo, & pipere mensis secundis adjiciunt Itali, & Narhonenfes Galli eodem modo, quo nos Apium dulce, *Celery*.

Radices Fœniculi usurpantur in syrup. aperiente cachectico *D. Daquin*, syrup. Chalybeato aper. cathartico *D. Daquin Pb. Reg.* antiasthmatico, & antinephriticum *eiusdem*, de Cichor. comp. *Pb. Reg.* de Artemisia *eiusdem*, de Præssio, & de 5 rad. aper. *Mesuae*. Semina in Theriaca, Mithridatio, confectioe Hamech, Electuar. Catholico cum rheo dupl. pulvere Diarrhodon *Abbatis Nicol. præpositi*, Philonio magno, Diaphœnico, Benedicta laxativa, de Pyllo, El. de Citro. Folia in aq. vulneraria *Penicberii collectan. pharmaceutic.*

FÆNUM-GRÆCUM.

Fœnum-Græcum, & Fœnu-Græcum, Off. Fœnum-Græcum sativum *C. B. P.* 348. *Inst. R. H.* 409. Fœnu-Græcum *J. B.* 2. 363. *Dod. Pempt.* 536. *Trag.* 397. Fœnum-Græcum *Gerard. Rasi Hist.* 954 vulgo, *Fenu Græc.*

E radice tenui, candida, simplici, lignosa, caulem emittit singularem semicubitalem, tenuem, virentem, intus concavum, in alas ramosque divisum; folia ex uno pediculo terna, pratenfis Trifolio similia, minorâ tamen, in ambitu leviter-serrata, modo oblonga, modo latiora quam longiora, superna parte virentia, inferna cineracea: flores ex foliorum alis nascentes, papilionaceos, subcandidos, filiquas vero longas, palmares, & sesquipalmares, nonnihil planas, falcatas, graciles, angustas, compressas, mucrone tenui, longo, inani, seminibus scetas non magnis, rhomboidiformibus, linea cum cavitate quadam oblique ab angulo ad angulum impressa, sulcatis, odoratis cum gravitate nonnulla, & flavescenibus. In campis feritur. Semen solum usitatum.

Analysi chymica, ex seminum Fœnu-Græci lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, seminis, odorem saporemque referentis, obscure salis, & obscure acidi 3xij. 3j. gr. iij. humoris rufescentis, odoris, & saporis empyreumatici, subsalis, & acidi 3ix. 3v. gran. xxxj. humoris rufi, sale volatili urinoso copioso imprægnati 3vi. 3v. gr. xlviij. salis volatilis urinosi conereti 3j. gr. xxviij. olei rami essentialis, tum empyreumatici, fluidi lbj. 3j. 3j. gr. xxxj. Massa nigra in retorta residua pendebat lbj. 3ij. 3iiij. gran. xlvij. quæ rite calcinata reliquit cinerum flavescenrium 3ij. gr. xij. ex quibus lixivio salis fixi alcali 3vj. gr. vij. extracta sunt. Parium jactura in distillatione fuit 3xij. 3ij. gr. xxvj. in calcinatione lbj. 3iiij. gr. xxxvj.

Fœnu-Græci semina saporem mucilaginosum referunt odoremque gratum cum quadam gravedine. Salem ammoniacalem continere videntur cum malio oleo tum tenui tum crasso implicitum, & terra copiosa quibuscum mucosum compositum exurgit, quod ex eis cum aqua coctis extrahi potest.

Fa-

Farina seminis tumores emollit, digerit, maturat, discutit, doloresque compescit, usque adeo frequentis est ut in fomentis & cataplasmatibus emollientibus & maturantibus, vel discutientibus fere omnibus usurpetur, vel ejus mucilago coctione cum aqua extracta. In clysteribus emollientibus, carminantibus & anodynis utiliter præscribitur ad flatus discutandos, humorum acrimoniam obtundendam, intestina erosa mucos obducenda, in colicis, alvi fluxibus & dysenteria. Insuper conducit ejus mucilago ad oculorum sugillationes discutendas. Interne rarissime usurpatur. In erysipellate foris sequentem Th. Sydenham laudat.

24. Semin. Fœnu-Gr. & Lini ana ʒʒ. Rad. Althææ, Bulbor. Lilior. ana ʒij. Folior. Malv. Sambuc. Verbasci ana M. ij. Flor. Melilot. Hyperic. & Centaur. minor. ana M. j. Coq. in f. q. aq. ad ℥iij. F. colatura. Usus tempore singulis decocti libris adde spiritus vini ʒij. Pars affecta calide foveatur.

24. Folior. & flor. Verbasci M. j. Furfuris triticeæ Mʒ. semin. Fœnugr. & Lini ana ʒij. Coq. in aq. vel lactis q. s. Fiat Enema in teneſmo & dysenteria.

24. Radic. Althææ & Lilior. minutim incisarum ana ʒij. Fol. Malvæ, Althææ, Senecionis, Violariz, Parietar. & Brancæ ursinz ana M. j. Coq. ex arte in aq. comm. ℥vj. ad putrilaginem usque. Deinde contunde in mortario marmoreo, & per cribrum cerne: colaturam & pultem secretam cum farinæ Lini & Fœnu-Græci ana ʒij. & oleor. Lilior. & Chamæmel. ana ʒij. coq. igne lento sæpius agitando ad debiram usque spissitudinem, & fiat cataplasma emolliens & maturans.

24. Farinæ Fœnu-Græci ʒij. Fermenti veter. ʒj. Sercor. columbin. ʒij. Olei Chamæmel. ʒʒ. Mell. ʒj. Contunde. M. F. cataplasma in maturandis abscessibus.

24. Radicum Cyclamin. Bryon. & Cucumer. agrestis ana ʒij. Folior. Absinth. & Mercurial. ana M. ij. Florum Chamæmeli & Meliloti ana M. j. Coquantur in aq. comm. ℥iij. & vini albi sub finem additi ℥ij. ad putrilaginem usque. Colaturæ & pulci tractæ adde farinæ Fœnu-Græci & Lupinor. Pulver. Absinth. Cumini Fœnicul. & Baccar. Lauri ana ʒj. F. ex arte cataplasma discutiens & resolvens.

Ad ischiadem, arthriticos dolores & tumores mammarum sequens cataplasma a J. Rajo commendatur.

24. Semin. Fœnu-Græci in melicrato cocti ad dissolutionem usque q. v. quod deinde consundatur, & iterum cum melle coquatur ad cataplasmatiz spissitudinem quod super pannum extensum parti dolenti applicetur.

Insuper conducit ejus mucilago ad oculorum sugillationes discutendas; & a S. Pauli ut optimum ophthalmicum commendatur. Laudatur quoque a Riverio in ophthalmia. Postulat autem Riverius ut Fœnu Græci semen, aniequam decoquatur vel ex eo mucilago extrahatur, excutiat per cribrum, ut pulvis quo abundat, auferatur, postmodum vero aqua frequenter ablatur.

24. Mucilaginis seminum Fœnu-Græci & Cydonior. extractæ in aqua Rosar. & Euphrasiz ana ʒʒ. Trochiscor. albor. Rhaziz sine Opio ʒj. Tuthiz pp. ʒʒ. F. collyrium in ophthalmia.

24. Pulpæ Pomor. dulc. ad consistentiam pulvis in aq. Fœniculi & Verbenæ

Geoffroy Tom. II.

R. 3

benæ

benæ coctæ ℞. Mucilaginis Fœnu-Græci aq. Rosar. extract. ℥j. Lapid. Hæmatitis exquisitissime triti ℥j. Camphoræ & Tuihiæ pp. ana ℥j. Bol. armen. q. l. Fiat epithema pro oculo in suggillationibus.

S. Pauli refert se aliquoties observavisse quod licet promiscue Fœnu-Græci semen commendetur utrique sexui ad alvum adstrictam emolliendam aut ad sedanda ventris tormina receptum in clysteribus, facile tamen nonnullas mulieres odore illius offendi, & præterim illas, quæ hysterica passioni obnoxie sunt. Quare abstinendum esse suadet a Fœnu-Græco in præscribendis illis clysteribus lequiori sexui.

Fœnu-Græci semen usurpatur in Syrup. de Marubio *Mesue & Iohoc facio ejusdem*, in ung. de Althæa, mundificativo de resina, martiato, emplastr. Dyachylo, de mucaginibus & de meliloto *Ph. Regiæ*.

FRAGARIA.

Fragaria, *Off.* cujus fructus Fragum: Fragaria vulgaris *C. B. P.* 326. & *Inf.* *R. H.* 295. Fragaria ferens Fraga rubra *J. B.* 2. 394. Fragaria & Fraga *Dod. Pempt.* 672. Fragula *Cordi*: Fragum & Trifolium Fragiferum *Tabern. Icon.* 118. Fragaria *Gerard. Raii histor.* 609. vulgo, *Fraizer*, & fructus *Fraise*.

Ex radice diuturna, subrusa, multis fibris capillata, gustu adstringente, pediculos palmares, tenues, lanuginosos & in summitate ramosos promit, quorum nonnulli folia, alii flores sustinent, tenuia quædam edit flagella proserpentina, ad intervalla nodosa & foliosa, ad nodos radices agentia, quibus late se propagat: folia autem proferit in uno pediculo terna, oblonga, lata, Pentaphylli similia, venosa, hirsuta, per ambitum ferrata, superius virentia, inferius albidiora: flores quatuor aut quinque ab uno pediculo exeunt rosacei, quinque petalis albidis in orbem positos constantes, staminulis numerosis, brevibus, apices luteos sustinentibus, pistillo globoso, & calyce e decem partibus seu segmentis composito. Pistillum deinde abit in fructum sere globosum vel ovato-acuminatum, edulem, carnosum, mollem, per maturitatem rubrum, quandoque, sed raro albicantem, dulci vinosoque succo prægnantem, odoratum: cui semina multa, exigua, extrinsecus adhærescunt. In sylvis & locis umbrosis sponte nascitur & in hortis colitur, ubi lætius viret, & Fraga fert crassiora & suaviora. Fructus inter edulia usus sunt frequentioris: inter medicamenta diuretica & aperientia radices & folia.

Analyti chimica, ex Fragorum maturor. ℔v. per B. V. distillatis prodierunt humoris limpidi, odoris & saporis fragrantis & vinosi, grati, primo obscure acidi, deinde magis aperte acidi ℔iij. ℥ij. humoris limpidi, manifeste acidi, subausteri, ℥xiiij. ℥vij. Massa sicca in alambice residua per retortam distillata præbuit humoris rufescentis, empyreumatici, manifeste acidi & adstringentis ℥j. ℥vj. gr. xxxvj. olei spissi ad instar extracti ℥j. ℥v. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥j. ℥iiij. quæ per 16. ho as in crucibulo calcinata reliquit cinerum e cinereo fulcorum ℥vj. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥ij. gr. xx. extracta sunt. Partium jacketura in distillatione fuit ℥ix. ℥j. in calcinatione ℥vj.

Fraga

Fraga saporem vinosum gratum obtinent, succo vinoso donantur cum multo mucō, seu terreis & aquosis partibus permixto & temperato. Si eorum succus fermentescat, vinosus fit, ex quo spiritus ardens extrahi potest, ac tandem diuturniori fermentatione acescit, putrescit & corrumpitur. Foliorum succus chartam cæruleam rubro colore leviter tingit, intensius vero radicum succus, & saporem aliquantisper stypticum, amaricantem referunt. Radices & folia sale essentiali donari videntur, tartareo nitroso, multo sulphure & terra adstringente simul mixtis.

Fraga refrigerant, sitim sedant, æstum ventriculi compescunt, alvum emolliunt, urinam provocant, arenulas expellunt, parum nutriendi, fugacemque alimoniam corpori exhibent. Hæc maxime secundis mensis apponuntur, & saccharo insperso comeduntur vel ex lactis cremore, vel vino aut aqua irrigata. Minus tutum est ea comedere cum lacte, quod facile in ventriculo coagulatur ab acido Fragorum evoluto sale. Vino quondam horum fructuum commentitiam frigiditatem corrigere tentant, sed perperam: imo, vini admixtione sæpe difficilius coquantur in ventriculo, nec adeo facile mucosa eorum pulpa dissolvitur, unde diuturniori mora effervescit & acescit, vel corrumpitur; aqua vero facilius dissolvitur, coquitur, & citius intestina permeat. Eligenda bene matura, & lotionem in aqua ab omni terra & eluvie repurgata. Picrocholis convenire dicuntur & siticulosi. Verum in ventriculo & intestinis imbecillioribus aut saburra mucosa vel etiam acida onulis facile corrumpuntur aut acescunt, cruditatesque pariunt generi nervoso noxias, ut in quibusdam hypochondriacis observare est. Nonnunquam etiam si majori copia ingerantur, vinosi spiritibus fermentatione evolutis, viscerum æstum augent, aut caput tentant & aliquo modo inebriant, nec gravidis majori copia concedenda, nam præterquam quod colicam in iisdem facile concitant, metuendum est, ne propter vim diureticam sætem pellant.

Insuper aperientia sunt & splenitica dicuntur, viscerum obstructions referant, partibus suis tenuibus & volatilibus humores lentos & viscidos dissolvendo, & blanda adstrictione partium fibras roborando. Renes & vesicam expurgant, unde inter antinephritica recensentur. Mirandum sane quod notat C. Hoffmannus *L. 2. de Med. offic. ff. 16.* se vidisse in quodam, qui copiosius comederat Fraga, multas illorum particulas in matula, ita ut renes putarentur colliquati. Certe quidem urina eorum qui assidue Fraga comedunt, fragranti Fragorum odore perfunditur.

G. Fabricius Hildanus *Centur. 5. obs. 38.* cuiusdam foeminae mentionem facit quæ, post esum Fragorum, jejuno adhuc ventriculo, horrendis symptomatibus statim vexata fuit, ut lipothymia, vertigine, hypochondriorum tumefactione, dolore ventriculi &c. Nec nisi post exhibitum vomitorium restituta fuit. Sed hic notandum est foeminam comedisse hæc fraga illota, sine vino aut saccharo. Unde recte J. Rajus existimat eos fructus venenatos fuisse ab urina, saliva aut habitu serpentis vel bufonis (qui *Fragis* summopere delectari dicuntur,) vel insecti alicujus punctura, quod succum quemdam noxium ipsis immiserat. Sunt, ut observat idem Rajus, qui ex Fragorum solo odore in animi deliquium incidunt. Narrat quoque post Velichium virginem quamdam Austriacam

ex esu Fragorum epilepticam factam fuisse, atque exinde quotannis tempore quo efflorescunt, paroxysmo obnoxiam fuisse. Sed observationes illæ de Fragorum noxis peculiaria tantum subiecta respiciunt; unde nihil ex eis adversus Fragorum salubritatem concludendum est. Ex Fragorum succo julapia parantur æstate gratissima & utilia ad sitim extinguendam, & sanguinis æstum compescendum; in febribus etiam utiliter propinantur.

Aqua ex Fragis distillatur in officinis pharmaceuticis ad usum cosmeticum præsertim: siquidem illius faciei maculas & lentigines abstergit. Ad hunc usum tamen aqua ex tota planta distillata a C. Hoffmanno utpote magis abstergens anteponitur. At præstantiores dotes ab auctoribus aquæ Fragorum tribuuntur. Cor enim confortare dicitur, vitia thoracis expurgare, morbum arcuatum discutere, sanguinem purgare, ulceribus oris & anginæ auxiliari gargarizato, calculum renum comminueret, alia etiam juvamenta præstare, si H. Trago credimus. Eadem in calida viscerum intemperie a C. Hoffmanno commendatur, iis præsertim qui pustulosam habent faciem, qui scabie vel in toto, vel in parte, pruriginosa & sicca afficiuntur: singulis diebus mane ʒjss. præterpropter propinatur. Eandem eodem modo sumptam calculosis proponit. Verum aliam longe præstantiorem adversus calculum Fragorum aquam seu potius tincturam J. Bauhinus Gesnero a multis calculosis commendatam refert, quæ sic præparatur. Fraga matura in phialam aqua ardente optima plenam conjicito, in aquam ardentem post horas quadraginta circiter colatam rursus nova Fraga injecto, ac sic relinquito optime testâ, ac munita, ne aliquid expiret. Cochlear unum sumatur mane jejunio ventriculo cum sacchari candi tantillo. At vero licet J. Bauhinus gratum, probatum, efficacissimumque hoc remedium prædicet, dubito tamen de ejus ad calculum comminuendum efficacia. Reipsa renes & vias urinarias stimulando, arenulas & suis larebris renalibus expellere potest; sed non semper felici eventu, imo nonnunquam pessimo. Si enim arenulæ majores sint quam ut per ureteres descendere queant, incassum propelluntur in eorum officia, ubi dolores nephriticos, diros cruciatus, mictionem truentam, renum exulcerationem, & alia mala excitabunt. Quod quidem Em. König de hac aqua spirituosâ observavit, qui in *Regno suo vegetabili* refert incautum ejus usum ulcus renum in quodam senatore Basileensi induxisse.

Fragariæ radices & folia diuretica sunt & aperientia, & crebri usus in viscerum obstructionibus, in ictero. Aliquantisper tamen adstringunt, unde adversus hæmorrhagias, alvi fluxus, dysenterias nonnunquam præscribuntur. Catarrhos & distillationes cohibere dicuntur, tum adstrictione sua partes roborando, tum serum sanguinis per urinarias vias educendo. In decoctis & ptisanis diureticis & aperientibus frequentur usurpantur, radices præsertim quæ Oxalydis radicibus consociari solent, & decoctum subrubrum efficiunt. Ubi observandum est etiam harum radicum decoctum assidue & assatim epotum alvinis excrementis rubentem colorem sæcui vini aut carniū loturæ similem inducere, ita ut primo intuitu ægrotans fluxu hepatico affici videatur. Sed mutato potu statim

statim alvinarum fœcum color mutatur . G. Hoffman. asserit Fragariam præstare egregium diureticum in febribus colliquativis , ad aquam intercurtem ad renes derivandam . Ejusdem decoctum adversus icterum utile esse S. Pauli testatur : & hoc decoctum palato gratum puerulis ictero laborantibus qui Chelidonii decoctum plerumque averfantur parare solebat .

24. Herbæ Fragariæ cum toto (ut loqui amant Medici , hoc est , plantæ integræ cum foliis , radicibus & flagellis) Cuscute ana M. j. Uvar. passular. Corinthiacar. concisar. vel contusar. ʒij. Tartari albi pulver. ʒss. Coq. in f. q. decocti Hord. ab remanentiam ʒss. in qua dissolve Syrup. Berberis ʒj.

Idem refert Fragariam in vino rubro coctam , & aliquoties pubi , & pectini impositam instar cataplasmatis , album mulierum fluxum sistere , quod etiam in pollutione nocturna & gonorrhœa non virulenta efficacissimum comperit .

Nobelius in *Miscell. natur. curiosor. Dec. 3. ann. 3. observ. 81.* vim traumaticam insignem Fragariæ assignat , & aliquot observationibus ulcerum pedum , tibiærum aut crurum sanatorum & tumorum œdematosorum resolutorum sola foliorum Fragariæ contusorum applicatione comprobat . Quam quidem virtutem tribuit tum particulis salino-sulphureis tenuibus , quibus hæc planta turget , quæ stagnantem sub cute lympham viscidiorum resolvere , frigidum ulcusculorum acorem immutare & humorum circuitum in loco affecto restituere valent , tum particulis suis austeris ac terreis fixis , quæ laxatas cutis fibras stringunt , atque ita resolutam lympham per cutis poros exprimunt , patentia ulcusculorum ora contrahunt , & illa , nova succrescente carne , consolidant .

Ad pernioles , seu fissuras , & intertrimenta manuum , & pedum hyberno tempore a summis algoribus provenientia , præcavenda , Fraga contusa cataplasmatis modo , partibus quæ per hyemem affici solent , æstate per aliquot noctes applicantur .

Fragariæ folia usurpantur in unguento martiato magno *Fernelii* & ungu. mundificativo de *Apio Bauderoni* .

FRAXINUS.

FRaxinus *Off.* Fraxinus excelsior C. B. P. 416. *Inst. R. H.* 577. Fraxinus vulgarior J. B. 1. 174. *Raii Hist.* 1702. Fraxinus *Dod. Pempt.* 833. Fraxinus vulgaris *Parkinson* : vulgo , *Frêne* .

Alia , & procera arbor Fraxinus caudice assurgit simplici , recto , crassitudinis subinde haud exiguæ , frequenter mediocri : corice contegitur lævi , cinereo : lignum albidum est , læve , durum , & crispis pectinibus discursu undulatum : rami hujus ex adverso positi , teneriores recensque enati geniculis aliquot nodosi sunt , medullamque intrus habent candidam , & fungosam , sed vetustiores toti lignosi geniculis , ac medulla carent . Frondes pinnatæ ex compluribus foliis constant , quadruplici , quintuplici , vel etiam sextuplici pinnarum conjugatione quam impar folium terminat , ad costam annexis , oblongis , latis , Laurinis similibus , sed mollioribus , dilutius virentibus , ac nequaquam odoratis , per ambitum leviter serratis , & sicco sapore , subamaro , acri , ac mordaci præditis . A tenerioribus ramis juxta foliorum exortum aliquot prodeunt simul

simul dependentes pediculi ramosi, qui flores plurimos sustinent apetalos, exiguos, gemino apice donatos, & pistillo bicorni quibus succedunt fructus plani, membranacei, oblongi, angusti, avicularum nonnullarum linguis assimiles, sescunciam longi, parum culmo latiores, sulci, in quibus semen perficitur ejusdem pene formæ, subrubrum, intus album, medullosum, gustu amaricante ac medicato. Radices summa tellure gaudent & in superficie terræ late extenduntur. In sylvis agri Parisiensis sponte crescit. Cortex, lignum, fructus usitata sunt.

Analyti chymica, ex Fraxini foliorum recentium ℥v. distillatis prodierunt humoris limpidi, fere inodori & insipidi, obscure acidi ℥iv. ℥v. humoris primo limpidi, magis ac magis acidi manifeste, deinde rufi, leviter empyreumatici, obscure austeri ℥iij. ℥j. gr. liv. humoris rufi empyreumatici, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥ij. ℥iv. gr. xxvj. olei spissi ad instar extracti ℥iij. gr. xxxvj. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥vj. ℥v. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥. gr. xxxvj. ex quibus salis fixi mere alcali ℥iv. gr. xxv. lixivio sunt extracta. Partium iactura in distillatione fuit ℥iv. gr. xvij. in calcinatione ℥iv. ℥iij. gr. xxxvj.

Ex cortice Fraxini recentis ℥v. prodierunt humoris limpidi, inodori, subacidi, cum levi acredine ℥xij. humoris limpidi, acidimagis ac magis, subausteri ℥ij. ℥iij. ℥iij. gr. lx. humoris rufi, sulci, empyreumatici, intense acidi, acris, urinosi & austeri ℥viij. ℥iv. gr. xvij. olei spissi & aqua gravioris ℥ij. ℥ij. Massa in retorta residua semicalcinata ob retortæ fissuram pendebat ℥ij. ℥v. quæ calcinata reliquit cinerum albicantium ℥iv. ℥iv. gr. liv. ex quibus salis fixi mere alcali ℥ij. gr. xlv. lixivio extracta sunt. Partium iactura uberior ob fissuram æquavit ℥ij. ℥v. gr. lxxvj. in calcinatione ℥xij. gr. xvij.

In Fraxino Cl. Tournefortius salem essentialem contrahi dicit fere similem Oxyali Diaphoretico Angeli Salæ, cum multo sulphure, & terra conjunctum. Corticis infusum vel decoctum vitrioli solutionem Galliarum instar nigro colore tingit.

Folii vis vulneraria assignatur; cortici splenetica, diuretica, & febrifuga: semini diuretica, & aphrodisiaca. Ligno quoque visexsicicans & sudorifera necnon styptica a nonnullis tribuitur.

Folia interne raro adhibentur. Quidam tamen foliorum & summatarum succum quotidie mane pauca quantitate potum hydropicis conducere dicunt. Ettmullerus eadem recentia contusa vulneribus, recentibus, & locis, quibus hæmorrhagiæ contingunt, imposita, revera balsami vulnerarii vices sustinere scribit, & vulgarem rusticorum curationem esse refert. Aqua ex Fraxini foliis distillata ad sordidatam commendatur, referente Ettmullero; eandem potam ictero & calculo mederi Tragus scribit.

Cortex, & lignum Fraxini siccant & attenuant: lienis duritiem specificè emollire dicuntur; unde & in polliculis ex hoc ligno factis, si quis assidue bibat, lienem extenuari ajunt, eoque nomine & corticis decoctum, quidam exhibent. Idem cortex febrifugus dicitur, & a nonnullis in locum Kinæ Kinæ substituitur, sed perperam. Lignum etiam, referente Ettmullero a nonnullis Germanorum Guajacum dicitur & ab illis diureticum, & sudoriferum habetur, licet hoc ligno viribus longe

longe inferius sit. Multa de hujus ligni vi vulneraria sympathica proferruntur, quæ velut stilia rejicimus.

Sal ex corticis Fraxini cineribus elixus urinas potenter movet, quod quidem illi commune est cum reliquis salibus alcali lixiviosis. Idem sal, auctore S. Paulli ex Fraxini tenellis ramulis & corticibus una extractus mire convenit variolis & morbillis laborare incipientibus, in aqua Cardui benedicti, cum tantillo syrupi Granatorum vel Rubi Idæi dilutus, a gr. v. ad xv. vel etiam cum Cornu Cervi philosophice præparato remixtus: potentissime enim, inquit, sudores movet.

Corticis & summitatum Fraxini cinis nodulo exceptus, cauterii potentialis supplet vicem madefactus & impositus, ut restatur post Lobelium Simon Paulli, indeque foraminulum contractum reteratum, immisso Hederæ folio, fovetur.

Ramulus Fraxini recens avulsus & una extremitate igni commissus, altera exsudat liquorem seu aquam, quæ maxime commendatur in lurdinare.

Semen quod in Officinis pharmaceuticis Ornithoglossum, Orneoglossum, Lingua avis, Passerina & Anserina dicitur, quod avium linguam quodammodo referat, sale volatili acri nitroso turget, & diureticum est: propterea nephriticis & calculosis commendatur. Hujus seminis post plenam maturitatem exsiccati pulvis ad ʒi. non tantum ad calculum, sed etiam ad icterum, & hydropem remedium præstantissimum a J. Rajo dicitur. Idem etiam sæpius ex vino Rhenano exhibitum ad obesitatem laudatur, nam corpore obesos ad maciem reducit. Insuper acrimonia sua veneris stimulos excitare dicitur. Cum nucleis pistaceis, pineis, & Saccharo miscetur, & comeditur.

Semen illud distillatum oleum fundit empyreumaticum, ab empyreumate per rectificationem liberandum, perquam acre, & potenter diureticum, & velut insigne antinephriticum a Glaubero in sua *Pharmacia Spagyrica*, magnopere laudatum. Semina Fraxini viridia, seu potius fructus collecti ante maturitatem in Anglia, narrante Rajo, muria ex aceto & sale congiuntur pro acetariis.

De antipathia inter serpentes & hujus arboris ramos foliaque Plinius mira refert. Tanta vis est, inquit, ut ne matutinas, occidentelæ umbras cum sint longissimæ, serpens ejus arboris attingat, adeo eam procul fugit. Experti prodimus, si fronde ea gyro claudatur ignis & serpens, in ignem potius quam in Fraxinum fugere serpentes. At Camerarius contrarium se expertum scribit in serpentibus Germanicis: & Moyses Charas in *Observ. & Experimentis de Piperis* asserit se facto circulo e foliis Fraxini, qui habuerat circa tres pedes diametri, viperam vivam in eum immisisse, quæ folia nihil verita, illico sub iis sese occultatum ivit.

Ligni materies ad plurima utilis, quippe quæ obedientissima, renacissima & durissima.

Fraxini semen usurpatur in electuario Diasatyrio Nicolai Myrepsi.

F U M A R I A.

Fumaria, & Fumus terræ, Off. Famaria Officinarum, & Dioscoridis flore purpureo, C. B. P. 143. & J. R. H. 422. Famaria vulgaris, J. B. 3. 201.

201. *Parkins. Raii Hest.* 405. *Fumaria*, *Dod. Pempt.* 59. *Capnos* ; *Fumaria*, *Lobel. Icon.* 757. *Fumus terræ*, *Brunfels. Thalii* : *Herba melancholifuga*, *Catalog. Altorffin* : *Cerefolium felinum* aut *Columbinum nonnullorum*, *Cprbej. Pharmac.* 36. vulgo, *Fume terre* ou *Fiel de terre*.

Fumariz radix tenuis, alba, modice fibrosa, recta dimissa; caulis nunc unus, nunc plures brachiati, angulosi, inanes, glabri, colore partim purpurante, partim in albo virente. Folia ima ex longis pediculis, latiusculis, & angulosis tenuiter dissecta ad umbellatarum fere modum, glauca, alternatim caulibus adnata. Flores congesti in spicam, quæ non e folii ala oritur, sed ex adversa caulis parte, tenues, oblongi, polypetali, anomali, papilionaceorum æmuli, ex duobus tantum petalis constantes quasi bilabiati, labio superiori in caudam abeunte, cum inferiori ad pediculum conjuncto. Inter hæc labia velut in palato pistillum positum est vagina obvolurum cum staminibus aliquot apicibus donatis. Singulis flosculis singuli succedunt fructus membranacei, cranio similes, subrotundi, minutuli, in quibus semen parvum, subrotundum, ex nigro virens, saporis amari, ingrati. In agris, & locis cultis sponte nascitur. Planta integra usurpatur, præsertim florida.

Analysi chymica, *Fumariz floridæ*, demptis radicibus, ℥v. per retortam distillatæ præbuerunt humoris limpidi, odoris, & saporis fere expertis, obscure acidi ℥j. ℥xv. ℥j. gr. lxxv. humoris primo limpidi, subacidi, deinde rufi, ac fusci, odore, & sapore panem rusticanum referentis, sub finem empyreumatici, manifeste acidi, ac tandem intense acidi, austeri ℥ij. ℥iij. ℥vj. gran. xlvij. humoris fusci, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥j. ℥iij. salis volatilis urinosi ℥j. olei syrupi ad instar spissi ℥j. ℥vj. gr. xv. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥iij. ℥v. gr. xxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥vij. gr. iij. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥iij. gr. xxx. extracta sunt. Partium iactura in distillatione fuit ℥iij. gr. xxvij. in calcinatione ℥ij. ℥vj. gr. xxxij.

Hæc planta intense amara est, & chartam cœruleam rubro colore inficit. Sale essentiali donatur ammoniacali cum aliqua salis mirabilis Glauberi portione, & multo sulphure conjuncto.

Fumaria purgat bilem, & humores adustos, verum magna dosi exhibitâ. C. Hoffmannus succum exhibet ab ℥v. ad ℥x. vel ℥xij. Ad alterandum ad ℥vj. propinari solet. Nostrates verno tempore herbam integram floridam ad M. j. in feri lactis ℥j. leviter decoquant, & decoctum percolatum cum syrupi Violarum ℥j. propinant. Diuturnam coctionem non fert; ea enim sale suo volatili orbat. Sanguinem fluidiorem efficit, humores tenaces potenter incidit, & sensim expurgat, obstructions aperit, ventriculum, & viscera roborat, urinas, & menses promovet. Hinc in cachexia, morbis chronicis, melancholicis, hypochondriacis, ictero, scorbuticis affectionibus plurimum commendatur: *Freitagius in Aurora Medicor.* dicit se hypochondriacis quos simul scorbutus affecerat, quique aliis remediis diu exagitati frustra fuerant, succum *Fumariz*, & *Cochleariz* in sero lactis caprilli, idque in primis verno tempore, cum successu exhibuisse. *Ettmullerus* succum *Fumariz* recenter expressum cum succo Buglossi, & sero lactis mixtum, & Vere mane calide sumptum

ptum in morbis cachecticis & melancholicis commendat. Riverius in *Obfero.* refert succi Fumariz $\mathfrak{z}\text{ij}$. cuidam ictero laboranti & vomitu frequenti vexato propinatis, prima exhibitione vomitum fuisse cohibitum, eodemque remedio per aliquot dies continuato morbum omnino sublatum fuisse.

In cutaneis affectionibus, scabie, pruritu, impetigine, serpigine, specificum medicamentum audit. Simon Paulli scabiosissimos ejus simplici infuso ex sero lactis vel decocto ex cerevisia se restituisse asserit. Necnon virgunculam quendam nobilem septennem delicatulam, scabie infestam, uniuersalibus præmissis, sequenti decocto non ingrato, paucis intermissis diebus fuisse restitutam refert.

24. Herbz Fumariz M. j. Fragariz, Cuscutz ana Mß. Radicum Taraxaci, Acetosz ana $\mathfrak{z}\text{ij}$. Cinnamomi acuti $\mathfrak{z}\text{ij}$. Coquantur in feri Tamarindinati q. l. F. colatura, quæ clarificata edulcetur cum syrupo Berberis q. l. Pro singulis hujus decocti \mathfrak{ss} . adde essentiz Plantaginis $\mathfrak{z}\text{ij}$. F. apozema sumendum ad $\mathfrak{z}\text{vj}$. tertia vel quarta quaque hora.

Aqua ex Fumaria distillata servatur in Officinis, quam diureticam & sudoriferam esse dicunt. Simon Paulli illam deficienti aquæ Cardui benedicti surrogare solebat. Alii hanc sudoriferam virtutem illi denegant, nisi cum Theriaca vel Mithridatio consocietur.

Camerarius ex Brassavola observat hujus plantæ pulvere sæpius exhibitto quendam a melancholia liberatum fuisse. Pulvis a \mathfrak{ss} . ad $\mathfrak{z}\text{j}$. exhibetur. Conserva Fumariz in Officinis præparatur. Ad eisdem usum ad \mathfrak{ss} . sumitur.

Extractum quoque conficitur non exiguz virtutis ad \mathfrak{ss} . vel $\mathfrak{z}\text{j}$. exhibitum. Cum ceteris extractis amaris in cachecticis affectionibus & viscerum obstructionibus optime consociatur.

25. Extractor. Fumariz, Gentianæ, Absynth. Centaur. minor. & Nasturtii aquatici, ana $\mathfrak{z}\text{j}$. Extractor. Elixir. propr. Paracelsi. Rhabarbar. & cortic. Peruvian. ana $\mathfrak{z}\text{ss}$. Croci martis aper. & cortic. malor. Aurantior. acrium pulverat. ana \mathfrak{ss} . Syr. Menthez crispæ q. l. M. F. opiata. Dosis \mathfrak{ss} . bis die.

Externe Fumariz succus vel aqua distillata oculis indita oculorum caliginem discutere vulgo creduntur. Idem succus, in quo gummi solutum fuit, oculis illius præcavet duplicaturam ciliorum. Ex succis Fumariz, Lapathi sylvestris, & Enulæ campanæ super ignem inspissatis cum axungia porcina mixtis unguentum conficitur adversus scabiem & cutaneos affectus perutile.

Ex Fumaria syrupus simplex & compositus in Officinis nonnumquam reperiuntur.

Usurpatur Fumaria in electuario de Psyllio, Electuar. Sennato, Confectione Hamech, Syrupo de Cichorio composito.

F U N G U S.

EX tot Fungorum generibus sive innoxiiis, sive nocivis, de duobus tantum mentionem faciemus qui apud nos innoxie esitari solent, quorum unus dicitur, Fungus campestris esculentus vulgarissimus; alter vero Fungus vernus & esculentus (Mouceron) nuncupatur. Quibus tertium genus adjiciemus ex nocivorum classe qui Fungus pulverulentus, Crepitus api, & Lycoperdon nuncupatur.

Fun-

Fungus campestris esculentus vulgarissimus, Fungus sativus equinus *Parishensium* : Fungus pileolo lato & rotundo, C. B. P. 370. *Inst. R. H.* 556. Fungus campestris, albus superne, inferne rubens, J. B. 3. 824. Fungi vulgarissimi, esculenti, *Label. Icon.* 271. IX. Genus esculentorum Fungorum, *Clus. Hist.* cclxviii. vulgo, *Champignon*.

Primo pullulatu globosus est, postmodum paulatim explicatus membranas seu lamellas infra ostentat rubentes, confertas : suberius inoffenso lævare æquabilis & albus, materia intus candidissima, pediculo brevi, crasso. Saporis & odoris est boni, primum e terra erumpens, ideoque antequam explicetur, colligendus est; nam vetustate vitium contrahit & noxius fit, gravem odorem contrahens & fuscum colorem. Fungus ille vulgarissimus in sylvis & in pascuis sponte passim creseit, & post pluvias potissimum exit. In suburbanis hortis olioriis, in pulvinis ex fimo equino & terra summa arte & industria constructis ac præparatis, colitur & uberime provenit. Horum pulvinorum construendorum & præparandorum ratio in *Commentariis Regiæ Scientiar. Academiæ Parisiensis ann. 1707. pag. 58.* a clariss. viro D. Tournefort accurate enarrata reperitur.

Fungus vernus & esculentus, *Moucceron* dictus, Fungus pileolo rotundiori, *Moucceron* dictus, *Inst. R. H.* 557. Fungi verni, *Moucceron* dicti odori & esculenti, J. B. 3. 823. vulgo, *Moucceron* ou *Moufferon*, quia sub musco communiter provenit & sub eo latitat.

Primulum erumpentes hi Fungi, pediculis brevibus fibras deorsum agentibus capitula sustinent Pilo magno æqualia : duodecuplo majorem molem nisi avellerentur, assecuturi; sed pediculus teres, & in imo crispus vel rugosus, ex terra non multum emergit. Cæterum clustis sunt, rotundique in summo, subtus vero, qua instar tentorii reflexi, rimosis e centro ad circumferentiam striis donati : ubi penitus excreverunt, campestrium Fungorum instar expanduntur. Tota vero substantia intus forisque candidi, gustus gratissimi, odorisque grati, & eapropter mensis lautioribus expetuntur.

Analyti chymica, ex Fungorum campestrium, vulgarissimorum, esculentorum, recentium liq. per retortam distillatis profluerunt humoris limpidi, Fungorum odorem & laporem referentis, magis ac magis ingrati ac tandem paulisper urinosi, obscure alcali & subfalsi liq. ʒxiiij. ʒviij. gr. xx. humoris limpidi, minus odori & sapidi, subfalsi liq. ʒvj. humoris limpidi, ejusdem odoris & saporis, subfalsi & alcali urinosi ʒxx. ʒviij. gr. xij. humoris rufi, deinde fusci, empyreumatici, sale volatili urinoso copioso imprægnati ʒj. ʒij. gr. xlvij. olei fluidi & limpidi ʒvj. gr. xlij. salis volatilis urinosi concreti ʒij. gr. x. Massa nigra in retorta residua pendebat ʒj. ʒiiij. gr. lvj. quæ rite calcinata cinerum reliquit ʒvj. gr. xlvij. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ʒij. gr. xxj. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ʒiiij. gr. xxix. in calcinatione ʒvj. gr. viij.

Fungi salem ammoniacalem essentialem continere videntur cujus acidam sale volatili urinoso copioso saturatum est, & cum oleo copioso ac pauca terra conjunctum. Hæc principia magna phlegmatis copia diluuntur. Ex actuoso illo sale volatili, urinoso, ammoniacali, oleoso, sapor & odor Fungorum; unde etiam eorum corruptio vel putrefactio facilis.

Si enim confusi sibi relinquantur ad putrescendum, in liquorem mucosum colliquescent, qui nullas salis-urinosis notas amplius præbet, sed falsi, & acidi salis evoluti. Urinosus enim sal volatilis avolat.

Fungus nonnullis a *funere*, vel a *funus*, & *Ago*, vel a *Fungus* dictus videtur, quia veneno suo ad funus velcentes deducit. Quidquid sit de etymo, Fungus certe hoc nomine non immerito male audit, ut qui avidè deglutientibus non raro funestus, & exitialis fuerit. Nam ut eos præteream Fungos qui se noxios latentur, & habitu ipso malum produunt; alii non pauci maligni cum sint, salubres simulant, adeoque incautos sæpe fallunt, & ad se colligendum invitant. Unde nos oblatores salubritate securos esse non sinunt colligentium vel imperitia, vel incuria, vel forte etiam malitia. Quin & salubres, & eculenti habiti vitium facile contrahunt, vel ex genio loci ubi nascuntur, vel ex natura succi quem combibunt, vel ex putridorum aut venenatorum vicinia, & afflatu. Quod si nihil horum sit, consententibus omnibus peritissimis Scriptoribus, vel optimè largius sumpti lædunt, ut qui pravam succum generent, ægre coquantur, strangulent, & bilis sursum, & deorsum eruptionem inducant. De his Aphanasius Kircherus *L. de Peste* sic loquitur. Fungus qualicumque sit semper malignus est, semper exitialis qualitarum apparatu instructus: cæsi non statim sentiantur, frequenter tamen comesus, nescio quid tamen occultæ machinationis interiore viscerum administratione moliantur. Apagete ergo, inquit J. Rajus, isthæ gulæ blandimenta. Quæ tanta, ut cum Plinio loquar, ancipitis cibi voluptas? An usque adeo vitæ tædet, ut eam tam vili ossa permuteamus, mortemque semper in procinctu stantem sollicitemus.

Symptomata gravissima, imo letalia, quæ a deleteriis Fungis excitantur, sunt maxime vomitus, præcordiorum oppressio, & anxietas, strangulationis sensus, ventris tormina, cardialgia, diarrhæa, dysenteria, animi deliquium, frigidus sudor, singultus, tremor partium. Forestus *De Venenis Observ. 2. p. 36.* solo interdum odore eos comitialis similique cerebri morbi, imo subitæ mortis causam extitisse scribit, & mulierem ex esu Fungorum in morbum gravissimum incidisse, & ab eo insanam permanisse refert. Hildanus *Centur. 4. Observ. 35.* memorat; symptomata pessima cuidam, qui manibus tantum Fungos versabat, accidisse.

Hæc symptomata quæ Fungi adeo celeriter in ventriculi, & intestinorum membranarum, & fibrarum nerveis concitant a particulari salino-sulphureis, subtilibus, acris, & causticis provenire videntur. Reipia exsiccata, & bene cum aqua calida eloti non ita nocent, quia partes illæ acres causæ exsiccatione vel lotione avolarunt aut extraxæ fuerunt: Nonnulli etiam eorum noxam emendare putant aceto vel oleo quæ eandem particulas sedunt vel involvunt. Verum quocumque modo etiam sumptuosissimo præparati, ad fimeum unde oriuntur relegandi sunt, fugiendique cane pejus, & angue ab omnibus sanitatis studiosis. Si quis vero forsitan venenatos comedent, nullum præsentius possem suadere auxilii genus, quam ut emeticum cum copioso lacte aut oleo bibat, quod & temperandæ acrimoniæ, & expellendæ ex ventriculi regione venenatæ materiæ erit accommodatissimum.

Fun-

Fungus pulverulentus, Crepitus lupi, & Lycoperdon, *Off.* Lycoperdon vulgare, *Inst. R. H.* 563. Fungus rotundus orbicularis, *C. B. P.* 374. Fungus orbicularis, *Dod. Descript. Pempt.* 484. Fungus pulverulentus, dictus Crepitus lupi, *J. B.* 3. 848. Fungus ovatus, Crepitus lupi, *Tragi* : vulgo, *Vesse de loup*.

Nullo fere conspicuo pediculo nititur : subrotundus est, nucis Juglandis plus minus magnitudine, membranofus, primo dum junior est, cute albicante subcinerea, eaque non lævi & æquali sed velut granulata lentus, includens pulpam initio mollem, candidam aut virescentem, deinde per tempus medullosam, levem, raram, spongiosam, lividam & veluti fuliginosam, quæ, dum corrumpitur, in tenuissimum, siccum, foetidum, & gustu adstringentem pulverem abit. Calceus crepitum edit, & fumum pulverulentum ac foetidissimum emittit.

Alia species est hujus Fungi, quæ tantam assequitur magnitudinem, ut caput humanum facile æquet aut excedat, cute membranea satis firma cinctus, in principio ex albo cinerea, cum tempore livida, substantia lenta, rara : siccus adeo levis est ille Fungus, ut caput humanum mole æquans unciale pondus quandoque non excedat. Dicitur Lycoperdon alpinum, maximum, cortice lacero, *Inst. R. H.* 563. n. XXXVI. generis perniciosorum Fungorum species 3. *Clusii Hist.* cclxxxvii. Fungus maximus rotundus pulverulentus dictus Germanis *Psoff*, *J. B.* 3. 848. Prior species in agro Parisiensi sponte provenit. Posterior in Alpibus, Germania, aliisque locis nascitur.

Analysi chymica, ex hujus Fungi recens collecti lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris primo limpidi, Fungorum odorem, saporemque leviter referentis, obscure salis, deinde rufescentis, alcali urinosi, ac tandem rufi, & sale volatili urinoso copioso imprægnati lbiiij. ℥viij. salis volatilil urinosi concreti gr. xxxviij. olei fluidi ℥iiij. gr. xv. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥iiij. ℥ij. gr. xxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum obscure cærulescentium ℥ij. gr. xxiiij. Lixivium horum cinerum per chartam bibulam transcolatum semper torbidum remansit, & ad tertias evaporatum glutinosum remansit & spissum pultis ad instar : tandem assiduo igne exsiccatum massam glutinis taurini similem reliquit siccam, quæ aeri exposita citissime humiditatem & lentorem contraxit : sicca pendebat ℥iiij. gr. i. Saporem salsum referebat. Sal ille fixus non mere alcali, sed salustus, aliquam olei portionem retinere videtur, quam in diuturna calcinatione numquam deserit. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥v. gr. lv. in calcinatione ℥iiij. gr. xij.

Ille Fungus salem essentielle ammoniacalem continet multo sale volatili urinoso saturatum cum oleo tenui, acri, copioso, terraque adstringente permixtum.

Interne ob metum veneni non exhibetur. Externe adstringit, incrassat, & humida absorbet, & sanguinem sistentibus medicamentis annumeratur. Vulneribus unde sanguis prorumpit exsiccat & pulveratus inspergitur, ulcera manantia exsiccat, hæmorrhoidum fluxum cohibet. Verustiores & jam maturitatem adepti, exsiccati & omni pulvere vacui in Germania a tonsoribus omnibus asservantur ad hos usus. Oculis tamen pulvis iste inimicus est, vehementissimaque ophtalmias incaute inspersus producit.

G A.

G A L E G A.

Galega, *Off.* Galega, vulgaris, floribus cœruleis, *C. B. P.* 352. Galega, *J. B.* 2. 342. *Dod. Pempt.* 548. *Raii Hist.* 911. Ruta capraria, *Fœnum Græcum* sylvestre, *Tabern. Icon.* Caprago, *Cæsalp.* 249. vulgo, *Galega*.

Hinc inde per terram spargit tenues radices, lignosas, albas, fibratas, diuturnas, aliquot continuis annis primo vere regerminantes: caules vero tollit bicubitales & altiores, striatos, inanes, ramis compluribus brachiatis: folia Vicæ pinnata, impari alam claudente, longiora, spinulam mollem ex extremitate proferentia, sapore leguminaceo: flores pedicularibus insident furculis ex foliorum alis exortis; jubam longam efficientes, penduli, papilionacei, colore albo, vel ex albo violaceo: quibus succedunt siliquæ teretes & quasi cylindracæ, tenues, longæ, erectæ, in quibus semina continentur plura, oblonga & veluti reniformia. In Italia sponte crescit: apud nos in hortis fertur. Herba usus est apud Italos crebrioris, apud nos vero rarioris.

Analysi chymica, Galega acidum phlegma copiosum, spiritus & salis concreti urinosis aliquantulum, mediocrem olei, exiguum vero terræ portionem præbet. Salem essentialem continere videtur ammoniacalem cum sulphure & terra adeo implicitum, ut mixtum mucaginosum consuevit.

Celeberrimum dicitur alexipharmacum & sudoriferum, venenum, in primis pestilentielle, potenter discutiens. Illius usus commendatur in petechiis expellendis, aliisque morbis pestilentialibus, ipsaque peste curanda, in morbillis, in epilepsia infantum, in ictibus serpentum & adversus lumbricos. Estur herba ipsa cruda vel cocta, vel succus ad cochlear unum aut alterum exhibetur: in iulculis & apozematibus alexitericis ad M. vj. præscribitur. Fabulam de duello lacertæ & viperæ a Foresto *L. 2. de falso urinarum judicio c. 5. p. 156.* relatam, ad vim ejus alexiteriam & vulnerariam comprobendam, sedulo omisimus.

Ex tota planta florida confusa & vino albo, macerata per sex dies, aqua distillatur, cui eadem virtutes tribuuntur. Ab ʒj. ad quatuor exhibetur.

G A L E O P S I S.

Tres plantæ sub hoc nomine in usum medicum veniunt, nempe Galeopsis five Urtica iners, magna, foetidissima; Galeopsis angustifolia foetida; & Galeopsis five Urtica iners flore luteo.

Galeopsis, Galiopsis, five Urtica iners, magna, foetidissima, *Off.* Galeopsis procerior, foetida, spicata, *Inst. R. H.* 185. Lamium maximum, Sylvaticum foetidum, *C. B. P.* 231. Galeopsis five Urtica iners, magna, foetidissima, *J. B.* 3. *App.* 853. Urtica herculea, *Tab. Icon.* 536. Galeopsis legitima Dioscoridis, *Parkin. R. H.* 548. Galeopsis vera, *Gerard. Emacul.* vulgo, *Grande Ortie puante*.

Radix sub terra reptat, fibras tenues & geniculis subinde dimittens. Caulis inde exurgunt cubitales aut sesquicubitales, quadrati, hirsuti, inanes,

Geoffroy Tom. II.

S

ramosi.

ramosi . Folia ex adverso bina , Urticæ majoris nonnihil latio-
ra , innocua lanugine obfita ; in ambitu serrata , pediculis longis infi-
dent , ea etiam quæ in caule sunt . In summis caulibus & ramulis flo-
res in spicas longas , angustas , verticillis non admodum crebris compo-
sitis digesti , monopetali , labiati purpurei , quorum labium superius lineis
albis picturatum cochlearis instar est excavatum , inferius vero in tres
partes divisum , medio segmento obtuso , longo , utrinque reflexo , la-
teralibus parvis , brevibus , cum staminibus purpureis , odorem foetidum ,
ac gravem spirantes . Ex calyce quinquipartito , brevi , parulo , surgit
pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum , ac quatuor veluti
embryonibus stipatum , qui deinde abeunt in totidem semina oblonga ,
mediocri magnitudine , per maturitatem nigra , in imo calyce recondi-
ta . Odor totius plantæ foetidus & ingratus admodum . Tota planta agri
Parisienfis incolæ in usum venit .

Galeopsis odorem foetidum bituminosum refert , saporem herbaceum
subalsum , aliquantisper adstringentem . Ejus succus chartæ cœruleæ colo-
rem non mutat . Unde salem ejus essentialem Cl. Tournefortius asserit
sali terræ naturali similem , compositum ex sale ammoniaco , nitro &
sale cibario , qui hæc in planta multo viscoso phlegmati uti & sulphuri
& terræ immixtum est .

Valneraria est , tumores resolvit ; & dolores demulcet . Infusum fo-
liorum & florum a rusticis exhiberi solet in pleuritide , nephritide , &
adversus scrophulas . Doctor Boevles apud Rajum herbæ decoctum , vel
ejusdem exsiccatæ pulverem commendat in affectibus stenis . Folia recen-
tia contusa & phagedenæ imposita , eam brevi sanant . Oleum in quo
folia & flores per aliquod tempus macerata sunt plurimum valet adversus
ambusta & tendinum vulnera .

Galeopsis angustifolia foetida , Off. Galeopsis palustris , Beticæ folio ,
flore variegato , *Inst. R. H.* 185. *Siachys palustris foetida* , C. B. P. 236.
Galeopsis angustifolia foetida , J. B. 3. *App.* 854. *Siachys aquatica* , *Tab-
bern. Icon.* 377. *Clymenum minus* , *Dalechamptii Lupd.* 1357. *Sideritis*
Anglica strumosa radice , *Parkinson. Raii Hist.* 563. *Panax coloni* , &
Marrubium aquaticum acutum , *Gerar. Ternola* , *Cesal. vulgo* , *Petite*
Ortie puante .

Radice est geniculata , reptante , tumoribus inæquali & velut strumo-
sa : caulibus bicubitalibus & tricubitalibus , modice rubentibus , hirsutis ,
asperis , quadratis , inanibus : foliis ex nodis binis ex adverso nascenti-
bus , angustis , acuminatis , hirsutis , mollibus , adversa folii costa rube-
scente , nonnihil asperis , per ambitum serratis , odore gravi , sapore sub-
amaro : floribus spicatis , verticillatis , monopetalis , labiatis , purpura-
scentibus , labello variegato : calyculo brevi , quinquipartito : seminibus
quaternis , nigris , niidis fere triquetris . In locis humidis sylvarum &
secundum rivulorum ripas sponte nascitur .

Folia amara sunt & foetida , & chartæ cœruleæ mutationem fere nul-
lam eorum succus affert . Salem essentialem continere videntur ammoni-
acalem oleo multo implicitum .

Eadem huic tribuuntur virtutes quæ priori . Valneraria est insignis .
Gerardus hujus herbæ efficaciam in vulneribus sanandis , experientia cu-
jusdam metoris Cantiani , qui crus sibi falce graviter vulneraverat , edo-
-

aus ,

Ætus, miris illam præconis celebrat. Folia rufa cum axungia porcina vulneribus recentibus imponit. Hinc nomen Panacis coloni. Paul. Hermannus Syrupum ex ea paratum optimum esse remedium ad raucedinem perhibet. Adversus tertianas febres à Cæſalpino commendatur.

Galeopsis five Urtica iners flore luteo, *Off. Galeopsis five Urtica iners flore luteo*, J. B. 3. 323. *Inſt. R. H.* 185. Lamium folio oblongo luteum, C. B. P. 231. Urtica iners tertia, five Lamium luteo flore. *Dod. Pempt.* 153. vulgo, *Ortie morte à fleurs jaunes*.

Radice est inæquali, fibris plurimis majusculis stipata: caulibus longis, quadratis, infirmis, concavis: foliis binis, per intervalla oppositis, viridibus, longis, angustis: floribus ad genicula verticillatim caulem ambientibus, monopetalis, labiatis, luteis, galea ampla ad margines pilosa, quatuor staminibus albis cum apicibus luteis, & stylo purpureo, bicorni, e centro calycis in medio quatuor seminum egresso. Rarius in usum venit, nonnunquam Lamio vulgari albo substituitur.

Adversus alvi fluxus & fluorem album mulierum commendatur. Urinam promovet & lienis morbis medetur five externe admota, sub forma cataplasmati, aut decoctum ejus intus sumptum.

Aliæ plures plantæ sub Galeopsidis nomine apud Medicos auctores reperiuntur, ut Lamii species nonnullæ, de quibus suo loco.

GALLIUM.

Gallium duplex in Officinis, luteum & album.

Gallium & Gallium luteum, *Off. Gallium luteum*, C. B. P. 335. *Inſt. R. H.* 115. Gallion verum, J. B. 3. 720. Gallium, *Dod. Pempt.* 355. vulgo, *Castelait ou Petit Muguet*.

Radicula donatum est longo tractu repente, tenui, lignosa, fusca: ex qua virgulæ surgunt dodrantes & cubitales, tenues, subhirsutæ, quadratæ, in apricis rubentes. Folia ad genicula ex intervallis radiatim cauliculos ambunt longa, angusta, tenuia, mollia, obscuro virore nitentia, quina & novena plerumque. Ad singula etiam genicula bini plurimum ramuli, in quibus, ut & in summis caulibus, flores copiosi in racemulos digesti, parvuli, monopetali, campaniformes, patentes, quadrifidi, lutei, odore suaves: quorum calyx abit in fructum ex gemellis seminibus constantem siccis, subrotundis, Summires floridæ in usum veniunt.

Analysi chymica, ex Gallii lutei floridi & recens lecti ℥iij. ℥iij. prodierunt humoris limpidi, plantæ odorem saporemque aliquantisper referentis, obscure acidi ℥x. ℥vj. gr. xxxvj. humoris primo acidi manifesti, deinde intensi magis, ac magis, subausteri, ac tandem rufescentis, empyreumatici, intense acidi & intense austeri ℥ij. ℥x. gr. xxx. humoris alcali, urinosi, volatilis ℥ij. ℥iij. gr. xlvij. olei ipsi ad instar extracti ℥ij. ℥j. gr. xlvij. Massa nigra in reorta residua pendebat ℥vj. ℥iij. gr. xxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum leucophæorum ℥ij. ex quibus salis fixi alcali ℥ij. gr. xx. lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥vj. gr. xvij. in calcinatione ℥v. ℥ij. gr. xxxvj.

Gallii lutei florum succus, chartam cœruleam rubro colore tingit, &

S 2 lac

lac cogit: Gerardus Castrienses circa Nantvicum Angliæ oppidum, ubi laudatissimus conficitur caseus, coagulo suo Galli lutei summitates floridas immittere solere tradit, & multo pluris facere caseos eo coactos, quam alios quoscunque.

Acetum ex his summitatibus Olaus Borrichius distillatione elicit hoc modo. Recentissimas Galli lutei comas floridas, ad manipulos aliquot lectas cucurbitæ vitreæ commisit, & subito subjecto igne invitavi ad distillantandum, ne quam ab aere aut mora subirent mutationem. Primo stillatitius liquor prodit pene insipidus, odore tamen fragantes Galli flores non parum referens. Post unam circiter liquoris hujus unciam, successit acetum non ingrati saporis ad uncias propem odum tres: tandem validiori igne admoto subsecutum est cum liquore acido oleum flavum ad drachmas pene duas, nec illud admodum ingrati odoris. Hoc acetum ferventi infusum lacti, illud statim cogit & leri a caseosis partibus separationem quam ab aceto vulgari infuso experimur, effecit.

Gallium igitur luteum acido, subtili, & volatili oleo essentiali commixio abundat. A neotericis adversus epilepsiam commendatur plurimum. Ejus pulvis ad ℥i. exhibetur, succus ad ℥iij. vel decoctum manipuli unius in aq. ℔j. quotidie mane propinatur, jejunò ventriculo.

Insuper herba aut pulvis ipsius hæmorrhagiam & sanguinis profluvia sistit. Nonnulli adversus podagram ejus infusum ad modum Theæ propinant.

Externe herba recens, tusa & imposita sacris ignibus & ambullis medetur. Naribus indita sanguinis profluvia sistit. Mulierculæ, inquit Tragus, Galli decocto infantes arida ac exigua scabie laborantes abluunt, asserentes singulare id esse adversus eam experimentum.

4. Pulver. Galli lutei & conserv. flor. Pæon. mar. ana ℥j. Radicis Valerianæ sylvestris ℥vj. Pulver. de Gutteta ℥ß. Myrrhæ & pulver. Lumbricor. terrestrium ana ℥ij. Cum syrupo de Stæchade fiat opiata Dosis. ℥ij. aut ℥ij. mane & sero.

Usurpatur in unguento margiato Nicolai.

Gallium album, Off. Gallium album vulgare, *Inst. R. H.* 115. Mollugo montana angustifolia, vel Gallium album latifolium, *C. B. P.* 334. Gallium album, *J. B.* 3. 721. Mollugo vulgarior herbariorum, Gallion album quorundam *Lobel. Icon.* 802.

Hæc a priori differt foliorum magnitudine, florum albo colore. Rarioris est usus: Gallio luteo deficienti substituitur. Eidem vis antiepileptica tribuitur.

G E N I S T A.

Genistæ species duæ in officinis usurpantur, scilicet Genista vulgaris & Genista Hispanica.

Genista vulgaris, Off. Cytiso Genista scoparia vulgaris, flore luteo, *L. R. H.* 649. Genista angulosa & scoparia, *C. B. P.* 395. Genista angulosa trifolia, *J. B.* 1. 388. Genista, *Dod. Pempr.* 761. vulgo, *Genet commun.*

Frucosa stirps Genista est, interdum hominis staturam attingens: radicem habet duram, lignosam, lentam, flexilem, luteam, fibris quibusdam obliquis subinde stipatam; caudices tenues, lignosos, a quibus plurimæ tenues spargun-

guntur virgulæ, angulosæ, virentes, lentæ, & flexi necque faciles; non raro quoque in alas divisæ; circa quas folia exigua, crebra, hirsuta, obscure virentia, priora trina, alia simplicia, acuminata. Flores virgulis quoque adnascuntur eleganti colore, lutei, papilionacei, staminibus recurvis cum apicibus croceis: quibus succedunt siliquæ compressæ, latæ, per maturitatem nigrescentes, in duas partes dehiscentes, seminibus fortæ planis, duris, subruis, & quasi reniformibus. In agro Parisiensi sponte nascitur: Foræ plantæ, flores, semen usurpantur.

Analysi chymica, phlegma acidum, austerrum præbet, olei, & terræ mediocrem portionem, nonnihil salis volatilis urinosi, haud parum salis alcali fixi; odorem foetidum ad Sambucum vel ad olei empyreumatici odorem accedentem spargit. Ejus folia amara sunt, neque chartæ cœruleæ colorem mutant. Unde C. Tournefortius concludit hanc plantam saltem essentialem continere salî naturali terræ similem cum oleo foetido plurimo intime permixtum. Exinde vero, & amaritie insigni aperit, abstergit, attenuat, hepatica, splenitica, & nephritica dicitur. Folia, ramuli, & summitates Genistæ cuncta in vino aut aqua, eorumve succus utilia sunt hydropicis, & omnibus obstructionibus renum ac vesicæ: partim enim purgant serosos humores per alvum; partim per urinas. Purgat Genistæ semen non minus potenter sere quam Spartium aut Helleborus, Ziss. pondere ex hydromelite ventriculo jejuno sumptum. Quare Matthiolus illud utiliter exhiberi putat adversus podagram. Idem confirmat Lobelius, semine Genistæ scopariæ vomitum non secus ac Spartio Dioscoridia sæpius Ziss. decocto propinato citra magnam contentionem se movisse scribens. Pulvis seminum cum hydromelite dosi Ziss. exhibitus in siene timido, hydropse, ischero quoque a J. Rajo commendatur. Flores, inquit Ettmullerus, si in decocto propinentur, per inferiora educunt; si in substantia, vomitum cient. Verum flores recens decerptos sæpissime quamplurimos, & per se acetariis inditos vorat, narrante Lobelio, plebecula Arvernæ, & Aquitanie, maxima copia innocuos non modo, sed etiam admodum gustui suaves: nec quicquam vomitionis aut nausæ vel commotionis movere solent. Quia apud Brabantos, & Anglos non minus, gemmantes dum adhuc virides sunt, condiuntur sale, & aceto flores, mensisque inferuntur, capparum olearumve pari commendatione. Creduntur enim non modo cordi vires, ac stomacho appetitum augere, sed etiam obstructiones referare ac calculum frangere. Tunc forte vis eorum vomitoria ab aceto infringitur.

Paratur ex Genistæ ramulorum ac virgultorum aridorum, & combustorum cinere cum vino tenui albo lixivium quod ad cachexiam, & leucoplegmatiam a nonnullis valde celebratur, & potenter quidem serosos humores cum urina per vesicam pellit. Sed acrimonia sua, inquit Dodonæus, interna viscera quandoque & lædit, & exedit, quod quidem ipse in hydropico observari post paracanthem. Vulnuculum enim ejus non solum non coaruit, sed inflammatum, & ulceratum fuit, quamdiu hoc usus est lixivio. Observat etiam Ettmullerus cineres caute nec adeo vehementer calcinandos esse, ita ut sal falsus maneat: tunc enim nonnihil oleo-
sarum partium retinet, quibus ejus vis caustica demulcetnr, & irretitur.

Extracum florum a Cl. Tournefortio commendatur ad ventriculum robo-
Geoffroy Tom. II. S 2 ran-

randum, & adhibetur in suis pilulis balsamicis. Verum cum incertæ admodum sint illius extracti vires, latius est ab eo abstinere, cum longe præstantiora in officinis reperiantur stomachica medicamenta.

Genista Hispanica, *Off.* Genista juncea, *J. B.* 1. 395. Spartium arbore-sceus, seminibus Lenti similibus, *C. B. P.* 396. Spartium Dioecoridæum, Narbonense & Hispanicum *Lobel. Icon.* 91. Genista Hispanica Gerardi *Raii hist.* 1726. Spartium Hispanicum, frutex vulgare *Perkins.*

Frutex ad hominis proceritatem assurgit, caule brachiali, vimina profert juncea, tercia, obsequiosa, viridantia, ad glaucum accedentia: per quæ dum florēt & novella adhuc planta est, sparsa sunt rara quædam folia, oblonga, angusta, Oleæ foliis similia, decidua, ramis fere concoloria. Flores in summis ramulis velut in spica oriuntur multi, papilionacei, ampli, aurei, odoratissimi, gustu dulces, pistillo in filiquam abeunte bivalvem, surrectam, uncias quatuor vel quinque longam, compressam, aliquantulum incurvam, colore fere Castaneæ; in qua semina continentur nonnumquam ad viginti, sæpius pauciora, compressa, reniformia, rubentia, lucida, sapore leguminoso Pisorum: sarum saporis æmulo. In Gallia Narbonensi sponte crescit. Hic in hortis colitur.

Viribus cum Genista vulgari convenit, quæ tamen efficacior censetur.

GERANIUM.

EX tot Geranii speciebus cognitæ tres potissimum in usum medicum veniunt, nempe Geranium Columbinum, & Geranium Robertianum, & Geranium Sanguineum.

Geranium Columbinum, *Off.* Geranium folio Malæ rotundo, *C. B. P.* 318. Geranium folio-rutundo, multum serrato, sive Columbinum, *J. B.* 3. 473. Pes Columbinus, *Dod. Pempt.* 61. Geranium Columbinum Gerardi *Raii hist.* 1059. *Tab. Icon.* 56. vulgo, *Ber de Grue*, *Pie de Pigeon*.

Radice est alba, simplici, turculosa, caules emittente plurimos, didrantes & altiores in terram reclinatos: foliis Malvaceis in plura segmenta, (septem plerumque insigniora, aut saltem quinque in summis caulibus) divisis, minoribus tamen, candidioribus, minus glabris, ambituque serratis, longis pediculis fultris. Flores bini in eodem turculo nascuntur, prope summitates caulium & ramulorum ex adverso plerumque foliorum sui, parvuli, hilari purpura nitentes, pentapetali, rosacei. Ex singulorum calyce surgit pistillum, quod deinde abiit in fructum rostratum, quinque striis per longitudinem incisum, quibus totidem adhærescunt capsulæ, in longam, tenuem, acuminatam, fere semineialem caudam rostri gravis instar desinentes, tenues, nonnihil pilosæ, per maturitatem a basi ad apicem extorsum se revolventes, singulæ singulo semine foetæ, oblongo, per maturitatem fusco.

Geranium Robertianum & Herba Roberti, *Off.* Geranium Robertianum primum, viride, *C. B. P.* 319. Geranium Robertianum murale, *J. B.* 3. 480. Geranium Robertianum, *Dod. Pempt.* 62. Grana Dei, Geranium quibusdam *Tragi*: Sideritis tertia Gesneri *Column. Rupertiana* vulgo,

Ca-

Cesalpin. 359. Herba Ruperti, & Geranium secundum Dioscorid. Lugd. 1278. vulgo, Herbe a Robert.

Ex radice tenui, colore duxeo, caules surrigit dodrantes, & cubitales, hirsutos, geniculatos, rubentes, maxime circa articulos, & prope terram, ramosos, & nonnullis pilis obritos. Folia promit partim a radice, partim ex geniculis, hirsuta, pediculo rubente, hirsuto, Marricarum fere divifura, segmentis primariis dumtaxat tribus, odore, ubi teruntur, Pastinacæ, sapore adstringente, per oras aliquantulum rubentia, interdum tota. Flores purpurei, dilutione purpure striati, pentapetali, rosacei, e calyce hirsuto, atrorubente, quinquepartito exeunt; apicibus in medio croceis, succedunt rostra mucronata, cum seminibus priori similibus. Tota herba est odore gravi satis, attamen haud injucundo.

Geranium sanguineum, & sanguinaria, *Off. Geranium sanguineum maximo flore, C. B. P. 318. & Inst. R. H. 267. Geranium sanguineum, five Helmatodes, crassa radice, J. B. 3. 478. Geranium septimum, Ait. 1. Clus. hist. cij. Sanguinaria radix, & Geranium tertium Tragi, 348. Geranium sanguinarium, Taber. Icon. 774.*

Crassa hæret radice, rubra, multis, longis, crassiusculis appendicibus aucta, aliquot fibris donata, novas sub terram propagines singulis annis ad latera spargente, quæ non modo fibras similiter agunt, sed etiam crassioribus radicibus interdum sese firmant: caules emittit plures, cubitum altos, rubentes, hirsutos, geniculatos, in multas alas divisos. Ad singulos nodos bina nascuntur folia circumscriptione rotunda, sed in quinque laciniis, trifidas plurimum, ad pediculum fere dissecta, hirsuta, superne virentia, subrus canescentia, sicco & adstringente sapore prædita. Ex superioribus alis oblongi nascuntur pediculi, unicum sustinentes singuli florem, inter reliqua Geranii genera maximum, Cisti marisæ flori ferme parem, colore eleganti rubro, quinque foliis compositum, decem intus staminulis, quæ quinque nervosis, hirsutis, viridantibus foliolis subtus natis suffulciuntur. Rostra suborsuntur pentagona, semen intumescens utriculis seu torulis continentia, quod maturum cum sonitu exilit, circumvolventibus se utriculorum mucronibus.

Geranium columbinum in pratis, & hortis frequens nascitur; Robertianum in veteribus muris, cæcis arboribus, aggeribus sepium, & locis ruderatis passim provenit; Sanguineum vero in sylvis, & dumeris sæpius occurrit. Tres illæ Geranii species sæpe indiscriminatim sumuntur, sæpius tamen Robertianum.

Analyti chymica, ex Geranii Robertiani floridi, demptis radicibus & per retortam distillatis, prodierunt humoris limpidi, primo odoris, & saporis herbacei, deinde subacidi ʒi. ʒj. gr. xxvij. humoris primo limpidi, deinde rubescens magis ac magis acidi, subausteri, odorem, & saporem panis rusticani referentis, ac tandem austeri ʒij. ʒx. ʒvj. gran. xlij. humoris fulci, sale volatili urinoso aliquantisper imprægnati, & intense austeri ʒj. ʒiij. gr. xvij. olei adiposi ʒvij gr. x. Massa nigra residua pen-debat ʒiij. ʒv. gr. xxv. quæ rite calcinata reliquit cinerum ʒj. gran. lx. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ʒiij. gran. xij. extracta sunt Partium jadura in distillatione fuit ʒv. ʒvij. gr. xxij. in calcinatione ʒij. ʒiij. gr. xxxvij.

Geranii Robertiani folia sapore styptico, falso, acidulo donantur, chartam cœruleam rubro colore tingunt, Bitumen aut Petroleum redolent. Ex his liquet, salem essentialem in hac planta contineri aluminosum cum aliqua olei sordidi portione, & modico sale ammoniacali conjunctum.

Robertianum Geranium insigne vulnerarium est, & adstringens, & præ cœteris temperatum, inquit Ettmullerus; unde in portionibus, & decoctis vulnerariis frequenter usurpari solet. Potenter quoque resolvit, sanguinis fluxum sistit, ipsamque sanguinem coagulatum resolvit, vulnera, & ulcera mundificat. Vinum in quo folia contusa per noctem macerata fuerunt, hæmorrhagias quasvisque sistit. Ejus pulvis ad ℥j. in vino generoso sumptus ad uteri status discutiendos multum prodest.

Externe in catharris, & tumoribus sub cataplasmaticis forma folia contusa, sive in vino cocta parti dolenti utiliter admoventur. Tumores pedum œdematosos resolvunt contusa, & cum sale, & aceto subacta. Usus est vulgo, inquit J. Rajus, ad erysipelata, mammarum, & pudendorum ulcera, & vulnera. Ettmullerus ejus succum subactum cum paulillo Terebinthinæ in balsami formam commendat, quod applicatum ea tuto, cito, & jucunde curat. Fabricius Hildanus asserit simplex ejus decoctum mammis cancris applicari sæpe non infelici successu.

Geranii sanguinei folia styptica sunt, & subsalsa. Chartam cœruleam rubro colore vivido, æque ac alumen, inficiunt: itaque vis ejus vulneraria pendet potissimum ab aluminoso sale cum magna sulphuris, & terræ copia, & tantillulo salis volatilis concreti.

Hujus plantæ folia utiliter usurpantur in decoctis, & jussulis vulnerariis, & ad catharros cohibendos.

Geranii Columbini folia palato saporem referunt herbaceum, salum, stypticum, & glutinosum: chartam cœruleam rubro colore tingunt: salem essentialem aluminosum obtinent in viscido phlegmate dilutum. Syrupus ex eorum succo paratus a Cl. Tournefort. adversus dysenteriam commendatur. Ejus extractum ad idem valet. Ejus folia in potionibus, decoctis, emplastris, oleis, & unguentis adversus contusiones, & vulnera usurpantur; herba quocumque modo exhibita sanguinem undecumque manantem mirum in modum compescit.

G N A P H A L I U M.

Plantæ duæ genere diversæ sub Gnaphalii nomine in usum medicum veniunt, Gnaphalium Pes cati dictum, & Gnaphalium vulgare seu Filago.

Gnaphalium, Pes cati, *Æluropus*, *Hispidula*, *Off. Elychrysium montanum*, flore majore purpurascens, *Inst. R. H.* 453. *Pilosella major* quibusdam, aliis Gnaphalii genus, *J. B.* 3. 162. Gnaphalium montanum flore rotundiore, *C. B. P.* 263. Gnaphalium montanum suaverubens, *Lobel Icon.* 483. *Auricula muris Lonic.* Lagopiron Hippocratis, *Gesner*: Gnaphalium montanum Gerardii *Raii bistor.* 283. Gnaphalium montanum sive Pes cati, *Parkins*: *Lagopus secundus Tragi* 332. vulgo, *Pied de Chat.*

Ra-

Radicibus fibrosis hinc inde repit & humi fundit circumcirca appressa fere terræ folia oblonga, cum acumine rotundiore, dilute virentia, incana lanugine obsita inferna parte : inter quæ surgunt caules palmares aut dodrantales tomentosi, candicantes, foliis vestiti longis, angustioribus, e quorum cacumine glomerari pendent flores multi flosculosi, plurimis scilicet flosculis constantes, stellæ ad instar divisis, embryoni insidentibus & calyce comprehensis squamoso, splendido, Embryo autem deinde abit in semen pappi instructum.

Hujus duæ habentur species, altera flore majore, & squamulis latioribus, altera flore minore, squamulis angustioribus : utraque floris colore albo & purpureo variat. In agro Parisiensi sponte nascuntur, & delectantur montosis herbidis & vento perflatis. Flores in primis usurpantur.

Analysi chymica, ex Gnaphalii floridi *libij.* demptis radicibus per B. V. distillatis prodierunt humoris primo insipidi, deinde obscure acidi *libj.* *3v.* *3ij.* gr. *xlviij.* Massa residua per retortam distillata præbuit humoris limpidi, manifeste acidi & subaulteri *3vij.* gr. *lx.* humoris fusci, sale urinoso imprægnati & intente austeri *3ij.* *3iiij.* gr. *lvj.* olei adiposi aqua gravioris *3ij.* *3v.* gr. *xxxvj.* Massa nigra in retorta residua pendeat *3vij.* *3j.* gr. *xxxvj.* quæ per tredecim horas calcinata reliquit cinerum albicantium *3ij.* *3j.* gr. *vj.* ex quibus lixivio salis fixi leviter alcalini *3j.* gr. *lvij.* extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit *3v.* gr. *lij.* in calcinatione *3iiij.* gr. *xxx.*

Pes cati succum obtinet lentum & viscidum, constantem sale essentiali, viridolito, ammoniacali, sulphure copioso, & multo phlegmate.

Inter moderate refrigerantia, seu iucrassantia efficaciter adstringentia, & agglutinantia reponitur; atque idcirco herba vulneraria adstringens perhibetur : cujus usus commendatur ad pulmonum affectus, qui ob imbecillitatem, laxitatem nimiam, & continendi sanguinis impotentiam oriuntur. Tussim sedat, humorum acrimoniam demulcet, expectorationem promovet, pectoris infarctus resolvit, sanguinem sistit, pulmonum exulcerationem præcavet, ulcera abstergit & consolidat. Maxime vero his convenit, quibus a capite, ac aliis partibus fit fluxio in thoracem, & quibus pulmones pituitoso humore multo infarciuntur. Humoris enim irruentis impetum cohibet, crassitiem digerit, partem affectam roborat & expectorationem movet, in sputo nimio & cruento, dysenteria utiliter adhibetur infusum & decoctum ejus vel syrupus ex eo confectus, tum simplex, tum compositus.

Conditum ex floribus paratum in officinis præparatur ad eadem utile.

Gnaphalium vulgare, Filago, Herba Impia, *Off.* Filago seu Impia, *Dod.* *Pempt.* 66. *Inst.* R. H. 454. Gnaphalium Germanicum, *J. B.* 3. 158. Gnaphalium vulgare majus, *C. B. P.* 263. vulgo, *Herbe a Cotton.*

Plures ex eadem radice fibrata & capillata caules surgit tenues, semipedales & dodrantales, plurimum erectos, teretes incanos, & lanugine obsitos, summa parte ramosos, foliis vestitos creberrimis, nullo ordine positis, pariter lanuginosis, angustis, oblongis, florum globuli tum in extremis ramulis, tum in ipsis angulis quos ramorum divaricationes efficiunt, sessiles, e pluribus floribus stipatis coagmentatis nascuntur. Sunt autem flores qui globulos hosce componunt & ipsi compositi e flosculis ob exiguitatem suam ægre visibilibus, quinquefariam divisis, embryoni insidentibus & calice squa-

fquamofo, fed nequaquam fplendente aut fpeciofo comprehenfis. Embryo autem abit deinde in femen pappis inftitutum.

Filago rarius in ufum venit: vulneraria & adftingens exiftimatur. A nonnullis Pedi cati fubftituitur ad cruentam exfpuitionem in pleuritide. Decoctum manipuli unius in aq. comm. flij. præferbitur. Dodonæus exficcantem facultatem & nonnihil adftingentem illi tribuit. Hinc fortaffe, inquit J. Raius, hæmorrhagiis, dyfenteriz nimio menfuum fluiori, arque etiam anginz conducit. Aquam ab hac planta diftillatam ad cancerum, præcipue mammillarum utiliffimam Dodonæus afferit: quippe quæ cum finteolis femel in die impofita occultos caneros continet, ne exulcerentur. Sunt vero, inquit, qui Afari foliis hujus aqua madefactis non infelicius ad caneros reprimendos utuntur.

Lobelius occiduz Angliæ plebem herba contufa oleo macerata & cocta, ad livores, concuffiones, cafa & verbera feliciter uti feribit.

G R A M E N.

DUÆ Graminum fpecies ufurpantur in officinis, Gramen caninum & Gramen Dactylon.

Gramen caninum vulgare, *Off.* Gramen foliaceum radice repente, five Gramen officinarum, *Inft. R. H.* 516. Gramen caninum ævenfe, five Gramen Diofcoridis, *C. B. P.* 1. Gramen repens officinarum forte, triticæ fpicæ aliquatenus fimile *J. B.* 2. 457. Gramen caninum arvenfe, five primum, five Gramen Diofcoridis & officinarum, *C. B. Theatr.* 7. Gramen, *Dod. Tempt.* 558. Gramen caninum, five Canarium primum; *Tabern. Icon.* 301. vulgo, *Chiendent*.

Radixbus eft candidis, nonnihil flavefcenribus, longe lateque repentibus, geniculatis per intervalla, lineam aut fetquilineam craffis, fibri invicem implicitis, fapore fubdulci, cum aliqua ftypticitate. Culmi ad duos pene cubitos affurgunt recti, nodofi, foliis donati quatuor vel quinque in eodem culmo, e totidem geniculis exeuntibus, bafi caulem inftar vaginæ ambientibus, palmum fuperantibus, anguftis, tres lineas lais, & in exquifitum mucronem abeuntibus. Flores, fpicatim fummo culmo infident flaminei, per duos verfus digeffi, cum ariftis brevioribus & feminibus oblongis fufcis, ad Triticum formam accedentibus. In agro Parifienfi frequens nafcitur.

Gramen Dactylon, *Off.* Gramen Dactylon, radice repente, five officinar. *Inft. R. H.* 520. Gramen repens, cum panicula Graminis mannæ, *J. B.* 2. 459. Gramen Dactylon, folio arundinaceo, majus, aculeatum forte Plinio, *C. B. P.* 7. Gramen legitimum, *Cluf. biffor.* cccxvi.

Ex radicibus perennibus, longis, nodofis, geniculatis, candidantibus, longe lateque repentibus, fubinde plurimis locis germinantibus, fibras parvas ex fingulis geniculis fpargentibus, fapore fubdulci, culmi, pedales, Canino breviores fæpe rufefcentes, rotundi, geniculati affurgunt: e quibus folia in ima parte mutuo amplexu fipata prodeunt, brevia, angufta, hifcua, in fuperna culmorum parte longiora. Culmi feu calami in quaternas, quinas, nonnumquam lenas fpicas virides, per macuritatem nigricantes, ali-

aliquando ex atro, purpureoque colore mixtas, desinunt : quarum utriculi brevibus aristis donati, sæpe ab una parte costæ propendent, dorso libero existente. In agro Parisiensi minus frequens occurrit quam Caninum, uberrime crescit, meridionalibus in Galliarum regionibus. Utriusque Graminis radices indiscriminatim usurpantur.

Analysi chymica, ex radicum Graminis canini exsiccatarum lbv. per retortam distillatam prodierunt humoris limpidi fere insipidi, & inodori, obscure acidi 3x. gr. xxxvj. humoris primo subacidi, deinde manifeste acidi, & subaustri 3j. 3ij. gran. xxx. humoris rufi, odoris, & saporis empyreumatici, subasali, intense acidi, & intense austri 3j. 3vij. gr. xij. olei 3ij. 3ij. gr. xlvij. Massa nigra in retorta superstes pendebat 3j. 3iiij. 3vj. quæ rite calcinata reliquit cinerum 3ij. 3ij. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali 3iiij. gr. l. extracta sunt. Partiom jactura in distillatione fuit 3xj. 3vij. gr. xvij. in calcinatione 3j. 3ij. 3iiij.

Radices Graminis sapore obrinent subdulcem, & aliquantisper saccharinum cum aliqua adstrictione. Salem continere videntur essentialem salis coralliorum analogum cum multo sulphure permixtum.

Refrigerant moderate, aperiunt, & subabstringunt & urinas blande movent, absque irritatione, ad obstructions hepatis, lienis : maxime si febres ex iis scaturiunt, item ad calculos renum pellendos valent. Ubi est insignis viscerum dyscrasia calida, cum eorundem obstructione plurimum comendantur; C. Hoffmannus enim observat eas sine calefactione opus suum perficere, & simul cum levi adstrictione partium solidarum tonum firmare. Is frequenter vimur in pituitis, decoctis, & jusculis diureticis, & aperientibus, ad hepatis, & lienis infarctus resolvendos. Ettmullerus post Sylvium refert occasionem hujus effectus suggestam fuisse ab experientia in bobus, qui hyemali tempore fere obstructioni folliculi fellei ductusque ejus cystici, vel a mucilagine viscosa, vel concremento calculoso obnoxii sunt: ast æstivo tempore esu Graminis iterum curantur, & liberantur. Earumdem decoctum a nonnullis quoque ad enecandos, & abigendos infantum lumbricos usurpatur.

Fridericus Hoffmannus plurimum laudat decoctum verno tempore paratum ex radicibus recentibus Graminis, Cichorii, Petroselinii, Asparagi, & Urticæ minoris cum foliis, pro hypochondriacis, & atrophia laborantibus ex venarum lactearum obstructione.

In cruenta exspuitione succus radicum, & foliorum utiliter usurpatur.

Earumdem radicum aqua distillata infantibus propinatur ad eorum vermes necandos. Earum quoque verno tempore collectarum, & exsiccatarum, pulvis ad 3j. exhibitus a nonnullis ad lumbricos, necnon etiam & in rachitide præscribitur.

℞. Rutæ murariæ, Polytrici, & radicum Graminis canini exsiccatar. & pulveratar. ana p. æq. F. Electuar. cum syr. de 5. rad. aper. Dosis 3j. bis die, in rachitide.

℞. Radicum Gramin. mundatarum, contusarum, & minutim concisar. M. j. Glycyrrhiz. exsiccatae rasæ, & contus. 3j. Coquantur in 3iiij. aq. comm. ad 3iiij. Sub finem adde nitri purificati 3ß. Fiat pitana pro potu solito ad urinam promovendam, & viscerum ac sanguinis æstum temperandum.

Ra-

Radix Graminis usurpatur in syrupo de Ibisco *Fernelii* & syrupo de
5. radicibus aper.

G R A T I O L A.

G Ratiola, Off. Digitalis minima, Gratiola dicta, *Morisson. hist. Oxon.*
p. 2. 479. *Inf. R. H.* 165. Gratiola centauroides, C. B. P. 279.
Gratiola, J. B. 3. 434. *Dod. Pempt.* 362. Gratia Dei, *Casalpini* 365. Gra-
tiola vulgaris, *Parkins.* : Gratia Dei, cujus semen Gelbenech, Papaver
spumeum forte *Anguillar* : Limnesium sive centauroides *Cordi* : vulgo,
Gratiolo, herbe a pauvre homme.

Radicibus est oblique repentibus, albis, geniculatis, fibrisque multis de-
orsum vergentibus stipatis : quæ caules emittunt erectos, crebris geniculis
distinctos, seliquidodrantales & longiores : in quibus folia vena ex adverso
nascuntur unciam superantia, semitunciam lata, glabra, venosa & intense
amara. Ex eorum alis emergunt flores singulares, monopetali, tubulati,
posterius perforati, flavescentes, & lineis fuscis, virgati, cornu modo in-
curvi, octo lineas longi, tres lineas crassi, anterieus hiantes & in duo labia
divisi dilute purpurascens : labium autem superius quasi cordiforme &
sursum reflexum, inferius tripartitum. Calyx monotomos, in quinque
partes divisus, ex cujus fundo pistillum emergit longius, quod mutatur
in capsulam dilute rufescentem, e rotundo acuminatam, in duo loculamen-
ta divisam, seminibus sætam tenuibus & rufescentibus. Agri Parisiensis in-
cola nascitur secus rivulos, & in pratis udis, Junio & Julio florens. Se-
mina Augusto & Septembri perficiantur. Herba & radices in usum veniunt.

Analysi chymica, ex Gratiolæ floridæ ℥v. per retortam distillatis pro-
dierunt humoris limpidi, fere insipidi & inodori, subacidi, obscure salsi
℥xv. ℥i. gr. lxij. humoris primo limpidi, magis ac magis acidi, austeri,
sub finem rufescentis, intense acidi & intense austeri ℥iiij. ℥vj. ℥ij. gr.
xlj. humoris rufi intense acidi, aliquantisper alcali urinofi, & austeri ℥ij.
℥iij. gr. xlvij. olei ipsi ad instar extracti ℥i. gr. vj. Massa nigra in re-
torta residua pendebat ℥iiij. ℥vij. gr. xij. quæ rite calcinata reliquit cine-
rum ℥i. ℥iiij. gr. xxxvj. ex quibus salis fixi alcali ℥v. gr. xvij. lixivio
extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. gr. xlv. in calcina-
tione ℥iiij. ℥ij. gr. xlvij.

Tota planta inodora, insigni amarore donatur cum obscura adstrictio-
ne. Sale essentiali tartareo, vitriolico donatur, cum multo sulphure acri
& crasso. Inter purgantia medicamenta hydragoga refertur : reipia len-
tam pituitam vehementer expurgat, non modo per inferiora, sed etiam
per vomitum. Hydropicis in primis commendatur. Prodest adversus diu-
tinos coxendicis dolores, adversus inveteratas febres sive tertianas sive
erroneas, jecur & lienem ab obstructionibus liberat, ventriculi lumbricos
pellit. Sed cum vehemens sit purgans, nonnisi robustis naturis convenit :
debilioribus enim sæpe dira excitat ventris tormina aut superpurgationes.
Herba recens ad ℥ss. vel sicca ad ℥j. in aqua vel vino macerata præscri-
bitur, sed longe tutior ac mitior est, si cum lactis ℥ss. leviter incoquatur,
& colatura propinetur.

Ejus

Ejus extractum cum vino paratum ad ℥β. vel ℥j. præscribitur, confer-
va vero ad ℥ij. vel ℥iij. usurpatur.

In enematribus foliorum ad M. j. in sero lactis vel ipso lacte vaccino decoctum minori cum periculo usurpatur. Cavendum tamen ne hæc ene-
mata præscribantur, dum æstuant viscera, aut ad inflammationem procli-
via sunt.

Folia recentia contrusa & imposita, vulnera consolidant & curant, te-
ste Cæsalpino. Eadem capiti imposita hydrocephalis mederi Hermannus
scribit.

24. Folior. Gratiolæ virid. ℥ij. vel exsiccat. ℥j. Injiciantur in lactis ser-
ventis ℥vj. Infunde per noctem. Colaturam æger capiat mane.

24. Folior. Gratiolæ ℥j. Macerentur per noctem in aq. font. ℥vj. F. co-
latura, in qua contunde Amygdalas dulces n. vj. Expressione dilue
symp. Violar. vel de Althæa ℥j.

24. Gratiolæ viridis M. j. Centaur. minor. Absynth. ana M. β. Seminis
Tanaceri & Santonic. ana ℥β. Coq. in sero lactis. Fiat clyster ad
enecandos & expellendos vermes præsertim ascarides.

24. Gratiolæ Soldanellæ, folior. Ebuli, Afari, Sambucci, florum Geni-
stæ, Persicorum, ana M. β. corticis Sambuci, Frangulæ, radicis Ireos
vulgaris & Esulæ ana ℥j. pulpæ Colocynthid. p. j. Coquantur in uri-
na. Fiat cataplasma hydrocephalo calide applicandum. *Paul. Her-
mans in Cynofura M. Medicæ.*

GROSSULARIA.

Inter plures Grossulariæ species tres potissimum inter edulia & medica-
menta recipiuntur: scilicet Grossularia, Uva crispa dicta, Grossularia Ri-
bes dicta, Grossularia olens Ribes nigrum dicta.

Grossularia, Uva crispa dicta, *Off* Grossularia simplici, acino vel spino-
sa sylvestris, *C. B. P.* 455. *Inst. R. H.* 639. Uva spina; *Martius* Uva
crispa, sive Grossularia, *J. B.* 1. 47. *R. H.* 1484. Uva crispa, *Dod. Tempt.*
748. Crispina vera, *Cordi*: Cæanothus spina, *Theoph*: vulgo, *Grosfelir*
blanch epineux, & fructus *Grosseille blanche*.

Ex radice lignosa, fibris non destituta, hic frutex exsurgit bicubitalis &
altior numerosa stolonum segete luxurians, varieque in ramulos subdivisus,
cortice in adultioribus ramis purpurante in junioribus virgis & surculis al-
bicante, materie fere buxæ colore pallecente, spinis longiusculis acutis ac
rigidis ad foliorum exortum passim armatus, singularibus, binis aut ternis.
Folia promixtæbrævibus pediculis innixa, unguem lara, nonnumquam ampli-
ora, nonnihil rotunda, modice divisa, vitigineis quodammodo similia, supe-
rius saturo virore splendentia, inferius dilutiora, mollia & modice pilosa, sa-
pore acido. Flores parvi, suavi, sed nonnihil gravi odore simul multi ex
eodem tuberculo ex quo folia prodeunt, ex pediculo brevissimo punican-
te, hirsuto, nutantes, rosacei, quinque petalis in orbem positis ex herba-
ceo albicantribus constantes calyce monophyllo, pelvisiformi, in quinque se-
gmenta utrinque rubentia, extrorsum reflexa, diviso, cum quinque stamini-
bus, & pistillo virescente, alba lanugine circa infima parte obfito. Calycis
pars posterior quasi globosa abijt in acinum seu baccam globosam, aut ova-
tam,

tam, interdum hirsutam, plerumque glabram, mollem, succosam, umbilicatum, plurimis lineis a pediculo ad umbilicum usque protensis, quasi totidem meridianis insignitam, colore initio virentem gustuque acidam austeram, per maturitatem vero subavescentem, ex vinoso dulcem, seminibus sacra plurimis, exiguis, candicantibus. In sylvis Sangermaniacis, & circa pagum *Montmorency* dictum, sponte nascitur. In hortis quoque colitur, ubi cultura maioribus foliis, & baccis donatur, quæ tunc dicitur *Grossularia spinosa sativa*, C. B. P. 445. *Infl. R. H.* 639. *Grossularia* majore fructu, *Clusi diss.* 12c. Uva crispâ fructu Cerasi magnitudine, *Gesner. hort.* Soli acini maturi vel immaturi in usum esculentum veniunt.

Analysi chymica, ex fructuum jam maturitatem assecutorum ℔v. distillatis prodierunt humoris limpidi, odore & sapore haud ingrato, dulci, primum nullo modo acidi, sub finem obscure acidi ℔j. ℥iv. ℥vij. humoris subacidi, deinde magis ac magis acidi, austeri, ac obscure alcali, urinosi ℔iij. ℥iij. gr. xvij. humoris rufescentis, parum acidi, sale volatili urinoso imprægnati ℥j. ℥iij. gr. xlij. olei adiposi ℥vij. gr. xvij. Massa nigra residua pendebat ℥iv. ℥j. gr. xxxvj. quæ per tredecim horas in crucibulo rite calcinata reliquit cinerum ℥v. ex quibus salis fixi mere alcali ℥j. gr. xxxij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥j. gran. xxx. in calcinatione ℥iij. ℥v. gr. xxxvj.

Fructus maturus acidi salis mediocrem portionem obtinet, multo sulphure, phlegmate, & terra obruti; quare sapore aliquantisper dulci, sed satuo donatur. Fermentatione tamen succus ejus aliquantisper vinosus evadit, sed non adeo generosus salium defectu. Fructus immaturus acidus est & austerus: refrigerat & adstringit. In cibatu apud nos usus ejus est uvarum acerbarum loco, juribusque gratissime innatat. Appetitum excitat: gravidis, quæ cibum omnem respuunt pergratus, nauseam tollit: hæmorrhagias, & ventris profluvia compescit. Juscula in quibus coctus febricitantibus utilis. Crudus comestus crudum parit succum, & parum aut nihil alit. Recte autem monet *Parkinsonus* largiorem immaturi fructus usum, quomodocumque præparetur, ventriculis frigidis & statibus obnoxiiis non permittendum, nec colicos dolores aut tormina ventris inducat.

Maturus mollis est, & cujusdam dulcedinis, satum tamen particeps. Longe minus adstringit immaturo: ad condimenta raro adhibetur; nec nisi a pueris aut sæminis voracibus aut rusticis comeditur. In ventriculo facile corrumpitur.

Vinum apud Anglos ex maturis acinibus conficitur, narrante *Rajo*. Acinibus in dolium injectis aquæ ferventis q. s. affunditur. Vas exacte clausum in loco temperato per tres quatuorve hebdomadas relinquitur, donec liquor baccharum succo, & spiritu penitus imprægnatus fuerit, baccæ autem plane exsuccæ, & insipidæ reddantur. Deinde exhaustus liquor cum Saccharo in ampullas vitreas infunditur, quæ probe obturatæ ad tempus reservantur, donec liquor cum Saccharo intime mixtus & fermentatus in generosum, & vini æmulum laticem exaltetur.

Grossularia, *Ribes* dicta, *Off.* *Grossularia* multiplici acino, sive non spinosa, hortensis rubra, sive *Ribes* *Officinarum*, C. B. P. 455. *Infl. R. H.* 639. *Ribes* vulgaris, acidus ruber, J. B. 2. 97. *Ribes* fructu rubra, *Ded.*

Dod. Pempt. 747. vulgo, Groselier rouge. Fructus, Ribes, Ribesium, & Grossula vulgo, Groseilles rouges.

Fruticosa stirps est radicibus multifidis, fibrosis, adstringentibus; stolonibus seu virgularis plurimis lentis ac flexilibus, ad duos vel tres cubitos assurgentibus corice spadiceo aut cinereo, materie virente cum ampla matrice seu medulla: foliis viris viniteræ similibus, sed multo minoribus, mollibus sinuatis, superne obscure virentibus, glabris, inferne molli lanugine canescentibus, acerbis. Flores racematim coherent plurimi, rosacei, e petalis quinque purpurascensibus constati quasi cordatis, & in crenis calyci pelvitormis, quinquifidi, nascentibus, cujus posterior pars abit in acinum, initio virentem per maturitatem rubrum duas lineas latum sphericum, succi acidi grati plenum, pluribus seminulis sætum. Oritur in sylvis Alpium, & Pyrenæorum coliturque vulgo in hortis ac septis. In usum cibarium & medicum venit.

Alia species est, quæ candidos pellucidos acinos profert, quæ hujus potius varietas est, quam species distincta. Dicitur Grossularia hortensis fructu Margaritis simili, C. B. P. 453. I. R. H. 640. Ribes vulgaris acidus, albas baccas ferens, J. B. 2. 98. Ribes vulgaris albo fructu, *Clas. Hist. 120. vulgo, Groselier blanc, & Groseilles blanches.* Ad usum medicum prior seligitur.

Analyti chymica, ex maturorum acinorum ℥v. per B. V. distillatis prodierunt humoris limpidi, odoris, & saporis fere expertis ℥ij. ℥v. humoris primo obscure acidi, deinde magis ac magis acidi, manifesti & intensi ℥j. ℥xij. gr. xxxvj. Massa sicca residua per retortam distillata præbuit humoris acidi & perasteri ℥vj. gr. xxxvj. humoris rufi, subtilis, tum acidi austeri, tum alcali ℥j. gr. ix. olei ipsi syrupi ad instar ℥j. gr. xl. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥v. gran. xxxvj. quæ per 23. horas calcinata reliquit cinerem cæruleo-fulgentem ℥vj. gran. lx. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥ij. gran. xlv. lixivio extracta sunt. Parrium jactura in distillatione fuit ℥j. ℥iv. gran. lix. in calcinatione ℥iv. ℥j. gr. xlvij.

Ribes saleem essentiali acidum, austerum obtinet cum olei portione mediocri consociatum. Hujus acini racematim adhuc ex pediculis dependentes nulla arte præparati, aut pediculis liberato tantillo Sacchari conspersi, æstivo tempore comeduntur. Imo a pueris, puellis chlorosi laborantibus, mulieribus pica & malacia affectis, ægris febri laborantibus avide expetuntur ratione saporis subacidi, vinosi & palato grati.

Matres familias has baccas integras Saccaro coniungunt sicut Cerafa; vel Ribetorum gelatinam elegantem & palato gratissimam, succum acinorum cum Saccharo coquendo ad debitam consistentiam, & pro dulciario, non solum ad secundas mensas instruendas, sed etiam ad ægotantium, febricantium præsertim solamen reservant.

Ex eodem succo syrupus, Rob seu Sapa, hoc est succus ad mellis consistentiam inspissatus, in officinis præparantur.

Ribes, & quæ ex eo parantur, omnium consensu utiliter exhibentur ad æstum-internum temperandum, sanguinis effervescentiam compescendam & biliosas commotiones cohibendas. Sanguinem enim & humores leviter inspissant, acidorum vegetabilium more: cumque simul adstringant mode-

moderate, ventriculū roborant, inappetentiam tollunt, in vomitionibus & diarrhæis a biliosa colluvie oriundis, aut febribus biliosis valde conducunt, hæmorrhagias, quæ a nimia sanguinis dissolutione aut effervescencia nascunt, coercent.

In febribus malignis, & morbis contagiosis plurimum commendantur: quandoquidem his in ægitudinibus non solum mirum nimiam sanguinis dissolutionem præcavent, sed etiam alcalia falia nimis evoluta retundunt, sulphura expansa nimis, & exaltata cohibent. Ne tamen existimes earum curationem, ab horum acidorum usu semper absolvi.

Nocebit Ribesiorum usus, si vel voracitate immodica vel tempore minus commodo deglutiantur. Tunc enim diarrhæas excitant, ventris tormina, febres. Acida quoque in quibusdam, quorum ventriculus debilior est ciborum concoctionem minuunt, bilis alcalinam indolem destruendo, chylum spissiore & grumoso efficiendo, unde humorum stagnationes viscerumque infarctus ab eorum esu quandoque nascuntur. Insuper assiduus acidorum fructuum usus pulmonibus nocet, tussim excitat, & phthisis prorsus insensu est. Imo notatum est ab Hannemann apud Bonnetum *Lib. 2. M. Septentriol. sect. 14. cap. 28.* a nimia Ribesiorum comestione tabem ortam. Nonnullis etiam fructus illi adversantur. Georg. Hannæus in *Ephemerid. Germanicis Decad. 2. ann. 6. Obs. 138.* observat virum quemdam, qui simul ac ex uno vel altero pediculo pendentes Ribesiorum acinos abluisset, gravedinem sibi acturum accelerasse.

℞. Syrup. de Ribes. ℥ij. aquar. Lactuc. vel Cichor. ℥ij. Salis Prunell.

℥ss. Misce pro potu in febribus.

℞. Rob. Ribesior. ℥j. Aquar. Meliss. & Oxytriphyll. ana ℥ijj. M. F. Julap. in febribus malignis.

In anginæ initio gargarismata parantur ex succo vel syr. Ribesiorum, & aquis Rosar. Plantag. Centinod. & aliis.

Folia vero Grossulariæ vehementer adstringere testis est Fusius.

Grossularia olens, Ribes nigrum dicta, *Off.* Grossularia non spinosa, fructu nigro, majore *C. B. P. 455. Inst. R. H. 640.* Ribes nigrum vulgo dictum, folio olente, *J. B. 2. 98.* Ribesum fructu nigro, *Dod. Pempt. 749. Groselier noir, Cassis ou Cassier des Poitevins, Paul. Constant. 39.*

Frutici huic folia sunt vitiginea lata, averſa parte leviter pilosa, odore fœtido. Flores ex eodem tuberculo plures aut racematim digesti. Uvæ crispæ floribus persimiles, quorum odor, qui & foliis, gravis, Baccæ oblongæ, colore nigro, quæ sive maturæ, sive immaturæ acidæ sunt cum sapore partim grato, partim ingrato. Apud Pictones & Turones frequens nascitur. Rarius apud nos, & circa vicum *Montmorency* tantummodo reperitur. Folia a nonnullis usitata.

Miræ hujus foliis tribunt virtutes in Tractatulo anno 1712. Burdigalæ edito sub hoc titulo, *Les Proprietes admirables du Cassis*; in quo veluti panacea omnibus fere in morbis frutex ille prædicatur. Ejus foliorum recentium succus expressus: infusum vel decoctum in vino vel aqua, eorundem exsiccatorum pulvis vel decoctum præscribuntur.

Ex iisdem foliis syrupus vel conditum præparantur. Ubi desunt folia, eorum

gundem germina vel fruticis cortex usurpatur. Sed in primis adversus viperatum & animalium rabidorum morsus, his in provinciis ejus folia plurimum usitata sunt. Folia recentia in vino contunduntur, succus exprimitur, cujus cyathus unus vel ℥viij. bis die per os iduum a demorsis hauritur mane, jejuno ventriculo & tribus quatuorve post prandium horis. Folia confusa & expressa vulnere apponuntur.

Paulus Contant Pharmacopæus Picardensis in suo *Commentario in Dioscoridem* aquam vel vinum in quibus Grossulariæ olentis folia per 24. horas macerata fuerunt, adversus hydropem ad ℥iij. per quindecim dies mane, jejuno ventriculo pota commendat: eademque adversus viperarum morsus utilia dicit.

Ab illustrissimo viro D. Chauvelin summo rei ærarie & judicariæ olim in Turonia, nunc in Picardia Præfecto, & Regi a sanctioribus consiliis audivimus hæc folia adversus rabidorum animalium morium plurimum valere, & usurpari in mixtura quadam adversus hydrophobiam apud Turones & Pictones decantata & plurimis experimentis comprobata.

℥. Folior. Galegæ, Rutæ hortens. Rorismarini, Salvie, Angelicæ sylvestris, Grossulariæ olentis, folior. & radicum Bellidis sylvestris minoris, Spongiolæ, Rosæ sylvestris, folior. Lepidii latifol. Allii bulborum ana p. æq. Confundantur, & confusus pro singulis hujus massæ manipulis adde salis communis ℥iij. vini generosi ℥iij. Digerantur in vase clauso per aliquot dies, identidem agitando. Hujus infusi cyatum unum aut alterum bis die sumat æger a cane rabido demorsus, mane scilicet, jejuno ventriculo, & vespere tribus post prandium horis per os iduum, celebrata prius venæ sectione. Si febris accendatur, sanguinis missu erit reiteranda, non interrupto hujus remedii usu. Nihil vero alimenti sumat æger nisi duabus post assumptum remedium elapsis horis. Externe vulnere, si opus sit, sufficienter dilatato, linamentum hoc vino imbutum apponatur, & post duodecim horas renoveatur: vel etiam herbæ ipsæ confusæ & vino madentes eodem modo applicentur.

Eadem est animalium quadrupedum demorsorum curandorum ratio. Si vulnus detegi possit, candente ferro comburatur, scalpello crusta indurata tota auferatur, & herbæ confusæ & vino maceratæ admoveantur: Medicarum vinum animali propinetur, sed dosi diversa; bobus scilicet ad ℔j. bis die per os iduum, minoribus animalibus minor dosi exhibebitur. Necessè est etiam ut animalia demorsa quotidie fluviorum vel stagnorum aquis per aliquot temporis intervallum innatent.

H E D E R A.

DUæ in Officinis plantæ Hedera nomine insigniuntur, scilicet Hedera arborea, & Hedera terrestris. De arborea jam egimus ubi de plantis exoticis, *Sectione de Resinis solidis, articulo de Gummi Hedera*. nunc de terrestri sermo erit.

Hedera terrestris, Off. Calamintha humilior folio rotundiore, *Inst. R. H. 194.* Hedera terrestris, vulgaris, *C. B. P. 306.* Chamæcissus sive Hedera terrestris, *J. B. 3. App. 855.* Hedera terrestris, *Dod. Tempt. 394* *Geoffroy Tom. II.*

T

Gr-

Gerard. Rari Hist. 567. *Metacoccifos*, *Lugdunens.* 1311. *Chamaeclema*, *Cord. Elaine*, *Brunfels*: *humilis Hedeta*, *Adversar.* *Corona terræ*, *Lobel. Icon.* 613. vulgo, *Lierre terrestre*, *Terrette*, *Herbe de S. Jean*, *Rondotte*.

Vniculus quadrangulis, repentibus & fibrosis late se propagat secus rivulos, & in sepibus, ac pratis, cauliculos promens tenues, quadrangulos, subrubentes, hirsutos: in quibus folia bina nascuntur, longis pediculis hærentia, rotundiora, aurita, unciam lata, subhirsuta, æqualibus crenis incisa. Flores ad caulium nodos verticillatim dispositi, & singulis foliorum alis tres quatuorve, aut etiam plures exeunt, monopetalis, labiati, cœrulei, labio superiore bifido, & ad latera reflexo, inferiore in quatuor segmenta diviso, tubo intus saturatoribus purpureis maculis & lineolis variegato, rectu pilis brevibus albis, velut lanugine quadam-obstituto: pistillo tenui, bicorni. Calyx floris oblongus, angustus, striatus, marginibus in quinque segmenta breviter paritatis, flore marcescente in ventrem turgescit, & quatuor semina oblonga continet, subrotunda, lævia. Totius plantæ sapor amarus, odor gravis ad Menstruam quodammodo accedit. Tota planta in usum medicum venit.

Analysi chymica, ex totius plantæ receptis ℥v. per retortam distillaris prodierunt humoris fere insipidi & inodori, limpidi, obscure salis & sub finem obscure subacidi ℞j. ℥v. gr. xvij. humoris primo subacidi, deinde magis ac magis acidi, subaulteri ℞ij. ℥viij. ℥ij. gr. xvij. humoris rufescentis, leviter empyreumatici, subacidi, subtilis, urinosi ℥j. gr. xxxvj. humoris rufescentis, sale volatili urinoso imprægnati ℥ij. olei adiposi ℥j. ℥ij. gr. xxxiij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥iiij. ℥vj. gr. xxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum subrufescentium ℥ij. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥vj. gr. xxxvij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥viij. ℥vj. gr. xij. in calcinatione ℥ij. ℥vj. gr. xxxvj.

Hederæ terrestres folia amara sunt, nonnihil aromatica, & chartam cœruleam vix mutant. Quamobrem ejus vires Cl. Tournefortius refert ad sulphur & terram, quæ copiose reperiuntur in hujus plantæ analysi, & talem essentialem quendam, non multum a tartaro vitriolato diversum, mixtum cum paucis sale ammoniaco. Unde ob partes bituminosas, salino-terrestres & spirituosas, aperit, abstergit, discutit & vulneraria est, tum intrinsicè sumpta, tum extrinsicè adhibita. Succus ejus descæarus ad ℥ij. aur ij. infusum vel decoctum ex aqua vel vino propinquant: vel etiam pulvis a ℥ss. ad ℥j. exhibetur. Ex summitatibus floridis conditum in Officinis præparatur; sicut ex ejus succo, syrupus & extractum. In decoctis & potionibus vulnerariis usus est frequentissimus. Specifica facultate, inquit S. Paulli, vulneratis & ulcerosis visceribus, si qua herba, hæc maxime medetur. Ettmullerus eandem erosionibus & exulcerationibus viscerum, pulmonum in primis & renum dictam, & in his consolidandis nulli cedentem scribit: & illius usum in tussi & phthisi pulmonali tum præservanda, tum curanda, sive ex læsione externa, sive ab erosionem interna ortum suum ducat, commendat. Vvillsius in *Pharmaceutica rationali* p. 2. §. 8. c. 6. pulverem conficit ex summitatibus Hederæ terrestres nonnihil rufescentibus, coactis & in placentam coactis, quæ sole servido statim exsiccata in pulverem

rem subtilem redigitur; quem a ʒʒ. ad ʒj. exhibet bis in die cum ejusdem plantæ aqua distillata aut decocto pectorali, in tussi gravi & pertinace, & in phthisi. Ettmullerus ancillam, quæ diu phthisi scorbutica laboraverat, decocto hujus herbæ unico curatam fuisse refert. Lindanus in empyemate & vomica pulmonum & in pleuritide suppuratâ non parum habere virum asserit, sive usurpetur ejus decoctum, sive conserva: materiam enim purulentam in pectore collectam mirum quantum evacuat, & ulcus potentissime detergit. Ad mistum cruentum, & purulentum sanandum plurimum valet. In casu ab alto, ab eodem Ettmullero, & in primis ad grumum sanguinis resolvendum, & inde oriundam difficilem respirationem auferendam ejusdem decoctum commendatur cum solutione lapillorum cancerum permixtum.

Insignes eidem tribuuntur vires ad effectus urinaris demulcendos, acrimoniam urinæ temperandam, nephritidem præcavendam, dispositionem ad calculum removendam, imo etiam calculum minuendum & expellendum: Audienda sunt hæc S. Paulli verba. In calculo vero renum simplex Hederæ pulvis cum Sacchari dimidio præparatus, & cum aqua Hederæ terrestris, cui spiritus vini quarta vel sexta pars est affusa, propinatus, omnem fere fidem superat, quam præclare eum atterat.

J. Rajus ex Hieronym. Reusneri observationibus narrat, quemdam viro in quo Hædera terrestris infusa esset, addito Saccharo cando, cum felici quidem successu usum fuisse, & arenulas excrevisse, ac cum insigni dolore.

Ad colicos dolores compescendos & ad dysenteriam sanandam ejus decoctum in clysteribus præcibitur. Ad puerperarum tormina post partum folia contusa ventri calide apponuntur. Matthiolus colicis in affectibus oleum in quo ad solem æstivum folia recentia macerata fuerunt, injectum & epotum tanquam singulare remedium prædicat.

Succus hujus plantæ naribus attractus cephalalgiam etiam vehementissimam & inveteratam, referente J. Rajo, non lenit tantum, sed & penitus aufert. Medicamentum hoc, inquit post suum auctorem, quamvis facile parabile & ubique obvium sit, non satis potest laudari, si res ex usu æstimarèntur, auro æquiparandum. Novi quippe qui per decennium ac amplius acerrimis doloribus conflictati statim ab ejus usu recreati sunt, nec unquam postea paroxysmum senserunt. Joan. Bauhinus eam observavit ad expellendos vermes equorum præstantissimam, si contusa detur cum Avena.

Ejus folia sinapis tibiae ulceribus medentur contusa, & admota. Ad insaniam sanandam eadem recentia in vino albo usque ad putrefactionem, ut ajunt, coquantur. Succus exprimitur & cum olei Olivæ æquali portione mixtus coquitur adhuc ad mediæ partis humoris diminutionem: hoc oleoso succo ægrotantis capitis vertex, sinciput & tempora calide inunguntur, easdem partes manu calida & hoc succo madida per semihoram fricando. Dein magma expressum eodem liquore imbutum eisdem partibus calens applicatur. Removetur cataplasma sexta quaque hora, novum & calidum admovendo, & frictiones unctioesque simul repetendo. Quod quidem per tres quatuorve dies continuandum est.

24. Radic. Rubiæ tinctor. Tormentill. & Bistort. ana ʒj. folior. Hederæ terrestr. Veronicæ & Virgæ aureæ ana M. j. Summitatum florid.

T 2

Hype-

Hyperici & Bellidis minor. ana M. j. Coq. in aq. comm. q. s. ad ℥iij. Colatura dilue Rhodomeli ℥ij. Fiat apozema vulnerarium ad ℥vj. tertia vel quarta quaque hora propinandum, ad ulcera interna detergenda & hæmorrhagias sistendas.

24. Pullum gallinaceum & vitulinæ carnis ℔ss. Orizæ cochlear unum; radic. Symphyti maj. & Tormentill. ana ℥j. Coq. in aq. comm. q. s. pro iusculis quatuor; Sub finem coctionis adde folior. Hederae terr. Chærefol. Portulac. Urticæ, Plantag. Geranii Robertian. & Sanicul. ana M. j. Sumat æger iusculum unum quarta quaque hora in hæmorrhagiis quibuscumque.

24. Succor. defœcator. Hederae terrestris, Chærefol. & Veronicæ ana ℥vj. Syrup. de Hedera terrestris ℥ij. M. Dividantur in sex doses quarta vel sexta quaque hora propinandas, in sputo & mîctu cruento aut purulento, in abscessu interno abstergendo.

24. Extract. Hederae terrestr. Conserv. Rosar. rubr. & Conserv. radiæ Symphyti major. ana ℥j. antihæctic. Poter. Succini subtilissime pulv. ana ℥iij. Corall. rubr. & oculor. Cancror. ana ℥j. M. F. elæctuar. antiphthisicum c. s. q. Syrup. de Hedera terrestr. Dosis ℥ss. ter quaterve in die.

24. Succ. Hederae terrestr. defœcati ℥iij. Thuris subtilissime triti ℥j. Mellis rosati ℥j. M. F. linctus in hæmoptoe, empyemate & vomica pulmonum.

Ejus aqua distillata servatur in Officinis pharmaceuticis plantæ viribus non prorsus destituta, sed succo vel decocto minus valens.

HELIANTHEMUM.

Plantis duabus genere diversis Helianthemi nomen Officinæ concedunt, scilicet Helianthemo vulgari, & Helianthemo tuberoso esculento.

Helianthemum vulgare, Off. Helianthemum vulgare, flore luteo, *J.B. 2. 15. Inf. R. H. 248. Chamæcistus vulgaris, flore luteo, C. B. P. 461. Raii Hist. 1013. Flos solis, Dod. Tempr. 193. Chamæcistus 1. Clus. Hist. 73. Helianthos, five Flos solis, Advers. Lobel. Helianthemum Anglicum luteum, Gerard: Panax chironium, five Flos solis, Matthioli: Hyssopus campestris, Tragi 221. Consolida aurea Chirurgis, Cordi Schol: vulgo, Heliantheme, Herbe d'or, Hysope des Garrigues.*

E radice alba, lignosa, caules, plures, tenues, teretes, humifusi; hirsuti emergunt foliis vestiti oblongis, angustis, Hyssopi foliis paulo latoribus, mucronibus obtusis, ex adverso binis, pediculis brevibus indentibus, superne viridibus, subter incanis. Flores in summitatibus in longas veluti spicas dispositi, pediculis semiuncialibus appensi, lutei, rosacei, pentapetali, cum plurimis intus staminulis flavis, e calyce trifolio, lineis rubris striato exeunt. Pistillum abut in fructum trigonum, grandem, trifariam dehiscentem, semina aliquot trigona, rufa, continentem: ad floris uniuscujusque pediculus apponitur foliolum longum, angustum. In agro Parisiensi sponte nascitur. Radices & folia usitata sunt.

Helianthemi folia succo lento & glutinoso scætant, qui chartam coræteam colore rubro leviter tingit.

Vulneraria est & adstringens hæc planta. Unde in sputo sanguinis, alvi profusio

vio; & omnibus affectibus quibus fluxus nimius conjunctus est, Symphyti aliarumque Consolidarum more, usurpari potest. Exhibetur utiliter decoctum in vino rubro, vel aqua, cum Symphyto & Plantagine ad sanguinis sputum, diarrhæam, dysenteriam.

Ad vulvam, ulcera oris & genitalium decoquitur in vino rubro, addito momento aluminis, decoctioneque os colluitur, aut ulcera partium distrahuntur.

Helianthemum tuberosum esculentum, Off. Corona solis parvo flore, tuberosa radice, *Inst. R. H.* 489. Helianthemum Indicum, tuberosum, *C. B. P.* 277. Flos solis Farnesianus, Alter Peruanus, tuberosus, *Col. Part.* 2. 13. Flos solis pyramidalis, parvo flore, tuberosa radice, Heliotropium Indicum quorundam Gerard, *emacul. Raii Hist.* 335. Battata Canadensis, *Parkins.* vulgo, *Taubinambours & Poires de terre*...

Ab una radice caulis singularis aut multiplex exsurgit, teres, virens; striatus, asper, pilosus, duodecim aut amplius pedes altus, medulla alba, fungosa fractus, foliis crebris, nullo ordine positis, ab imo ad summum usque cinctus pallide virentibus, apertis, latis, acuminatis, floris Solis vulgaris fere similibus, non tamen rugosis nec æque latis. Caules ab imo statim ramosi sunt, foliis paulatim magnitudine decrescentibus ab imo ad summum usque. Flores in summis caulibus & ramulis nascuntur floris Calendulæ vulgaris magnitudine, radiati, quorum discus ex plurimis flosculis luteis, dense stipatis; corona vero ex semiflosculis duodecim aut tredecim, striatis, cuspidatis, aureo fulgore micantibus, embryonibus insidentibus, calyce e squamis villosis composito comprehensis. Embryones autem abeunt in semina parva. Caulis plures emittit radices tenues, repentes, fibrillis tenacibus capillatas, longe lateque se diffundentes, inter quas e radice pismaria multæ aliæ soboles tuberosæ excresecunt, glomeratæ, nunc radici primariæ seu matri adhærentes, nunc fibris longis ad pedis ab eâ distantiam adnascens, terram elevantes, & nonnunquam supra ejus superficiem apparentes. Unica radix triginta, quadraginta, quinquaginta, aut etiam plura non raro producit hujuscemodi tubera. Radices hæc tuberosæ foras colore rufescunt, substantia seu carne interna fungosa, candicante, sapore dulci, variis prominentiis gibbosæ, pugni humani interdum magnitudine, ea parte qua germinaturæ sunt velut in rostellum elata. Caulibus marcescentibus radices tuberosæ per hyemem in terra resiliunt, & sequenti vere regerminant. In hortis colitur. Radices tuberosæ in usum esculentum veniunt.

Analysi chymica, ex radicum tuberosarum recentium lib. per vaporarium distillatis prodierunt humoris limpidi, primum sapore subdulci, saturo, odore herbaceo, obscure subfalsi, deinde saporis & odoris prorsus expertis libij. humoris limpidi, obscure acidi ℥xij. Residuum per retortam distillatam præbuit humoris rufi, empyreumatici, manifeste, & impenite acidi ℥v. ℥vij. gr. xxxvj. humoris rufi, empyreumatici, sale volatili urinato imprægnati cum granis aliquot salis volatilis ℥j. ℥iij. gr. xxxvj. olei ℥j. gr. xlv. Massa nigra in retortâ residua pendebat ℥vj. ℥iij. quæ per quindecim horas in crucibulo calcinata reliquit cinerum albican-tium ℥i. ℥ij. gr. xxxvj. ex quibus salis fixi mere alcali ℥v. lixivio sunt extractæ. Partium jactura in distillatione fuit ℥iij. ℥vij. gr. xxvij. in calcinatione ℥v. ℥i. gr. xxxvj.

Harum radicum succus & decoctum chartam cœruleam rubro colore tingit . Sapore dulci & palato grato hæc tubera gustui se commendant & edulia sunt tum cruda , tum cocta . Cocta carnis capitum Cinaræ saporē referunt . Salem essentialē obinent tartaro similem cum aliqua ammoniacalis salis portione , sulphure crasso , terra copiosa & multo phlegmate viscido conjunctum . Mediocriter nutriunt , sanguinis & humorum acrimoniam demulcent , unde pectoris affectionibus conducunt . Nonnulli eas flatulentas esse & ventriculo inimicas pronuntiant ; alii autem aliter sentiunt , nec ullam hujusmodi statum excitandi vim in illis percipiunt aut agnoscunt . Apud nostrates aqua decoquuntur & cum butyro , sale & pipere tantillo condita comeduntur . Alii ea frustulatim secta & massa farinacea involuta cum butyro aut oleo in sartagine frigunt . A quibusdam cruda cum sale & pipere utpote palato gratiora devorantur : sed ob suum succum viscidum difficiliter coquuntur in ventriculo .

HELIOTROPIMUM.

Heliotropium & Verrucaria , *Off.* Heliotropium majus Dioscoridis , *C. B. P.* 253. & *Inst. R. H.* 139. Heliotropium majus , flore albo , *J. B.* 3. 604. Heliotropium , *Dod. Tempt.* 70. Heliotropium Officinis , Verrucaria scorpioides , *Adversar. Lobel.* 101. vulgo , *Herbe aux verrues.*

Huic radix est simplex , tenuis , lignosa , dura : caulis dodrantalis & altior , fungosa medulla plenus , rotundus , ramosus , nonnihil hirsutus , foris ex viridi incanus : folia ad ramulorum exortum & per ipsos ramos disposita , ex rotundo oblonga , Oeymi foliis paria , sed albidiora asperioraque , caulis concoloria , hirsuta . Flores in ramulorum cauliculorumque fastigiis scorpiionum caudæ instar reflexis ordinata serie digesti , parvi , candidi , monopetali , infundibuliformes , centro stellæ in modo corrugato & in decem partes alternarum inæquales ad oram incisi . Ex calyce lanuginoso surgit pistillum infimæ floris parti ad instar clavi infixum & quatuor velut stipatum embryonibus , qui deinde abeunt in totidem semina hinc angulata , inde gibba , brevia , cinerea . In agro Parisiensi sponte nascitur . Herba integra usitata est .

Analyti chymica , Verrucaræ floridæ lbv. per retortam distillatæ præbuerunt humoris flavescens , saporis & odoris herbacei penetrantis , sub-salsi , subcalini , urinosi ℥iij. ℥ij. gr. liij. humoris rufescentis , odoris & saporis herbacei , magis penetrantis , salis & alcali urinosi lbj. ℥xj. ℥vj. gr. lx. humoris limpidi , flavescens , ejusdem odoris , & saporis magis salis ℥x. ℥j. gr. lx. humoris rufi , empyreumatici , sale volatilâ urinoso copioso imprægnati ℥j. gr. xij. salis volatilâs urinosi concreti ℥j. gr. lvi. olei syrupi ad instar spissi ℥j. ℥vj. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥vj. ℥v. gr. xij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥iij. ℥ij. ex quibus lixivio salis fixi alcali ℥iij. gr. lx. fuerunt extracta . Parrium jactura in distillatione fuit ℥iij. ℥vj. gr. xxiiij. in calcinatione ℥ij. ℥j. gr. xij.

Verrucaræ folia amara sunt , & eorum succus chartam cœruleam nullo modo mutat . Salem essentialē ammoniacalem continent cum oleo copioso tum tenui & acri , tum crasso , & multa terra conjunctum .

Ver.

Verrucas, myrmecias seu prurigines & thymos in glande aut præputio & ano affricata herba valenter adimere dicitur. Optime detergit, & efficacissima censetur adversus carcinomata & ulcera serpentia & gangrænosa, necnon strumosos tumores. J. Rayus folia coniula cum oleo rosaceo & capiti admoda, adversus cephalalgiam commendat. Idem refert epotum foliorum decoctum una cum Cumino renum calculos pellere & frangere, & intestinorum animalia necare.

H E P A T I C A.

A Pari Hepatis obstructions resolvendi, qua pollent, facultate, tres stirpes, licet genere prorsus diversæ, Hepaticæ nomen per antonomasiam obtinuerunt, scilicet Hepatica fontana seu vulgaris, Hepatica nobilis seu trifolia, & Hepatica stellaris, seu Asperula. De hac jam egimus sub Asperulæ nomine.

Hepatica fontana, Hepatica vulgaris, Hepatica terrestris, Lichen petræus, Off. Lichen petræus latifolius, sive Hepatica fontana, C. B. P. 362. Lichen, sive Hepatica fontana, J. B. 3. p. 758. Lichen, sive Hepatica vulgaris Parkins. Inf. R. H. 124. Hepatica terrestris, Gerard. Jecoraria, seu Hepatica fontana, Trag. 523. Fegatella, Cæsalp. 601. vulgo, *Hepatique commune*.

Radicibus hæret sericeis similibus pilis, tenuibus admodum, copiosis sub foliis, quæ digiti sunt latitudine, & dupla longitudine vel majore, superne virentia vel parum flavicantia, squamosa velut serpentum cutis vel limacis, singulique squamis punctum in medio inscriptum elevatur. Flos, si quis sit, non manifestus. Caulem ex parte folii extrema, parum scissa & sinuosa, lunata, album, lævem, firmum, succosum, Junci crassitie, diaphanum, quatuor uncias longum habet, supra quem pileolus, veluti fungus, insidet parvus, in quatuor aut quinque partes inferne divisus. Pileolus primum viridis est, parum ad flavum inclinans, postea flavescit, atque demum rufus efficitur; & partes illæ inferiores divisæ fructum nigro-purpureum ostendunt, atque apertis fructus seu vascula seminalia decidunt nigro-purpurea, succosa cum viridia, siccata vero pulverem pro semine nigrescentem fuliginosum continent. In saxis aquis & umbrosis oritur juxta rivulos, fontes, aut puteos.

Analysi chymica, ex totius plantæ recentis ℥ij. ℥xiiij. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, saporis herbacei, obscure salis ℔j. ℥j. gr. lx. humoris limpidi, primum obscure salis, deinde obscure subacidi, ℥xij. ℥vij. gr. vj. humoris limpidi, tum alcali urinosi, tum acidi, ℥v. ℥ij. humoris fulci, leviter empyreumatici, manifeste subfalsi, alcali & subacidi ℥vij. gr. liij. olei adiposi ℥ij. gr. xxiiij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥vj. ℥ij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ruforum ℥ij. ℥ij. gr. xxxvj. ex quibus salis fixi salis gr. xxx. tantummodo extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥j. ℥ij. in calcinatione ℥j. ℥vj. gr. xxxvj.

Hepatica saporis est herbacei cum amarore nonnullo & astringentia, & odore leviter aromatico, bituminoso, quasi mastichino perfusa. Sale essentiali ammoniacali cum mediocri olei bituminosi portione & copiosa terra conjuncto instruitur.

Ex horumce principiorum miscela compositum exurgit potenter incidenti, abstergendi, adstringendi & consolidandi virtute præditum. Heparica est insignis hæc planta, necnon vulneraria. Pulmonum, hepatis, lienis & cæterorum viscerum obstructions aperit, humores crassos dividit, solvit, partium tonum firmat, roboratque. Sanguinem sistit in vulneribus. Humorum acrimoniam ratione terræ & olei bituminosi demulcet & reterundit. Cæsalpinus notat quod adulos & crassos humores leniter purget, si in magna copia ut pondere ℥ij. ejus decoctum propinetur, præsertim si cum sero lactis confectum fuerit: quo remedio iterato per multos dies sanatos multos vidit ex maligna scabie & ulceribus exedentibus. Usus ejusdem in hectica febre infantium, empyemate, phthisi, ictero, scabie & cutaneis affectionibus commendatur. In juleculis aperientibus ad M. j. præscribitur.

Emanuel Konig in suo Regno Vegetabili, hunc pulverem velut specificum antiphthisicum proponit.

℥j. Lichenis petræi exsiccati & pulverati ʒss. Geran. Roberrani pulver. Pulmon. vulpinor. præparator. Bol. armen. ana ʒij. Anthelctic. Poter. ʒijss. Sacchar. cand. ʒj. M. F. pulvis. Dosis ʒss. vel ʒij. mane & vespert.

Officinæ Basileenses Syrupum servant ex Lichene præparatum, qui infantibus tussientibus & scabiosis, maxime autem phthisicis utilissime datur.

Heparica usurpatur in Syropo de Cichor. simplici & composito.

Heparica nobilis, Heparica trifolia, Off. Ranunculus tridentatus, vernus, flore simplici, cœruleo, *Inf. R. H.* 286. Trifolium Heparicum, flore simplici, cœruleo, C. B. P. 330. *Raii Hist.* 480. Trifolium Heparicum sive Trinitatis herba flore cœruleo J. B. 389. Heparica trifolia, cœruleo flore, *Clusii Hist.* 247. Trifolium magnam seu aureum, quod nobilis Heparica, *Tragi* 519. Heparica aurea, *Brunsfelf. Tabern. Icon.* 527. Trinitas Matiboli: Heparica nobilis sive Trifolia *Parkinson.* Trifolium aureum S. Pauli *Quadr. Bot.* 5. vulgo, *Hepatique des Fleuristes*, ou *belle Hepatique*.

Radices sunt crassiusculæ in plurima capita divisæ, fibris innumeris ex rubro nigricantibus varie intertextis capillatæ, adeo ut totæ sibi hisce occultentur, nec aliud esse videantur quam massa seu congeries fibrarum glomeratarum & miris modis implexarum. E singulis autem radices capitulis seu nodulis quotannis progerminant primo flores: deinde folia, cum primulum emergunt complicata & hirsuta, postquam extenduntur glabra, superne obscurius viridia, adversa parte pallidiora, & interdum Cyclaminis modo purpurascens, firma, triquetra, in tria segmenta notamen ad pediculum usque divisa, per margines æqualia, pediculis semipalmaribus & longioribus insidentia. Caules ex eadem radice plures, tenues, pediculis foliorum breviores, nudi, singuli singulos flores sustinent speciosos, rosaceos, & sex vel octo petalis cœruleis constatos, staminibus cum suis apicibus rursus plurimis cum calyce trifolio & pistillo globoso ac verrucoso, quod abit in capitulum, in quo plura semina acuta, Ranunculorum modo congeruntur. Variat floris colore cœruleo, carneo, albo: in hortis colitur ob floris sævientie hyeme erumpentis elegantiam: Herba integra usurpatur.

Inter plantas Hepaticas recensetur, necnon vulneraria dicitur. Refrigerat enim, siccatur, roboratur, & adstringit. A nonnullis, referente J. Bauhino, ad vul-

vulnera glutinanda tam foris illita quam intus sumpta probatur : item ad enterocelas , in quem usum pulverem dimidii cochlearis mensura ex vino austro propinpat . Tota planta decoquitur in vino eodem ad columellæ fauciumque inflammationes . Tiagus asserit , herbam vino decoctam & potam obstructione liberare jecur , præsertim in his , qui veneri nimium indulgere : eandemque inflammationes impositam sedare , doloresque demulcere . Easdem vires ejus aquæ distillatæ tribuit . Nonnulli ejus extractum cum Saccharo præparatum in herniis puerorum perutile esse asserunt . Aqua pluvialis , post ternam quaternamve ex recentibus cohobationem infutura , fit cosmetica egregia , quam honestissimæ matronæ narrante Simone Pauli , ubi sole sub ardente versatæ sunt , ad formæ suæ restorationem solent expetere .

H E R B A P A R I S .

Herba Paris, *Off. Dod. Pempt. 444. Inst. R. H. 233. J. B. 3. 613.* Solanum quadrifolium bacciferum C. B. P. 167. Uva versa , Uva lupina , Uva vulpina , *Germanorum* : Solanum tetraphyllum , *Adversar. Lobel. Icon. 267.* Aconitum salutiferum , *Tab. Icon. 112.* Aconitum Pardalanches monococon *Cordi* : vulgo , *Raisin de Renard.*

E radice tenuj , longiuscula , geniculis aliquot articulata , oblique serpente , alicubi interdum progerminante , cauliculum erigit teretem & singularem , solidum , duos palmos altum , prope terram rubentem , superius viridem : atque circa hunc folia promit quatuor , ab uno veluti centro in decussis sive crucis figuram concinne digesta , ex angusto principio nata , in acumen desinentia , rugosa & nervosa , per margines æqualia , inferne splendens , superne nigricantia . Supra hæc , in cauliculi fastigio , flos prodii cruciformis , quatuor scilicet petalis longis , angustissimis , acutissimis , & viridantibus constans octonis staminibus longis , acutis , viridibus , cum additamentis ut plurimum croceis nonnumquam albicantibus , & calyce ex quatuor latulculis , acuminatis , & viridantibus foliis composito : in cujus medio sedet pistillum seu embryo fructus cum stylo brevi . Embryo autem abiit deinde in fructum seu baccam mollem , fere globosam , atropurpuream , in quatuor loculamenta divisam , ex cujus umbilico quaterna filamenta ejusdem cum ea coloris emicant . His in loculamentis semina copiosa , minuta , oblonga , albidia , magnitudine Papaverini aut Amaranthi , continentur . Odor totius plantæ virosus & ingratus , In agro Parisiensi sponte nascitur . Tota planta in usum venit .

Analysi chymica , ex ℞iv. & ℞ij. totius plantæ recentis , dempta radice , per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi , saporis herbacei obscure acidi ℞iij. ℞iv. humoris magis ac magis manifeste acidi , & austeri ℞ij. ℞vi. ℞j. humoris rufi , leviter empyreumatici , minus acidi , subtili , austeri & obscure alcali ℞v. gr. lx. humoris rufescentis , sale volatili urinoso copioso imprægnati ℞vij. salis volatilis concreti urinosi gr. xlij. olei extracti ad instar spissi ℞j. ℞iv. gr. xxxij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℞ij. ℞iv. gr. xlvij. quæ rite calcinata reliquit cinerum leucophaeorum ℞j. ℞j. gr. xxxvj. ex quibus salis fixi mere alcali ℞v. gr. xlij. extracta sunt . Partium jactura in distillatione fuit ℞iv. gr. xlv. in calcinatione ℞ij. ℞ij. gr. xij.

Herba

Herba Paris saleem essentialiorem obtinere videtur vitriolico-ammoniacaalem cum multo oleo bituminoso conjunctum.

Alexipharmaca censetur, cephalica, resolvens, & anodyna. Fuerunt; qui eam Aconitis speciem esse conjectantes, venenatam prodiderunt. At vero Lobelius in *Adversariis* eandem alexipharmacam esse probat experimento duorum canum, quorum intimas in fauces vi indita fuit Arsenici, & Mercurii sublimati ana ℥ss. carnibus admixta. E vestigio, inquit, uterque canum ore patulo aerem captabant, spumas elidebant, anxioque & crebro conatu, sed irritato, vomere nitentur: latratus edebant ore & assultu rabido, rictuque minaci proximum quemque invasuri videbantur. Hora vix exacta uterque frigidior, & quietior factus, decubuit moribundus. Tum Pulveris Saxonici ℥ij. ex rubello vino insulæ fuerunt in fauces unius, ac nec tum quidem quicquam evomuit: quin potius aliquantulum post, cum socius periculi jam eneatus esset, hic nobis attractantibus visus fuit calefcere. Itaque coepit ore reptare, oculos reservare, & animum viresque adeo repente recipere ut hilari & ludibundus aliquot horis post, cenam sub mensa coepit, planeque convalescit. Idem evenit ad Badenses Thermas aliis canibus, quibus data fuit cum arsenico mixta nuxvomica: sed hi vertigine ventrisque diris cruciatibus acti sese in gyrum indefinenter versabant.

Joann. Schroderus usum baccharum internum alexipharmacum in peste; venenatis morbis, venenisque assumptis pronuntiat. Ettmullerus eas eorum malignitatem per sudorem expellere scribit.

Baptista Sardus & Cæsalpinus adversus mentis emotionem, insaniam & fatuitatem tam per morbi diurnitatem aut savitiam, quam pravam rerum assumptione contractas commendant, si viginti continuis diebus dimidium cochlear pulveris hujus herbæ jejuno propinetur. Idem præstat solum baccharum semen pulveratum, si Matthiolo credere fas est, ℥ss. vel ℥j. pondere potum ad vigesimum usque diem. Secundum Camerarium pulvis radicis colicam sanat. Eadem baccæ n. v. vel ix. pulverizatae, & in aqua florum Tiliae propinatae a nonnullis summopere laudantur adversus epilepsiam, in primis infantum.

Non desunt tamen qui asserant acinos Uvae lupinæ devoratos soporem inducere. Ergo sane, inquit H. Tragus, illos nequaquam degustare volo, ne forte prius obdormiam. S. Paulli propter diversas auctorum hac de planta sententias internum illius usum prohibet, Galeni monito obtemperans. Medicinas, quæ jam longo tempore probatae sunt, quæque uno ore a peritis Medicæ materiæ auctoribus commendantur, omnibus aliis præferre videtur. *Lib. 2. de antidotis c. 23. p. m. 399.*

Exirinfecus foliorum, & baccharum usus plurimum commendatur in bubonibus pestilentialibus, calidis tumoribus, inflammationibus malignis, paronychia, & ulceribus inveteratis, sive in decocto, sive sola coniusa, aut cum fuligine impastata, in forma cataplasmatum imponantur. Sic, auctore Ettmullero, & inflammationem, & tumorem scroti ac testium, folia imposita admodum laudata sunt remedium, non minus, quam in inflammatione ipsius penis cataplasma ex herba virente coniusa factum, & applicatum egregie convenit. Hujus plantæ foliis aliquid anodynæ & narcotici in recessu recondi existimat, quo actum, & dolorem valent refragare:

nare: propter quod in cancro tam exulcerato quam occulto folia hæc confusa in mortario plumbeo, & imposita non leve levamen afferre scribit.

Folia & bæccæ in pulvere Saxonico usurpantur, cujus hæc est descriptio a Lobelio recensita.

℞. Utriusque angelicæ, domesticæ nempe, & sylvestris, Vincetoxici, Valerianæ domesticæ, Polypodii querni, radicum Althææ, & Urticæ ana ℥iv. corticis Mezerei Germanici ℥ij. Grana Herbæ Paridis n. xxiv. folia ejusdem cum toto n. xxxvj. Ex maceratis in aceto radicibus & siccatis fit omnium pulvis. Dosis ℥ij.

HERNIARIA.

Herniaria, Millegrana, Herba Turca, Off. duplex est, alia glabra; alia hirsuta.

Herniaria glabra J. B. 3. 378. & Inf. R. H. 507. Polygonum minus, sive Millegrana major glabra, C. B. P. 281. Herniaria, Dod. Tempt. 114. Empetrum, Tragi 527. Herba Turca, sive Herniaria, Lobel. Icon. 421. Epipactis Anguillar: vulgo, Herniole, Turquette, Herbe du Turc.

Herniaria hirsuta J. B. 3. 379. Inf. R. H. 507. Polygonum minus sive Millegrana major hirsuta, C. B. P. 381.

Parva hæc herba supina humique procumbens, late subiectum solum occupat luxurie læta complurium ramulorum, quos ex pusilla radícula in altum descendente fundit, hinc inde sparsos, teretes, subrubentes, creberrimis intercepro geniculis, ad quorum singula adversa folia perquam exigua, Serpilli minora, ex viridi lutea, in hac hirsuta, in illa glabra, gustu acri. Eisdemque locis erumpunt mirum in modum numerosi flores, minimi, luteoli, aut albidi, apetalii, plurimis scilicet staminibus constantes, ex calyce surgentibus. Horum pistillum abit deinde in semen perpustillum, splendens, nigrum, in capsula oblonga, & striata, quæ calycis floris fuit, & per maturitatem horizontaliter rumpitur reconditum. Utræque agri Parisiensis incolæ in usum medicum indiscriminatim recipitur.

Analyti chymica, ex torius plantæ floridæ, & seminibus sætæ ℔v. distillaris prodierunt humoris limpidi, saporis & odoris herbacei, obscure acidii ℔ij. ℥iv. gr. lxxvj. humoris limpidi, sub finem rufescentis, magis ac magis manifeste acidii, & austeri ℔j. ℥xv. ℥vij. gr. xxiv. humoris rufi, tum acidii, tum alcalii, & sale volatili urinoso imprægnati & austeri ℥iv. ℥vj. olei adiposi ℥ij. ℥vij. gr. xij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥ix. ℥vj. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥vij. ℥vij. gr. xxxvj. ex quibus salis fixi mere alcalii ℥iv. gr. lx. lixivio extracta font. Partium jadura in distillatione fuit ℥vj. gran. xliij. in calcinatione ℥vj. ℥vj. gran. xxxvj.

Herniaria saporem salsum, acrem refert, chartam cæruleam colore rubro leviter tingit. Sale donatur essentiali vitriolico ammoniacali cum oleo copioso, & terra adstringente conjuncto.

In curandis herniis præsertim omenti, & intestinorum, quæ propter peisonæ laxitatem in serotum descendunt, speciatim est proficua. Andrea^s Mat.

Matthiolus refert, Gabrielem Fallopiū Mutinensem hac tantum herbæ plures intestinorum ramice laborantes sanavisse. Eandem Jacobus Hollerius Medicus Parisiensis celeberrimus mirum in modum ad hernias commendat in tractatu *de morbis internis cap. 62.* Et propterea a Parisiensibus herba Holleriana dicta fuit. Hollerius succum expressum solum vel subinde affuso vino albo ab ℥ij. ad ℥iv. per novem dies propinat. Antonius Valetius in *annotationibus in Hollerium* narrat, adolescentem quemdam, cui citatior saltus insignem herniam conciliaverat unico haustu aquæ stillaritiæ Herniaræ curatum fuisse, admoto tamen post reductionem factam hoc emplastro.

℥. Emplastri contra rupturam & emplastri de gratia Dei ana ℥j. Sanguinis draconis, Olivani, & radic. Oimundæ regalis pulverator. ana ℥ij. cum modico olei Mirrillor. Molliantur in igne, & fiat emplastrum super alutam.

Alii Herniaræ pulverem vel vino dilutum aut jusculo, vel sub forma boli ad ℥j. exhibent. Maceratur vel coquitur ejusdem herbæ M. j. in aquæ vel vini ℔j. & colatura ad ℥vj. vel ℥viij. propinatur: & post reductionem omenti vel intestini cataplasma ex herba confusa sola vel cum aliis huic morbo accomodatis mixtæ parti afflictae admoveretur. S. Pauli cataplasma sequens adversus exomphalon expertum proponit.

℥. Herbæ Persoliatæ cum toto M. j. Herniaræ, Auriculæ muris, Plantaginis, musci Acaciæ nostratis ana M. ℔. In suff. quant. vini rubri cocta loco affecto applicentur, & umbilicus scilicet arte & debite constriungatur.

Commendantur quoque pulvis decoctum, insusum, vel vinum ex musco cum herba recenti fermentato paratum ad urinam ciendam, ad promovendas arenulas in urinariis meatibus hærentes, & ad nephriticos dolores sedandos. Cl. Tournefortius aquam diureticam ex hac herba conficit in urinae suppressione & nephritide præstantissimam.

℥. Herniaræ & Melissæ Tragi ana ℔j. Asperge salis marini M. ℔. & aquæ q. s. Digerantur per triduum. Postea in Balneo arenæ distillentur. Deinde aqua distillata iterum atque iterum novis plantis affundatur, & distilletur. Servetur ad usum Dosis ℥iv. cum vini albi tantumdem. Quarta quaque hora exhibeatur in urinae suppressione, & nephritide.

Extus inungantur abdomen, inguina, perinæum & lumborum regio oleo per infusionem parato ex Millepedum M. j. Cantharidibus n. x. & semin. Amineos ℔j. in olei Olivar. q. s. igne leviter decoctis aut sub solis æstivi radiis per triduum maceratis.

Præterea Herniaria ab Ettmullero inter plantas vulnerariæ numeratur. Anguillara scribit succum hujus porum, aut herbam esuriam, vel etiam emplastri modo plagæ impositam, morsis a vipera auxiliari. Idem refert eam jecori prodesse, & aquam ejus distillatam & potam intra dies octo iterum sanare.

Joann. Godofredus Gruhlmannus adversus oculorum caliginem Herniariam, quam ea de causa Oculariam nuncupat *Specimine publico anno 1706. Jene edito*, velut specificam promulgavit, & illius usum senibus æque ac juvenibus visionem lectionem scriptorum subtiliore charactere impressorum, diu nocturne debilitantibus commendat. Pulverem ejus pani butyro illito aspergit & mane

mane ac vespere exhibet: vel extrahit ex ea cum spiritu vini per infusionem & digestionem essentiam singulis auroris in iusculo vel aquam ejusdem distillata propinandam: quin imo pulverem ejus cum radice Helenii, foliis Verbenæ, Eufasiæ, Betonicæ, Chelidonii majoris, Majoranæ, Rutæ, addito saccharo in formam Tragæ non minori cum successu redigit.

H O R D E U M.

DUæ in primis Hordei species ad usum esculentum, & Medicum recipiuntur, scilicet Hordeum Polyctichum hybernum, & Hordeum Polyctichum vernum.

Hordeum polyctichum hybernum, *Off.* Hordeum Polyctichum hybernum *C. B. P.* 22. & *Inst. R. H.* 513. Hordeum polyctichum, *J. B.* 2. 429. *Raii hist.* Hordeum polyctichon hybernum majus, *Tab. Icon.* 274. Hordeum majus, *Tragi* 638. Hordeum primum, *Anguillar.* Hordeum, *Brunfelsi Matthesii*, vulgo, *Orge*.

Hordeum, ut reliquæ culmiferæ stirpes radicibus est fibrosæ, tenuibus numerosis: brevioris culmo quam vel Triticum vel Secale, sesquicubitali tamen interdum, & in lætiore solo bicubitali, quinque, sex, & pluribus interdum geniculis intercepto: ad quæ singula folia graminea, longæ, angustæ, culmum aliquoties obvolvencia, ima triticeis angustiora, superiora nonnumquam æquæ lata, scabrïora, & quousque culmos obvestiunt glauco quodam polline plerumque obducta. Spicas promittunt in ordines & versus nunc ternos, interdum quatuor, nunc sex, nunc octo axi dentatæ affixas digestas, longis, firmis, mordacibus & alperis aristis & glumarum apicibus prodeuntibus munitas: in quibus flores nascuntur apertali, staminibus plurimis constantes ex calyce ut plurimum triphylo surgentibus. In centro calycis seu glumæ embryo fructus reconditur, qui deinde abit in semen duas irseve lineas longum, pallidum vel flavescens, farinaceum, utrimque acutum, ventre tumido, glumæ, quæ calyx floris fuit arcte adhærensens, adeo ut eam deponere vix queat. Seritur in arvis autumnæ & sequenti anno colligitur.

Hordeum polyctichum vernum, *Off.* Hordeum polyctichum vernum, *C. B. P.* 22. *Inst. R. H.* 513. Hordeum hexacticum pulchrum, *J. B.* 2. 429. Hordeum polyctichon æstivum, *Tabern. Icon.* 275. Hordeum, sepius notissimum, *Leisl. Obs.* Hordeum senis versibus, *Matthesii Matthesii*, vulgo, *Orge de printemps*, *Orge avante*.

Priori breviores spicas præbet, & crassiores. Cæterum non differunt nisi solo sætationis tempore. Hoc apud nos in arvis verno tempore seritur.

Hordei stipulæ per maturitatem molliores sunt minisque fragiles quam triticeæ: unde & succulentiores sunt, & pabulum bobus, & vaccis atque lendis commodius, & pinguis suppeditant. Spicæ ob longitudinem, & gravitatem plerumque nutant & deorsum incurvantur, & vel viginti interdum grana in singulis versibus contingat. Ab eodem grano plures stipulæ exeunt.

Analyti chymica, ex granor. Hordei lbj. & 3viij. per retortam distillata pro-

prodierunt humoris limpidi, odore & sapore decoctum Hordei referentis, primum obscure subfalsi, obscure acidi, deinde, manifeste acidi ℞j. ℥j. gr. xxiv. humoris rufi, empyreumatici, impenfe acidi, acuti, primo obscure austeri, deinde manifesti ℞j. ℥x. ℥iv. gr. xlviii. humoris rufefcentis, empyreumatici, fale volatili urinofo copiofo, imprægnati ℥iv. ℥ß. olei fiffi fere adipofi ℥iv. ℥v. gr. xxxvj. Maffa nigra in retorta refidua pendebat ℞j. ℥xiiij. ℥vij. gr. xxxvj. quæ pulverata, & per decem horas rite calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥vj. gr. xl. illorum cinerum lixivium adeo vifcidum erat, ut chartam bibulam permeare vix, & nifi poft longum temporis intervallum valeret: ex cineribus falis alcali fixi ℥j. lixivio extracta eft. Partium jactura in diftillatione fuit ℞j. ℥vj. ℥j. gr. xxxvj. in calcinatione ℞j. ℥xj. gr. lxxvij.

Hordei femen feu granum multum falis essentialis tartarei continet cum fulphure craffo copiofo, nonnihil falis ammoniacalis & terræ adstringentis conjunctum. Ex hac mixtura compositum exurgit farinaceum, quod cum aqua dilutum vel coctum in mucilaginem abit adeo vifcidum, ut igne quidem defrui vix poffit: quandoquidem granorum Hordei insignis portio, (fere tertia pars) in carbonem convertitur, & cineres licet optime calcinati mucofam & vifcidam reddunt aquam. Hæc farinacea & mucofa fubftantia actuoſis donatur principiis, quæ, ſi ope aquæ in motum agantur, fermentationem concipiunt, mucofas partes dividuntur, attenuantur, ac compositum vinofum fit, ut experimur in Cereviffa poſtea acetofum, ac tandem evanidum aut putidum, ſicut ceteri fere omnes plantarum ſucci. Ex liquore vinofa feu Cereviffa ſpiritus ardensextrahitur ſpiritus vini haud abſimilis.

Hordeum non eandem cum Triticum facultates obtinet: ſi quidem Triticum calefacit: Hordeum vero quocumque modo paratum fit, nunquam corpus calefacit, ſed quodammodo refrigerat & abſtergit, & varie pro modo præparationis tum humectat, tum ſiccac. Coctum ut in piſana humectat, coctum ut in polenta ſiccac. Diſſet præterea a Triticum, quod ſuccum tenuem aut ſaltem minus craffum: ac deterſorium goneret, cum Triticum craffum ac lentum fit & nonnihil obſtruentis naturæ obſineat. Nonnulli obſervant Hordeum flatulens eſſe, & ſtomacho adverſari, quod quidem intelligendum eſt de Hordeo coctione aut fermentatione non debite ſubacto aut de ventriculo Triticeis aſſuefacto.

Ex Hordei farina olim apud populos quàmplurimos, panes conficiebantur, & hoc etiam ſæculo ſunt, verum in annonæ caritate & ad ſublevandam Tritici inopiam a tenuioribus præcipue. Apud nos certe, ſicut apud Romanos olim, mediocrem habet auctoritatem, ſaltem ad panificia: nam ad conficiendam cereviſiam valde expetitur, & a ſeptentrionalibus populis quotidiano uſu frequentatur, illis æque neceſſarium pro potu parando, ac Triticum pro pane. Reipſa Hordeum minus quam Triticum alit, difficilius concoquitur, quoniam minus habet lentoris, & corpori agglutinari, & adhærere æque ac Triticum nequit. Hordeum laudatur candidum, & purum, totum plenum, denſum ac ponderoſum, quantum ejus natura poſtulat. Reprobatur gracile, rugoſum, laxum ac leve. Nec ſtatim a meſſe & tritura eo utendum eſt, ſed loco ſiccò, & minime humenti per aliquod tempus condendum eſt propter humorem vifcidum ſupervacuum, qui

qui exhalari aut attenuari postulat. Quando vero mediocriter siccatum contrahi videtur, tunc ejus usus tempestivus est, idoneus & salutaris. Cortex autem exterior, qui furfuraceus, interiore pulpa seu farina siccior est, minime vel parum nutrit, abstergit, & purgatorium quid, monente Hippocrate, obtinet.

Variis modis Hordeum paratur, vel ut alimentum sit, vel ut alimentum medicamentosum.

1. Panes ex Hordei farina conficiuntur. Triticeis friabiliores, & multo inferiores, pabulum tenuioris fortunæ hominum præbent, iis tantum accommodati sunt, qui duros subire labores necesse habent, robustum enim ventriculum requirunt: quapropter apud Athenienses, narrant Plinio, gladiatores, qui eo frequenter vescerantur, hordearii cognominati fuerunt. Dicuntur etiam convenire catarrhis, hydropicis, & mulieribus, quibus menses immodice fluunt. Laudabiliores sapidioresque panes evadunt, si Hordeum cum Tritico, Spelta, aut Secali æquis portionibus miscantur.

2. Maza Græcorum, & Latinorum, genus panis Hordacei apud veteres usitatum, Hordei tosti farina est liquore aliquo confecta atque subacta v. g. aqua, oleo, lacte, vino, sapa, melle, &c. Hinc forte placente, quæ in officinis ex amygdalis, & saccharo conficiuntur, Massipanes nominantur. Maza coquitur, inquit Galenus L. 1. de alimentis cap. 12. panibus Hordaceis ægius magisque ventriculum statu implet, in quo, si diutius manserit,urbationem excitat. Citius autem subducitur seu dejicitur, si bene commixta fuerit ac diutius subacta. Quod si mel quoque addatur, citius etiam ventrem ad excretionem excitabit.

3. Polenta, ἀλευρον Græcis, geminam habet apud Auctores significationem, generalem & specialem. Generaliter quamlibet farinam cujuslibet frumenti & leguminis denotat. Fragmenta enim omnis grani mediocri magnitudine moliti ἀλευρον vocabant prisca: majora fragmenta ῥίμια seu farinas crassiores, vulgo Griau ou Gruau: minora ἀλευρον, farinas tenuiores. Specialiter polenta farinam Hordei recentis tosti vel frixi, ex qua pulvis parabantur cum aqua, vel lacte, vel passo significat. Ait enim Plinius Polentam ab Hordei farina eo distare, quod torreretur. Fit Polenta laudatissima inquit Galenus L. 1. de Alimentor. facult. c. 11. ex recenti Hordeo mediocriter frixo. Græci Hordeum aqua perflutum siccabant nocte una postero die frangebant: tum molis frangebant. Alii vehementius tostum rursus exigua aspergebant aqua, siccabantque priusquam molerent. Nonnulli Hordeum virentibus spicis decussum recens purgabant, madidumque tundebant in pila, atque in cordibus eluebant, ac sole siccatum rursus tundebant, purgatumque molebant. Polenta omnis ait Galenus loco citato, quæ quidem legitime decensique facta, boni odoris est: sed suaveolentissima illa, quæ ex optimo & recenti Hordeo, quod spicam non admodum siccam habet parata. Addit insuper morem esse compluribus eam sapa & vino dulci mulsoque commixtis, nonnumquam sola aqua confersam, æstare duabus tribusve horis ante balneum bibere, idque sitis extinguendæ gratia. Sæpius antequam Hordeum torretur, pinfereturque; Linum Salem & Coriandrum miscebant, quorum hanc proportionem ac mensuram Plinius refert. Recipiebant Hordei ℥xx. Semin. Lini ℔ij. Coriandri ℔ss. Sa-

℞. Salis ℥ij. His omnibus tostis, & simul tritis utebantur. Polenta leve, & exiguum præbet alimentum: privatis quidem & ab omni exercitatione liberis satis multum: iis autem qui quoquo modo exercentur, minus, quam satis est. Desiccatur vero magis quam Hordeum: alvum quoque cohibet.

Hodie in quibusdam Galliarum Provinciis sicca Hordei farina quasi torrida & in clibano resiccata venalis circumfertur, inspissandis carniū jusculis inserviens. *Griotta* vulgo dicitur aut *Grûu*. Offic. genus etiam paratur ex Hordeo sub mola trito in aqua & sale elixato aique despumato, cui lac aut butyrum adjiciuntur. Vocant *des Grûaux d'orge*. Ex avena quoque torrida conficiuntur, quæ *Grûaux d'Avoine*.

4. Ptilana, Ptilana *Latinorum*, πτίσανη, ἢ πτίσανη *Græcorum* quadruplicem significationem habet: impropriam, generalem, specialem, & specialissimam, ac priscis medendi artificibus usitatam.

Improprie in officinis ptilana sumitur pro decocto Hordei, quod tenue est, & substantiæ ejus parum retinet. Adduntur autem Hordeo etiam alia; v. g. Glycyrrhiza, Graminis radix, Palsulæ, Jujubæ, Ficus, Semina &c. Sumitur Hordeum integrum, cum mundificandum, abstergendum, siccandum: excorticatum vero, quando leniendum, mitigandum, emolliendum, sistique magis extinguenda.

Generaliter, pro quovis frumenti genere, quod pistum est, suoque cortice spoliatum, juxta vim vocis: πτίσανη enim vox videtur Athenæo deducta ἐπὶ τῇ πτίσανη, quod est tundendo deglubere, seu pinsendo decorticare. Verum ptilanam istam non simplici ptilanæ nomenclatura, sed addito frugis, ex qua constabat, nomine veteres exprimebant. Hinc dicebatur: πτίσανη πυρρή, ptilana triticea; χοδροπτίσανη, in ζείας καὶ ἑρβίης πτίσανη, quæ ex alica, zea, & oriza parabatur: quæ sit ex lentibus πικροπτίσανη.

Specialiter, pro Hordeo pisto & decorticato cui proprie & peculiariter ptilanæ nomen competit. Hordeum enim tundendo deglubebatur, ac suo cortice spoliatum, recondebatur ad usum. Officinæ Hordeum mundatum hodie appellant: vulgo, *Orge monde*.

Specialissime, & juxta vulgarem Medicorum acceptionem, pro πτίσανη specialiter sumptæ χυλὴ καὶ ριζομήνη hoc est ptilanæ cremore seu succo, & sorbitione. Celsus tamen jus Hordei integri, quod decortikatū non est, in aqua tantisper decocti, dum coctione dissiliat, Hordei cremorem vocat: qui biliosis, & ardentibus febribus propinatur.

Ptilanam coquendi ratio aliis atque aliis diversa fuit, sed Græcis maxime vulgata hæc est, & optima quam Galenus annotavit *L. 1. de Ptilana cap. 4. & Lib. 1. de Alimentor. facultat. cap. 9.* Monet autem ad illius confectionem eligendum esse Hordeum optimum, & quod inter coquendum in magnam molem attollatur, & aquam optimam. Primum veteres Græci Hordeum crudum in aqua macerabant. Deinde maceratum manibus contrebant, donec exterior cortex manibus esset excussus. Tum validius iterum manibus confricabant, quousque totum illud quod paleacetum erat, ablatum esset: nisi ptilanam parare vellent majori abstergendi virtute pollentem: tunc enim Hordeum cum

tum ipso cortice exteriori coquebant. Coquebant id autem primum vehementius, ut bulliret multum: postea igni blando, donec in cremorem abiret, qui etiam jus, succus, & lac, *ρῆγμα* græce & *χυλος* appellatur.

Hæc erat psisana veterum simplicissima. Compositam tradit Galeus, loco citato. Coquitur Hordeum decorricatum in aquæ decem, vel, ut Paulus Ægineta ait, quindécim partibus: daturque inter coquendum opera, ut quam amplissime intumescat. Cum in tumorem est sublatum, aceti infunditur momentum, deinde olei exiguum; quod tamen etiam per initia injici potest. Quando ad exactam coctionem perventum est, sal friatus inspergitur, neque aliud quidquam præterea admiscetur, nisi forte Anethi aut Porri pauxillum. Et talis quidem est optima psisanæ confectio. Ab ea multum aberat quam plerique aliis multis superfluis imperite condiebant. Alii namque Amylum, alii Sapam indebant, alii Mel, & Cuminum, cinnam potius quam psisanam parantes. Nec defuit illis forte ratio, quod sic Hordei crassitiem tenuari, lentorem incidi, statum discuti arbitrentur.

Hippocrates *l. de visu in acutis*, qui & *de psisana* etiam inscribitur, miris psisanam laudibus extollit, eamque omnibus frumentaceis sorbitionibus in acutis morbis præferendam judicat. Tunc enim de carniū usu in morbis nulla erat mentio. Galeus *in Commentariis* ait dicti Hippocratei veritatem elucere, si acutorum naturam, & qualitates viresque psisanæ considerentur. Etenim morbi acuti cum febribus sunt conjuncti, & quidem putridis validisque: ideoque ratione febrium opus iis esse refrigeratione, & humectatione: ratione putredinis concoctione, & evacuatione, concoctione quidem eorum quæ adhuc concoqui, & ad meliorem statum redigiqueunt: vacuatione illorum, quæ jam plane sunt exusta, & concoquæ amplius non possunt; poscere etiam eosdem acutos morbos refecutionem & refocillationem, virum causa; hisce autem scopis, & intentionibus omnibus psisanam satisfacere. Revera ab omnibus antiquis Medicis psisana acutis, & ardentibus febribus accommodatissima censetur. Refrigerat enim lentis ac viscidis suis partibus sanguinis, & humorum æstum ac effervescentiam compesceudo: humectat, solidas partes nimis rigidas emolliendo, sicciore, & crispas aquosis ac lentis particulis irrigando, humores vero spissos & viscidos dissolvendo, sanguinem fluxiliorem efficiendo, & ad circuitum suum placide, & æqualiter perficiendum aptiorem reddendo: magis sitim extinguit quam ipsa aqua, non solum humorum acrimoniam retundendo, sales, & sulphura nimis evoluta involvendo, & irretiendo, solidas partium fibrillas emolliendo, sed etiam lentore suo aqueas fluxiliores particulas intra fibrarum poros diutius retinendo: humores crude ad coctionem disponit, tum succos inspissatos, & coagulatos dissolvendo, tum solidas in quibus reconduntur partes emolliendo & laxando. Cruditas enim humorum vel eorumdem spissitudo nimia, vel nimia partium continentium contractio aut erethismus, quibus diluentia apprime medentur: putridos humores abstergit, & evacuat eandem ob causam, restituendo nempe & secretiones & excretiones debitas: facillime concoquitur, & quaquaversum digeritur: Quid est enim psisana? nisi chylus vel potius lympa jam fere perfecta, quæ succum nutritio succo congenerem nutritioni aptissimum continet, multa aqua dilutum, tenuissimum, levissimum, fluxilem, qui ventriculi succo facile confociatur, per totum corpus cito diffunditur, sanguini, & humoribus

prompte, & intime permiscetur, eos diluit, fluidiores efficit, & partibus omnibus nutrimentum exiguum quidem sed convenientissimum, quale in febribus requiritur, suppeditat atque circum vehit. Alimentum est insuper innocentissimum, omni potentiori qualitate vel excessu carens, qui quidem aliqua dignus sit animadversione aut reprehensione: non enim salium, & sulphurum exuperantium majori copia donatur, sed omnia principia in eo ita sunt commixta, temperata, & assueta, particula aquæ, & terrestribus partibus adeo exacte involuta, & subacta, ut gustu excessus nullus percipiat. Nullam inflammationem in partibus, nullum æstum in sanguine, in bile nullam effervescentiam excitare valet: quin imo si quæ sint turbæ in humoribus, ab ea facile sedantur, & coercentur. Si quid flatulenti in cerealibus deprehenditur, corrigitur in psisanæ tostione, & coctione, quibus viscidæ ejus particulae sufficienter attenuantur.

Præstantissimo hocce alimento medicamentoso antiquiores Medici in acutis ægriantium vires suslinebant, naturæ morborum medicatrici opitulabantur, nullas morbo suppetias ferendo. Nec indiscriminatim psisanam granulofam, aut psisanam jurulentam cuicumque ægrotanti afferebant: sed modo cremorem solum, modo psisanam, modo cremorem variis proportionibus psisanæ consulum, quantum scilicet ægro cuique pro varia febris ætate, aut indole conveniebat, psisanam plus aut minus cremore dilui. Psisanam enim nemini perscrutantur indulgebant, nisi biduo post crism vel catharsim elapso, cremorem prope nemini, etiam minus robusto, dum crisis erat futura quarto die; nec ante septimum, si septimo tantum crism futuram autumabant, & vires essent ferendo pares, sola portione contenti aut mulla seu hydromeli, aut apomelite (a), aut aqua frigida vel calente. Secus, cremoris oxybaphæ (b) duo, id est uncias quinque dabant; simul ac semel, si semel tantum cibum sumere solitus fuerat ægrotus: bis, & cremoris dosi supradicta in duas partes divisa, si sanus bis pasci fuerat assuetus; æqualibus vel inæqualibus portionibus, pro ratione consuetudinis in sumendo cibo, dum valebat. A primo vel secundo die tam exiguum demensum magis magisque minuebatur, donec morbus pervenisset ad criseos tempora, id est, ad septimum, nonum, undecimum morbi diem; eo die nihil dabant præter potionem. Judicato morbo per crism vel per concoctionem, alimentum quibus gradibus imminutum fueret, augebatur. Biduo post crism addebatur cremori, psisanæ seu grani concocti nonnihil. Hoc sensim augebant imminuta cremoris portione, auditis dosibus, donec ad solidum alimentum per ova, pisciculos, avium corallium extrema fieret seditus. In hoc curriculo, sit fastidiebatur cremor psisanæ, panis bis, ter, quater, quinque, sexies elorus, donec aquæ innataret, sorbitioni fastiditæ sufficiebatur: Nec ex Hordeo solo alimonia febrientium petebatur, sed ex Zea, Chondro (c), Trago (d),

(a) Decoctum paratum ex melle vel favis cum aceto commixtus, & tantisper a coctis.

(b) Oxybaphon, acetabulum, mensura.

(c) Alca, & Chondros granum significant ex Zea frumenti specie paratum fore quod simile a l'Orge perle.

(d) Tragus sit ex Olyra decorticata: Olyra est vel ipsa Zea, vel Zeæ aut Triticum respondet. Fortè erat gruti species ex hoc frumento.

deinde alica facticia, oriza, deinde Milio, imo & ipsis leguminibus. Ex his prisanas conficiebant, nunc solo nomine notas, olim tam vulgares ut vix eas describere dignati sint veteres. Nonnunquam & carnis nonnihil adiciebatur; sed hæc magis medicamenti vel condimenti nomine, quam alimenti, si quando liquiditas alvi aut fastidium stomachi infestaret aut metueretur. Nunc vero apud nostros homines harum sorbitionum vestigia sola supersunt: prisanæ hujus ætatis, nudum nomen nisi quod Hordei nonnihil continent, ut constet aliqua nominis ratio.

Nec solum jussula carniarum inolevere, exoletis jam tot plurimorum sæculorum auctoritate confirmatis prisanis. Sed (quod quidem serio consideranti mirum videbitur & ab omni ratione alienum) postremis hisce temporibus, una cum jussulis carniarum, pro antiquariis multiplicibus veterum scitis, de delectu, de mensura, de modo seu systasi, de intervallis alimentorum sorbitionum; de his sensim mihiuendis, augendis, vel omnino prohibendis pro ratione virium, ætatis, consuetudinis, temporum morbi: una successit lex omnium naturarum, ætatum, tempestatum, febrium utcumque inter se distantium communis, ineunte, procedente, vigente morbo, trium quatuorve horarum intervallis sorbitiones exhibere, non quales veller Medicus ex artis decretis, hoc est leviores, ac leviores febre gliscente, sed a primordiis ad summum succo carniarum majorum quadrupedum opimarum valentissimo refertas, & quantas ventriculus ægri potest admittere, hoc est, librales, vix exceptis paroxysmorum gravissimis temporibus. His autem vix minus quatuor libris bubulæ, vitulinæ, vervecinæ uni febrienti in unicum dæm deputantur: adeo ut multo plus alimoniarum ægrotanti homini quam sano aggeratur. Liquidæ tantum inveniuntur carniarum, illis offeruntur sorbitiones & carniarum longa coctione elicite. Verum quid est illa sorbitio nisi carniarum succus, adeo compactus ut jam fluiditatem suam amitteret, & in gelatinam concresecat; extractum potius salibus & sulphureis carniarum onustum & ideo ipsis carniarum magis noxium. Et reipia hæc jura sæpe ventriculum ægrum sollicitant, ardorem in eo concitant, difficile concoquuntur, imo citissime corrumpuntur, varia symptomata pariunt, ructus nidosos, nauseas, vomitiones, diarrhæas, sulphurei fœtoris intolerabiles dejectiones, insuperabile fastidium, & alia huic alimoniarum potius imputanda quam febrili: tandem in sanguinem irrepta variis illum imbuunt partibus incendiariis, sulphureis, salinis, aquosis, quibus conturbatus vehementer effervesce, febrilis excandescit ardor: ita ut non tam ægri vires his alimentis sustineantur, quam putridorum humorum copia & morbi robur augeantur & crescant. Sed ad Hordeum redeamus.

Inter diversos Hordei præparandi modos tres nobis aliquantisper adhuc usitati supersunt. Unus qui decoctum Hordei de l'eau d'Orge in officinis dicitur: alter a veterum prisanarum parum discrepans, Hordeum mundatum dicitur, vulgo, un Orge monde: Tertius Hordeatum de l'Orgeat, de l'Orge passe, seu cremor Hordei de la Creme d'Orge.

Decoctum Hordei vel simplex est, vel compositum. Simplex præparatur ex Hordeo vel integro, quod ratione corticis magis detergit, & in obstructionibus magis conducit, vel decorticato seu mundato, ut ajunt,

quod paulo magis refrigerat & incrassat. Cum aqua communi purissima plus minusve coquitur, modo ad granorum molliem tantum & turgentiam, modo ad perfectam crepaturam, ut ajunt, seu donec granorum tunica a nimia farinaceæ substantiæ rarefactione disrumpantur. Hæc decocta in febribus ardentibus & aliis ægitudinibus utiliter usurpantur ad humores crassos & viscidos diluendos, ad humorum acrimoniam temperandam ac demulcendam.

Compositum vero decoctum Hordei fit cum radicibus Glycyrrhyzæ, Graminis, Cichorii, aut aliis aperientibus, Scorfonneræ, Lapathi, Bardanæ &c. Passulis, Jujubis, Ficibus, Dactylis, seminibus, & aliis diversis pro diversis indicationibus. Sic Ettmullerus in plenitide laudat potum ex decocto Hordei, in quo flores Papaveris erratici aut Bellidis infusi fuerunt; in variolis & morbillis decoctum Hordei cum Cornu Cervi; idem decoctum cum radice Chinæ in febribus ardentibus & cum radice Scorfonneræ in petechialibus.

Hordeum mundatum ex Hordeo integro conficitur, eoque laudatissimo, & pistrino gluma sua decorticato, quod *Orge græ* nostrates appellant: cujus pars quædam in aqua maceratur, abluitor, & iterum manibus teritur, ut quidquid exterioris tegumenti inter pinsendum reliquum est, defricetur. In hâcilli postmodum reponitur, nova aqua affunditur, & in ea elixatur per quinque, sex, vel septem horas, donec in cremorem abeat: sed ne ebullitio interrumpatur, cum nova aqua opus est, tepida affundenda, & igne blando coquenda præsana granulosa, in qua nempe semen ipsum restitat: ut vero melius fiat hoc Hordeum mundatum, quidam ab initio butyrum recens addunt, sub finem vero salis quantum satis. Sic paratum ab infima plebe comeditur. Alii ut suavius sapiat, Amygdala, & ad refrigerium semina Melonum vel Cucurbitarum admiscunt, & insuper multo Saccharo condiunt. Hujus multus est usus per rotum quadragesimale jejunium commodum præbet alimentum, & succum laudabilem in sanis & ægris generat.

Hordeatum quod veterum præsanae cremor, nobis *Orgeat*, sic conficitur. Hordeum, ut diximus decorticatam, maceratam & manibus fricatum, atque per horas septem octove elixatum in mortarium marmoreum conijcitur, cum Amygdalis dulcibus decorticatis denuo teritur, & sic trajicitur crassius, aliis liquidius tum additur Saccharum, & patinæ argenteæ impositum iterum prunis leviter ebullit, atque exhibetur sanis, ægris, tussientibus, extenuatis, his qui noctes ducunt insomnes, quo tempore semina quatuor frigida majora adjiciuntur. Cum post colaturam coquitur denuo, crassius fit, & magis nutrit: sin minus, liquidus est, & avidius a multis sumitur, sed minus alit: propterea non tantum semel in die circa horam somni porrigitur, sed bis ter aut sæpius julpiorum in morem propinatur. Interdum præsanae sub finem coctionis lac additur, quo nomine suaviter estatur, sed febricitantibus non convenit.

Si vero æger uberiori nutritione refrigerante & humectante opus habeat, vel Hordeum incoquitur cum pallastro vel frustulo carnis vitulinæ: vel post longam in aqua elixationem, jus carniæ affunditur & transcolatum simul cum Hordei cremore hauritur.

Quoddam apud Germanos & Belgas Hordeum præparatur in granula rotunda candida seminis Milii magnitudine contritum, quod Hordeum perlatum dicitur,

citur, ex eo quod semen margaritas forma, crassitudine, candore quodammodo referat. Confititur ex Hordeo decorticato, & suspensa mola trito. Fortasse non multum differt a crinno veterum, quod *κρίνον*, Galeno monente, crassior farinæ pars est, quæ effracto Hordeo grandiuscula invenitur, quæ exquisitiorem molæ contractionem refugit, & per cribrum laxiora habens foramina transmissa est. Ex eo apud Hermanos Pulvis modo cum aqua, modo cum lacte, nonnunquam cum jusculo carniarum conficitur.

24. Hordei integri ʒij. Decoque in aqua pura; sed primum servescita abjiciatur: nova addatur, ad q. s. & coquatur igne lento ad ℥ij. Fiat colatura sine expressione. Adde Sacchari rosati vel syrupi cujuscumque ʒj. Sumat æger pro potu solito, ad leniendam tussim, & ad sanguinis æstum in calidis affectionibus compescendum.

25. Hordei integri optime loti M. j. Radicum Gramin. Bruscæ, & Cichorii ana ʒj. Coquantur in aq. comm. ℥iiij. Sub finem coctionis adde folior. Taraxaci, Scolopendrii ana M. j. Liquiritiæ rasæ, & contusæ ʒij. F. apozema aperiens per cyathos, tertia quaque hora, propinandum.

26. Hordei mundati ʒj. Bulliat leviter in aq. q. s. rejicienda. Nova, & limpidissima affundatur ad ℥iiij. & coquatur ad molliem. Tum adde Passularum ʒß. Caricas ping. n. ij. Glycyrrhizæ rasæ, & contusæ ʒij. Bulliant per horæ quadrantem. Adde sub finem, Capillor. vener. Canad. florum Papaveris rhæad., & Tussilaginis ana M. j. Decoctum refrigeratum transeoletur, & pro potu servetur. Ad tussim sedandam, humorum acrimoniam compescendam, expectorationem promovendam.

27. Hordei mundati optime loti ʒij. Coquatur in aq. purissimæ q. s. igne lento ad crepaturam. Trajice deinde per colum, & ad ʒviiij. adde Sacchari ʒj. vel syrup. de pomis simplic. de Althæa aut alterius ʒjß. aq. florum Aurantiorum ʒj. Fiat Hordeum mundatum. Capiat mane, jejuno ventriculo, & vespere, dum sit cubitum ad temperandam humorum acrimoniam aut somnum conciliandum.

28. Hordei mundati loti ℥ß. Fiat decoctio in aqua fortis purissima lento igne usque ad perfectam crepaturam. Aquam colo separa: & extrahe pulpam seu medullam ab Hordeo per setaceum, quæ ad pultis consistentiam cocta servetur in vase terreo vitreato optime cooperto, & in loco frigido non multum humido, quia cito liquefceret. Hujus pulpæ duo aut tria cochlearia dissolve in jusculo, & coquantur per semihoram ad modum liquidæ panatellæ, seu cremoris Hordei antiquor. addendo si lubet aq. florum Aurantiorum perparum. Capiat æger bis aut ter in die.

29. Hordei perlati vel Hordei mundati ʒij. Coque cum frustulo colli carnis viulinæ vel cum pullo gallinaceo. Colatura sumatur instar liquidioris panatellæ. Ad tabidos, & hæcticos nutriendos.

30. Hordei mundati ad crepaturam cocti ʒjß. Amygdalas dulc. decorticas n. vj. Semin. Meloni ʒij. Contunde in decoct. Hordei ʒxvi. Expressioni adde syrup. de Althæa aut Nenuphar. ʒij. aqua florum Aurantior. ʒij. Fiat emulsio pro duabus vel tribus dosibus.

Cerevisia, & Cervisia: Gallis olim *Cervoise*, nunc *Bierre*: *Zuider* aut *Zythus Aegyptiorum*, & *Græcorum*: *Κῆρος* *Dioscoridis*: *Οἶνος* *Martiani* *Diodori Siculi*, seu vinum Hordeaceum. *Πῖνος* seu *Πῖνος Arabum*: *Βρυαν* *ejusdem*: *Βρυαν* *Hesychii*: *Φῶνος* *Simonis Sethi*, & *Arabum*: *Φῶνδος* aliorum: *Cœlia*, & *Ceria Hispanorum*, *Plinii*: *Potus* *Peleusiæcus*, *Columelle*: *Sabaia* *Illyticorum*, *Ammiani Marcellini*. Potiones sunt inebriantes non prorsus dissimiles. Ex Hordeo vel aliis Cerealibus præparatæ, licet ratione præparationis granorum, fermentationis, aut admixtarum rerum aliquantisper differant.

At Cerevisia nostra potus est aqua cum Malto infusione paratus & fermentatus, medix quodammodo inter aquam, & vinum naturæ.

1. Ex Hordeo. Triticove, vel utroque Maltum, *Basis Antii*, & *Brafium Quorundam*, ad conficiendam Cerevisiam sic præparatur.

Grana Hordei vel Tritici in ampla cupa lignea macerantur per unum aut alterum diem, donec cum mollitie intumescant. Deinde subter infusa aqua, grana eximuntur, & in pavimento asseribus strato paulum exsiccantur, ut nimius humor aquosus evaporetur. Humida adhuc aliquantisper coacervantur ad altitudinem circiter dimidiæ ulnæ, quo protusis perpusillis radicum cirris seu filamentis germinant, & quasi fermententur.

Germinatio hæc quo rectius successit, eo porosior evadit Malti substantia, ac infusioni extractionique aptior. Sub germinatione autem hæc grana quotidie bis terve versantur, ac moventur, ut æqualiter germinant, ne quædam grana calore nimio suffocentur, & putrescant, quædam autem substantiam seu medullam omnem in filamenta ejusmodi effundant, quædam etiam in superficie, & per ambitum locata ab aeris frigore in germinatione impediuntur.

Postea vero ne nimia ejusmodi germinatione Maltum quasi enervetur, & nimiam actuosarum partium quantitatem deperdat, grana ita germinantia laxè & sulcatim dispersa aëri exponuntur ac sensum siccantur, vel tandem etiam supra tabulatum quoddam, igne subiecto, blando calore torrentur sæpius sub rostone versando ne adurantur. Torrefactio tamen si nimia fuerit, Cerevisiæ saporem ingraram conciliat.

2. Maltum molle molarum beneficio ad xremorem redigitur, ac dein aquæ ferventissimæ in cupa lignea infunditur, ea fere quantitate ut pulmentum referat, & a viris robustis, per aliquot vices, ligneis quibusdam instrumentis planioribus probe agitur, donec spuma in superficie appareat, quod signum sufficientis extractionis est: si maceratio hæc aut extractio justo diutius protrahatur, Cerevisia evadit crassior, mucaliginosa, ac dein vix fermentescit, cujus causa in particulis terrestribus simul extractis latet. Deinde beneficio colatorii cujusdam lignei in cupa repositi, infusum cremore Malti imprægnatum transcolatur: continuo iterum exhaustur, & in caldario ad ignem rursus coquitur per semihoram, sesquihoram aut aliquot horas ut melius conservetur, adjectis aliquot manipulis florum Lupuli italicarii. Mox in cupas, ut resigescat, distribuitur. Tandem hujus decocti frigescenti libris octo vel decem, fermenti sive focis Cerevisiæ libra aut sesquialibra adduntur exactè agitando, in loco tepidiore: stragulis operiuntur, sensimque reliquus liquor affunditur, ut com-

et commodius fermentescant. Quibus absolutis liquor fermentescens transcolatur: vasa adimplentur, & demum fermentatione absoluta exactissime occluduntur.

Eidem Malto nova aqua affunditur servida, transcolatur, & ex colatura tenuis Cerevisia concinnatur.

Quo diutius liquor Malto imprægnatus decoquitur, eo durabilior est Cerevisia, & ætatem melius fert; cæteris paribus. Lupulus Cerevisiæ incoctus, eidem diutius asservandæ, & ab aciditate tuendæ intervit, quod efficit amarore insigni quo pollet, quin & eandem sapidiorem salubrioremque reddit, nimium autem lentorem attenuando, obstructions, quas Cerevisia sæpe gignit, apertiendo, & abstergendo. Quæ sine Lupulo Cerevisia conficitur, Ala dicitur ab Anglis. Si generosior sit, maxime nutrit, & corpus obesum nimis, & pigrum reddit. Cerevisia vero lupulata Pinguedinem dissipat, corpusque vegetius, & ad motum aptius efficit.

Cerevisia non ut simplex potus consideranda est ad sitim extinguendam, & sanguinem humoresque tantummodo diluendos apta, sed ut potio alimentosa, cujus lymphæ actuosæ granorum partibus fermentatione evolutis imprægnata, & plurimis eorundem mucosis partibus eadem fermentatione attenuatis, & in motum actis onusta plurimum nutrit, sanguinis motum auget; & si nimia quantitate sumatur, caput ferit, & inebriat. Revera distillatione, spiritus ardentis, spiritui vini haud dissimilis, portionem non mediocrem suppeditat, olei plurimum, & humoris acidi. Salem essentialem continet tartaro æmulum, sed crassiores aut terreis ac oleosis particulis magis involutum.

Observandum autem diversis esse Cerevisiarum qualitates pro casum differentia, quæ multiplex est ratione materiei frumentacæ, Malti, aquarum, coctionis, fermentationis, substantiæ, ætatis, necnon etiam locorum, in quibus conficitur, ut accurate notatum fuit à Doctiss. viro Conrado Bartholdo Behrens in *Selectis Dieteticis*.

Frumentacea materia in genere selecta, & bona esse debet: & quo firmius est frumentum, eo firmior quoque potio. Ratione vero ejusdem, primo Triticæ est, quæ quidem calefacit, valde nutrit impingatque: sed sanguinem simul viscidiores reddit, respirationis difficultatem, & asthma inducit, viscerum obstructions parit, urinam moratur, & nephritidi occasionem præbet, alvum tamen lubricat. Hordeacea succi tenuioris est, nec ita nutrit ut Triticæ, magis tamen aperit, abstergit ac urinam movet, præteritum lupulata, quæ ventriculum roborat, & calefacit. Avenacea in Polonia frequens minus calefacit ac nutrit, & si non satis desecetur, flatulenta valde est, & alvum constipat. Urinas, & calculum pellit, in frequenti apud Anglos capropter usum. Scetalina vinum Rhenanum colore subviridi æmulatur, nec ingrati saporis est, valde nutrit, simul tamen obstruit, & urinam moratur: respirationem difficilem reddit.

Ratione Malti nimis torrefacti Cerevisia saporis plerumque ingrati existit. Maltum vero quod calore Solis tantum exsiccat, facile corrumpitur, nisi fervetur accuratissime. Cerevisiam suppeditat candidiorem, sed excrimentitiam, quæque simul obstruit, & pectoris difficultatem inducit.

Ratione aquarum, facile per se patet optimas esse, quæ ex fontana aliisque salubribus parantur. Quo enim aqua est levior, & tenuior, eo

melius granorum, & Lupuli qualitates imbibit, & extrahit. Quæ ex puteali, & stagnanti aqua conficitur, lapidior quibuldam videtur, nec adeo facile acescit. Sed improbanda est aqua turbulenta, & impuriatibus conspurcata, & corrupta, ne coctione, & fermentatione non satis purgari, & defæcari possit, quicquid alii contra sentiant.

Coctio etiam ipsa ut & fermentatio non exiguum momentum ad Cerevisiæ bonitatem conferunt, ut jam dictum est.

Ratione substantiæ alia Cerevisia est tenuis, alia crassa. Tenuis existit ob frumenta pariori manu adhibita. Ejusmodi vero Cerevisia parum nutrit, melius vero humectat, refrigerat, diluit, & totum corpus pervadit, unde quoque magis diuretica, & salubrior est. Crassa vero duplici ratione dici potest Cerevisia, 1. quatenus turbida, & fœculenta est; quæ plerumque crudæ ac stagulentiæ sunt, difficulter digeruntur, obstructions, colicos dolores, stranguriam calculumque, quandoque subito, & quasi in instanti causantur, sanguinemque crassum generant. 2. Crassior fit Cerevisia propter frumentum copiosius additum. Cum enim particulis farinaceis Cerevisiæ ejuscemodi turgidæ sint, chylo quoque diluendo minus adequatæ sunt, illis qui multo, & euchymo alimento utuntur, aut vinum bibunt, non admodum conveniunt, qui quidem rectius potu tenuiore sibi consulant. Quibus vero ventriculus imbecillior, aut qui alimenta sumunt pauciora, & parum nutritia, iis Cerevisiæ illæ pinguioræ apprime conducunt, cum & ventriculi digestionem subveniant, adeoque condimenti vices præsentent, & simul nutrant, unde & plurimis inde insignis corporis crassescencia, & obesitas.

Ratione ætatis præstat Cerevisia defæcata, præsertim tenuis, quamvis enim minus nutriat, facile tamen distribuitur. Recensior vero si simul turbida & crassa sit, incommoda modo recensita accelerat, & adauget. Vetusta, quæ acescere incipit, nervis, ventriculo, utero, renibus, & vesicæ noxia.

Dulcis fit Cerevisia a frumento, amara a Lupulo. Illa magis nutrit, non ita tamen cum urina secedit, obstructions parit. Hæc magis calefacit, mesenterium, & viscera deobstruit, citius tamen caput afficit, inebriat, ac somnolentiam inducit.

Diversis etiam qualitatibus imprægnantur Cerevisiæ a diversis rebus quæ sub fermentatione adduntur. Ita in Hollandia Cerevisia cum aromatibus paratur quam vulgo *Bottelbier*, lagenariam Cerevisiam vocant, quæ adhuc fermentescens in lagenis reconditur, & aperta lagena tota in spumam abit. Valde stagulenta est, & periculosum Zithi genus a nonnullis censetur. Non tamen sua laude caret, cum, si moderate, & tempestive sumatur, ventriculum, & digestionem egregie roboret, & in paralyticis affectibus utilis dicatur. Multæ parantur Cerevisiæ medicatæ: apud Anglos Borriginare, ab admixta Borrachine, usitatæ. Aliæ Absinthium, Carduum benedictum, Scordium, radices Gentianæ, Helenii, Angelicæ, & sexcenta alia habent admixta quorum saporem, & vires obtinent.

His Cerevisiarum differentiis addi possent illæ, quæ a regionibus, & urbibus petuntur, quæ innumeræ sunt. Sic Anglicanæ plurimi æstimantur: Brunsvicensis apud Germanos præstantissima dicitur. Apud nos quæ in S. Marcelli suburbio præparatur: vulgo, *Bierre des Gobelins*. Sed de singularum virtutibus agere non est nostri instituti. Jam de hac re prolixiores fuimus.

Ex

Ex Cerevisia spiritus ardens conficitur spiritui vini aliquantisper similis, sed odore & sapore minus grato, imo acri, ob oleum empyreumaticum crassum & acre, quo spoliari vix potest. Idcirco ad usum internum spiritus ex vino extractus semper anteponendus est. Chirurgi observant quod hunc spiritum externe vulneribus admotum minus conducere ob acrimoniam, qua vulnera aliquantisper proritat. Externe hunc spiritum ex frumentaceis granis extractum anodynum dicunt aut soporiferum.

Farina Hordei inter quatuor farinas resolventes recensetur; & sunt farinæ Hordei, Fabæ, Orob, & Secalis: quibus nonnumquam substituitur farinæ Triticæ, Lini, Fœnu Græci & Lentis. Hæc farina externe sub forma cataplasmaus admota emollit, resolvit, maturat, & anodyna est. Quapropter vel sola, vel cum aliis farinis adhibetur in cataplasmatibus.

℞. Folior. Malvæ, & Althææ ana M. ij. Flor. Chamæmeli, Melilot. summitatum Aneth. ana M. ss. Coquantur in aq. q. s. ad putrilaginem. Contusis adde farinæ Hordei ℥ij. Olei Chamæmeli ℥jss. Fiat cataplasma resolvens & emolliens.

℞. Quatuor farinar. resolventium ℔ij. Coquantur in lixivio leni cinerum Sarmentorum. Tum effuso per vasis inclinationem lixivio, massæ farinacæ adde pulver. florum Camomillæ, Meliloti, Sambuci, & pulveris radices Iridis Florentinæ ana ℥ss. cum olei Chamæmeli q. s. Fiat cataplasma.

Si polenta Hordei, affirmante Simone Paulli, decoquatur in aceto, & decocto per linteum transcolato os proluatur, intolerabiles dentium dolores sæpe mitigat. Idem auctor sequentem observationem refert. „Affinis „quidam meus vehementissimis calculi doloribus & intolerabili ischuria „laborans, post usitata remedia incassum usurpata, ei quod sequitur ap- „plicui. Recipiebam arbitriam quantitatem probe contusæ Polentæ ca- „lidæ, & tantumdem Lupuli, quæ frigebam, addita bene magna quan- „titate butyri, ex quibus parabam cataplasma quod tam calide pectini & „perinæo applicabat linteo implicitum, quam ferre posset: & intra qua- „drantem horæ a recensitis symptomatibus liberatur. Postea simile cata- „plasma pluribus dein ægris calculo & dysuria laborantibus felici successu præscripsi. Hæc S. Paulli.

Hordei integri decoctum tenue in gargarismatis & injectionibus detergentibus usurpatur.

℞. Hordei integri pug. j. Coquatur in aq. comm. q. s. ad ℔j. Decocto dissolve Diamori simplic. ℥jss. salis Prunell. ℔j. pro gargarismate.

℞. Hord. integr. p. j. folior. Agrimon. M. ss. flor. Hyperici, Rosar. rubrar. summitatum Absynthii ana p. j. Coq. in aq. q. s. In colaturæ ℔j. dissolve mellis rosati ℥j. F. injectio detergens & vulneraria.

Hordeum mundatum usurpat in syrupo de Hyssopo Mesuæ *Colloq. pharm. Penicher*. Syrupu Jujubino *Pb. R. Charas*, Electuar. Lenitivo *ejusdem*. Trochiscis Gordonii *ejusdem*. Integrum in syrupo de Cichorio composito *Pb. Reg. Charas*.

Ex Hordeo mundato præparantur Saccharum Hordeatum dictum & Penidia ab Arabibus Alphenicum dicta. Saccharum Hordeatum est confectio flavæ-

flavescens pellucida ex Saccharo in decoctione tenui Hordei tamdiu coctæ donec consistentiam idoneam acquirat ut possit in bacillos effingi. Penidia vero sunt ex aqua Hordei & Saccharo ea proportionem & arte coctis, ut massa quædam exurgat admodum solida & ita tractabilis, ut digitis oleo Amygdalarum unctis non adhæreat, & in fila ducuntur, tenuiora, crassiora; breviora aut longiora & sæpius intorta, semper vero alba. Plurimum conferunt tussi, raucedini, asperitati arteriæ, sputo movendo, coquendo, excludendo, & omnibus affectibus pulmonum & thoracis.

H O R M I N U M.

Horminum, Orminum, Sclarea, Scarlea, Orvala, Orvalia & Tota bona, Off. Sclarea Tabern. Icon. 373. & Inst. R. H. 179. Horminum Sclarea dictum, C. B. P. 138. Raii bistor. 543. Gallitricum Sativum J. B. 3. 309. Orvala, Dod. Tempt. 292. Syderitis Heraclea, Fracastor: Martyralvia maior, Quorundam: Galli centrum, Nonnullorum: vulgo: Orvale, Toute bonne.

Radice est singulari, lignosa, plurimis fibris capillata, fusca, non ingrati saporis, postmodum palatum & fauces calefacientis: ex qua caulis oritur bicubitalis, digitum minimum crassus, quadrangulus, hirsutus, geniculis distinctus, in ramos conjugatim & cruciatim dispositos divisus, medulla alba fæctus: cum foliis binis, ex adverso positis, canescentibus, rugosis, glutinosis, longis pediculis insidentibus, ex rotundo oblongis, spithamam longis, sesquipalmam latis, ex ampliori basi in acumen desinentibus, ad marginem quodammodo denatis aut crenatis, Hircum olentibus, villis lenissimis aspersis; quæ deinde oriuntur ad summum usque minoræ fiunt; ex eorum alis longissima serie flores prodeunt quasi verticillatim positi, monopetali, labiati, subcærelei, quorum labium superius amplum, prælongum, falcatum, pistillum tenue, incurvum, nonnihil exstans, in summo bifidum, quatuor embryonibus stipatum, & bina stamina cum suis apicibus oblongis occultat; inferius verò in tres partes divisum, media cochlearis instar excavata. Calyx cytiniformis, tubulatus, striatus, tactu glutinosus, in quinque spinulas divisus, quarum tres sursum spectant supra flosculum, duæ infra eum sitæ sunt. In imo calyce ad pistilli originem embryones reconditi abeunt per maturitatem in quatuor semina majuscula, subrotunda, altera facie gibbosa, altera angulosa, coloris rufescentis, lubrico lævore perpolita, ad singulos verticillos cauli apponitur hinc inde folium, figuræ & texturæ, multum diversæ ab inferioribus in caule & a radice exeuntibus: sunt enim hæc parva, concava, lata basi absque pediculo cauli immediate adnexa, in acutum apicem abeuntia, minus rugosa & tenuiora iis, quæ in caule sunt, colore purpurascente. Odor totius plantæ vehemens & gravis; sapor amarus. Seritur in hortis & viridariis. Herba integra in usum venit.

Analysi chymica, ex totius Hormini floridi ℔v. demptis radicibus per retortiam distillatis prodierunt humoris limpidi plantæ odorem saporemque referentis, subacidi ℔j. ℥ij. gr. xxxvj. humoris limpidi ꝑ magis ac magis manifeste acidi, austeri ℔ij. ℥vij. humoris limpidi, subacidi, & minus acidi ℥j. gr. liij. humoris fusci, empyreumatici, acris, tum acidi, tum alcali,

tali, utinosi & austeri atque sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥ij. ℥j. gr. xvij. cum salis volatilis urinosi concreti granis aliquot : olei spissi ad instar syrupi ℥j. ℥v. gr. xxvij. Massa nigra in retorta residua pendeat ℥v. ℥v. quæ rite calcinata præbuit cinerum ℥ij. ℥vj. gr. xx. ex quibus salis fixi mere alcalini ℥vj. gr. xxx. lixivio sunt extracta. Partium lactura in distillatione fuit ℥iij. ℥ij. gr. xij. in calcinatione ℥ij. ℥vj. gr. liij.

Hormini folia odorem quali citratum, acutum, vehementem, gravem tamen exhalant. Gustu amara sunt & aromatica. Eorum succus chazam cæruleam parum mutat. Salem continere videntur tartareo-ammoniacaalem cum multo oleo tum tenui, tum crasso & terra consociatum.

Horminum Oenopolis Germanis in primis innotuit, inquit Ettmullerus, pro vinis suis adulterandis. Solent namque ex ejus floribus cum floribus Sambuci per infusionem vinum Rhenanum in Moschatellinum mutare.

Tragus asserit vinum Gallitrico imposito si efferverit & decoctum fuerit, apprimè stomachi frigiditati conducere, phlegmata incidere, consumere : frigidis, insæcundis & albis mensibus laborantibus scæminis subvenire. Confitetur tamen, capiti noxium esse ob odorem gravissimum, præsertim si quis hoc vini genere intemperantius usus fuerit. Semen ejus, inquit Lobelius, *καρποσάριον* seu capitis gravitatem inducit odore : quo magni usus quibuscum septentrionalium ad Zythi Bieræque confectiorem. Illud enim Lupuli vel penuria, vel vegetioris porionis faciendæ causa cortinis ferventibus addunt, sique temetum, quo non multis poculis depletis temulenti fiunt, hilaritate propemodum insana.

Horminum tum interne sumptum, tum externe admotum plurimum commendatur his tribus in affectionibus, mulierum fluxu albo, suffocatione hysterica, & colicis doloribus. Folia & flores usurpantur in infusis vel decoctis ex aqua vel vino, vel in jusculis alterantibus conditum cum summatibus floribus conficitur. Essentia quoque seu tinctura paratur cum spiritu vini a foliis & floribus pluries abstracto ad eadem utilis. In albo mulierum fluxu Ettmullerus decoctum Hormini cum Roremarino in vase clauso patatum proponit. Corbejus *de morbis mulierum* c. 3. p. 83. refert, mulierem quamdam alias mulieres fluxu albo laborantes curavisse hoc unguento. Scilicet Sclaream contrivit, cum bytyro non salito miscuit, mixta vero per tempus putrefacienda reliquit, postea coxit, transcolavit, & colatum unguentum ad usum servavit. Hoc genitalia mulierum umbilico tenus inuncta fuerunt. Intrinsecus herbam istam comedendam dedit & sic istas mulieres liberavit. Observatum quoque fuit, narrante Ettmullero, quod tale unguentum omnes post partum dolores, eodem modo inunctum sedare soleat. Idem unguentum a Cratone quoque inter alia sua eupposita commendatur in suffocationibus uteri & similibus affectionibus spasmodicis umbilico imponendum cum admixtione Tacamahacæ. Ettmullerus hanc plantam externe admotam in passione hysterica plurimum valere, nec ipsi Castoreo cedere asserit.

A Friderico Hoffmanno Profess. Hallensi inter specifica antispasmodica retinetur ; si quidem spasmos intestinorum & nervosarum partium sedat ac sistit : colicos dolores mulcet. Ejus aqua distillata vel decoctum, propinatur, vel sub clysteris forma injicitur. J. Raius refert, Sclareæ folia apud Anglos ovis conquassatis cum flore lactis & pauca farina persusa, & in

& in fartagine frixa pro placentis palato non ingratis, mensis secundis inferri, & ad lumborum imbecillitatem veneremque stimulandam commendari. Idem scribit post Schvvenckfeldium Sclaream epilepsie mederi. Herba in pulverem redacta & naribus indita sternutationem provocat, catharum tollit, & cerebrum purgat.

Semen oculis inditum utile esse traditur ad excutiendam eorum caliginem & educenda corpuscula, quæ in illos inciderunt. Quippe emollita humore oculi hujus seminis mucilagine, id quod in oculos illapsum est quasi obvolvitur, & cum semine tandem ejicitur. Præterea ex hoc semine mucilago ope liquoris idonei extrahitur pro vitiis oculorum plurimum proficua: siquidem lymphæ lacrymalis acrimoniam plurimum demulcet.

24. Folior. Hormini, Urticæ mortuæ, Portulacæ, Chærefolii ana M. j. frusti carnis vitulinæ ℞ss. Coquantur ut artis est in aq. q. s. pro duobus jusculis mane & sero propinandis. In fluore albo.

25. Summitatum floridar. Urticæ mortuæ, & Sclareæ, florum Chamæmelii Romani ana pugill. unum. Infundantur in aquæ bullientis ꝑviij. Theæ in modum. Infusum calens syrupo de Hedera terrestris edulcatum mane & sero sorbeatur. In fluore albo mulierum.

Succus Hormini usurpatur in emplastro Diabotano D. Blondel collecta. neor. pharm. Penicber.

H Y O S C Y A M U S.

HYoscyami species duæ in officinis occurrunt: niger scilicet & albus: Hyoscyamus niger vulgaris, Jusquiamus, Faba suilla, Off. Hyoscyamus vulgaris vel niger. C. B. P. 169, & L. R. H. 118. Hyoscyamus vulgaris, J. B. 3. 627. Hyoscyamus, niger, Dod. Pempt. 450. Rasi Hist. 711. Hyoscyamus flavus, Fuchs: Apollinaris Cord. Dens Caballinus Herba Cunicularis, Herba Calicularis, Faba Jovis, Fabulum, Mania Quorundam: vulgo, Jusquiame, Hannebane.

Radice est crassa, rugosa, proluxa, multistida, foris fusca, intus alba: foliis amplis, mollibus, lanuginosis, dilute virentibus, per margines altius incisus, Acanthi quodammodo similibus sed minoribus, graveolentibus, copiosis, nullo ordine digestis, in caulibus cobitalibus, ramosis, crassis, rotundioribus, densa lanugine obsitis: quos flores longa serie digesti convestiant monopetali, infundibulum referentes, in quinque obtusa segmenta divisi, colore secundum margines subluteo, discurrentibus una purpurascensibus aliquot venis, in medio vero ex obscuriore purpura nigricantes, cum staminibus quinque brevibus purpureos totidem apices crassos & oblongos ferentibus, & pistillo longiore, apice rotundo, albo; quod ex calyce hirsuto, oblongo, margine in denticulos rigidos, acuminatos quinquipartito surgit & deinde abit in fructum in ipso calyce reconditum, olloe formam referentem, bicipularem, cui operculum suum incumbit, intus pluribus feminibus exiguis, subcinereis, subrotundis, rugosis, compressis refertum. Gravis odoris ac ingrati tota stirps est, caput aggravans & somnolentiam inducens. In agro Parisiensi frequens nascitur.

Hyo-

Hyoscyamus albus, Off. *Hyoscyamus albus major vel tertius Dioscoridis*, & quartus Plinii, C. B. P. 169. *Inf.* R. H. 118. *Hyoscyamus albus*, J. B. 3. 627. *Dodon. Pempt.* 451. *Hyoscyamus candidus*, *Trati* 134. vulgo, *Jusquiamée blanche*.

A priori differt foliis mollioribus, minoribus, minus sinuatis, uberiori & candidiori lanugine obsitis: cauliculis brevioribus, minus ramosis: floribus secundum cauliculos candidis, minoribus, seminibus candidioribus. In Occitania sponte adolefcit, hic in hortis feritur.

Utriusque ad usum externum folia, flores & semina adhibentur: ad usum internum vero semina tantum. Nonnulli nigrum majori virulentia præditum esse suspicantur, quapropter illum prorsus rejiciunt, albi tantum semina usurpantes. Sed ab omnibus fere tum Parisiensibus, tum Germanis & Anglis niger adhibetur.

Analysi chymica, ex foliorum & summitatum floridarum *Hyoscyami nigri* ℞v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, saporis herbarum, aliquantisper virosi, obscure subalsi, & obscure acidi ℞j. ℞iij. ℞j. gr. xlvij. humoris magis magisque manifeste acidi, & subausteri ℞ij. ℞xv. ℞ij gr. lxxj. humoris rufi, leviter empyreumatici, impenfe acidi, acris, austeri, & obscure alcali urinosi ℞ij. gr. xij. humoris rufi sale volatili urinoso copioso imprægnati ℞ij. gr. xij. salis volatilis urinosi concreti ℞j. gr. xij. olei spissi ad instar extracti ℞j. ℞vij. gran. xxxvj. Massa nigra in retorta residua pendebat ℞v. ℞iij. gran. xxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum albicantium ℞ij. ℞ij. gr. xxxvj. ex quibus salis fixi mere alcali ℞j. ℞j. gr. xxxvj. lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℞ij. ℞iij. gr. lxxj. in calcinatione ℞ij. ℞j.

Ex seminum *Hyoscyami* recentium ℞v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, fere inodori, obscure subalsi ℞iij. ℞ij. gr. xxxvj. humoris limpidi, obscure subalsi & obscure subacidi ℞v. ℞v. humoris rufi, aliquantisper acidi, austeri ℞j. ℞j. gr. xxxvj. humoris rufescentis, sale volatili urinoso imprægnati ℞xij. olei spissi ad instar syrupi ℞j. ℞v. gr. liij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℞j. ℞ix. ℞ij. quæ per 12. horas calcinata reliquit cinerum *Leucophæorum* ℞v. ℞vij. ex quibus lixivio salis fixi falsi cum substantia terrea talcosa permixti gr. xxxvj. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℞ix. ℞j. gr. xvij. in calcinatione ℞j. ℞ij. ℞ij.

Hyoscyami folia saporem satuum referunt: manibus confricata odorem virosi exhalant. Eorum succus chartam cæruleam rubram efficit: Radices subdulces sunt & Cinaræ sapore donantur. Hæc planta sale effentialem obtinere videtur ammoniacalem cum multo oleo crasso viroso confociatum. Ejus semina saporis sunt aliquantisper glutinosi, odoris narcotici & ingrati. Oleum continet tum tenue, tum crassum virosi & valde narcoticum, summæ rarefactionis aut expansioris capax; cum sale ammoniacali conjunctum.

Hyoscyamus potenter emollit & resolvit externe abhibitus. Verum si externe admoveatur, si intus sumatur, somnum inducit, dolores sedat; humorum acrimoniam mitigat sicut *Papaverina*; Mentem vero in modum perturbat & afficit ridiculis deliriis; somniis phantasticis & ecstatis, & specialiter ad jurgia & altercationes disponit, in biliosis præ-

præsertim naturis : in quo differt ab Opio & Papaverinis ; quæ sæpius soporem & stuporem inducunt absque mentis alienatione . Has autem mentis turbas excitat, quocumque modo adhibeatur, sive intus sumantur ejus radices, folia, semina, sive decocta clysteribus injiciantur, sive torrefactione fumus excitatus naribus excipiat : imo solis ipsius effluviis aere calido in motum actis nocet . Ejus summæ virulentia observationes plurimæ apud auctores occurrunt, quarum nonnullæ hic referendæ sunt, ut hujus veneni natura & indoles melius innotescat .

Primo quidem memorabilis est de Hyoscyamo locus apud Scribonium Largum, *cap.* 181. ubi ait : „ Hyoscyamum qui biberunt, caput grave „ venisque distentum habent, mente abalienantur cum verborum alterca- „ tione, unde etiam nomen herba trahit Altercum : postea sopiuntur & „ omni sensu carent, livescentibus membris eorum . “

Obiter tamen notandum est hanc vocem *Altercum* non ab altercando originem ducere, siquidem antiquissima vox est arabica, ut refert Plinius.

Joh. Jac. Vvepferus *Traſtatu de Cicuta aquatica*, de Hyoscyami radicibus comestis hanc observationem refert . „ Die 25. Martii 1649. in Con- „ ventu RR. PP. Benedictinorum Rhinoviensi præparatum pro collatione „ vespertina acetarium fuit, cujus materia debuissent esse radices Cichoreæ „ eliquatæ . Creverant hæ una in areola mixtim cum Hyoscyamo : Eru- „ tæ utraq; separatim collectæ, & ab hortulano relictæ, a puero re- „ rum signaro ad coquinam deferuntur, ibique promiscue coctæ mensis in- „ feruntur . Nemo pene edentium fuit cui non orexim cierat obolom in- „ solitum, & maxime ob tam corpulentas & pingues radices . Avide su- „ muntur tum a patribus, tum a servis . Quid multis ? Suo tempore cu- „ bitum eunt . Hic vero oriri symptomata cœperunt & vesicarum radi- „ cum diffundi toxicum : sentiri a quibſdam capitis vertigo : aliquo- „ rum torrerî linguæ & labra, asperari fauces, torqueri nonnullorum „ illa, ac totis artibus male haberi . Fuit qui gargarismo palati ardo- „ rem compescere studuit, sed lingua velut in frixorio tosta omnem re- „ spuit medelam . Inſonante noctis duodecima, cum ad preces matutinas „ pro more movere excitarentur, miserabili aliquorum metamor- „ phosim spectare fuit . Unus tam destitutus mente ac debilis re- „ pertus fuit, ut pro vita desperato habitus Sacro-sanctæ Ecclesiæ „ Sacramentis provideri debuerit : alius quasi dentibus nuces frange- „ ret & exemptos nucleos aviculis domesticis projiceret, una manu fa- „ vones abigens, varia obmurmurabat : alius in cella sua fornaceu „ prensabat, quasi arborem perrepturus : alius anſatis utrinque bra- „ chiis, ac toto corpore incurvus illa sibi rumpenda clamitabat . Ex illis „ qui ad chorum venerant, ad matutinum solvendum pensum, aliqui „ oculos vix aperire & litteras legere nequibant, vel aliqua inter „ verba seu versiculos admiscebant, quæ ibi non continebantur, „ unde unus aut alter abire compulsus fuit . Non nemo privatis ora- „ re volens, dum librum aperit, myrmidonum aciem aspiciis, & lit- „ teras jam animatas velut formicas in aggestu suo confusim discurrentes „ sibi videbatur intueri, ut exinde ne syllabam quidem, ne dicam „ verbum aut versum integrum combinare ad aliquod tempus-valuerit .

„ Le

Lepidum præterea fuit mane magistrum sarrorem videre laboraturientem jam sedili suo minus oculatum, quippe qui ne solum quidem armare acu, nec a tyrone armato, tangere rem acu, ut sibi videbatur jam tricuspide valens, quoque punctu aut digitos aut poplitem truentavit. Pauci admodum qui gustu variante moniti, minoribus radiculis prælibatis a majoribus abstinerant, mente sani erant. Et his quidem interemptis agitati aliqui usque mane; nec tamen scitum adhuc quæ malî esset origo. Quia tamen omnibus fere commune fuit, judicatum est e culina promanasse. Tandem post diligentem indagationem, pueruli error compertus fuit. Summo mane Schaffusio accersitus Medicus luctantes adhuc cum hallucio suo reperit, & aqua e Juniperis distillata ad potandum porrecta sævientem pestem aut mitigat aut abstergit. Patribus ea de re gratulatus quod Hyoscyami radices Cichoreæ radicibus oleo, sale, & aceto attemperatæ fuissent, fractæque nonnihil earum vires. Aliter enim omnes orci candidati fuissent. Post discessum ejus patres fere omnes melius se habere cœperunt paulatim. Unus tamen illorum qui in edendis radicibus largior fuerat, has sibi reliquias superesse conquestus est, oculos nimirum antea acutissimos, adeo obtusos redditos, ut postea perspicillis uti necesse fuerit.

Simon Schultzeus in *Ephemerid. N. C. annis IV. & V. Decurie 1. Observ. cxxiv.* narrat VVratislaviæ quatuor juvenes studiosos simul cum coqua a comestis Hyoscyami, & Pastinacæ radicibus simul per errorem cum carne bubulæ elixatis, magnam mentis perturbationem, & alienationes passos fuisse, & quasi furore percitos, primum jurgiis, dein verbis se exceperunt, & nisi vi abacti fuissent, forsitan ad internecionem perventum fuisse, cum miris gesticulationibus, & phantasias: qui tamen adhibitis idoneis remediis sanitati restituti fuerunt.

Iisdem in *Ephemeridibus N. Curiosor. Decur. II. annor. IX. & X. p. 178. in appendice*, videre licet hanc observationem de Delirio ex soliorum Hyoscyami decocto clystere excepto. „Sacerdoti cuidam 61. annorum, viro ex cachexiâ scorbutica asthma cum tumore pedum œdematoso, & doloribus tum nephriticis, tum abdominis scorbuticis habitualibus afflicto, enema terebenthinatum ex speciebus carminativis, & Hyoscyami foliorum dimidio tantum manipulo cum lacte coctis ab Ettmullero, & aliis Medicis præscribitur. Paulo post sacri officii memor habitu sacerdotali supra indusium amictus, & biblia sacra in manus tenens templum adire, & concionem habere intendit: ab adstantibus vi retentus ad iram furibundam concitatur, & cum his maxime altercatur, parumque abfuit quin unum ex illis, placidus alias satis, & minime iracundus, arreptis quibusdam armis vulnerasset. Eo tandem in lectum redacto, furor brevi quidem cessavit, sed delirium diutius propter injecti enematis in intestino moram continuavit, donec post aliquot horas novi clysmatis acrioris injectione alvus a scybalis triduum jam retentis una cum clystere antea injecto liberatus fuit: in quo quasi momento non solum delirium cessavit, sed intra bihorium etiam duo calculi renales rejiciebantur. „Dioscorides insaniam a foliis Hyoscyami clysteri incoctis, & colo exulcerato infusus suo jam tempore observatam fuisse refert.

Alia iisdem in *Ephemeridibus N. C.* legitur observatio de mentis per-

tur-

turbatione cum rixis oriunda decocti foliorum Hyofcyami vaporibus :
 „ Matrona quædam 78. annorum , una cum nephritica scorbutica notha
 „ habituali , doloribus abdominis ac crurum simul contumacissimis afflige-
 „ batur. Quibus sedandis sacculi tres foliorum Hyofcyami manipulis duo-
 „ bus , & floribus Camomillæ , Sambuci , Verbaici , Althææ radicibus ,
 „ & baccis Juniperi repleti præscripti fuerunt ; abdomini , & urrique cruri
 „ applicandi . Hi ægrotantis iussu intensissime fervidi applicabantur , &
 „ statim atque calor remittebat , in decocto fervido immergebantur denuo
 „ admovendi . Ægrotæ quidem cum tantillo phantasie errore dormiendo ,
 „ leviter , & per intervalla delirabat . At vero duæ ancillæ 15. & 18.
 „ circiter annorum , quibus sacculorum horum calefactio , & applicatio
 „ reiterata incumbabat , longe gravius afficiebantur , utpote temulentæ ,
 „ hinc sæpius vomentes , crebrius altercantes , & in crines sibi invicem
 „ involantes , seque unguibus lacerantes , vix a domesticis separari pote-
 „ rant . Pax minis adstantium indicta brevis durationis erat , simul ac
 „ enim sacculorum calefactiones novæque fomentationes reiterarentur ,
 „ prælia quoque pugnantium gallorum more renovabantur , minis ver-
 „ bique ridiculis se invicem provocabant , & invadebant “ .

Ibidem longe gravior mentis alienatio cum furore observatur e semi-
 num Hyofcyami combustorum fumis . „ Dresdæ in pharmacopolio Mul-
 „ leriano , tyro quidam semen Hyofcyami contusum charta inclusum
 „ super capella arenaria calida poluerat . Horæ autem dimidio non
 „ elapso , charta per nimium arene calorem nigredine primum infecta ,
 „ tandem scintillis igneis conceptis comburi incipit , semenque Hyofcyami
 „ inferiori ex parte jam accensum fumo exhaleante laboratorium effluviis
 „ suis implet , & tragicis partim altercationibus , partim ridiculis gesticu-
 „ lationibus , & imaginationibus locum præbebat . Propter seminis enim
 „ dicti scintillantem sollicitam nimis collectionem , & e flamma libera-
 „ tionem , hinc fumi majorem inspirationem , exoriebantur inter mini-
 „ strum pharmacopolii dictumque tyronem in laboratorio commorantes ,
 „ una cum contumeliis innumeralibus rixæ tantique tumultus , ut in-
 „ felix tyro ab alio ministro humum jam prostratus , crinibus circum-
 „ ductus , imo jam ex verberibus undique cruentus occisus fuisset , nisi
 „ magna vi separati fuissent . Per reliquum interim diei spatium scoto-
 „ mia , & crebrioribus vomitibus vexabatur , totamque insequentem no-
 „ ctem ridiculis gestibus ebriorum more delirabat , & ultra duas septi-
 „ manas vertigine afficiebatur . Alter vero minister , homo alias non
 „ adeo iracundus , præter vomitus , & secessus crebriores , cum absurdis
 „ gesticationibus , morionis instar , saltando , hymnos amatorios , &
 „ profanos cantando &c. per reliquum diem , & post noctis medium
 „ pariter delirabat . Hinc aliquot septimanis mente , & corpore ægrotans
 „ de vertigine , & cephalalgia querebatur , multum dormiebat . Post hæc
 „ melius se habere per aliquod temporis intervallum videbatur . At
 „ paulo post neglecta sanitatis cura parum sui compos factus tristem vi-
 „ tam egit per plures annos identidem recurrente , & transeunte de-
 „ lirio . “

Christian. Frideric. Garmannus in *Ephemer. G. annis VII. & VIII. Decur.*
 III. pag. 10^a refert ipsa effluvia ex Hyofcyami seminibus in hypocansto
 recon-

reconditis exhalantia eisdem effectus producere, quod sequenti observatione confirmat. „ Vir pannorum laneorum opifex & conjux ejus, cum alii quot annos concorditer, & mutuo amore vixerant, ex improvise verba inter se commutare, & iracundia incitati sæpius in maledicta compellari cœperunt; ita ut ad verbera nonnumquam dilaberentur. Maxime vero, utur concordēs, animorum mutationem sentiebant hypocausto conclusi, in quo ad rabiem quasi conversi, primum rixis, & contentionibus, post pugnis, & plagis maritus maritam invadebat, quæ ut severo & vehementer vindicaret, toto nitebatur sanguine. Dolebant extra hypocaustum constituti vicem hanc suam conjuges, & vicinos non leviter consernebant hæ animorum dyidix. Curiosiores aliquid magici sub his latitare suspicabantur, adeoque omnes hypocausti primum, & postea domus angulos, loculamenta, & secessus exquisitè excutiendos decernunt. Quod ubi factum in superiori tetrini in hypocausto constituti parte magnam seminis Hyoscyami charta involuti quantitatem inveniunt: quo sublato oppido animis temperies rediit, & omnis cessavit contentio, murmur, & ira. „

Ex his liquet quam parum sit tutus Hyoscyami usus tum internus, tum externus: nihilominus tamen a plurimis magni nominis Medicis ejus vires multis in morbis notatæ sunt, & commendatæ. Ejus semen a Cratone, Forti, Helidæo, Heurnio, Platero tanquam efficacissimum remedium laudatur potissimum in hæmoptisi vel solum, vel cum aliis remediis idoneis admixtum, a Dß. ad ʒj.

ʒi. Semin. Hyoscyam. & semina. Papaver. alb. ana ʒij. conserv. Rosar. rubrar. veteris ʒij. M. F. electuarium ad nucis Moschatæ magnitudinem seu ʒi. pro dosi semel aut bis die sumendum.

ʒi. Semin. Hyoscyam. & Papaver. alb. ana ʒij. Corall. rubr. Terr. sigillar. Bol. armen. Lapid. Hæmatit. pp. ana ʒß. conserv. Rosar. antiq. ʒij. cum Syrup. de Symphyto confusar. Fiat electuarium; cujus dosi ʒij. mane, & sero.

Ad catarrhos serofos acres a capite ad pectus defluentes Hyoscyami semen & radix non raro usurpantur.

ʒi. Semin. Hyoscyam. & Papaver. alb. ana ʒß. Terr. Japonic. Oliban. Myrrh. ana ʒj. Croci pulver. ʒß. Succ. Liquiritiæ inspissati Hispanic. ʒj. Sacchar. alb. ʒß. mucilag. gumm. Tragacanth. q. s. M. F. rotulæ exiguæ, quarum unam subinde in ore deinceat, & sensim deglutiat.

Adversus epilepsiam Theodorus Turquet de Mayerne velut præstantissimum remedium prædicat semen Hyoscyami per 40. dies, & ultra usurpatum, incipiendo a granis vj. vel viij. & gradatim ascendendo ad ʒj aut ad gr. xxiii. sumptum quotidie mane, jejuno ventriculo, ex cochleari uno succi Sempervivi recenter expressi. Vereor tamen ne semen Hyoscyami nervorum sensum obtundendo palliativum potius hujusce morbi sit remedium, quam vere curativum.

Verum quidquid de salutiferis Hyoscyami virtutibus: tot celeberrimi Medici prædicent, cum ex supra recensitis satis superque manifestum sit omnes ejus partes noxias nonnumquam esse, inde concludere licet aut illius usum internam prorsus rejiciendum esse, aut nonnisi parce, & summa cum cautione adhibendum, & ab illius usu abstinendum statim.

Geoffroy Tom. II.

X

atque

atque graviora symptomata sedata sunt, aut levis mentis alienatio sensuum² ve torpor apprehenditur.

Hyoscyamus externe refrigerat, emollit, potenter resolvit, & dolores sedat. Ab Etmullero cataplasma ex foliis *Hyoscyami* ad scorbuticos quarcumque partium dolores compescendos potissimum commendatur. Ad tumores dolentes, & inflammatorios demulcendos, & resolvendos in cataplasmatibus anodynis, & resolventibus *Hyoscyami* folia, & semina usurpantur, vel sola, vel cum aliis conjuncta.

24. Folior. *Hyoscyami*, *Mandragoræ*, *Solani* ana M. ij. *Seminum Hyoscyami*, & *Papaver. alb.* contusor. ana ʒi. Coquantur in lactis vaccini; q. s. Pulpæ per Seraceum expressæ adde *Croci pulver.* ʒß. vitellos ov. n. ij. Fiat cataplasma anodynum, & resolvens.

Ex *Hyoscyami* foliis foras aut cataplasmata a nonnullis præscribuntur ad arthriticos dolores sedandos. Sed minus tuta sunt hæc præsidia, quæ arthriticis dolores conspire valent potius quam eorum causam destruiere aut foras quocumque modo eliminare. Eadem folia supra calidos cineres emollita, & mammis admota nutricum lac grumescens dissolvunt. Tabernæmontanus semina *Hyoscyami* cum vino coniundit, & puerperarum mammis applicat ad lac avertendum.

Quidam adversus pruriginem illam molestant, & tumores manuum pedumque a frigore contractos *Hyoscyami* cytinos cum seminibus vel semina sola carbonibus inspergunt, fumumque exhalantem manibus pedibusque excipiunt. Clar. Tournesfortius observat lympham sub cute effusam, & inspissatam, digitorum fosti compressione exprimi, & per cutis poros sub vermiculorum specie expelli.

Adversus capitis aut dentium dolores fumus ex *Hyoscyami* semine prunis imposito ab agyrtis plurimum laudatur. Fumus ille licet terribili odore, naribus vel ore per infundibulum excipitur, quo expellantur vermiculi, qui aliquando in naso vel dentibus nascuntur; eosque in subiecta pelvi aqua repleta excipiunt ut melius oculis percipiantur. Verum Matthæus Jacobæus in *adit Hafnienfis* T. 1. *Obs.* 14. p. 209. Hanc fumigationem non xiam observat. Ancilla, inquit, odontalgia immani diu vexata, suavis juvenis cuiusdam, seminis *Hyoscyami* supra prunas injecti fumum per infundibulum ore excepit, unde subito plusquam quinquaginta vermes e cavitate dentis prosilierunt, albicantes, & exiles admodum, vix filii crassissimi æquantes, qui statim se nonnihil contorquendo mortui sunt. Sedatus quidem dolor fuit nec post rediit, sed vertigine, stupore, & imbecillitate capitis ex eo tempore correpta fuit, & per sat longum tempus vexata, adeo ut plus hic mali quam illic boni fuerit.

In *Hyoscyami* usu vel interno vel externo eadem cautiones observandæ sunt, quæ in cæterorum narcoticorum, & Opii præsertim usu observari solent: quas *Capite de Opio* videre licet.

Si vero vel per imprudentiam vel per malitiam exhibitus nocivas suas qualitates exerceat, tum vomitorium statim initio præscribendum est, deinde ad narcoticorum antidota confugiendum est, quæ sunt omnia acida, quibus *Hyoscyami* malitiam refrænari fere omnes Medici consentiunt. Tandem quibuldam stomachicis, & cephalicis ventriculus, & cerebrum roboranda sunt, & firmanda.

Hyo-

Hyofcyami folia usurpantur in unguento Populeo Nicol. Alexandrin. Semina in antidoto Reques Nicolai Myrepsi dicto, Philonio romano, Nicolai Alexandrini, Philonio magno, Pb. Reg. Tryphera magna, Ejusdem Pilulis de Cynoglossa, Pb. Reg. & Trochiscis Alkekengi.

HYPERICUM.

Hypericum, Hypericon, Perforata, & Millefora, *Off. Hypericum vulgare*, C. B. P. 279. *Inst. R. H.* 254. *Hypericum vulgare* sive *Perforata* caule rotundo, foliis glabris. *J. B.* 3. 381. *Hypericon*, *Dod. Pempt.* 76. *Rui Hist.* *Herba perforata*, *Tragi*: *Androsæmum ininus*, *Gesner*: *Afeyron*, *Cordi*: *Fuga Dæmonum*, *Quorundam*: *Herba folis*, & *Ruta folis perforata*, *Nonnullorum*: vulgo, *Milleperuis*.

Radice est lignosa, fibrosa, flavescente: caulibus compluribus, rigidis, lignosis, teretibus, subrubentibus, ramosis, cubitalibus, & altioribus, in quibus nascuntur folia bina ex adverso posita absque pediculis, semiunciam superantia, tres lineas lata, glabra, nervis per longum excurrentibus donata, quæ Soli objecta innumeris foraminulis pertula esse videntur, unde *Perforata* dicitur hæc herba. Sed hæc puncta translucida nihil aliud sunt quam vesiculæ succo oleoso repletæ, sapore sicco adstringente cum aliquo amarore. Flores in extremis ramulis copiosi, rosacei, e quinque petalis aureis constati, utrimque acutis, quorum medium occupat numerosa staminum congeries cum apicibus aureis. Ex calyce pentaphyllo surgit pistillum crassum, tricone, quod floris centrum occupat, & marcescente flore abit in capsulam divisam in terna loculamenta, in quibus adsunt semina minutissima, nitida, oblonga, ex fusco nigricantia, saporis subamari, resinosi, odoris picej: tam flores quam capitula semine gravida, si terantur, sanguineum succum reddunt: abunde nascitur in campis, & sylvis agri Parisiensis. Folia, flores, & semina in usum veniunt.

Analysi chymica, ex totius plantæ floridæ lbv. demptis radicibus per fl. V. distillatis prodierunt humoris limpidi, odoris, & saporis non ingrati, obscure subacidi, cum olei essentialis portione aliqua, lbj. ℥iij. humoris limpidi, manifeste acidi, subausteri lbj. ℥j. Massa residua per retortam distillata præbuit humoris rufi, leviter empyreumatici, acidi, austeri, subfalsi ℥vj. ℥v. humoris fusci, empyreumatici, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥iij. gr. xxxvj. olei tum tenuis essentialis, oleo Terebenthinæ similis, tum crassi, adiposi ℥iij. ℥j. gr. l. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥xj. ℥iij. quæ per horas xvij. in crucibulo calcinata reliquit cinerum albicantium ℥j. gr. lx. ex quibus salis fixi parum alcali ℥ij. gr. ij. lixivio extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥iij. ℥vj. gr. lvij. in calcinatione ℥x. ℥ij. gr. xij.

Hyperici folia saporem stypticum subasum, & subamaricantem referunt. Flores, & semina contrita spirant odorem gratum resinofum, succum vero fundunt rubentem. Multum olei essentialis Terebenthinæ oleo similis hæc planta continet. Puncta enim translucida quæ in foliis pro foraminibus perperam habentur, puncta nigra quæ in petalorum marginibus

bus deprehenduntur, & tubercula quæ ad fructuum superficiem occurrunt, totidem sunt vesiculæ hoc oleo essentiali repletæ. Salem igitur essentialem continere videtur Hypericum vitriolico-ammoniacalem cum oleo tum tenui his in vesiculis recondito, tum crasso & intime permixto consociatum.

Hypericum vulgatissimum quidem multi usus est & emolumenti in affectionibus quamplurimis. Inter plantas vulnerarias principem locum occupat: unde præcipuus ejus usus est in vulneribus, & exulcerationibus tum internis, tum externis mundificandis, & consolidandis tam interne quam externe adhibiti. Sanguinis excretioni, & mictui cruento medetur. Sanguinem coagulatum resolvit, Menfes, & urinas promovet; calculos, & arenulas expellit: lumbricos enecat: in hysterica passione, melancholia, hypochondriaca affectione, mania, & mentis aberratione plurimum commendatur. His qui pro Dæmoniis habentur, opitulari dicitur, unde Fuga Dæmonum nuncupatur. Non quod Dæmones ad hujus plantæ aspectum fugere visi fuerint, sed quod conferat illis hypochondriacis qui eo melancholicæ aut maniæ pervenerunt ut pro Dæmoniacis habeantur. Nullos enim Dæmoniacos vel a Dæmonibus vere obsessos vidimus. Summitates floridæ ut plurimum in aqua vel vino decoctæ vel infusæ ad M. j. usurpantur: folia nonnumquam, & semina ad ℥j. præscribuntur, sola vel cum aliis vulnerariis consociata.

Ettmullerus affirmat summitates recentes pro usu vulnerario diuretico par sibi remedium non habere. Eapropter in affectionibus renum, & vesicæ, in primis in dysuria, renum, & vesicæ ulceribus earum decoctum plurimum commendat sive solum sive cum Agrimonie decocto. Idem decoctum, teste eodem, mictum cruentum tollit, & sanguinem grumosum resolvit. Ex Hyperici seminibus cum conserva Violarum, vel Malvæ, aut Rosarum paratur electuarium ab eodem Ettmullero laudatum velut nobile specificum præservativum in dolore nephritico, si bis in septimana Castaneæ quantitate usurpetur. Herbarum decoctum per sat longum tempus mane jejuno stomacho potum calculos pellere dicitur, teste J. Raio.

Tinctura florum Hyperici vel sola, vel cum tinctura Anagallidis a plurimis laudatur in mania & melancholicis affectionibus. Andreas Tentzelius in *Exegesi Chymiatrica ad Angli Salæ opera* hanc Hyperici tincturam sic describit.

℥j. Summitatum floridarum Perforatæ contritatum q. l. Macerentur in spiritu vini per octiduum in vase clauso. Expressio instar sanguinis rubro colore tincta resideat. Pars purior a sæcibus per inclinationem vasis effundatur, & separetur. Spiritus vini major pars distillatione abstrahatur ut remaneat liquor spissus seu tinctura, Balsamum vere pretiosum.

Angelus Sala hujus balsami ℥ij. recipiebat, Sacchari ℥ss. & aquæ distillatæ foliorum Hyperici vel Betonicæ ℔j. Solutione rite peracta, hujus mixturæ cochlearia duo, tria vel quatuor exhibebat, mane & vespere maniacis, melancholicis, hypochondriacis, & mentis alienatione absque causa manifesta laborantibus, & subita intellectus depravatione. Plurimos hac mixtura restitutos fuisse, & sanæ mentis compotes factos testatur. Observat tamen his ægritudinibus satis tempestive succurrendum esse, quando scilicet malum nondum altas egit radices, ratioque non omnimode abolita est, ac prorsus corrupta.

Ad lumbricos pellendos Thomas Bartholinus in *Actis Hafnienſibus*, flores Hyperici in ſpiritu vini infuſos & cum liquore exhibitos commendat velut præſtantiffimum remedium experientia comprobatum Camerarius eorundem ſuccum expreſſum vermiſugum aſſerit. Schroderus quoque, ſed ſuperſtitioſe nimis, Hypericum lumbricos fugare ſcribit, ſed ſi tempore exaltationis collectum fuerit, alias hac facultate deſtitui.

24. Summitatum floridarum Hyperici & Virgæ aureæ ana M. j. Radic. Symphyti major. cateolatum ſect. ʒʒ. Raſur. Corn. Cerv. ʒij. Coquantur in aq. ferratiſſ. ʒiij. ad ʒij. Colatura diſſolve ſyrup. de Hedera terreſtri vel de Symphyto ʒiſſ. F. apozema vulnerarium per cyathos debitis intervallis propinandum in hæmorrhagiis, & renum aut inteſtinor. exulcerationibus.

25. Summitatum Hyperic. & herbæ Anagallid. flore purpureo ana M. j. Infund. in aq. bull. ʒij. Colatura detur pro potu ordinario in melancholia, mania, &c.

Hypericum externe admodum vulnerarium eſt inſigne: nervolarum præſertim partium conuſionibus, vulneribus, & ulceribus dicatur. Reſinoſis enim & baſſamicis ſuis partibus reſolvit, detergit, & conſolidat: capropter nullum fere eſt baſſamum quod illud non admittat. Herba florida conuſa applicatur, vel in vino aut oleo maceratur & decoquitur. Quidam, referente Paulo Hermanno, ad vulnera conſolidanda & cicatrizanda capiebat Hyperici flori recentis q. l. & affundeat vinum. Idem vinum per aliquot dies maceratum bis vel ter ſeminibus affundeat, & poſtea diſtillabat uſque dum ſpiritus vini per alambicem prodiens totus reſinoſus apparebat: hoc pënicilla imbuta vulneribus applicabat. Chirurgus quidam, referente J. B. Chomel in ſua *Plantar. Uſual. Hiſtoria*, tincturam Hyperici præparabat, vas vitreum floribus Hyperici adimplendo & ſpiritu vini affundendo. Vas accurate obturatum ſolaribus radiis per mentem circiter exponebat, donec ſpiritus rubro colore tinctus fuiſſet. Tinctura percolata Camphoræ ʒj. pro ſingulis ſemilibris diſſolvebat. Hac tinctura in vulneribus, conuſionibus, rheumaticis doloribus ſancti cum ſucco uſebatur.

Oleum Hyperici duplex in Officinis habetur, ſimplex & compoſitum; & utrumque varie apud varios conficitur. Simplex vulgo fit per infuſionem ſorum cum oleo Olivarum quod novis floribus ſemper affunditur quoſque rubrum colorem aſſecutum fuerit. Apud Monſpelliſes flores macerantur in liquore reſinoſo ex Ulmi veſiculis extracto. Olei Hyperici compoſiti legitimam confeſionem videre eſt in *Pharmacop. Reg. Moſſ. Charas*. Hoc oleum habetur præſtantiffimum baſſamum, quod potenter attenuat, reſolvit, & diſcutit. Dolores omnes a frigore contractos ſedat, arthriticos demulcet, vulnera detergit & conſolidat, ambuſtis medetur. In inſectionibus vulnerariis, unguentis digeſtivis, & cataplaſmatibus frequenter adhibetur. Intus nonnunquam etiam uſurpatur ab ʒʒ. ad ʒj. ad cruentam exſpuſionem, & dyſenteriam: necnon in enematibus utiliter admiscetur ad inteſtinorum exulcerationes ſanandas.

Hypericum uſurpatur in ſyrupo antinephritico, aperiente & clicheſtico *Pharm. Reg.* ſyrupo de Artemiſia, Pulvere contra rabiem *Palmarii*, Theriaca *Andromachi*, Mithridatio, oleo Scorpionum compoſito, *Groſſey Tom. II.* X 3 Ung.

Ung. Martiato, Pb. Reg. mundificativo de Apio, Aqua vulnecar. *Pernicher.*

H Y S S O P U S.

Hysopos & Hyssopum, Off. Hyssopus Officinarius, cœrulea seu spicata, C. B. P. 217. *Inst. R. H.* 200. Hyssopus vulgaris, spicatus, angustifolius, flore cœruleo, J. B. 3. 274. J. R. *Hist.* 516. Hyssopus vulgaris, *Dod. Pempt.* 287. vulgo, *Hyssope*.

Radice est lignosa, dura, fibrata, crassitudine digitali: caulibus cubitalibus, frutescentibus, fragilibus, ramosis: foliis binis ex adversa nascentibus, unciam aut sesquiunciam longis, duas lineas latis, acutis, glabris, obscure virentibus, gustu acris & suaveolentibus. Flores densis verticillis spicas longas mentientibus, in caulium summitatibus, in unam partem fere spectantes, & calycibus longis, striatis, in quinque acuta segmenta partitis exeunt, amplii, monopetali, cœrulei, labiati, quorum labium superius surrectum est, subrotundum, bifidum, inferius venter in tres partes divisum, media cochlearis instar excavata bicuspidata & quodammodo alata: singulis floribus stamina insunt quatuor oblonga, cœrulea, cum suis apicibus parvis, obscure cœruleis: ex calyce surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, & quatuor veluti embryonibus stipatum, qui deinde abeunt in totidem semina minima, subrotunda, sulca, in capsula quæ calyx floris fuit recondita. Vulgo collitur in hortis. Herba integra florida usitata est.

Analyti chymica, ex Hyssopi floridi ℥v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, odorem & saporem plantæ referentis, obscure acidi, cum olei essentialis guttis aliquot ℔j. ℥v. ℥vj. gr. xliij. humoris primum limpidi, deinde rufescentis, ac tandem rufi, magis ac magis manifeste acidi, ac tandem austeri ℔ij. ℥viiij. ℥iiij. gr. xxx. humoris rufi, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥ij. ℥ij. salis volatilis urinosi coacti, gr. xxxvj. olei tum tenuis essentialis, tum crassi & spissi ad instar extracti ℥ij. ℥vj. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥vij. ℥i. gr. xxiiij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥vj. gr. xxiiij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥vj. extractæ fuerunt. Partium jactura in distillatione sui ℥iiij. ℥i. gr. xii. in calcinatione ℥iiij. ℥ij.

Hyssopus sapore acri & odore gravi aromatico donatur. Salem essentialem obtinet ammoniacalem cum oleo tenui essentiali aromatico & oleo crasso bituminoso consociatum.

Vi incidendi, attenuandi, & discutiendi pollet. Pulmonum affectibus tartareis potissimum dicatur. Ventriculum roborat, & ciborum concoctionem juvat. Acrimonia sua aromatica viscidum pulmonum mucum eorum vesiculas insarcientem incidit & ad expectorationem promouet: unde in asthma humorali specificum audit: simili modo ventriculi inflationi & ciborum inapparentiæ medetur, incidendo & adstergendo glutinosam pituitam hujus visceris parietibus inhaerentem. Sunt qui eum Absinthio in corroboratione ventriculi præferunt. Cerebri quoque pituitosis & nervorum affectionibus opitulari dicitur, non solum pituitam discutiendo, sed etiam easdem partes roborando. Eapropter in catarrhis & morbo comitia-

riati a nonnullis proponitur. Ejus infusum vel decoctum in aqua, vino, vel Cerevisia præscribitur. Syrupus simplex & compositus, & conditum in officinis præparantur in affectibus pulmonum eximii usus. Ejusdem aqua distillata ad eadem utilis servatur.

24. Radic. Chinæ ʒij. Bulliant leviter in aq. fluvial. ℥ij. Adde folior. Hyssopi M. ij. Macerentur donec decoctum refrigeratum fuerit. Colatura dilue Syrup. de Hyssopo, vel Erysimi aut Stæchad. ʒij. Sumat æger per cyath. 3. quaque hora in asthma humorali & cataractis.

25. Rad. Iridis Florentin. ʒij. Agaric. minutim concisi & in nodulo ligati ʒiſs. folior. Nicotianæ exsiccat. ʒj. Summitatum floridar. Hyssop. & Thymi ana M. j. Coquantur in ℥iſs. aq. comm. ad ℥ij. Colatura dissolve Oximel. simplicis ʒiiij. F. apozema expectorans, in asthma humorali præpotens remedium. Propinetur calidum ad instar Caffæ ad ʒv. bis vel ter in die.

26. Conserv. flor. Hyssop. & Conserv. ad Enul. camp. ana ʒij. Aristoloch. rotund. & Ireos Florentin. ana ʒij. c. f. q. Syrup. de Alihæa Fernel. F. opiata ad magnitudinem Nucis Moscharæ in asthma humorali.

Externe quoque in oculorum suggillationibus & sanguine sub cornea collecto sive a causa interna sive contusionibus nihil condicibilis Ettmullerus asserit quam summitates Hyssopi recentis vel exsiccati nodulo inclusas, quæ immerse aquæ fervidæ vel vino calido & instar somenti humidum impositæ oculis, quemvis sanguinem grumosum & extravasatum dissolvant. Idem testatur Riolanus senior in *Tract. de affectibus Ocular. p. 153.*

„ Expertus sum, inquit, verum quod affirmat Archigenes apud Galenum, quod si Hyssopi coma nodulo inclusa bulliat in aqua, & tepide nodulus oculo cruento applicetur, tam manifeste fugit sanguinem, ut linteam ipsum sanguinolentum videri possit. “ Simon Pauli hujus auctoritatem secutus, ubi occasio tulit, decoctum Hyssopi aliquammultis adversus suggillationes quascunque, imo etiam oculorum commendasse asserit, sed loco aquæ sacculum in vino bulliendum quandoque curavisse, & ex voto eas evanuisse, dum lectum petentibus sacculus subtepidus clausis palpebris suis applicatus. Aliam observationem ex Roberto Boyle J. Rajus sic refert. Vir quidam celebris, qui semur ictu equi calcibus incusso graviter contusus fuit, sola applicatione cataplasmatibus ejusdem ex Hyssopi foliis minutim concisis & cum butyro recenti non salito commixtis parati intra paucas horas a dolore liberatus est, deleta etiam livida & decolori macula in cute. “

Aqua Hyssopi distillata servatur in Officinis ad oculorum inflammationes utilis. Quidam aquam Hyssopi & aquam Hyoscyami conjungere solent, & externe applicant in suggillatione. Ex ejus summitatibus floridis conditum præparatur & syrupus simplex.

Usurpatur in Syrupo de Hyssopo composito *Mesue*, Syrup. de Artemisia *Pharm. Reg.* Syrupo antiasthmatico D. Daquin *ejusdem Pharm. Reg.*

J A C E A.

Jacea nigra, Jacea vulgaris, Off. Jacea nigra pratensis, latifolia, C. B. P. 271. *Inf. R. H.* 443. Jacea nigra, vulgaris, capitata, & squamata, J.

ta, J. B. 3. 27. Jacea nigra, *Taber. Icon.* 152. Jacea nigra, *Dod. Pempt.* Jacea nigra vulgaris, *Lobel.* Hyofiris Plinii, *Anguill.* Jacea nigra Gerardi, *Infl. R. H.* 325. vulgo, *Jacee*.

Radice satis crassa, lignosa, vivaci, multis fibris stipata, sapore cum nausea adstringente, nritur: folia priora, quæ a radice exeunt, aliquid commune habent cum Cichorii foliis; sunt enim longa, nonnihil laciniata, præ virore nigricantia, brevi lanugine hirsuta: caulis ex eadem radice interdum unicus, sæpius plures assurgunt, cubitales aut sesquicubitales, hirsuti, teretes, striati, firmi & rigidi, fractu contumaces, medulla farcti, foliis crebris, nullo ordine positis, iis quæ ad radicem similibus, verum angustioribus, obiter præcipue ad exortum dentatis, cincti: e quorum alis seu sinubus a medio caule sursum versus ramuli egrediuntur consimilibus foliis seu minoribus, donati, in fastigiis unum, duos, tresve flores sustinentes flosculosos, plurimis scilicet flosculis constantes tubulosos, profundius in summitate quinquefariam divisos, purpurascensibus, arcte stipatis, embryoni insidentibus, & calyce squamis composito nigricantibus, circa margines cillii instar pilosis, imbricatum positis. Flosculus marcescentibus embryones abeunt in semina oblonga, parva, per maturitatem ex cinereo nigricantia, barbata, & denso, sed brevi pappo intermixta. In agro Parisiensi sponte nascitur. Flores, & folia in usum veniunt, sed raro.

Analysi chymica, ex Jaceæ floridæ lbv. per retortam distillantis prodierunt humores limpidi, odore & sapore herbaceo, cum levi quadam acrimonia, obscure alcalini, urinosis, & subtilis lbj. 3j. 3ij. gr. xij. humoris subtilis, alcalini, urinosis lbij. 3iij. 3vj. gr. lxxvj. humoris rufi, sale volatili urinosis copioso imprægnati 3j. 3v. olei adiposi 3j. Massa nigra in retorta residua pendebat 3iij. 3vij. gr. lxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum 3j. 3vj. gr. xij. ex quibus salis fixi mere alcali 3iij. gr. xxvj. lixivio fuerunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit 3j. 3j. gr. xij. in calcinatione 3iij. 3j. gr. xlij.

Jacea itaque plurimum continet salis acris seu alcalini tum volatilis, tum fixi, cum oleo bituminoso conjuncto.

Inter plantas vulnerarias ab Italis recensetur qui eam *Herba d' elle fe-rite* nominant. Præstansissima in aphthis oris sanandis ab Anguillara dicitur. Ulcera optime detergit. Potenter resolvit; quapropter ad faucium, tonsillarum, uvæque tumores commendatur. Tabernæmontanus ad hernias eam valere scribit, si pulverata ad 3j. in iusculo fumatur.

J A C O B Æ A.

Jacobæa, *Off.* Jacobæa vulgaris, laciniata, C. B. P. 131. *Infl. R. H.* 485. Jacobæa vulgaris, J. B. 2. 1057. J. R. H. 284. Jacobæa, *Dod. Pempt.* 642. Flos Sancti Jacobi, *Tragi* 287. Senecio major, sive flos Sancti Jacobi, *Matthioli.* Lugd. 575. vulgo, *Jacoeæ*, *Herbe de S. Jacques*.

Radix plurimis fibris majusculis, albescentibus terræ firmiter adhærescit, ut non sine difficultate possit extirpari. Caules exinde exsurgunt non raro plu-

res, interdum unicus, teres, striatus, alias glaber, alias nonnihil lanuginosus, in apicis plerumque purpureo, solidus, foliis crebris, nullo aut alterno ordine positis vestitus, sesquicubitalis aut altior, summa parte in ramos aliquot divisus. Folia oblonga sunt, profundè dissecta, primo in laciniarum quasdam conjugationes ad mediam prope costam, deinde in alias lacinias secundarias subdivisa, glabra, & obicurius virentia, præsertim supina parte. Flores in summis caulibus & ramulis nascuntur in umbellæ quodammodo dispositi, magnitudine mediocri, radiati, flavi, quorum discus ex plurimis flosculis fistularibus, in summitate quinquifidis, corona vero ex semiflosculis cuspidatis componitur, embryonibus insidentibus, & calyce tubiformi, ac multifido comprehensis. Embryones marcescente flore abeunt in semina perexigua, oblonga, pappi instructa, per maturitatem rubescentia. Agri Parisiensis incola in ulum medicum nonnumquam venit.

Jacobææ folia amara sunt, aromatica, nonnihil adstringentia, & cæruleam Heliotropii solutionem parumper mutant. Salem essentialem salis terræ naturali fere similem cum plurimo oleo & terra copiosa conjunctum eam continere Cl. Tournefortius existimat.

Vulneraria dicitur. Eisdem cum Senecione vires, & facultates obnere Hieronymus Tragus scribit, in primis autem vulneribus, inflammationibus, & fistulis mederi. Cui C. Hoffmannus, & S. Paulli haudquamquam subscribendum censet. Viribus quippe a Senecione discrepare autumant. Senecio, inquit Hoffmannus, *Lib. 2. de Med. Offic. cap. 66. pag. 221. §. 34.* quia insipidus, cum modica caliditate, digerit: Jacobææ vero quia amara, cum majori caliditate discutit, & abstergit. Ubi ergo mitigandi dolores in insipientibus inflammationibus sunt, Senecio potius præ Jacobææ eligatur: ubi vero siccare, & abstergere citra morbum, & consolidare ulcera animus est, priores Jacobææ teneat, inquit, S. Paulli. Jacobæam ad anginas tonsillarumque inflammationes utiliter adhiberi docet Camerarius, & ex ea gargarisma parat, quod tamen rejicit S. Paulli propter ingratum & propemodum abominandum ejus saporem. Idem S. Paulli narrat se a Chirurgo quodam Castrensi accepisse, cum dysenteria epidemica grassaretur in castris, complures militum gregarium, solius decocto Jacobææ, aut ea in pulmentum cocta, sanitatem pristinam esse consecutos. Quin & idem observat nonnullis Jacobæam calidam cataplasmatibus forma adversus ventris tormina, quæ dysenteria affectos nonnumquam misere excruciant, felici successu fuisse abdomini applicatam. Simon Paulli in *Quadr. Botanico* egrotantium palati delictuosis miseratis hæc euporista medicamenta nauseabunda pro militibus, rusticis ac plebejis relinquit. Revera Medicus tuto citò & jucunde quantum fieri potest, mederi debet. Sed si palato minus grata remedia rejiceremus, exigua sane & curia foret Officinarum pharmaceuticarum supellex. Non ideo igitur propter fastidiosum, & S. Paulli palato minus ardentem saporem a foro medico Jacobææ rejicienda sunt.

Externe Jacobææ ad vulnera & ulcera inveterata ac sordida ab omnibus fere Botanographis commendatur. Eapropter idem auctor in conrumaciore dysenteria aut sordido intestini recti ulcere clysteres aut injectiones ex Jacobææ decocto

cocto vel succo solo aut cum aliis sarcoticis confociato proponit. Remedium quidem tentandum, sed nondum expertum. Nonnulli unguentum adversus erysipelata utile ex ejus succo parant: sed Cl. Tournefortius ejusdem decoctum pro. foru præstantius fore censet, & multa cum ratione, siquidem adiposa & pingua externe admota in erysipelate sæpius noxia comprehenduntur.

JUGLANS.

Juglans, Nux, & Nux Juglans, Off. Nux Juglans, sive Regia vulgaris; C. B. P. 417. & Inst. R. H. 581. Nux Juglans, J. B. 1. 241. Dod. Pempt. 816. & Raii Hist. 1376. vulgo, Nøyen. Cujus fructus Nux simpliciter, Nux Juglans quasi Jovis glans, vel juvenis glans, Nux basillica, Nux regia, Persica Nux, Nux Græca, Nux Euboica, *ναρπος* Græcis: vulgo, *Naix*.

Prægrandis arbor est, multis prælongisque nixa radicibus; caudice procero & crasso ad binum ternumve sæpius cubitorum amplexu, multis ramis in summo sese diffundentibus. Cortice truncus vestitur crasso, cineraceo, subvirente, levi per senium hiulco & in rimas altas dehiscente. Materie constat ampla, rufa vel subfusca, multis exquisisegmentis scarificata, quibusdam partibus undulatis crispis, robusta. Folia pinnatim disponuntur, quina senave ad unam costam coherentia, conjugationes claudente folio impari, primum tenera, rubicantia, suaviterque olentia; cum adoleverint ampla sesquipalmum longa, palmum fere lata, principio & mucrone angustiora, venis obliquis a medio nervo deductis, lævia pulchre viridantia, odore jucundo, fere laureo, sed graviori & vehementi, sapore adstringente. Flores amentacei sive juli cum foliis vere erumpunt juxta foliorum pediculos, duas tresve uncias longi, suaveolentes, plurimis foliolis seu petalis constantes, axi squamatis affixis, quibus singulis denso agmine subsunt stamina & apices flavescencia, quæ brevi decidunt. Fructuum embryones in eadem arbore a floribus separati nascuntur plurimi eidem pediculo innixi, singuli singulis calyculis herbaceis, in summo bifidis, inclusi: abeunt deinde in fructum subrotundum, duas tresve uncias crassum, qui maturitatem assecutus constat cortice carnoso, foris virente, intus albicante, acerbis, & amari saporis non sine acrimonia, nigro colore manus inficiente & subiecto putamine seu testa, quæ sub initio pulposa fuit & candida. Substantia, ex acido amaricans, per maturitatem ossea sive lignosa, rugosa, unciam circiter lata, & ipsa latitudine longiore, in duas. carinas fissili, nucleum continente in duas partes ad medium fere fissum & pene quadripartitum, revolutionibus cerebri similiter inæqualem primo-mucosum, ac fere insipidum, deinde per maturitatem callosum, candidum, dulcem, ori gratum; dum recens est, (aridus enim oleosum & rancidum quid contrahit) cuticula tectum amara, acris, ori ingrata, quæ dum nux recens est, facile deglubitur, cum arefcit adheret, nec potest separari, extrinsecus flavicante, intus albicante, intercusante lignea quasi membrana divisum. In agris secus vias, & seminas & in viridariis plantatur. Ubi sponte proveniat, nesciunt. Læti gaudet collibus; montibus delectatur: laqueos odit, aquososque tractus spernit.

Nuces Juglandes magnitudine, figura, duritie, sapore multis modis differunt

runt. Nux Juglans sive Regia vulgaris, quæ a duro cortice & frangendi mora Morancia, & Moracilla a nonnullis dicitur. Surdam nominat Cæsalpinus, fortasse quia exsiccata & concussa sonitum non edit. Nux Juglans fructu maximo, quam Caballinam Dalechampi vocat, & Angli Nucem Gallicam. Mali magnitudinem fere æquat. Bonitate & pondere ratione molis reliquis cedit. Non enim intus oppleta, sed magna ex parte vacua est, & minus sapida. Nux Juglans fructu tenero, & fragili putamine, a Dalechampio Mollusca dicta, quod cæteris generibus mollior sit, ejusque putamine digitis facile rumpatur. Tarentinæ veterum vel eadem est vel similis. Cæteras differentias prætermitto.

Umbram Juglandis noxiam esse plerique affirmant non solum humano capiti, sed & stirpibus omnibus juxta satis. Hinc a græcis *Κερα*, quod *Κερα* id est caput sua umbra lædat. Hinc in hortis & agris extremis partibus lotatur ac plantatur. Unde versus:

Me, sata ne lædam, quoniam sata lædere dicor,

Cultus in extremo margine fundus habet.

Reipsa decubitus sub hac arbore nonnullis capitis dolorem inducere experientia comprobatum est; quod non provenit ab umbra, sed a graveolentibus halitibus ex foliis arboris emanantibus, qui quidem nonnullis cæteris noxi sunt, sed non omnibus, ut patet ex J. Raii & Evelyni testimonio, qui hanc umbram non tantum innocuam, sed & amœnam & salubrem asserunt ob odorem gratum quem folia exspirant. Cum etiam hæc arbor sit admodum ramosa, & patula, spissiores umbras constituit, in qua plantæ satè minus bene quam sub aperto celo crescant.

Trunci materies seu lignum maxime æstimatur ob elegantem suum colorem varium, venas undulatas & crispas, materiei soliditatem, ac durationem, quod egregie politur, & nitidum splendorem acquirit. Hinc mensis, armariis, utensilibus, & operi ædificio potissimum dicatur.

Truncum igitur Nucis fabri lignarii quærant, fructuum corticem exterioriorem insectores, fructum pueri ad lulum, & esum Pharmacopœi ad usum medicum partes fere omnes, sed in primis folia, flores, germina, Nuces tum virides, tum maturas adhibent.

Analysî chymica, ex Nucum viridum tenerimarum quales condiri solent ℥v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, fere inodori, & insipidi, & subalsi, & subacidi ℔j. ℥ij. gr. xlvij. humoris primo limpidi, magis ac magis acidi, austeri, deinde rufescentis, odoris, & saporis empyreumatici, impense acidi, & austeri ℔ij. ℥xij. gran. xxxvij. humoris rufi, empyreumatici, sale volatili urinoso, copioso imprægnati ℥j. ℥ij. gran. lvij. olei ℥ij. gran. lx. Massa nigra residua pendebat ℥ij. ℥iij. gran. xxiiij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥ij. gran. vj. ex quibus salis fixi mere alcali ℥j. gran. lxxvij. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥xj. ℥ij. gran. lx. in calcinatione ℥ij. gr. vj.

Nucum bene maturarum recentium medullæ ab omnibus involucris & pellicula spoliata: ℔v. per retortam distillatæ præbuerunt humoris limpidi, Nucum aliquantisper torridarum odorem levem referentis, obscure subalsi, deinde subacidi ℔j. ℥iij. gran. ix. humoris limpidi, odorem & saporem

rem axungiae veteris, & rancidae referentis, obscure acidi ℥iv. ℥ij. gr. xv. humoris rufefcentis, subacidi, obscure subausteri ℥i. ℥j. gr. xlij. humoris parum rufefcentis tum acidi, tum alcali urinosi cum oleo pingui, fusco ℥i. ℥vij. gr. xlv. humoris tum subacidi, tum -falsi & alcali urinosi, & austeri ℥vij. gr. xxxvj. cum multo oleo fluido, & olei spissis Resinae seu Colophoniae ad instar, fortiter recipienis parietibus adhaerentis ℥vj. gr. xvij. olei tum fluidi, tum spissi & resinosi ℔ij. ℥vj. gr. xxij. Massa nigra valde sicca in retorta residua pendebat ℥v. quæ per duodecim horas igne vehementi calcinata reliquit cinerum nigricantium ℥v. gr. lxiv. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali gr. lxij. extracta sunt. Partium iactura in distillatione fuit ℥vij. ℥i. gr. xj. in calcinatione ℥iv. ℥ij. gr. viij.

Nuces virides saporem herbaceum stypticum obtinent, nonnihil aromaticum: parum terræ, perparum olei continent, plurimum phlegmatis, & salem essentialem aluminoso-tartareum. Nucum autem maturarum medulla saporem dulcem, gratum, amygdalinum obtinet: cum aqua confusa lactescentem aquam efficit. Multum olei, mediocrem phlegmatis portionem, & salem essentialem tartareum præbet.

Diversæ sunt diversarum hujus arboris partium facultates. Cortex interior seu potius liber Juglandis exsiccat vim insignem emeticam possidet: Julij seu nucamenta leniorem, & a ℥ss. ad ℥j. eorum pulvis exhibetur affirmantibus Fernelio, Camerario, Sennerto, & aliis. Ducunt satis valide bilem piratamque viscidam ex ventriculo vicinisque partibus, ira ut in robustis corporibus tura sint remedia ad febres extinguendas. Ex Camerario, in *Herbo*, julorum pulverem exhibet pro vomitivo in doloribus colicis, & nephriticis.

Attramen Matthioli in suffocationibus uterinis eundem pulverem ad ℥j. exhibet. In epistolis Cratonis idem medicamentum cum hoc elogio commendatur ab eo, qui scribit adversus eundem morbum. „In hoc affectu nihil novi præstantius. „Hunc autem pulverem exhibet ad ℥ij. cum olei Succini gutt. ij. Eidem quidam Joannes Ranzenbach affirmabat, Anabaptistas in Moravia iactare, habere se antiepilepticum secretissimum, quo dato infantibus novissime natis ante omnes alios cibos, præsentibus securis per totam vitam, hos nempe Julos. Has diversas facultates emeticam & antispasmodicam, S. Paulli conciliare vix potest. Quod tamen non prorsus impossibile est; sed ad experientiam confugiendum. Idem Julii a nonnullis, referente Ettmullero, commendantur veluti arcanum specificum adversus dysenteriam, pulverati & in aqua conveniente ad ℥j. propinari. Folia arboris Juglandis aroma spirantia, a vulgo Germanicæ, inquit S. Paulli, frequenter expetuntur, æque ac folia Menthae corymbiferae seu balsamitæ, ad pediluvia & balnea sanorum, quæ conservandæ valetudinis causa instituuntur. Idem S. Paulli refert eadem folia adversus podagram commendari, si ex illis virentibus & modico sale, in olla vitrea stratum super stratum fiat reponendum quotannis in cellam, ut paroxyfmi tempore semimarcida folia parti dolenti cataplasmatibus in modum applicentur. Hoc remedium dicurienti & roborandi, minime autem repellendi facultate prædium censet.

J. Rajus refert, succum radices violenter purgare, nec nisi rusticis exhibendum esse: quod quidem de expresso radicum recentium contusarum succo intel-

telligendum existimo . Nam alius succus ex radicibus mense Februario vulneratis aut perforatis sponte stillat , narrante Ettmullero , in plurimis morbis , præsertim chronicis commendatus , in primis in a-thride , nephritide , & cephalalgia . Urinam potenter movet : minus dulcis est quam Betulæ succus .

Nuces pro diversa earum ætate , diversis virtutibus donantur , necnon variæ sunt diversarum earundem partium facultates .

Nuces virides decerpitæ Majo vel Junio appetente , antequam earum putamina obdurerint , Saccharo conditæ stomacho utiles dicuntur . Antequam condiantur , cortice viridi spoliantur , stylo undequaque perforantur , & in aqua per plures dies macerantur , singulis diebus mutata & nova assusa ; coquuntur igne blando donec mollescant , ac tandem cum Saccharo & aromatis perfecte coquuntur . Nuces sic conditæ commendantur ad ventriculi imbecillitatem , ad flatuum dissipationem , colicum dolorem sedandum , ciborum concoctionem juvandam , ad pestis contagium arcendum : quin & frigidis maritis & ad venerem pigris conceduntur , eamque excitare perhibent . Attamen si quid hac in re præstent Nuces conditæ , non tam ipsis debetur , quam admixtis aromatibus . J. Raius ex propria observatione refert Juglandes virides adhuc immaturas , integras cum cortice viridi Saccharo conditas , ut moris est , si duæ vel tres sub vesperam a sumpto cibo sumantur , alvum blande subducere .

Cortex viridis exterior Nucum Juglandium saporem habet adstringentem vitriolicum : unde ex eo vitriolum quoddam vegetabile Ettmullerus parare tentat hoc modo . Cortices Nucum Juglandium quando maturescunt , deglubiti contunduntur , & cum aq. q. s. decoquuntur . Decocti per pannum laneum transcolati mensuris tribus salis communis manipuli duo dissolvuntur . Solutio ad cuticulam evaporata in locum frigidum reponitur , ubi crystalli virides saporis adstringentis concreverunt , vitriolum vegetabile dictæ . Ex hoc vitriolo cum Boli triplo distillato spiritus acidus extrahitur ad coralliorum perlarum solutionem a quibusdam commendatum . Sal ille improprie vitriolum dicitur , cum revera nil aliud sit , quam sal eibarius seu communis cum corticis Nucum essentiali sale permixtus . Spiritus vero inde distillatus a spiritu salis parum differt .

Viridi huic cortici recenti vim quamdam vomitoriam Ettmullerus tribuit . Eundem corticem viridem exsiccatum & pulveratum a nonnullis Piperis loco usurpant Tragus refert ; & huic pulverem foliorum Salviæ sapientis gratia commisceri : prævum sane condimentum .

Ejusdem corticis succus expressus adstringens est , & in omnibus faucium inflammationibus , præsertim in principio morbi in gargarismaribus usurpatus commendatur , & ad uvulæ relaxationem . Ex eodem succo cum melle inspissato ad syrupi consistentiam Rob Nucum conficitur , Dianucum vel Diacaryon a pharmacopœis dictum , ad eadem utile .

Nonnulli succum hujus corticis inspissant ad extracti consistentiam , & hujus extracti grana aliquot in ejusdem corticis aqua distillata vel alia quacumque solvunt , sicque parant collyrium in ophthalmiis & oculorum inflammationibus perutile sub initio morbi .

Ejus corticis aqua distillata non solum ad oculorum & faucium inflam-

ma-

rationes commendatur ob vim quamdam adstrictoriam, sed etiam ratione tenuium suarum partium quæ odore facile deprehenduntur, ad multa alia utilis dicitur: ab Ettmullero ad calculum, a J. Raio & aliis ad dissolvendos thrombos concreti sanguinis intus sumpta, ad vulnera & ulcera calida, & ad anthracem pestilentem foris imposita. Quin & vis alexipharmaca a S. Paulli ipsi tribuitur: & aquam antipestilentialem describit ab Henrico Paulli patre suo multis optimo cum successu peste affectis exhibitam, ex Nucibus Juglandibus & aliis alexipharmacis sic compositam.

℞. Scabiosæ, Veronicæ, Borrag. Bugloss. Acetosæ, Rutæ, Calendulæ, Card. bened. ana M. iijß. Rosar. rubrar. M. iijß. Cortic. Citri ℥j. Nuc. Jugland. virid. n. xxv. Omnia contusa distillantur baln. Mar. In hujus aquæ cochleari uno atque altero dissolvit sequentis electuarii ℥j. vel ℥ss.

℞. Diafcordii ℥ß. Pulver. Card. bened. ℥iiij. Sal. Card. bened. ℥j. cum Syrupi acetositatis Citri q. s. Fiat l. art. electuarius.

Aqua e tribus Nucibus distillata in Officinis hodie celebratissima est & usitatissima in febribus intermittentibus, necnon in malignis, in hysteriæ affectionibus, in hydropæ. Exhibetur ad ℥iiij. vel vj. quarta vel sexta quaque hora. Sudorem movet, urinam provocat, flatu discutit, ventriculum roborat. Sic autem præparatur.

℞. Julor. seu florum Juglandis ℔x. Tetantur & macerentur calide in succi expressi & colati aliorum nucamentorum ℔xij. per duodecim horas. Deinde distillantur per alambicem. Aqua distillata affundatur embryonum fructuum primo erumpentium ℔vj. & distilletur secundo. Tertio denique aqua distillata supra eandem Nucum fere maturarum quales condiri solent, & vulgo des *Cerneaux* dictarum quantitatem affusa distillatur; aqua e tribus Nucibus dicitur.

Per solum hujus aquæ ad ℥vj. quarta quaque hora propinatae usus, uxor Pharmacopœi Parisiensis peritissimi, plurimis aliis remediis frustra tentatis, paucis abhinc annis ab hydropæ liberata fuit.

Nuces novellæ, vulgo des *Cerneaux*, palato placent quia suaves & dulces, si delibratæ; & ideo mensis secundis frequentissime apponuntur, & cum sale & aqua suaviter esantur. Parum nutriunt, ægre concoquuntur, tarde descendunt. Quanto vero magis ad maturitatem accedunt, eo minus sunt gratæ. Mitate oleaginosam & rancidam qualitatem contrahunt quæ illas reddit esui ineptas. Maturitatem assecutæ & aridæ parce nutriunt, tenuis cuticulæ qua velantur ratione, haud leviter adstringunt. Difficulter concoquuntur. Bilem venenis non inferiorem gignere dicuntur; rursim etiam excitant, vocem extinguunt, asperum quid & rancum in faucibus pariunt; gravitatem capitis afferunt. Corrumpunt tamen si edantur cum Caricis & passulis. Ut vero diutius recentes sint, in media maturitate colligi debent & in cella vinaria sabulo sepeliri. Imo aridæ si per aliquot dies in aqua macerentur, albescunt, & membrana ut virides facile exuuntur.

Nuces Juglandes post piscium esunt comestæ, eorum concoctionem adjuvare creduntur: Unde illud scholæ Salernitanæ:

Poff

Post pisces nux fit, post carnes caseus efflo.

Existimaverunt enim pitium frigiditatem, & humiditatem ab aridarum Nucum caliditate, & siccitate temperari, & emendari.

Quæritur quis sit sensus alterius versiculi ejusdem scholæ:

Unica nux prodest, nocet altera, tertia mors est.

Per primam nonnulli intelligendam esse putant nucem moschatam omnino salutarem. Per alteram intelligunt alii nucem Avellanam, alii nucem Juglandem. Per tertiam vero quidam Balistæ nucem, vel sclopeti glandem jocosè interpretantur, quod nimirum repentinam inferant mortem. Verum alii nucem intelligunt Metellam, seu fructum Stramonii (fructu spinoso rotundo, semine nigricante *Inst.* Solani pomo spinoso rotundo longo flore, *C. B. P.*) quippe quæ venenum sit narcoticum seu torporem inducens. Plerique per hanc triplicem nucem nihil aliud intelligendum esse censent quam unam, & eandem Juglandem: per unicam quidem paucas numero quæ citra denarium consisterent: per alteram quæ paulo largiore copia ingererentur: per tertiam vero quæ immoderatissime sumerentur.

Nucibus bene maturis virtutem alexipharmacam veteres tribuerunt. Eas venenis resistere cum Ficibus, & Ruta anre alios cibos comestas, vel etiam post ipsa venena hausta sumptas asserunt. Necnon contra pestem, & malignos morbos præservative, & curative commendantur. Hinc antidorum Mithridatis regis ingrediuntur adeo celebratam adversus venena in devicti a Cn. Pompejo regis Mithridatis sanctuarii repertam, quæ duas nuces, Ficus totidem, Rutæ folia viginti, simul trita cum salis grano admittebat. Qui hanc jejunos fuit, nullum venenum illo die nociturum asserunt. Nec paucæ sunt compositiones alexipharmacæ, & antipestilentiales, in quibus nux Juglans usurpatur. Attramen C. Hoffmannus de hac alexipharmaca quæ nucibus tribuitur virtute, valde dubitat.

Juglandibus maturis ab Andræa Matthiolo propria quædam, & peculiaris facultas tribuitur ad remoratos menses ciendos, aliis medicamentis nihil proficientibus. Ad id macerantur in aqua donec nuclei membranæ possint studari: deinde nuclei ita exspoliati macerantur in aqua vitæ per biduum, eorumque duo vel tres quotidie mane jejunæ prius perpurgatæ exhibentur comedendi per decem dies ante tempus menstruæ fluxionis.

Singulare quoque medicamentum ex membrana aut tunica illa subamara lutea, quæ nucleum juglandium artissime investit, paratur, & Zi. pondere contra colicos dolores propinatur.

Sunt qui præmanas juglandes nuces eum in finem commendant ut earum beneficio exploremus morsus canum. Etenim si præmanas nuces parti affectæ aliquamdiu applicentur, ac postea projiciantur devorandæ gallinis, nec illæ ab earum esu male se habeant, pronunciandum arbitrantur, canem qui ægrum momordit non fuisse rabidum. Imo nonnulli quoque tradunt eisdem morsui canis licet rabidi posse mederi, ubi commenducatæ a jejuno homine illitæque fuerint.

Nucum testæ, & lignæ intermedia sèpimenta vi exsiccante, & sudorifera instructa censentur: unde in quibaldam decoctis sudoriferis, & exsiccantibus adversus catarrhos, & rheumaticos dolores, & venereos usurpantur.

24. Antimonii crudi confusi ꝑvj. Rad. Sarsaparillæ ꝑvj. Rad. Chinæ ꝑj. Testas, & sèpimenta intermedia lignea juglandium n. xl. Contusa coquantur in aq. commun. ℥xij. ad ℔vii. F. colatura, de qua sumat æger cyathos tres quatuorve singulis diebus, per dies 21.

Ex nucibus bene maturis, aridis, tuis, & expressis oleum elicitor, cui eadem tribuuntur virtutes ac oleo amygdalino: imo status potentius dissipat, & in coli affectibus a flatu genitiis plurimum affert auxilii. Non solum per os intus sumitur ad ꝑj. aut alteram, sed etiam cum decoctis carminativis in clysteribus injicitur. Infusum auribus surditati prodest, & idem utile calidis doloribus illitum. Eodem nonnulli ad ambusta a pulvere tormentario utuntur, qui præcipiunt partem ustulatam eo esse inungendam, mox eidem esse applicandum arboris Juglandis folium: ad ambusta alii illud cum aqua calcis permixtum, & diu agitatum utiliter usurpant. Robertus Boyle oleum Juglandium verus, & per annum, & amplius asservatum commendat veluti specificum adversus calculum, & arenulas in seipso expertum. Imo quo vetustius est, eo efficacius deprehenditur. Calculos, & arenulas comminuit, & expellit: ad ꝑj. vel tres mæne jejuno ventriculo, oleo amygdalino recenti ob spissitudinem dilutum propinatur. Quod quidem identidem reiterandum est. Hoc oleum ad lucernas præcipue expetitur quod durabilius sit oleo olivarum. Quin etiam a pictoribus quod colores incorruptos diutius conservet, & a lignariis fabris ad splendorem suis operibus conciliandum.

In Juglandis arboris truncis fungus nascitur seu spongiosa substantia satis tenax, & pene coriacea sub forma tuberum, græcis *ῥαμα*. Hoc inter cauteriorum genera usos fuisse Paulus Ægineta testatur, in longis stomachi defluxionibus, & in hydrope. Ita autem, teste Cælio Aureliano, vocabatur in usum. Fungum hunc acuminatum in pyramidis formam, cuti apponebant, & summitate accensum concremari sinebant, donec cineresceret, & sponte decideret. Simili fere modo Turcæ aridam sarmenti Vitis portionem parti male affectæ applicant, & summitatem ejus accendunt: hoc modo Moxa sua Sinenfes utuntur ad podagram, & alios morbos.

J U N I P E R U S.

Juniperi species duæ in officinis vulgo distinguuntur; Juniperus fruticosa, & Juniperus arborecens, quæ quidem nonnisi magnitudine inter se differre videntur. De arborecente jam egimus articulo de *Sandaracha*. Nunc de fruticosa.

Juniperus fruticosa, Juniperus vulgaris, Off. Juniperus vulgaris, fruticosa, C. B. P. 488. & Inst. R. H. 588. Juniperus vulgaris baccis parvis, purpureis, J. B. 1. 293. Raii Hist. 1411. Juniperus, Dod. Pempt. 852. vulgo, *Genevrier* ou *Genievrier*: & fructus, *Genèvre* ou *Genevre*.

Frutex est omnibus notus & omnibus Europæ regionibus familiaris, in sylvis & montibus nascens, radicibus numerosis, hinc inde sparsis, nonnullis etiam, alte descendentibus: stipite hominis proceritatem nonnumquam assequente, non multum crasso, ramofo, densissimo, corticē scabro, deciduo, rubente:

mate-

materie firma nonnihil rubefcente, maxime si siccata fuerit, odore resinoso grato: foliis acutissimis, angustissimis, raro uncia longioribus, sæpe brevioribus, rigidis, pungentibus, temper virentibus, ternis plerumque simul per intervalla. Julos proferit Aprilis, & Maji in foliorum alis duas treise lineas longos, purpura cum croceo mixta pictos, & plurimis squamis compactos, quarum infima pars munitur vesiculis tribus quatuorve, Papaveris semine minoribus, pulvere aureo tenuissimo plenis. Steriles sunt illi flores. Fructus vero numerosi in aliis Juniperi speciebus nascuntur quæ staminibus carent. Baccæ sunt sphericæ, primum virides, minutissimæ, & calyce tribus foliolis minutissimis constante involutæ, deinde per maturitatem granis piperis duplo majores, cum umbilico trifurcato, nigra & pulvere cæruleo conspersæ, pulpa subrusa resertæ, sapore acri, aromatico, resinoso, dulci, tria officula continente oblonga, angulosa, dura, semine oblongo foeta, quibus singulis totidem vesiculæ succo resinoso turgidæ adhærent. Fructus maturitatem nisi anno secundo non consequuntur: ita ut aliquando fructus trium annorum in eadem arbore conspiciantur. Quædam sunt Juniperi arborescentis species quarum baccæ non sphericæ sunt sed oblongæ, & subrotundæ: aliis quoque baccæ rufescent. In calidis regionibus ex Junipero arborescente resina sponte vel per corticis incisiones stillat quæ Sandaracha, vernix, & gummi Juniperium dicitur: de qua suo loco mentionem fecimus.

Omnes Juniperi partes odoratæ sunt, & in usum medicum veniunt, nempe radices, lignum, folia, baccæ.

Analyti chymica, ex baccarum Juniperi maturarum, & contusarum lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris primo limpidi, baccarum odorem, & saporem referentis, acidi, subausteri, deinde magis ac magis austeri, tandem rufescentis, empyreumatici, lbj. ʒj. gran. xxxvj. olei essentialis, limpidi, rufescentis ʒij. gran. xlvij. humoris primo rufescentis, tum impense acidi, tum salis, urinosi, deinde rufi, sale volatilî urinoso imprægnati ʒiij. ʒij. gr. liij. olei rufi, spissi ad instar syrupi ʒix. gr. xxvij. Massa nigra in retorta residua pendebat lbj. ʒiij. ʒv. gr. xxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum leucophæorum ʒij. gr. lx. ex quibus salis fixi alcali ʒiij. gran. xxxvij. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ʒxij. ʒvj. gran. xv. in calcinatione lbj. ʒij. ʒiij. gr. xlvij.

Baccarum contusarum lbvj. per biduum in aquæ limpidæ lbxxxvj. maceratæ, igne vehementi distillatæ præbuerunt olei essentialis limpidi ʒvij. extracti lbj. ʒiij. Massa crassa residua post debitam expressionem, & exsiccationem pendebat lbij. ʒiij. ex quibus olei essentialis limpidi flavescens ʒvij. olei vero crassi, rufi ʒvj. ʒj. gr. liij. distillata sunt. Massa nigra in retorta residua pendebat ʒxv. ʒvj. quæ post calcinationem reliquit cinerum ʒj. ʒvij. gran. lx. Liquores vero proluciti pro majori parte acidi austeri erant, sub finem nonnihil alcalini urinosi. Unde liquet baccas Juniperi parum terræ, plurimum vero olei tum tenuis essentialis, tum crassi, tum etiam fixi, ut ita dicam, continere, quod nonnisi diuturna calcinatione elevatur, & comburitur: salem autem essentialem aluminosotartareum obtinent.

Si baccæ contusæ diutius in aqua macerentur, fermentescunt, & humor

vinosum odorem saporemque contrahit, qui debite distillatus spiritum ardentem fundit, nihil vero aut perparum olei essentialis.

Ligni Juniperi ℥v. multum liquoris acidi austeri præbuerunt: olei essentialis limpidi circiter ℥j. ℥iij. olei rufescentis, & spissi syrupi ad instar ℥ix. cinerum vero debite calcinatorum ℥ij. ℥iij.

Summitatum viridum Juniperi ℥v. præter liquorem acidum austerum ac tandem nonnihil alcali urinosi, præbuerunt olei fluidi tum limpidi, tum rufi ℥vj. ℥ij. gr. iij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥xij. ℥ij. gr. xxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥j. gr. xxj. ex quibus salis fixi mere alcali ℥iij. gr. xlij. lixivio extracta sunt.

Baccæ itaque majorem olei quantitatem fundunt, lignum minorem; minorem adhuc folia, & summitates.

Juniperi baccæ apud Germanos in culinis condituræ nomine frequenter adhibentur, & ab Erismullero, & aliis aroma Germanorum appellantur: apud nos vero medicamenti tantum rationem habent. Potenter resolvunt, discutiunt, attenuant, calefaciunt, abstergunt, roborant. Ventriculo frigido profunt, pituitam, quæ in illo coit, digerunt, status inde ortos discutiunt, colicos dolores sedant, ciborum concoctionem juvant, urinam promouent, viscidum mucum renibus aut vesicæ in hærentem abstergunt, & expellunt, calculos, & arenulas hoc mucu irriteritos, & in his partibus morantes foras amandant, & eo nomine lithiasim earum usu præcaveri dicitur. Viscidam piritram pulmonum glandulas insarcientem resolvunt, & expectorationem promouent, tussi medentur, & æsthmati humido. Utiles sunt in affectionibus catarrhosis, & in mensium suppressione conducunt. Sanguinis fluiditatem restitunt, motum augent, sudorem excitant, venenis coagulantibus resistunt; & merito Theriaca rusticorum & nonnullis vocantur. Verum non ideo, ut nonnulli volunt, pro panacea omnibus in morbis usurpandæ sunt: conveniunt tantummodo in pituitosis affectionibus, & ubi fibrarum aronia aut imbecillitas deprehenditur: alioquin sanguinis æstum augent, partibus solidis ardorem, & phlogosim inferunt. Unde sæpius videre licet urinæ suppressionem aut ardorem earum usum subsequi, ventriculi inflationem, roctus, & flatuum majorem copiam produci, ubi nempe ventriculus, intestina, renes ardore aut inflammatione laborant.

Ad ℥j. præscribuntur per diem identidem esilandæ; vel contusæ in aqua bulliente Theæ instar macerantur, & infusum ante cibum propinatur calidum ad ciborum concoctionem promovendam; aut in vino per noctem macerantur, & calculosis mane jejuno ventriculo colatura exhibetur. Sic S. Paulli plurimos a jugi nephritico dolore vindicasse asserit. Quidam Laurentius Rostochienfis Professor, narrante eodem, quotidie circiter pugillum unum baccarum comedebat, quo simplici medicamento obtinuit, ut non solum arenulas, sed calculos minutulos, imo etiam lentis magnitudinem æquantes, si non sine omni molestia, attamen dolore, excreverit, cum ante usum harum baccarum sæpe oppido male se habuisset.

Observandum est baccas Juniperi comestas aut earum essentialis olei guttulam deglutitam urinam violarum odore imbuere, non secus ac Terebinthina vulgaris, & Qillatitium ejus oleum.

Non

Non semper tamen tutus est granorum Juniperi usus in calculosis. Ino Carolus Piso in suis *Observationibus*, *sect.* 4. c. 2. *Observ.* 105. p. 319. scribit pulverem granorum Juniperi semper ipsi suspectum fuisse, quod ab illius usu diuturno urinæ tandem cruentæ emittantur. Simon Paulli baccarum defensionem suscipit, cruentam mictionem calculorum alperitibus tribuendo. Quod quidem re ipsa verum esse potest. Attamen sæpius observavi, usum baccarum urinas ardens, & flammeas excitare, renum dolores, urinæ ardorem producere, ac tandem in cachecticis, & hydropticis, ubi adest in visceribus inflammatoria dispositio, urinæ notabilem immutationem. Unde non facile hujus diuretici usum suadeo, nisi prius viscerum crasis rite perspecta ab omni æstu, & inflammatione libera deprehendatur. Eadem cautione opus est in quibusdam ventriculi affectionibus, in appetentia, flatulentia, difficili ciborum concoctione, nausea, vomitione, quæ sæpissime sunt renum ægitudinis symptomata, his enim in ventriculi affectionibus symptomaticis nocet baccarum usus, qui in iisdem prodest cum idiopathicæ sunt.

Baccæ apud Germanos velut singulare remedium ad grassantia pestilentia contagia depellenda commendantur: comestæ solæ, vel aceto maceratæ.

Ob tot ac tantas Juniperi baccarum virtutes, diversa præparata ex his conficiuntur, aqua Juniperi distillata, vinum Juniperinum, spiritus per fermentationem extractus, oleum essenziale, Rob seu extractum, Elixir.

Inter præparata ex baccis aqua seise offert quæ ab Ettmullero colicis, & nephriticis admodum utilis prædicatur, urinam ciendo, vias urinarias abstergendo, moderate easdem stimulando, & in primis dispositionem calculosam renum corrigendo, si jejuno ventriculo potetur per balneum maris distillata, ad ℥iij. vel ℥vj.

Vinum Juniperinum paratur ex baccis contusis cum affusa aqua fermentatis donec vinosum odorem saporemque referant: potum præbet haud ingratum, & quibusdam in Galliæ locis familiare rusticis deficiente vino, & in frigidis ventriculi, intestinorum, & renum affectionibus. utilimum. Ex hoc fermentato liquore spiritus ardens extrahitur commendatus in affectionibus capitis, & nervosarum partium, interne, & externe adhibitus: in utrumque sumptus urinam potenter movet.

Oleum essenziale, & Rob, seu extractum Juniperi sic præparantur. Recipiuntur libræ octo baccarum Juniperi recentiorum, & succulentarum; affundantur aquæ limpida ℔xxiij. Macerentur per duos trefve dies in loco calido. Postea per vesicam cupream igne vehementi distillatio instituat, cum aqua olei essentialis fragrantissimi odoris, & flavi coloris uncia tres ad summum prodibunt. Quod relinquitur in vesica, decoctum per pannum transcoleatur, & leni calore inspissetur. Ita obtinetur Rob ipsioris consistentiæ, coloris ex flavo fusci, saporis amaro-dulcis, balsamici. Oleum essenziale Juniperinum in spiritu vini rectificatissimo solutum insigne diureticum est, emmenagogum, & carminativum, quod cum infusus solorum Theæ vel cum vino Hispanico sumitur ad guttas aliquot vel etiam elæosaccharum ex hoc oleo essentiali paratur cum saccharo, sicque facile cum aquosis liquoribus admiscetur. Externe in unguentis nervinis, & antiparalyticis usurpari potest. Michael Alberti in sua *introductione in Medicinam*, baccarum oleum aut spiritum non ita facile, &

liberaliter in nephriticis morbis admitti debere pronuntiat: quoniam acrorem qualitatem habent, valde calefaciunt, & sanguinem impetuosis exagitant: quapropter ea ad usum externum reservanda suadet.

Rob Juniperinum quod extractum, & mel Juniperinum ratione consistentiæ, Theriaca Germanorum ratione virtutum, oleo & spiritu magis temperatum est, & ideo multo magis usitatum. Præstantissimam præbet medicinam ad imbecillum ventriculum roborandum, ad defectum fibrarum ventriculi tonum restituendum, ad præsertionem a calculo, & ab hydropse. Senibus prodest, qui vesicæ vitiis, urinæ difficultatibus, & imbecillitatibus ventriculi, & intestinorum obnoxii sunt. Urinam blande provocat, menses movet, sudores quoque nonnumquam propellit, & vis alexipharmaca, & antipestilentialis ipsi tribuitur, si cum ceteris cardiacis, & alexueriis medicamentis consocietur, unde frequenter loco mellis in electuariis stomachicis, antinephriticis, & alexipharmacis usurpatur. Ad ʒi. in vino Hispánico, aceto, aqua Cardui benedicti aut alio liquore conveniente exhibetur, vel mane jejuno ventriculo, vel ante aut post cibum.

Ex hoc melle Juniperino cum f. q. spiritus Juniperini supradicti diluto, paratur elixir Juniperinum, stomachicum, & diureticum insigne. Dosis cochlear. j. Ex baccis Juniperi contusis, & in axungia suilla decoctis unguentum fit adversus porriginem, vulgo, *Teigne*, a D. Chomel plurimum laudatum. Humores identidem evacuandi sunt blando cathartico ex Aquilæ albæ, & Diagridii ana granis vi. vel viij.

Juniperi folia seu summitates rarius in usum veniunt. Fridericus Hartmannus in *notis ad Schroderum*, & S. Paulli post Matthiolum, & Hartmannum lixivium proponunt ex earum cineribus cum vino factum adversus hydropem. Ettmullerus scribit easdem summitates seu turiones alvum laxare eodem modo ac turiones Sambuci.

Magis familiaris est usus ligni Juniperini. Ob suaveolentiam commendatur incensum ad aerem pravis halitibus inquinatum emendandum, & odores noxios, & contagiosos arcendos. Sudorifera virtus huic ligno tribuitur, ejus scobis in decoctis sudoriferis a nonnullis usurpatur adversus catharos, & lœm veneream; & scobi Guaiaci vix cedere credunt. Ex eadem scobe in aqua diu macerata cum sale, oleum essentielle flavescens, & fragrans distillatione per vesicam æneam extrahitur sudoriferum simul, & diureticum. Ex eodem ligno per retortam distillato oleum rufum nigrumve empyreumaticum elicitur oleo cadino dicto non dissimile. Hoc autem cadinum oleum recipitur ex truncis, & ramis Oxycedri, & Juniperi arborescentis in quibusdam fornibus huic usui destinatis, combustis. Externe illitum potenter resolvit. Utile dicitur impetigini, capitis porrigni, pecorum etiam scabiei, & ulceribus, quibus a tonsione infestantur.

Baccæ Juniperi usurpantur in Elixir vitæ *Fioravanti*, Elixir pestilentiali *Sennerti*, Elixir asthmatico *Zuelferi*, in opiata *Salomonis*, Antidoto Orvietano *Ph. Reg.* Oleo scorp. comp. *Matthioli*. Rob seu extractum melagineum in Theriaca reformata *Ph. Reg.* & antidoto Orvietano *Frid. Hoffmanni*. Oleum Juniperi essenziale usurpatur in Balsamo vulnerario *Metensium Schroder.* vulgo, *Beaume veri de Fevillet.*

Kci-

KEIRI.

Keirī, Cheiri, Leucoium & Leucoion luteum, *Off.* Leucoium luteum vulgare, *C. B. P.* 202. Leucoium luteum: vulgo, *Cheiri flore simplici*, *J. B.* 2. 872. *J. Raii* 782. Leucoion luteum, *Ded. Pempt.* 160. Viola lutea, *Tragi* 560. Viola petræa lutea, *Tab. Icon.* 305. Leucoium aureum, *Matthioli*: vulgo, *Violier ou Girofier jaune*, & flos *Girofée jaune*.

Radicibus, sarculisque seu ramulis ubertim fruticantibus luxuriat, lignosis, albicantibus, quos obsident folia nullis appensa pediculis crebra, unciali & ampliore longitudine, ex angusto principio sensim dilatata, viridentia aut canescentia, idque maxime prona parte, sapore subacri. Flores edit suaveolentes, sapore parum grato, subacri, subamaro, cruciformes, quatuor scilicet petalis luteis constantes, staminibus senis & pistillo pallefcentibus, in medio penitus fere latentibus. Succedunt fructus seu siliquæ longæ, compressæ, in duo loculamenta divisæ, cum septo intermedio, cui valvæ adhærescunt, & seminibus planis, orbiculatis, rufis, gustu acri-amaro. In pervetustis muris, rudibus & saxosis locis libentius nascitur: feritur & in hortis juxta parietes & muros. Flores, potissimum in usum veniunt. Keiri folia saporis sunt amari, herbacei, subsalsi; & eorum succus chartam cœruleam rubro colore tingit.

Analysi chymica, ex floribus Keiri ℞v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, fere inodori & insipidi, obscure acidi ℞vj. ℥j. gr. xlviii. humoris aliquantis per empyreumatici, primo subacidi, deinde magis ac magis acidi ac tandem austeri ℞ij. ℥iiij. ℞vij. gr. xxiiij. humoris rufi, turbidi, empyreumatici, manifeste acidi, & nonnihil alcali urinosi ℥j. ℞vij. gr. xviii. humoris rufi, sale volatili urinoso imprægnati ℞v. gr. xxiiij. olei pissi ad instar extracti ℥j. ℞vij. gr. xxxvj. salis volatilis urinosis concreti ℥j. gr. xxx. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥iiij. ℥j. gr. xxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum albicantium ℥j. ℥j. gr. xxxvj. ex quibus lixivio salis fixi salis ℥iiij. gr. xxiiij. extracta sunt. Parium ja-Quara in distillatione fuit ℥j. ℞vij. in calcinatione ℥ij.

Keiri scatur sale ammoniaco cum multo sulphure tum tenui, tum crasso conjuncto.

Flores Keiri attenuant, discutiant, abstergant; dolores mitigant, utero speciatim dicantur; menses cient, secundinas & foetum pellunt. Laudantur quoque tanquam discutienti in apoplexia & paralyti medicamentum. Folia & flores macerantur ad M. j. per 24. horas in vini ℞j. pro duabus dosibus mane & sero propinandis: vel in aqua communi decoquuntur ad viacerum obstructiones. Semen ad ℥j. vel duas intus sumitur. Ferunt hoc semen magna dosi sumptum, non solum foetum vivum pellere, sed vivum enecare, & enecatum ejicere. De ejusdem plantæ succo simile quid Ebrodunensis herbarii auctores tradunt, prudenterque admonent eundem exhibendum non esse nisi in summa necessitate consiruitis.

Conserva florum Keiri in officinis parari solet. Eam cum ejus aqua distillata crebro sumptam, præservare ab apoplexia, & paralyticos juvare

Camerarius auctor est. Hieronym. Reusnerus in observationibus a Vvelschio editis refert Episcopum quemdam Tridentinum ad præsertionem ab apoplexia & paralyti isdem feliciter uti.

Oleum per infusionem est floribus præparatum quod potenter resolvit & rheumaticos dolores sedat. Eodem in Italia ad facilitandum partum regio pubis innungitur.

LACTUCA.

Lactuca a lacteo, quem fundit dum abruptitur, succo dicta, plurimas habet varietates. Summa illius duo genera distinguuntur, sativum & sylvestre. Sativum rursus ratione magnitudinis, coloris & figure varium est & multiplex: album, nigrum, rubrum, capitatum, crispum, læve, laciniatum. At vero tres præcipue Lactucarum sativarum species frequentior in usum veniunt, tum in alimentis, tum in medicamentis: Lactuca nempe sativa non capitata, sativa capitata, & Lactuca Romana. Inter sylvestres Lactuca sylvestris costa spinosa frequentius apud nos usurpatur.

Lactuca sativa, non capitata, Off. Lactuca sativa, C. B. P. 122. Inf. R. H. 473. Lactuca sativa, vulgaris, non capitata, J. B. 2. 997. Lactuca sativa, folio Scariolæ, Lobel. Icon. 24r. vulgo, *Laitus*.

Radice est longa, crassa, pluribus stipata fibris: foliis oblongis, latis, rugosis, lævibus, pallide virentibus, lacte aquoso prægnantibus, cum primo adolescit, grato, tandem amaro, ubi caulescit planta: caule firmo, crasso, terete, folioso, sesquipedali & altiore, ramoso, cujus rami adhuc divisi & in latam effusi comam flores in summitate gerunt parvos, semisfoculosos, seu plurimis constantes semisfoculis luteis, embryoni insidentibus, & calyce squamoso oblongo tenui comprehensis: quibus succedunt semina papposa, parva, utrinque acuminata, oblonga, compressa, coloris cinerei. Tota planta vulnerata similem aquoso lacti succum effundit. Seritur in hortis.

Lactuca sativa, capitata, Off. Lactuca capitata, C. B. P. 123. & Inf. R. H. 473. Lactuca sativa, vulgaris capitata, J. B. 2. 997. Lactuca sativa, sessilis live capitata, Lobel. Icon. 24r. vulgo, *Laitus pommé*.

Folia huic breviora & latiora, extrema circumscriptione rotundiora, quam sativæ vulgaris, plana & lævia, quæ brevi in caput rotundum conglobantur, Brassicæ capitatæ in modum: semen priori simile, sed nigrum.

Dodonæus Lactucam sativam culturæ mangonio folia ita mutare scribit, ut vel crispentur, vel ita in se contrahantur, ut capitatam Brassicam æmulari videantur. Eiusdem sententiæ J. Bauhinus etiam esse videtur. Verum J. Rayus tum figuram foliorum, tum seminis colorem, si perpetuo niger sit, nec unquam muretur, differentiam specificam arguere contendit, & in eadem sententia Cl. Tournefortius fuisse videtur qui species capitatas & crispas a sativa vulgaris distinguit.

Toto anno seritur in hortis olitoris. Dum adhuc tenella est, evellitur, & alio fundo probe stercoreato plantatur: sic majori foliorum copia luxuriat, & magis capitata, seu, ut ajunt, pomata evadit.

Alia

Alia Lactuca capitata species elegantior paucis abhinc annis laetioribus mensis in acerariis apponitur cuius color ex albo purpureo & laeteo variegatur. Dicitur a Cl. Tournefortio, *Lactuca sativa*, maxima, austriaca, capitata & variegata, *Inst. R. H. 473.* *Lactuca caryophyllacea* vulgo, *Horti Lugd. Batavi*: vulgo, *Laitue panachée*, *Laitue de Sibirie*.

Analysi chymica, ex *Lactuca capitata* foliorum tenerorum & nondum in caput comprobatorum lbv. per retortam distillatis, prodierunt humoris limpidi odore & sapore virentem herbam referentis, subfalsi, obscure alcali urinosi absque ullo acidi indicio ℥viij. ℥iij. gr. xxiiij. humoris turbidi albicantis, primo leviter ferentis, subfalsi & urinosi, deinde magis ac magis empyreumatici, alcali urinosi manifeste, ac tandem sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥iiij. ℥vij. gr. xxxvj. salis volatilis urinosi concreti gr. lxx. olei ℥v. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥ij. ℥iij. gr. xlvij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥iij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥iij. gr. xxxvj. lixivio sunt extracta. Partium iactura in distillatione fuit ℥ij. ℥j. gr. lvij. in calcinatione ℥j. ℥j. gr. xlvij. Ex totius *Lactuce capitatae* capitum cum radicibus lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi odore & sapore *Lactucam* & herbam virentem referentis, tum obscure subfalsi & obscure alcali urinosi, tum leviter subacidi ℥ij. ℥v. humoris limpidi, ejusdem odoris & saporis, tum obscure falsi & alcali urinosi, tum obscure subacidi ℥ij. ℥iij. ℥j. gr. xxxvj. humoris fusci, empyreumatici, falsi; tum subacidi, tum alcali urinosi & sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥iij. gr. vi. salis volatilis urinosi concreti ℥ij. gr. liij. olei spissi ad instar extracti ℥iij. gr. lxx. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥j. ℥iij. gr. xxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥j. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥iij. gr. xlvij. extracta sunt. Partium iactura in distillatione fuit ℥j. ℥j. gr. xlvij. in calcinatione ℥iij. gr. xxxvj. Foliorum *Lactuce capitatae* tum virentium, tum albicantium, demptis caulis & medulla lbv. præbuerunt in distillatione humorem salsum, urinosum & copiosum, absque ullo acidi manifesti indicio: salis volatilis urinosi concreti gr. lxx. olei spissi syrupi ad instar ℥iij. massæ nigrae ℥j. ℥iij. gr. xxxiij. cinerum ℥j. gr. xlvij. salis fixi alcali ℥iij. gr. xxxvj. *Lactucarum capitatarum* caulis seu medulla ad lbv. distillata humorem tum alcali urinosum & tum acidum præbuit salis volatilis urinosi concreti gr. xxxviij. olei ℥iij. massæ nigrae ℥j. ℥iij. gr. xxxvj. cinerum ℥vij. gr. lxxvj. salis fixi alcali ℥v. gr. xlvij. *Lactucarum capitatarum* radices ad lbv. distillatae præbuerunt humorem tum acidum copiosum, tum alcali urinosum; olei ℥iij. nihil salis urinosi concreti; massæ nigrae ℥j. ℥iij. gr. xxxvj. cinerum ℥iij. gr. xxxvj. salis fixi mere alcali ℥v. gr. lxx. Ex seminum *Lactuce capitatae* lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris tum falsi & obscure acidi, tum manifeste alcali urinosi & sale alcali urinoso copioso imprægnati ℥ij. ℥vj. gr. liij. olei ℥ij. ℥vij. gr. xxxix. salis alcali volatilis ℥ij. gr. lxx. massæ nigrae ℥j. ℥iij. gr. xxxvj. cinerum ℥vj. ℥j. gr. xlvj. salis alcali fixi ℥ij. gr. lviij.

Totius *Lactuce capitatae* floridæ lbv. præbuerunt humoris primo alcali urinosi, deinde tum alcali, tum acidi, magis ac magis manifesti ℥iiij.

℞. ix. gr. ix. olei adiposi ℥j. ℥j. massæ nigræ ℥ij. ℥vj. gr. vj. cinerum ℥j. ℥vj. gr. liij. salis fixi mere alcali ℥j. gr. xxv.

Succus ex Lactucis capitatis expressus plurimum humoris præbuit limpidi, satui, qui plantæ saporem & odorem referebat: deinde humorem alcali urinosum cum aliqua acidi occulti portione: tandem humorem empyreumaticum, tum manifeste acidum, tum alcali urinosum & sale urinoso copioso imprægnatum. Massa residua foliorum Lactucæ capitatæ ex quibus succus fortiter & accurate expressus fuerat ad quantitatem ℥v. distillata præbuit humorem tum salum, tum manifeste acidum, tum alcali urinosum: salis volatilis conciei gr. xij. olei ℥vj. massæ nigræ ℥ij. ℥vij. cinerum ℥j. ℥iij. gr. lxij. salis fixi alcali ℥vj. gr. xlvij.

Decoctum Lactucarum aqua coctarum trancolatam & ad extracti liquidi seu syrupi consistentiam in vase aperto redactam, in distillatione liquorem primo acidum austerum, deinde empyreumaticum, urinosum & sale alcali urinoso copioso imprægnatum præbuit. Unde concludere licet sales volatiles urinosos plantarum, ceteris principis involutos, neque diuturna coctione, neque lenta humoris evaporatione in vase aperto exhalari, imo fortiori igne indigere ut evoluantur, apt potius fortasse ut producantur.

Lactucæ capitatæ exsiccatae dum igne aperto comburantur, fulgurationes identidem emittunt, non secus ac nuxum in carbonem projectum producere solet.

Ex tot diversarum Lactucæ partium analysibus aut aliis tentaminibus institutis sequitur Lactucas saltem essentialem continere nitrosum ammoniacalem, qualis exsurgit ex mixtura spiritus nitri & salis volatilis urinosi. Sal ille mediocri olei portione, multo phlegmate, & exigua: admodum terræ portione involvitur. Mirum sane hanc plantam aquosam & fere inspidam tantam salis volatilis urinosi copiam in analysi præbere, ut plurimas plantas longe sapidiore hujus salis copia superet. In ea sal acidus alcali urinoso ita obruitur ut in nonnullis analysibus sit detegere possit; & succus Lactucæ chartæ cœruleæ colorem non mutet. Vel potius sal essentialis nitrosus hujus plantæ nitro seu Salipetræ profus similis sal falsus est, qui nullum acidi aut alcali indicium præbet, ac distillationibus per ignem in alcalinum saltem tum fixum, tum volatilem fere totus convertitur: eodem plane modo ac in nitri cum pulvere carbonum deflagratione in vasis clausis peracta observare licet: ubi mirum non modo saltem fixum alcalinum copiosum relinquit, sed etiam humorem sale volatile urinoso copioso imprægnatum distillatione fundit. Hæc nitri salis transmutatio in saltem alcali fixum & volatilem fuscè describitur in *Commentariis Regiæ Scientiarum Academia Parisiensis anni 1717.* ubi de acidorum salum in salis alcali transmutatione egi.

His in Lactucæ analysibus Academici Parisienses primario deprehenderunt quosdam liquores ex plantis distillatos acidi & alcali salis notas indiscriminatio præbere, nempe cum aliis liquoribus acidis aut alcalinis permixtos pariter ebullire, cyaneam Heliotropii tincturam rubram efficere, & limpidam Mercurii sublimati corrosivi solutionem turbidam, lacteam vel etiam spissam & grumescerem reddere, ac, ut ajunt, præcipitare. Quibus experimentis acida & alcali in ejusdem liquoris sua pacifice & sine

ulla

ulla effervescencia aut mutua lucta sæpius recondi perceperunt. Reipsa liquores mere acidos, aliosque mere alcali urinosos ex plantis extractos miscuerunt absque ulla effervescencia. Pariter acetum distillatum, spiritus urinae simul mixti nullo modo fermentescunt: attamen si sal volatilis urinae rectificatus, ut ajunt, aqua limpida solvatur, & solutioni acetum distillatum affundatur, vehemens ex hac miscela exsurgit effervescencia. Diversorum horum effectuum ratio in eo posita est, quod in spiritu urinae aut in aliis alcali urinosi liquoribus ex plantis aut ex animalibus extractis sales urinosi plurimis oleosis involvantur partibus, quibus spiculatorum acidorum ingressus intra salium alcali urinosorum poros prohibetur. Unde sæpius ambo sales acidi, & alcali in eodem liquore innascent, sed non intime permiscentur, nec in se invicem agunt. At vero si sal volatile urinae rectificato aqua soluto acidus liquor affundatur, ambo liquores fermentescunt, quia salinae urinosae molecule rectificatione oleosis particulis fere spoliatae fuerunt, sicque liberum spiculis acidis ingressum intra suos poros præbent, unde exsurgit effervescencia seu tumultus, qui mutuam horum salium & intimam conjunctionem comitatur & transmutationem in alium saltem neutrum seu salum, ut vocant.

Lactuca Romana, *Offic.* Lactuca Romana, longa, dulcis, *J. B.* 2. 998. & *Infl. R. H.* 473. Lactuca folio obscurius virente, semine nigro, *C. B. P.* 123. Lactuca folio obscurius virente *Dod. Pempt.* 644. Lactuca Intibacea, *Gervard.* Lactuca Regia: vulgo, *Laitue Romaine, Chirouze*.

Folium huic angustius est, & productius, planum, & minime rugosum aut bullarum, modice sinuatum, & inferna parte secundum costam spinulis armatum. Flore est, & caule Lactucæ vulgaris, sed semine succedente nigro. Folia dum adolescunt paleaceo simul collecta vinculo alligantur; & sic candidissima redduntur, & fragili teneritudine cæteras vincunt. In hortis olitorii ad mensarum usum teritur.

Analysi chymica, ex foliorum Lactucæ Romanæ candidissimorum, & tenerorum lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, odore & sapore herbam virentem referentis, subacidi lbj. 3xj. 3iv. humoris limpidi, manifeste acidi, obscure subausteri lbj. 3xij. 3iv. gr. xxxvj. humoris limpidi, odore leviter empyreumatico; tum acidi; tum subsalis, & leviter alcali urinosi 3ij. gr. xlvij. humoris rufi, sale volatili urinoso copioso impræghari 3vj. salis volatilis urinosi concreti gr. xx. olei syrapi ad instar spissi 3ij. gr. xxiiij. Massa nigra pendebat 3j. 3v. gr. vj. quæ rite calcinata reliquit cinerum 3vj. gr. x. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali 3ij. gr. xxvj. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit 3ij. 3ij. gr. xi. in calcinatione 3vj. gr. lxxvij.

Lactuca Romana prioribus magis sapida est: sale essentiali nitroso ammoniacali donatur haud dissimili, sed paulo majori copia, & in quo acidus sal paulo magis evolutus est.

Inter olera Lactucæ sativæ primas ab omni ævo tenent. Ut enim gratissimæ sunt in acerrimis crudæ & in jussculis elixæ, sic in medicis usibus salutaris deprehenduntur. Refrigerant, humectant, & familiare præbent alimentum medicamentosum juvenibus, & biliosis naturis perutile. In ventriculo facile concoquuntur, præsertim si aqua pro potu huic cibo consocietur. Nam chylum

chylum efficiunt multum, blandum, dilutiorem, fluidiorem, minime æstuosum. Sanguinem paucum quidem gignunt, sed laudabilem, fluidum, minime acrem, minime æstuantem. Humorum acrimoniam demulcent, bilis effervescentiam, sanguinis & humorum æstum compescunt, sitim egregie restinguunt: quare æstivis temporibus passim in frequentissimo usu habentur.

Veteres conciliandi somni causa, ultima mensa illis vescebantur: postea mutato ordine, Domitiani tempore ab illis Promulsidem (*entree de table des Romains*) auspicabantur. Ideo quærit Poeta Martialis, *L. 13. Epigr. 2.*

Claudere, quæ cœnas Lactuca solabat ovarum

Dic mihi cum nostras inebat illa daper

Galenus quoque hoc olere ut familiarissimo cibo & juvenis & senex usus fuit. De seipso refert, se in juventute quoniam assidue os ventriculi bile effervecebat, æstus moderandi gratia Lactucas assumpsisse; cum declinante jam ætate noctes insonnes ageret ob studia longiora & raro intermissa, unicuique præsentissimum adversus immoderatas vigilias remedium Lactucas vespere comestas fuisse. Cum vero denique ipsi deteriores esse comperunt, ita ut mandi crudæ circa molestiam non possent, easdem in aqua elixas comedisse.

Hanc Lactucarum vim anodynam quotidie experimur, quæ quidem non a quodam narcotico & noxio principio dependet, ut nonnulli opinati sunt; sed ab aquoso suo succo. nriso, quo humorum effervescentiam temperare valent, ventriculi, hepatis, renum, cæterorumque viscerum ardorem & æstum mitigare, eorum fibras nimis crispatas & vividius oscillantes laxare, sicque functiones omnes ac proinde somnum in integrum restituere. Convalescentibus agrypnia adhuc laborantibus olim Lactucæ oserebantur, teste Lucio Junio Columella:

Jamque salutarî propevat Lactuca sopore.

Tristia, quæ relevat longi fastidia morbi.

Alvum blande emolliunt. Ideo veteres eas prima mensa sumebant, ut videtur est apud Martialem Poetam, *L. 11. Epigr. 53.*

Prima tibi dabitur ventri Lactuca movendo

Utilis.

Siccioribus alvi constitutionibus summi sunt levaminis sive crudæ sive coctæ sapius comestæ; ac proin hypochondriacis scorbuticisque, quibus diuturnior alvi adstrictio non pauca inducit symptomata. Egregio id exemplo hypochondriaci cujusdam a Josepho Latxonio in *Epibemerid. Germanic. Dec. 3. ann. 2. Observation. 34.* allegato confirmatur. Ille malo ejusmodi a longo tempore affectus cum insigni ventriculi imbecillitate, anxietate a pasto, respirandi difficultate, aurium tinnitu & flatibus copiosis inter suctus erumpentibus, frequenter demum Lactucarum tam in prædio quam in cœna usu sanatus est.

Ejusdem constitutionis & Augustus Imperator fuisse videtur qui pristinam valetudinem, narrante Plinio, *L. 19. C. 8.* Lactucarum etiam recuperavit ex Concilio Archiatri sui Antonii Muse: cui idcirco Romanus Populus statuum juxta ædem Esculapii erexit, narrante Suetonio.

Hæc Lactucarum præstantia adversus malum hypochondriacum a Simonis Paulli votis in *Quadr. Botanic.* commendatur. Optabat enim ut multi ad maris

maris Baltici oras vel littora sitorum accolarum, si non crudis, at coctis vescerentur eis, & a multis morbis vindicaretur, quos diuturnior alvi adstrictio mali hypochondriaci comes, & affecla invehere suevit. Eandem Lactucarum in malo hypochondriaco virtutem quotidiana comprobata experientia; siquidem plurimos vidimus melancholicos & hypochondriacos assiduo earum crudarum coctarumve usu, carnium esu & vini potu prorsus interdictis, plurimum sublevatos, & sanatos fuisse. Fuere Medici qui sanguinem multum a Lactucis generari tradiderunt: quod quidem ipsis vitio vendam non foret. Hac fretus opinione Simeon Sethi monet esum vitandum illis, qui sanguinem expaunt. At cum Galeno opinamur Lactucas sanguinem non quidem multum producere; sed chylum laudabilem efficere fluidum, tenuem, aquosum, quo sanguinea moles optime diluitur, extenditur, rarescit, & fluidior evadit; sicque sanguinis molem, non quantitatem augent. Utiliter autem sanguinem expucentibus præscribantur ad eorum sanguinis acrimoniam demulcendam, fervorem compescendum. Eadem ratione lac augent nutritibus; quibus propter sicciorum crassitiam aut testam lac vel deficit, vel parcius succedit.

Galenus succum refert e Lactucis expressum & ad cochlearium quatuor seu ʒij . quantitate intus sumptum, non secus ac Cicuta & Papaver hominem interficere: quamvis folia majori copia, quam pro succo quatuor cochlearium exprimendo opus est, comesta; damnum nullum inferant: sed Galenus aut vulgarem suo tempore opinionem inexpertus tantummodo refert, aut Lactucarum, quæ suo sub cælo nascebantur vires a nostris prorsus erant diversæ: quandoquidem nostrarum succus non modo turo, sed & salubriter quotidie propinatur.

Lactucas semen minuere venerisque impetus cohibere nonnulli suspicari sunt. Hinc a Pythagorice Lactucæ quoddam genus *Euryxus* idest castrata, & *Æronis*, id est sterilis & infœcunda dicitur, quia viros eunuchorum instar reddit, mulieres vero steriles. Hinc Callimachus Poeta fingit Adonin a Venere inter Lactucas sepultum fuisse: & Ebulus comicus Lactucas *νεκρὰ βρώμα* mortuorum cibum vocat. Quæ opinio apud Romanos multorum animis adeo inhærebat, ut Augusti temporibus plurimis religio esset Lactucis vesci; narrante Plinio L. 19. c. 8. quam Imperatoris exemplum prorsus delevit. Vera Lactucæ venereos appetitus non accendunt, imo humores contemperando minuunt, sed non prorsus extinguunt. Nihil igitur de illis timeant conjuges, qui progeniem expetunt; licet utiliter largissime vorandæ præscribantur illis, qui cælibatus ex voto sunt addicti, aut illis, qui in matrimonio nimis præuriunt, ne scilicet ex immodica venete escant. Quorum imbecillior est ventriculus & frigidior ab earum esu abstinant. Phlegmaticis; & asthmaticis quoque interdiciuntur, & illis, quibus visus debiliior contingit. Antiqua enim & vulgaris est opinio, trebriorum illarum esum claritati oculorum officere.

Comeduntur crudæ æstivis præsertim temporibus cum oleo, aceto & sale. Nonnulli ad nimiam earum frigiditatem putatitiam corrigendam Chæresolium Draconculum hortensem, Nasturtium, Cœpas, &c. addunt. Sed hæc non indigent emendatione. Imo hæc ipsa difficilior quam Lactucæ digeruntur. Quod quidem ex rusticis, quos stomachus post eorum esum per sat longum tempus emittit, harum herbarum odorem saporemque referen-

ferentes, percipitur. Si quis Lactucarum concoctionem faciliorem, & citiorem velit; aquam & limpidam superbibat & a vino abstineat.

Quidam existimant Lactucas coctas crudis magis nutrire, & salubriores esse, illis præsertim qui imbecillo sunt stomacho. Alii contra sentiunt cum Nonnio L. *De Re cibaria*, quia Lactucas a coctura nimiam humiditatem contrahere asserit, quæ stomachum exolvere potest, & laxiorem reddere: quæ de causa, inquit Hippocrates *Lib. vij. Epidemior.* inter causas cholerae morbi refert elum Lactucarum coctarum, quia humiditate sua nimia stomachum subvertunt. Verum crudæ juxta ac coctæ Lactucæ salutares sunt, modo moderatus sit earum usus. Cum aqua, & sale coquantur, addito nonnumquam butyri momento, vel in carniū jusculis.

Cum Lactucis apozemata & juscula refrigerantia, & humectantia præparantur. In decoctis pro clysteribus ad refrigerandum & emolliendum frequenter præscribuntur.

In Officinis prostant semina Lactucæ, quæ inter semina frigida minora recententur, nempe Lactucæ, Porulacæ, Endiviæ, & Cichorii. Servatur, & aqua Lactucæ distillata, quæ utilis est ubi refrigeratione, & humectatione opus est, & in julapii, & potionibus refrigerantibus recipitur. Emulsio ex seminibus Lactucæ in ejusdem aqua parata cum syrupo Nenupharis aut Althææ urinæ ardorem mitigat, quietem nocturnam accersit, & venerea insomnia pellit.

24. Radicum Cichorii, Acetosæ, Nenupharis ana ʒj. folior. Lactucæ, Porulacæ, Oxalydis, Bugloss. & Cichor. albi ana M. j. Florum Violar. & Borragin. ana p. j. Bulliant in ʒij. ad ʒiij. Sub finem coctionis adde quatuor seminum frigidior. major. contusor. ʒj. Colatura dilue nitri purificati ʒj. syrup. de Nymphæa vel Granator. ʒij. F. apozema pro quatuor dosibus, quarta quaque hora propinandis. Ad refrigerandum, humectandum, incrassandum, & demulcendum.

25. Pullum gallinaceum exenteratum, & decorricatum, demptis pedibus & capite, frustulum colli vitulini ad ʒij. Coquantur in aq. limpida ʒvj. ad ʒiiij. Sub coctionis finem adde caput Lactucæ in quatuor partes sectum, folior. Porulacæ, Betæ, Borragin. ana M. j. pro quatuor, jusculis refrigerantibus, & alterantibus horis medicis sumendis.

26. Radic. Tormentillæ, Bistortæ ana ʒß. Symphyti majoris ʒj. folior. Lactuc. Porulac. Plantag. Millefol. ana M. j. Rosar. rubrar. & Balustior. ana P. j. seminum quatuor frigidior. major. ʒß. semin. Papaver. & Lactuc. ana ʒj. cum frustulo carnis vitulinæ vel bovinæ, vulgo, *le Trumeau*. Coquantur ex arte & fiant juscula duo ad sanguinem incrassandum in hæmorrhagiis & alvi profluviiis.

27. Aquar. Lactuc. Porulac. & Oxytriphyll. ana ʒij. nitri deseccati ʒß. syrupi Granor. aut Berberis ʒj. F. julap. refrigerans, & humorum æstum temperans.

28. Quatuor seminum frigidior. major. ana ʒß. semin. Lactuc. & Papav. alb. ana ʒj. Contande ut artis est sensim affundendo aq. Lactuc. stillatiz ʒvj. Expressione dilue syrup. de Nymphæa aut Althæa ʒj. F. emul-
sio

sio pro unica dosi hora somni sumenda in vigiliis immodicis vel sæpius in die iteranda in urinæ ardore, &c.

2. Succor. desiccator. Lactuc. Portulac. & Plantagin. ʒiij. Syrup. de Symphyto vel de Hedera terrestri ʒß. F. Julap. in exsiccatione cruenta & hæmorrhagiis.

In phrenitide, delirio, febris ardente S. Paulli applicat temporibus & futuræ coronali, necnon carpis lintheum duplicatum vel triplicatum permadefactum aqua Lactucæ in qua nitrum crystallizatum solum fuerit.

Usurpantur Lactucæ omnes in syrupo de Cichorio composito, in electuario *Requies Nicolai* dicto, Unguento Populeo. Semina in syrupo Jujubino, Pb. Reg. resumptivo seu de Testudinibus ejusdem.

Lactuca sylvestris costa spinosa, Off. Lactuca sylvestris costa spinosa, C. B. P. 123. J. Raii Hist. 222. & Inst. R. H. 473. Lactuca sylvestris sive Endivia multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso, J. B. 2. 1003. Lactuca sylvestris, Dod. Pempt. 646. Seris domestica, Lobel. Icon. 234. Endivia Officinarum, Quorundam; Scariola & Serriola, Cordi: vulgo, *Laitue sauvage*.

Radicem habet quam sativa Lactuca brevior ac minorem: incondita promit per caulem folia oblonga, minora tamen & angustiora, ac utroque latere profundioribus incisuris sinuosa, spinis duriusculis secundum costam averta & infima parte donata, amaro lacte prægnantia. Caulis cubitalis & major, in principio spinosus, in summo multis abijt in ramulos, quos flores ornant parvi, lutei, sativæ Lactucæ æmuli, quibus succedunt semina papposa, nigricantia, sativæ similia. Ad sæpes & agrorum margines reperitur. Nascitur quoque in vineis & hortis, in quibus olera seruntur. Tota planta in usum venit.

Analysi chymica, ex Lactucæ sylvestris semipedem altæ, demptis radicibus, lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, sapore herbaceo, primo obscure subacidi, deinde manifeste subacidi, ac tandem manifeste acidi austeri lbij. ʒiij. ʒvij. gr. iij. humoris rufi, empyreumatici, tum salis, subcalci, tum austeri ʒij. ʒij. gr. vj. humoris rufi, sale volatili urinoso copioso imprægnati ʒj. ʒvj. salis volatilis urinosi concreti ʒj. gr. xxxvj. olei adiposi ʒj. ʒiij. gr. xxj. Massa nigra in retorta residua pendebat ʒiij. ʒv. gr. lx. quæ rite calcinata reliquit cinerum ʒiij. gr. xvij. ex quibus lixivio salis fixi alcali ʒvj. gr. xlij. lixivio sunt extracta. Partium lactura in distillatione fuit ʒj. ʒvj. gr. xvij. in calcinatione ʒj. ʒv. gr. xlij.

Lactuca sylvestris sativis amara magis est & lacte copiosiore referta. Analysi plus olei fundit & majorem salis urinosi copiam. Salem essentialem obtinere videtur nitroso vitriolico ammoniacalem. Viribus ad sativas accedit, sed potentius aperit & abstergit: alvum movet; somnum conciliat.

Usurpatur in Syrupo de Cichorio composito Pbarm. Reg.

L A M I U M.

L Amii species duæ usitatæ sunt in Officinis, scilicet *Lamium album* & *Lamium rubrum*.

La-

Lamium album, Urtica iners & Urtica mortua, *Off.* Lamium vulgare album sive Archangelica, flore albo, *Parkinſ. Theatr.* 604. *Inſt. R. H.* 183. Lamium albuur, non fœtens, folio oblongo, *C. B. P.* 231. Galeopſis ſive Urtica iners, floribus albis, *J. B.* 3. 322. Urtica iners ſive Lamium primum, *Dod. Pempt.* 153. Lamium album Gerardi, *Raii Hiſt.* 559. Lamium album, *Tab. Icon.* 536. vulgo, *Ortie morte*, *Ortie blanche*, *Ortie qui ne pique point*.

Radicibus plurimis fibroſis nititur: plurimis etiam ſurculis, oblique Menchæ ſere in modum ſub terra reptantibus, & e nodis ſubinde radices agentibus, late ſe propagat. Caules inde exſurgunt pedales aut cubitales, quadrati, grandiuſculi prope terram tamen graciliores & infirmiores, unde etiam vix ſe ſuſtinent. inanes, modice hirsuti, ramoſi, geniculis rarioribus intercepti, prope terram in apicis purpuſcentes. Folia ex adverſo bina, Urticæ ſimillima, quæ in imis ſunt caulibus, longis pediculis nuntur, quæ in ſummis, brevioribus, brevi, & innocua lanugine hirsuta. Flores ad genicula verticillatim caules ambiunt, ſatis ampli, monopetali, labiati, vel exterius pallidi potius quam nivei, quorum labium ſuperius ſeu galea cochlearis inſtar eſt excavata, ad margines præcipue piloſa, quatuor in eis ſtaminula, duo longiora, breviora toridem occulians; inferius vero labium pallidum, non punctatum, biſidum, cordiforme, deſcenduntque ambo in fauces marginatas. Stamina apices marginibus circumeirca nigriſ formam characteris & quodammodo repræſentant. Piſtillum prætenue, biſidum, ſtaminibus adjacens, ex calycis fundo ſurgit poſticæ ſloris parti ad inſtar clavi inſixum. Calyx ſloris amplius, patulus, tubulatur, ſtriatuſ, in quinque oblonga, anguſta ſegmenta dividitur, quæ in tenues & acutas ſed innoxias ſpinulas deſcunt. In imo calyce piſtillum quatuor veluti embryonibus ſtipatum eſt, qui deinde abeunt in totidem ſemina triangularia, ſimul juncta, in capſula quæ ſloris calyx fuit recondita. Odoꝝ huic plantæ aliquantiſper gravis. Ad ſepes, ſecus vias & parietes, in locis ruderalis atque dumetis, non raro in hortis parum cultis reperitur. Folia & ſloꝝ in uſum veniunt.

Analyſi chymica, ex plantæ ſloridæ, demptis radicibus, ℥v. diſtillant prodierunt humoꝝ limpidi, odore & ſapore herbaceo, obſcure ſali ℥x. ℥iiij. gr. xij. humoꝝ limpidi, primo obſcure ſubſali & obſcure ſubacidi, tandem manifeſte ſubacidi ℔j. ℥xij. ℥ij. humoꝝ limpidi, primum ſubacidi, deinde magis ac magis acidi, obſcure ſubaſteri ℔j. ℥vj. gr. xxiiij. humoꝝ ruſi, leviter empyreumatici, tum acidi, tum ſubſali uꝛinoſi ℥v. ℥j. humoꝝ ruſi, ſale volatili uꝛinoſo copioſo imprægnati ℥ii. ℥j. gr. xlij. olei adipoſi ℥ij. ℥j. Maſſa nigra in retorta reſidua pendeat ℥v. ℥j. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥iiij. gr. xlij. ex quibus lixivio ſaliſ fixi mere alcali ℥j. ℥j. gr. xij. extracta ſunt. Partium jaſtura in diſtillatione fuit ℥iiij. ℥iiij. gr. lxxvj. in calcinatione ℥ij. ℥iiij. gr. xxx.

Lamii ſuccus chartam cæruleam vix mutat. Salem eſſentialem tartareum continere videtur multo ſulphure bituminoso & terra implicituꝝ. Ab hoc ſulphure poſitiſſimuꝝ ejus viſ baſſamica dependet.

Lamium album a recentioribus Medicis commendatur adverſus fluoꝝ album mulierum, pulmonum vicia, lienis tumoꝝ & indurationes, ad hæmorragias præſertim uterinas liſtendas & ad vulneta conglutinanda. S.

Paul-

Paulli de illis virtutibus valde dubitat. Attamen quotidiana experientia in fluore albo & hæmorrhagiis uterinis ejus flores & folia utilia apud nos deprehenduntur. Summitates floridæ in aqua fervida Theæ instar macerantur & unus aut alter infusi cyathus bis terve in die hauritur. Vel ex iisdem juscula cum Portulacæ foliis parantur; aut ex floribus cum Saccharo conditum, seu, ut ajunt, conserva coquitur singulis diebus ad 3j. fumenda.

24. Frustulum colli carnis vitulinæ ad ℥ss. Coquatur in aq. q. s. Sub finem coctionis adde summitatum floridarum Lamii albi M. iij. fol. Portulacæ M. ij. pro duobus jusculis mane & sero hauriendis.

Externe oleum Olivarum in quo Lamii flores sub sole macerati fuerunt, balsamum vulnerarium constituit, præstantissimum in tendinum vulneribus, observante Dyonisio Dodart D. M. Parisiensi Reg. Scientiar. Academiæ socio & doctrina ac probitate apud omnes commendatissimo. Plurimum valet ad ulcera detergenda & cicatrizanda, & ad tumores discutiendos, auctore Hieron. Trago. J. Raius hoc ad scrophulas remedium ex manuscripto D. Hulse transcripsit.

24. Folior. Lamii albi M. j. Calefat inter duos lateres calidos & tumori applicetur. Eum noctis unius spatio plurimum aperit. Aperto adhibe mixturam sequentem.

24. Omphacii cochlearia sex, Butyri Maialis instar juglandis: misce & impone lanæ nigræ oleo e pedibus bubulis madefactæ. Intus interim propinetur aqua florum Genistæ mane & hora quarta pomeridiana singulis diebus.

Alia est Lamii species flore purpureo non sætens quæ a priori fere non differt nisi floris colore purpureo, & dicitur Urtica iners flore purpureo, Off. Lamium folio oblongo, flore rubro, *Parkins. Theat.* 606. *Inst.* R. H. 183. Lamium purpureum, non sætens, folio oblongo, C. B. P. 231. Galeopsis sive Urtica iners, flore purpureo, majore, folio non maculato, J. B. 3. 321. vulgo, *Ortie morte a fleurs purpurines*: ad eadem utilis dicitur, sed minus usitata.

Lamium rubrum & Lamium purpureum, Off. Lamium purpureum sætidum, folio subrotundo sive Galeopsis Dioscoridis, C. B. P. 230. & *Inst.* R. H. 183. Galeopsis sive Urtica iners, folio & flore minore, J. B. 3. 323. Urtica iners altera, *Dod. Pempt.* 153. Lamium rubrum Gerardi, *Raii Hist.* 559. Lamium vulgare folio subrotundo, flore rubro, *Parkins.* vulgo, *Ortie morte puante*.

E radice tenui, fibrosa, non repente, plures erigit caules quadratos, concavos, propemodum glabros, satis grandes, prope terram ramulos, deinde uno vel altero foliorum pari cinctos, tum ad summitatem fere nudos semipedales, infirmos. In summis caulibus flores in verticillis densius stipati, monopetali, labiati, parvi, purpurei, labio inferiori latratioribus maculis guttato. Calyces florum breves, patuli, striati, sessiles, quinque partiti, quatuor in imo semina continent oblonga, triangularia, per maturitatem fusca & splendentia: folia Urticarum æmula sed minora & breviora, mollia, circum oras crenata, pediculis semiuncialibus insident. Olor totius plantæ sætidus & ingratus. Ad sepes, macerias, & in locis ruderalis ac hortorum areis minus excultis nascitur. Flores & folia usitata sunt.

Hæc

Hæc planta majorem olei bituminosi copiam continet quam Lamium album, sed minorem quam Galeopsis procerior fœtida; ideo raro usurpatur, illis vero nonnumquam substituitur. Vulneraria est, resolvens & demulcens. Ejus decoctum adversus dysenteriam commendatur. Externe herba tula & imposita valere creditur ad tumores quoscunque discutiendos, necnon ad inflammationes compescendas, ulcera putrida detergenda, & vulnera ad cicatricem perducenda.

L A M P S A N A.

L Ampsana vulgaris, Off. Lamplana, Dod. Pempt. 675. Inst. R. H. 479. J. B. 2. 1028. Raii Histor. 256. Soncho affinis Lamplana domestica, C. B. P. 124. Lamplana, Gerardi Emaculat. Lamplana vulgaris, Parkinson. Chrysolachanum Plinii, Ruell. Papillaris herba, Quorumdam: vulgo, Lamplane ou Herbe aux mammelles.

Radice nititur alba, simplici, surculosa tamen & varie fibrosa. Caulis inde exurgit bicubitalis & altior, teres, striatus, pilis rarioribus hirsutus, rubescens, concavus, ramosus. Folia ad radicem & in ima parte caulis uno vel altero pinnularum pari donata, extremitate latiore, magnitudine & figura fere foliorum Sonchi lævis muralis, aut Barbareæ distæ, mollis, hirsuta, alternatim posita: quæ in caulibus & ramis superiora, oblonga, angusta, acuta, nullis pediculis fulciuntur, nullis pinnulis lobisve donata. Supremæ caulis & ramorum partes glabræ, in flores terminantur exigui, luteos, semisfoculosos, plurimis scilicet semisfoculis constantes, singulis singulis embryoni insidentibus, & calyce comprehensis monophyllo & multihdo, qui deinde abit in capsulam striatam, seminibus scætam tenuibus, oblongis, nigricantibus, nonnihil incurvis, acutis, minime papposis; licet J. Bauhinus flores in pappos abire scribat. Tota planta vulnerata lac fundit amarum. In hortis & cultis, juxta agrorum margines, secus vias, frequentissima est. Tota planta in usum venit, sed minus frequentem.

Analyti chymica, planta florida ad ℥v. distillata præbuit plurimum humoris primo herbacei, obscure subacidi, deinde obscure acidi austeri, ac tandem manifeste acidi & alcali urinosi: salis urinosi concreti grana aliquot: olei adiposi circiter ℥j. ℥j. Massa nigra in retorta residua ad ℥vj. ℥v. per quindecim horas in crucibulo calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥v. gr. xxxvj. ex quibus lixivio talis fixi alcali ℥vj. gr. xxxvj. extracta sunt. Partium jactura in calcinatione fuit ℥ij. ℥vj. gr. xxxvj.

Salem essentialem hæc planta continet tartareum multo oleo spisso bituminoso permixtum & non mediocri terræ & phlegmatis portione impletum.

Refrigerat & emollit. Usurpatur nonnumquam in decoctis emollientibus pro clysteribus. Raro interne per os adhibetur.

Externe planta contusa admota ulcera & vulnera potenter abstergit, vel ejus succus expressus & unguentis admixtus. Idem succus imperigines sanat. Efficax esse censetur in sanandis papillis exulceratis: unde nomen Papillaris sortita esse videtur.

LAPA-

L A P A T H U M.

Plantæ plures in Officinis Lapathi nomine insigniuntur; scilicet I. *Lapathum hortenſe*, folio oblongo, ſive *Lapathum ſativum*. II. *Lapathum majus* quod *Hypolapathum* vel *Rhabarbarum Monachorum*, Off. III. *Lapathum ſinuatum*. IV. *Lapathum ſanguineum*. V. *Lapathum ſylveſtre*, quod *Oxylapathum*. Off. VI. *Lapathum rotundiſolium*. VII. *Lapathum aquaticum*, *Hydrolapathum*, Off. VIII. *Lapathum Spinacia dictum*. IX. *Lapathum acetofum*, *Oxalis*, & *Acetoſa dictum*. X. *Lapathum unctuoſum* ſeu *Bonus-Henricus*. De his duobus jam egimus.

I. *Lapathum hortenſe* folio oblongo, *Lapathum ſativum*, *Lapathum*, *Rumex*, *Parella*, *Patientia*, Off. & *Culinar*: *Lapathum hortenſe*, folio oblongo ſive ſecundum *Dioſcoridis*, C. B. P. 114. Inſt. R. H. 504. *Lapathum ſativum*, *Lapas*, J. B. 2. 985. *Lapathum ſativum*, *Dodon. Pempt. 648*. *Hypolapathum ſylveſtre*, *Matthiol. Rumex hortenſis* vel ſecundus, *Tragi 314*. vulgo, *Patientia*, *Parella*.

Radice eſt recta, prolixa, fibroſa, intus lutea: caule terete articulado, bicubitali, & altiore, nonnumquam hominis altitudinem æquante: foliis oblongis Lapathi ſylveſtris ſimilibus, ſed majoribus, & mollioribus, acumine magis obtuſo, minoribus tamen quam *Hypolapathi* folia. Flores ſecundum ramulos verticillata ſerie digeſti, exigui, apetalii, ſex ſtaminibus viridibus, brevibus, cum apicibus rectis albis, conſtant ex calyce heptaphyllo ſurgentibus, ut in *Acetoſa*. Piſillum abit in ſemen triangulare, capſula membranacea obvolutum. Hæc autem cõſtititur ex tribus calycis foliis alternis, cõteris tribus marceſcentibus. In hortis colitur: raro in uſum venit.

II. *Lapathum majus*, *Hypolapathum*, *Rhabarbarum Monachorum*, Off. *Lapathum hortenſe latifolium* C. B. P. 115. & *Inſt. R. H. 504*. *Lapathum majus*, ſive *Rhabarbarum Monachorum*, J. B. 2. 985. *Hypolapathum* ſive *Rhabarbarum Monachorum*, *Dod. Pempt. 648*. *Hypolapathum ſativum* *Gerardi*, *Raii Hiſtor. 171*. *Lapathum ſativum* ſive *Patientia*, *Parkinſ. vulgo, Rhabarba des Moines*.

E radice prolixa, craſſa, multis adnatis fibris donata, foris ſuſca, intus intenſe crocea; caulis aſſurgit interdum ad hominis proceritatem, ſtriatus, rubens, ſuperiora verſus in numerosos ſurculos diviſus; cui adhærent folia pedalia, & ſeſquipedalia, lata, acuminata, firma, non tamen dura, & rigida, lævia, & obſcurius viridia, oris aliquando ſuſum nonnihil reflexis, æqualibus tamen, & minime crenatis, pediculis rubentibus longis nixa. Flores per totos fere caulis ramulos longa ſerie diſponuntur apetalii, ſtaminei, *Acetoſæ* floribus ſimiles, quibus ſuccedunt ſemina anguloſa, folliculis membranaceis circumdata, ſeminibus Lapathi aut *Acetoſæ* ſimilia. In horris colitur.

Iſdem fere donatur principiis ac *Lapathum rotundiſolium*, iſdemque viribus inſignitur. Ambo leviter purgant bilem, potenter aſtringunt, hepatis obſtructiones reſerant, tum humores craſſos ſolvendo, tum ſtrarum tonum

Geoffroy Tom. II.

Z

quam

quam par est laxiorem restituendo. Unde in quibusdam alvi profluviiis & viscerum obstructionibus nonnumquam coram pulvis vel decoctum eadem dosi utiliter usurpantur.

III. *Lapathum sinuatum*. *Off.* *Lapathum pulchrum*, Bononienſe, ſinuatum, *J. B.* 2. 988. *Inſt. R. H.* 104. *Lapathum Pariſienſe*, ſinuatum, *Horti Reg. Pariſienſ.* vulgo, *Lapaton violon*.

Ex craſſa radice multa folia, duarum pleraque unciarum, pediculis ejuſdem pone longitudinis, proſeri, unciam plus minus lata, in medio profundo utrimque ſinu ex adverſo reſpondente, extremitate diſtremenda, adeo ut muſicum illud inſtrumentum noſtratibus un *violon* dictam figura ſua imitentur. E medio foliorum caulis pedalis, nonnumquam ſeſquipedalis exit in plurimos ramos incurvos brachiatus. Ad ſingula genicula ſores herbaceos ſtamineos cæterorum *Lapathorum* more proſert: quibus ſingulis ſuccedunt anguloſæ capſulæ ternis foliolis dentatis coagmentatæ, continentes ſemina triangularia, ſubruſa. In agro Pariſienſi ſponte naſcitur. A Gallo-provinciæ ruſſicis inter plantas olitorias eſculentas colitur, & Hyberno tempore comeditur.

IV. *Lapathum ſanguineum*; *Lapathum rubrum*; *Lapathum nigrum*; *Off.* *Lapathum folio acuto*, rubente, *C. B. P.* 114. *Inſt. R. H.* 104. *Raii Hiſtor.* 175. *Lapathum ſanguineum*, ſive *Sanguis Draconis* herba, *J. B.* 2. 988. *Lapathum rubens*, *Dod. Pempt.* 650. vulgo, *Sang de Dragon*, ou *Patiente rouge*.

Lapathi ſativi non abſimilis facile a reliquis *Lapathi* ſpeciebus diſtinguitur ſanguineo quo ſcatet ſucco, nervis per folia crebris diſcurrentibus varioque implexu ruborem ſanguineum virentibus foliis conciliantibus: quorum ſuccus, & manus, & aliam primum purpureo, mox in cæruleum degenerante colore tingit; quo ſimul, & pediculi foliorum rurgent. In hortis pro olere colitur. Folia & ſemen uſitata ſunt.

Lapathum rubrum ſalem eſſentialem *Oxylapathum* magis niroſum obtinet. Ejus folia inter olera coſta comeduntur a nonnullis. Alvim cient, & ideo in ſuſculis emollientibus, & refrigerantibus nonnumquam præteribuntur. Semen quod in Officinis perperam ſemen *Sanguinis Draconis* dicitur, roborat, adſtringit, & dolores demulcet. Ad ʒſ. aut ʒi pulverizatum, & liquore idoneo dilutum propinatur ad fluxus uterinos nimios ſiſtendos, alvi profluvia torminoſa aut cruenta ſiſtenda. *Joh. Georg. Volckamer, in Eph. Germ. Dec. II. ann. 1. p. 421.* vinum in quo idem ſemen ad ʒi. aut ʒſ. calide maceratus fuit, percolatum, in torminoſis alvi fluxibus propinaviſſe ſeliciter cum ſuccellu aſſerit.

Analyſi chymica, *Lapathi hortienſis* folia plurimum liquoris manifeſte acidi, mediocrem ſalis volatilis urinoſi portionem, parum olei, & terræ præbuerunt.

Eorum ſuccus chartæ cæruleæ colorem in rubrum mutat. *Salem eſſentialem* rariareo-ammoniacalem obtinet.

Ab antiquis inter olera *Lapathum* menſis frigalioribus offerebatur. Ut videre eſt apud *Horatium Flaccum* in vitæ ruſticæ laudibus. *Epoſ. II.*

Non Attagen Ionicus

Jucundior, quam læta de pinguiſſimis

Olivæ

Olive ramis arborum:

Aut herba Lapatii prout amant, & gravi

Malva salubres corpori:

Galenus sylvestre Betam posse hoc ulus vocari censet, quod gustu viribusque horrenti Betæ similis sit: nonnihil tamen interesse putat, quod videlicet hæc soavior sit, ideo quoque mentas frequentius subit. A præcis Medicis Lapatii cucumque decocto vis alvum emolliendi tribuebatur, quod nec eundem fugit Poetam *Satyrar. Lib. II. Sat. 4.*

... Si dura morabitur alvus,

Mytilus, & viles pellent obstantia Concha

Et Lapatii brevis herba, &c.

Brevem autem appellat Lapatii herbam, priusquam caulis enatus fuerit decerpam, quo tempore esui potissimum idonea est.

Lapathorum hortensium folia hodie mentis nostris rarissime apponuntur, usurpantur tantum ad juscula, & apozemata emollientia, & refrigerantia conficienda. S. Paulli in *Quadr. Botanico*, suadet ut ferculum aut pulmentum ex hortensium Lapathorum foliis pareretur, iis apponendum, qui dolore arthritico torti, facile alvi adstrictionem insuper incurrunt. Quod confirmat experientia Clarissimi viri Caspary Bartholini, qui ob intempestiva studia huic malo obnoxius, paroxysmi tempore hujus beneficio laxam sibi alvum servare solebat. Succum producit aquosum, mediteriter crassum, & parum nutrimenti conferentem. Sylvestrium vero Lapathorum folia nonnumquam, sed radices potissimum ad usum medicum expetuntur.

V. Lapathum sylvestre, Lapathum acutum, Oxylapathum, Off. vulgo, *Patientie sauvage*. Tres Lapatii sylvestris species sub his nominibus in Officinis indiscriminatim usurpari solent, & ob foliorum variantem formam sæpe confunduntur non solum a Pharmacopæis sed etiam ab auctoribus Botanici. Joannis Raii distinctionem secuti sumus quæ accuratior nobis videtur.

1. Lapathum folio minus acuto, C. B. P. 115. Lob. Icon. 285. Inff. R. H. 504. Lapathum vulgare, folio obtuso, J. B. 2. 984. Raii Hist. 175. Lapathum sylvestre, vulgatus, Parkinsf. Lapathum sylvestre folio minus acuto, Gerard.

Radix huic simplex, interdum surculosa, crassa, alte in terram descendens, exterius fusca, interius lutea. Folia quæ a radice exeunt, longis insident pediculis, quæ in caulibus sunt brevioribus, palmum, & sesquipalmum lata, longitudine ad latitudinem dupla, alias rotundiora, & obtusa, alias longiora & acuta, marginibus extimis sinuatis ut crenata videantur, utrimque glabra, media tamen costa, & nervi insigniores hirsuti averfa parte, pallidius virentia. Caules plures, cubitales, & sesquicubitales, teretes, striati, brevi lanugine hirsuti, medulla sæcti, ramosi, foliis ad nodos longis intervallis distantes alternatim positis cincti. In summitatibus caulis, & ramorum flores in spicas longas, laxas tamen, & e pluribus florum verticillatim dispositorum agminibus constantes digesti. Flores exigui, apertali, singuli brevibus, & tenuibus pediculis penduli, apertali, staminibus pluribus constantes cum apicibus luteis, & calyce hexaphyllo, cujus tria interiora segmenta seu foliola in magnum aucta

& ad margines dentata vasculum seminale conficiunt, quo semen unicum, triquetrum, splendens, colore castaneo, pallidius quam Oxylapathi crispī continetur. In agro Parisiensi circa vicum Montmorenciacum sponte nascitur.

2. *Lapathum folio acuto, crispo*, C. B. P. 115. *Infl. R. H.* 504. *J. Raii Hist.* 175. *Lapathum acutum*, crispum, J. B. 2. 988. *Tabern. Icon.* 436. *Lapathum acutum*, minus, *Parkinsf.* *Lapathi acuti* varietas folio crispo, *Gerard. Emacul. vulgo*, *Patiente sauvage frisee*.

Radice cum præcedente convenit, nisi quod minor huic sit, ut sunt & reliquæ ejus partes, foliis differt angustioribus, longioribus, obscurius videntibus, per margines crispis, & sinuatis, præsertim prope pediculos. Flores minores, longioribus tamen pediculis penduli, verticillis crebrioribus; ut semina caulem plerumque penitus contegant, & occultent. Tria illa calycis foliola quæ conniventia semen amplectuntur, & includunt, per margines æqualia sunt, non ut præcedentis denticulata. Semen quam illius magis rubicundum, seu, castaneo colore intensiore præditum, magnitudine æquale. Frequens in agro Parisiensi occurrit sponte nascens, & sæpius ad usum medicum usurpatur.

3. *Lapathum folio acuto*, plano, C. B. P. 115. *Infl. R. H.* 504. *Lapathum acutum*, sive *Oxylapathum*, J. B. 2. 983. *Lapathum sylvestre*, sive *Oxylapathum*, *Dod. Pempt.* 648. *Lapathum acutum* *Gerard. J. Raii Hist.* 175. *Lapathum acutum*, majus, *Parkinsf. vulgo*, *Paselle ou Patientte sauvage ordinaire*.

Folia huic quam præcedenti breviora, inferiora a lato principio in acutum mucronem sensim angustantur, minora quam *Lapathi* folio minus acuto. Caules in parem altitudinem attolluntur; sunt tamen graciliores, rigidi, & interdum tortuosi. Rami a caule magis exstant, seu obfusiores cum eo angulos efficiunt, florum verticilli rariores seu longius distantes, apposito interdum ad singulos foliolo ligulæ instar. Flores minores quam præcedentibus. Semina plus duplo minora. Extimo foliolorum quæ semini pro vasculo inserviunt tuberculum seu verruca rubens grandis innascitur, cui & similis in præcedente *Lapatho* cernitur, sed multo minor. In hortis colitur, & in usum medicum venit, sed huic *Lapathum* crispum apud nos sæpius substituitur.

VI. *Lapathum rotundifolium*, *Lapathum montanum*, *Pseudorha*, & *Pseudorhabbarbarum*, *Off.* *Lapathum folio rotundo*, alpinum, J. B. 2. 987. *Infl. R. H.* 504. *J. Raii Hist.* 171. *Lapathum hortenſe*, rotundifolium sive *montanum*, C. B. P. 115. *Hyppolapathum rotundifolium*, & *Pseudorhæ recentiorum*, *Lobel. Icon.* 287. *Hyppolapathum rotundifolium vulgare*, *Parkinsf. vulgo*, *fausse Rbubarbe*, *Rbubarbe batarde*.

Radice furculosa, & longa nititur, cujus singuli surculi plusquam pollicarem crassitudinem facile assequuntur, rugosi, & fibrosi, intense flavescetes, sapore amaro. Caulis bicubitalis, & tricubitalis, cavus, profundis sulcis exaratus, rubescens, alis multis donatur. Folia *Bardanzæ* similia, notabilis latitudinis, rotunda, glabra, pallida, & quasi ex luteo virentia, pediculo rubenti, & striato appenduntur. Flores copiosi alas fere totas obſident ex staminibus, & apicibus multis luteis compositi, & calyce hexa-

hexaphyllo herbido; quibus succedunt semina triangularia nonnihil rubentia. Nascitur in Arvernizæ montibus, unde ejus radix afferri solet. In hortis quoque colitur. Radix in usum venit.

Lapathi rotundifolii radix ad Rhabarbari veri colorem accedit ex flavo & rubro. variegatum: saporis est amaricantis, styptici & glutinosi; chartæ cœruleæ colorem subrubrum inducit.

Analysi chymica, ex hujus Lapathi radicem recentium lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, sapore leviter herbaceo, primum obscure subsalsi, deinde obscure subacidi lbj. ℥ix. ℥ij. gr. liiij. humoris acidi, magis ac magis, & tandem obscure subausteri lbij. ℥v. ℥v. gr. xliij. humoris rufi, manifeste acidi & sale volatili urinoso imprægnati ℥iiij. ℥j. gr. xxiiij. olei adiposi, spissi, gravis ℥i. ℥iiij. gr. xv. Massa nigra residua pendebat ℥viiij. ℥ij. gr. xxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥i. ℥v. gr. xxiiij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥iiij. gr. vj. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥iiij. gr. xlvij. in calcinatione ℥vj. ℥v. gr. xij.

Hæc Lapathi montani radix salelem essentialem obtinet tartaro similem cum aliqua salis ammoniaci portione conjunctum, sulphure crasso copioso & terra non pauca.

Eandem ac Rhabarbaro virtutes tribuuntur, sed longe debiliores. Purigare ajunt, si ad duplum Rhabarbari exhibeatur. Præscribitur ejus pulvis ad ℥ij. in infuso vero usurpatur ad ℥vj.

Hic Parisiis Lapathum crispum, utpote in agro Parisiensi frequentius occurrens, magis usitatum est. Hujus radix amara est, adstringens & chartam cœruleam rubentem efficit. Ejus folia subacida sunt & chartæ cœruleæ colorem intense rubrum inferunt. Unde conjicere licet foliis majorem acidi salis quantitatem inesse, radices vero plus salis acris & terræ obtinere. Sal essentialis hujus plantæ tartareus est ammoniacalis ad nitri naturam aliquantisper accedens: & in aliis sylvestribus Lapathis haud ab similibus videtur.

Eorum radices alvum hortenfibz magis laxant: viscerum obstructions aperiunt, nec fibrarum tonum deiciunt: in illis enim, sicut in Rhabarbaro vis subadstringens seu fibrarum tonum nimis laxum roborandi, sed longe debilius deprehenditur. Unde ad hepatis & lienis obstructions tollendas, functiones restituendas Oxylapathi radicis decoctum solius vel cum aliis aperientibus consociatæ utiliter præscribitur. Idem decoctum prodest in alvi adstrictione nimia; vel juscula ex eadem radice & Polypodio conjunctis parantur ad alvum emolliendam utilissima.

℞. Radicum Oxylapathi taleolatum conciat. ℥j. Liquiritiæ ras. & contr. ℥j. Coq. in aq. comm. lbj. ad lbj. Hauriat æger quotidie mane jeuno ventriculo. Vel

℞. Carnis vitulinæ. lbj. radice. Lapath. sylvestr. & Polypod. querni ana ℥j. Coquantur in aq. lbij. ad medias pro jusculis duobus mane & sero propinandis in alvi siccitate nimia, & viscerum infarctu.

℞. Radicum Oxylapathi, & Althææ ana ℥j. foliorum Lapathi hortensis, Oxylapathi, Malvæ, Betæ, Lactucæ, Oxalidis, Atriplicis ana M. j. Coquantur cum frustulo carnis vitulinæ in aq. f. q. pro quatuor jusculis emollientibus & refrigerantibus.

Geoffroy Tom. II.

Z 3

℞. Ra-

24. Radicum Oxylapathi, Polypod. Eryng. ana ℥j. carnis vitulinæ ℔ss. Coquantur in aq. ℔iij. ad ℔ij. Sub finem coctionis adde folior. Cichor. sylvestr. Taraxaci, Scolopendr. Agrimon. ana M. j. pro jussulis duobus, quibus singulis dissolve vel salis Tamarisci ℥j. vel Tarax. Martial. solub. ℥ss. Mane & sero propinentur in viscerum obstructionibus.

Adversus cutaneos affectus quoscumque Oxylapathi radices tum interne, tum externe adhibitæ ab omnibus plurimum commendantur. In decoctis & jussulis præscribuntur solæ vel cum Helenii radicibus consociatæ.

24. Radic. Lapathi sylvestr. mundatæ & taleolatum concis. ℥ij. Radic. Helenii concisæ ℥j. Liquiritiæ ras. & contus. ℥ij. Coquantur in aq. comm. ℔iij. in vase terreo, in quo ℥i. Aquilæ albæ subtilissime tritæ & nodulo inclusæ filo suspensa fuerit. Decoctum ad ℔ij. redactum propinetur pro potu in scabie & aliis cutaneis affectibus.

24. Carnis vitulin. ℔ss. cancris fluviatiles leviter contusos N. xij. radicum Oxylap. ℥ij. Enul. campan. ℥j. Bardan. ℥ij. Coq. in aq. comm. q. s. pro duobus jussulis. Sub finem coctionis adde folior. Oxylapathi, Scabiosæ, Fumar. Chærefol. ana M. j. Sumat æger mane & sero in affectionibus cutaneis.

Externe radices Oxylapathi recens e terra eradicatæ, vel etiam in umbra exsiccatæ, in foribus, linimentis & unguentis adversus scabiem, porriginem, impetiginem aut alios cutaneos affectus usus sunt creberrimi, præmissis tamen præmittendis. Ex radicibus recentibus vel solis vel cum radicibus Enulæ campanæ consociatis paratur decoctum quo pars affecta sæpius abluitur. S. Pauli plurimum laudat decoctum radicum Oxylapathi, quo quædam stercoreis galli gallinacei portio diluitur, & velut remedium adversus scabiem nulli secundam prædicat.

Radices recentes in aqua decoctæ & conrosæ sub forma cataplasmatidis paribus scabie affectis utiliter applicatur. Solæ, vel cum radicibus Helenii, sulphuris floribus, Mercurio præcipitato albo aut aliis hujuscemodi conjunctæ cataplasmata & unguenta adversus cutaneos affectus usitata succedunt. Pulvis earundem radicum cum aceto dilutus ad serpiginem tollendam plurimum valere dicitur.

24. Radicum Lapathi sylvestris ℥iij. Coquantur in aq. communi ℔v. ad ℔ij. Colatura dissolve stercoreis galli gallinacei ℥j. pro foru adversus scabiem.

24. Radicum Oxylapath. & Enul. campan. ana ℥ij. Coq. in aq. comm. ℔vj. ad mediet. Colaturæ adde Mercurii præcipitati albi ℥j. quæ partes scabiæ affectæ sæpius abluantur.

24. Radicum Oxylapathi & Helenii minutim concisar. ana q. l. Coquantur in aq. comm. q. s. ad putrilaginem, ut ajunt. Per fetaceum radices coctæ trajiciantur. Tum

24. Hujus pulpæ ℥iij. butyri recentis ℥ij. Florum sulphuris ℥ss. M. F. unguentum quo partes affectæ inungantur.

24. Radic. Oxylapath. Althææ ana ℥ss. rad. Helenii ℥ij. folior. Aristoloch. Scabios. Nummular. Plantag. ana M. ss. Coq. ad putrilag. in suff. q. aq. comm. Trajiciantur per fetaceum rarius; addantur deinde stor.

flor. sulph. ℥ij. Balsam. Peruvian. parum. F. l. a. linimentum ad scabiem a S. Paulli commendatum.

2. Succor. Oxylapathi, Rhabarbar. Monachor. & Chelidon. major. ana ℥ij. pinguedinis lactis ℥iij. Mixta coque ad succi fere consumptionem. Adde Diapompholygos ℥j. Cerasæ ℥j. Alumin. ℥j. Thuris ℥℥. flor. sulph. ℥j. Mixta deinde diu multumque agitentur in mortario plumbeo. Quod si inter agitandum siccus fiat, addatur semper pinguedo lactis, ut fiat linimentum mollius ab eodem S. Paulli in scabie commendatum.

Obiter hic notandum est & observandum hæc remedia externa nunquam esse adhibenda, nisi prius æger rite præparatus fuerit tum venæ sectionibus, tum catharsi plus minusve reiteratis, tum balneo, tum etiam medicamentis supra præscriptis, aut aliis idoneis debere & per sat longum tempus administratis, quibus humores acres & vitiosi in sanguine exuperantes emendantur, evacuentur, & debita massæ sanguineæ crasis restituitur. Tutum enim non foret, imo sæpe maxime noxium, dum sanguis pravis satens succis eos e suo sinu ad cutim propellere & per ejus poros expellere consuevit, hanc viam derepente intercludere medicamentis topicis. Tunc enim pravi illi succi ad alias partes internas collati novas ibi parerent congestiones, & mala sæpe prioribus pejora procrearent. Quot autem & quanta mala quotidie videmus ex retropulsa scabie aut ex aliis cutis vitiiis citius & incaute per topica remedia extinctis?

Oxylapathi radices cerevisiæ infusæ a Villifio adversus scorbutum commendantur: a nonnullis adversus iterum præscribuntur.

Semen hepar roborat & fluxus alvi quoscunque sistit: tunc vero semen Lapathi sanguinei ut præstantius eligitur.

Oxylapathum usurpatur in unguento Nicolai Alexandrini.

VII. Lapathum aquaticum, Lapathum palustre, Hydrolapathum, Off. Lapathum aquaticum, folio cubitali, C. B. P. 116. *Inst. R. H.* 504. Lapathum aquaticum maximum, sive Hydrolapathum, J. B. 2. 986. J. Raii *Hist.* 171. Lapathum palustre, *Tabern. Icon.* 437. Lapathum longifolium nigrum palustre, sive Britannica antiquorum vera, vel Hydrolapathum nigrum Muntingii, J. Raii *Hist.* 172. Britannica antiquorum vera Muntingii *Phytographia* 202. vulgo, *Patience aquatique ou Parelle de marais*.

Magis huic in fibras ducta est radix quam vel Oxylapatho vel Hypopolapatho, foris nigra, intus buxæ, cum notabili adstringente amaricans. Caulēs assurgunt ad duos tresve cubitos, flores & semina Lapathi acuti sed majora. Folia lata, prælonga, Rhabarbari Monachorum non dissimilia, sed multo longiora, duriora, rigidiora & surrectiora, longitudine fere seiquicubitali, in mucronem acutum desinentia, lesiter crispatis oris subacida & strenue adstringentia. Flores & semina Lapathis similia sunt. In aquis, palustribus locis & fossis humidioribus sponte nascitur. Radices & folia in utrumque veniunt.

Analyti chymica, folia Lapathi aquatici ad ℔v. per B. V. distillata præbuerunt humoris limpidi, sapore herbaceo, obscurè subalsi & obscurè subacidi ℔ij. ℥viii. humoris limpidi, manifeste acidi, ℔j. ℥viij. ℥v. per

retortam humoris rufi, empyreumatici, manifeſte acidi auſteri ℥j. ℥vij. gr. xxxvj. humoris rufi ſale volarili urinoſo imprægnati ℥ij. gr. xxxvj. olei ſpiffi fere adipofi ℥j. ℥iiij. gr. lxxvj. Maſſa nigra reſidua pendebat ℥vj. ℥vj. quæ per 13. horas in crucibulo calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥vj. gr. lx. ex quibus ſalis fixi alcali ℥vij. lixivio ſunt extractæ.

Ex radicum ejuſdem Lapathi recentium ℔v. per B. V. diſtillatis prodierunt humoris limpidi, odore & ſapore aliquantiſper ingrato, primum obſcure ſubſali, obſcure ſubacidi, deinde manifeſte ſubacidi, ℔iiij. ℥x. gr. xxxvj. per retortam humoris rufi, intenſe acidi & auſteri ℥vj. ℥iiij. humoris rufi tum ſubacidi, tum leviter alcali urinoſi, ac tandem intenſe auſteri ℥j. ℥iiij. gr. xxxvj. Maſſa nigra reſidua pendebat ℥ix. ℥vj. gr. xxxvj. quæ per 24. horas calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥iiij. gr. lx. ex quibus ſalis alcali fixi, ℥iiij. gr. xx. lixivio ſunt extractæ.

Hujus plantæ folia ſtyptica ſunt, amaricantia, & eorum ſuccus cœruleum chartæ colorem intenſe rubrum efficit. Eundem radicis ſuccus minus rubentem reddit. Radicis ſapor ſtypticus eſt & valde amarus. Lapathum aquaticum ſalem eſſentialem obtinet vitriolico-ammoniacalem cum multo oleo craſſo & bituminoſo conjunctum.

Abrahamus Muntingius Groninga-frifius, Medicinæ & Botanices Profeſſor, tractatu *De vera antiquorum herba Britannica, ejuſdemque efficacie contra ſtomacacem & ſcelotyrben, Amſtelodami* 1681. 4. hanc plantam veram & genuinam antiquorum Britannicam herbam eſſe contendit: ſiquidem deſcriptionibus ejus quæ apud veteres exſtant, tum facie, tum viribus per omnia reſpondeat. Reipla Doſcorides reſert eam folia habere ſylveſtris Lapathi, ſed nigriora, pilioſiora, gultu adſtringentia, ejuſque ſuccum ſpeciatim eſſe depaſcentibus oris & conſillarum ulceribus accommodatum.

Radix ſicut cœterorum Lapathorum, alvum leviter emollit & laxat; viſcerum obſtructiones tollit, cutaneis affectionibus quibuſcumque medetur, in rheumaticis doloribus, arthriticis & iſchiadicis, chronicisque ægri-tudinibus & contumaciſſimis utiliter adhibetur. In ſcuſculis & apozematibus aperientibus recens uſurpatur ad ℥j. aut ℥ij. vel infuſum ℥j. aut ℥ij. exſiccatae radicis præſcribitur. Adverſus ſcorbutum, auctore Muntingio, plurimum valet. „ At quoniam, inquit, ſcorbutus altis adeo in qui- „ buſdam egit radices, ut ex ſolius Britannicæ decocto parum commodi „ ſentiant, hanc ob cauſam conſectum medicamentum auro pretioſius, „ ac domi adverſus omnem ſcorbuti ſuſpicionem, inæſtimabilis inſtar the- „ ſauri habendum æponere volui.

℥. „ Croci ℥ij. Macis, Glycyrrhizæ, Cinnamomi, Piperis nigri, Ra- „ dic. Gentianæ, ana ℥iiij. Rad. Britannic. ℥vj. Omnia groſſo modo „ pulverizata immiſceantur vini Hiſpanici ℔xvj. aceti ſamburini vel „ alterius forſiſſimi ℔iiij. ovorum recentium vitellis tribus. Maceren- „ tur ſimul in vaſe lapideo vitreato probe obturato, per triduum in „ cinere, calido aut ſimo equino, aut arena calida, eo tamen modo „ ut ultra calorem tepidum non progrediatur. Reponatur deinde & „ ad uſum ſeryetur.

„ Hu-

Hujus infusi tres, quatuor, quinque, vel sex etiam uncias sumat æger mane, jejuno stomacho, per dies quatuordecim, viginti vel plures. Bibat etiam quotidie ad sitim extinguendam vinum Rhenanum optimum, vel cerevisiam non recentem, sed desecratam, & bene coctam, singulis cyathis cochlearia tria hujus vini medicati affundendo. Notandum tamen, quod si in hujusmodi ægro siccitas quædam, tussis vehemens, vel suspicio tabis adsit, piperis loco sumatur Glycyrrhiza ad ℥vj. Hoc vino non solum brevi temporis spatio inveteratus scorbutus, præsertim si absque febre vel inflammatione sit, verum etiam reliqua scorbuti genera omnia, inveteratæ herniæ, paralysis, & venerea lues felicissimo successu curantur. Hæc omnia Muntingius. Adversus Arthritidem hic Parisiis sequens infusum non prorsus dissimile a nonnullis commendatur.

℥i. Rad. Lapath. aquatic. exsicc. ℥vj. Gentians ℥iij. Liquiritiæ, Cinnamon, Macis ana ℥iij. Croci minutim concisi ℥ij. Macerentur in vini albi generosi ℔xij. supra cineres calidos per triduum in vase rite obturato. Tum adde spir. vini rectificati ℥viij. Reponantur in loco frigido per 24. horas. Fiat colatura. Exhibeatur quotidie mane ad ℥ij. vel ℥iij.

Omnes Hydrolapathi partes, sed præcipue radices externe ad moræ leviter abstergunt, valide adstringunt & conglutinant. Hinc omnia putrescentia, ut erysipelata tam ulcerata quam integra, herpes, phagedæna, gangrænæ, inhibent & sanant. Undecumque manantem sanguinem, hæmorrhoides simul & menses sistunt. Decoctum vel succus foliorum, aut radicum anginam, uvulæ relaxationem, oris & faucium mala adstrictione egentia, apostemata, & ulcera probe depellunt, folia virentia contrita ulceratis parvis per duodecim horas imponuntur, & alia renovantur. Succus quoque caniculari sole, aut igne inspissatus inungitur.

VIII. Lapathum Spinacia dictum, Spinacia, Spinachia, Spinaceum olus & olus Hispanicum, Off. Hispanac. *Arabum*: vulgo, *Epinars*. Hujus oleis tres species a nonnullis distinguuntur, scilicet Spinacia mas semine spinoso, Spinacia mas semine non spinoso, & Spinacia scemina seu sterilis. Alii vero has stirpes non distinctas species, sed ejusdem speciei varietates tantum esse contendunt. Revera ex ejusdem plantæ seminibus fructiferas & steriles nasci satis compertum est. Verum apud Botanicos non certo constat an Spinacia semine spinoso, necnon Spinacia semine lævi satæ semper producant sui generis sobolem, hæc nimirum semine lævi, illa semine spinoso tractam, an interdum diversam? quod illis ulterius examinandum. J. Rayas proponit. Quidquid sit, ad usum medicum & culinarium indiscriminatum sumuntur: viribus enim inter se conveniunt.

Spinacia vulgaris, capsula seminis aculeata, *Inff. R. H.* 533. Spinachia mas *J. B.* 2. 963. Lapathum horrense seu Spinacia semine spinoso, *C. B. P.* 114. Sinacia, *Loebel. Icon.* 257. Olus Hispanicum Spinachia vulgaris, *Trag.* 319.

Spinacia vulgaris sterilis *Inff. R. H.* 533. Spinachia scemina *Lugd. J. B.* 2. 963. Lapathum horrense seu Spinacia sterilis, *C. B. P.* 115. Spinachia Gerard. & Parkins. *Raii Hist.* 162.

E radice tenuj, alba, simplici, paucissimis fibris donata: caules ferrigit pedales, fistulosos, teretes, striatos, in alas divisos: folia Atriplicis fere, longis pediculis nixa, inferiora ad basim suam interdum utrinque laciniata mucronibus acutis: quæ autem in summo caule existunt, duos tantum processus velut aurículas ad basim obtinent, tenuj quodam polline Atriplicis in modum aspersa. Flores, & fructus in speciebus distinctis nascuntur. In florigeris speciebus flores in caulibus a medio ulque ad fastigium digesti, apetalj, plurimis staminibus, & apiculis herbaceis aut purpurantibus calyci tetraphylo insidentibus constant, in oblongis furculis seu racemis e foliorum alis hortis: steriles sunt. In fructiferis speciebus nulli flores cernuntur: sed tantum fructuum embryones subvirides filamenis quatuor albicanibus onusti foliorum alis arte adnascuntur, conferti, in globulos seu racemulos congesti, qui abeunt in fructum seu capsulam majusculam, nonnihil compressam, orbiculatam, in aliis spinosam, in aliis levem, semine turbinato feciam. Spinacia ubi sponte oriatur, non constat. Colitur ab hortulanis, & rusticis tam in hortis, quam in arvis, & quovis fere tempore anni feritur, nullum solum aut cœlum respuens. Verno tempore lata brevi progerminat, & semina intra duos menses perficit. Autumno lata non tam cito crescit, folijs magis luxuriat, sed hyemem perdurans mox primo vere semen profert.

Spinacia vulgaris, capsula seminis non aculeata, *Inst. R. H. 533*. Spinachia semine non pungente, folio majore rotundiore, *J. B. 2. 964*. Lappathum hortenſe seu Spinacia semine non spinoso, *C. B. P. 115*. Spinachia nobilis, *Trag. 324*.

Longe major majoribusque est folijs quam Spinacia vulgaris, necnon rotundioribus; semina conglomerata sunt veluti in racemulum, lenticulis fere paria, rotunda, nullis spinis horrida, cinericei coloris. In hortis olivæ colitur.

Analysi chymica, ex recentium Spinaciæ vulgaris folior. lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, odore & sapore herbam virentem referentis, obscure subalſi, & alcali urinosi obscure acidi, ac tandem manifeste subacidi lbj. ℥ix. ℥ij. gr. lxij. humoris acidi aliquantisper subauſteri lbj. ℥ix. ℥ij. gr. x. humoris primo limpidi tum subacidi, tum alcali urinosi, ac tandem rufescentis, & sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥iv. ℥ij. gr. lxij. salis volatilis urinosi concreti ℥j. olei fluidi ℥j. ℥v. gr. xxxij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥ij. ℥ij. g. xxij. quæ rite calcita reliquit cinerum ℥j. ℥vij. gr. xxx. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥j. gr. xij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥iv. gr. xxv. in calcinatione ℥j. ℥ij. gr. lxxvj.

Spinaciæ crudæ sapor herbaceus est non ingratus: coctæ vero sapidus est, subalſus, nonnihil acris. Chartæ cæruleæ colorem non mutat. Saltem essentialem videtur obtinere ammoniacalem nonnihil nitrosum, cum mediocri olei & exigua terræ portione consociatum, at multo phlegmate dilutum.

In culinis per totam fere Europam vix quicquam frequentioris est usus pultribus ex Spinacia confectis, quas buryro, aut oleo condiunt, herba minutim concisa. Citra aquam coquitur hoc olus, quod plurimum humoris inter coquendum emittat, & velut proprio contentum jure alienum

num aspernetur. Editur apud nos cocta semper; magis enim sapida est & grata majori phlegmatis parte exhalata. Alibi quandoque inter cruda recipitur acetaria, cum scilicet recens enata. Parantur quoque ex ea placenta non injucunda: vulgo, *Tourtes d'Epinars*. Refrigerat & humectat; cito descendit, alvum emollit. Parca vero admodum nutrit. Effervescentes circa primas vias acres, & biliosos succos temperat, & inde natos ardores mitigat. Serosos humores generat; quod vitium coctione corrigitur & sale, butyro, pipere, nuce moschata, aut aliis aromatibus quibus condiri solet. Licet autem ut alia olera paucum nutrimentum suppeditet, non ideo tamen insalubre videtur. Imo plures Medici ejus usum suadere solent, propter vim emolliendi qua pollet, ideo a nonnullis Scutlomalache (a) quasi malvaceam Betam dicas, denominatur. Uberiori enim humore quo turget, alvum movet. S. Pauli hoc olus febricitantibus & senibus adstrictioris alvi maxime commendat; illis imo vel hecticis, ut febrilem aestum temperet, his ut alvum lubricket, quod longe magis expedit quam ut vel suppositoriis, clysteribus, pilulis Aloeticis aut Scammonaeatis alvus illis quotidie excituletur. Tussi arida medetur & expectorationem promover. Juscula ex ea parata cum oleo amygdalarum dulcium aut butyro recenti hausta asthma & raucedine laborantibus medentur.

Illustrissimus ac Doctissimus vir Guido Crescentius Fagon, Meritissimus quondam Ludovici Magni Archiater Spinacis vitulinae carnis decocto conditis assidue vescabatur & hydromelite pro potu utebatur tum ad alvi siccitatem, cui obnoxius erat emolliendam, tum etiam ad asthma, quo graviter afflictebatur sublevandum.

Nonnulli Spinaciam assiduo usu melancholicum succum gignere profecerunt. Alii eandem nauseosam esse perhibent. Sed haec vitia huic cibo perperam exprobrantur, quae potius pravæ quorundam constitutioni referenda sunt. Res ipsa quidam occurrunt quibus ventriculus debilis & frigidior, ut ajunt, Spinacia sicut aliis quibusdam oleribus insatur, & subvertitur; sed illi ab eorum usu abstineant, aut ipsis aromata confocient. Ceterum Spinacia non judicio solum Tragi, Simonis Pauli, & plurimorum Botanico-um, & Medicorum, sed etiam experientia quotidiana inter culinaria olera laudatissimum & gratissimum olus comprobatur.

In jusculis emollientibus, & refrigerantibus utiliter praescribitur.

¶ 26. Carnis vitulinae libb. Coquatur in aq. comm. libj. ad libj. Tum adde folior. Spinaciae, Betæ, Lactuc. Atriplici ana M. j. Coquantur per quadrantem horæ pro jusculis duobus mane & sero sumendis.

¶ Extrinsecus venterculo & hepati imposita cataplasmatibus instat, eorum inflammationes doloremque tollere dicitur.

LAVANDULA.

Lavandulae species duæ in officinis distinguuntur, & indiscriminatim usurpantur, scilicet Lavandula major seu latifolia, & Lavandula minor seu angustifolia.

La-

(a) Ζουλαος, Beta; Μαλva Malva.

Lavandula, aut Lavendula major, Lavandula latifolia, & Spica, *Off.* Lavandula latifolia C. B. P. 216. *Inst. R. H.* 198. Pseudonardus, quæ vulgo Spica, *J. B.* 3. p. 2. 281. Lavandula, *Dod. Pempt.* 273. Lavendula major five vulgaris Parkinson. *Raii Hist.* 512. Spica Nardus Germanica, *Tragi* 58. Nardus Italica, Casta alba Theoph. *Dalech. in Plinium*; vulgo, *Lavande male*, *Spic*, *Aspic*, ou *Nard commun*.

E radice lignosa, in fibras divisa, in fruticem satis grandem, & lignosum, plurimis ramulis densum, tenuibus, quadrangularibus, geniculatis adolefcit, altitudine sesquicubitali aut bicubitali: folia infima quidem crebra & incondita sere, superiora ex adverso bina, alternatim posita, carnosa, incana, culmum aut etiam semunciam lata, duarum triumve unciarum longitudine, nervo medium percurrente, odore vehementi grato, sapore amaricante. Summis ramulis flores spicæ in modum verticillatim inascentur cærulei, monopetali, labiati, quorum labium superius surrectum est, subrotundum, bifidum, inferius tripartitum. Ex calyce oblongo angusto surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, & quatuor stipatum embryonibus, qui deinde abeunt in totidem semina in capsula, quæ calyx floris fuit recondita.

Folia huic longiora latioraque multo quam Lavandulæ minori magis incana, non tamen adeo crebra in caulibus & ramiulis: ramuli seu potius pediculi spicas sustinentes huic duplo majores longioresque quam illi. Spicæ quoque multo longiores, & inflexæ. Flores tamen, quod mirum, quam illius minores. Odor quoque totius plantæ vehementior.

Lavandula, Lavandula minor, Lavandula angustifolia, *Offic.* Lavandula angustifolia, C. B. P. 216. *Inst. R. H.* 198. Pseudonardus, quæ Lavandula vulgo, *J. B.* 3. p. 2. 282. Lavandula altera, *Dodon. Pempt.* 273. Pseudonardus foemina, *Matthioli*: Lavandula brevior, folio, & spica, *Clus. Hist.* Spica Italica, & domestica, *Cesalpin.* 459. vulgo, *Lavande femelle*.

Tota, quidem facie præcedenti proxima est, minor utcumque & humilior, pariter tamen dense fruticans: foliis minoribus seu angustioribus, & brevioribus, nec adeo albidis, odore minus vehementi. Spicæ florum, ut dictum, breviores sunt & erectiores. Flores tamen majores. Utraque variat interdum floris colore albo. In Gallia Narbonensi sponte proveniant. Apud nos in hortis seritur. Florum spicæ ad usum colliguntur.

Analysi chymica, ex spicarum floridarum Lavandulæ lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, odore & sapore aromatico, florum odorem referentis, subacidi lbj. ℥v. ℥vij. gr. lx. cum olei essentialis guttis aliquot: humoris limpidi magis ac magis acidi, sub finem austeri lbj. ℥iv. ℥ij. gr. xxx. cum olei essentialis portione, humoris rufi, empyreumatici, intense acidi, subtili & austeri ℥j. ℥iij. gr. xij. humoris rufescentis, sale volatili urinoso copioso imprægnati, necnon acidi ℥iij. ℥ij. gr. xxiiij. olei cum essentialis, tum empyreumatici, & spissi ℥iij. ℥iv. gr. xlviij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥vij. ℥vij. gr. xxiv. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥v. ex quibus lixivio salis fixi mere aleali ℥vij. gr. xlvj. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥v. ℥iv. gr. xvij. in calcinatione ℥v. ℥ij. gr. xxiv.

Ex

Ex ejusdem floribus ad ℥v. per aliquot menses maceratis salis volatilis urinosi concreti gr. xxx. extracta sunt.

Lavandula salem obtinere videtur essentiali ammoniacalem, similem ammoniacali composito ex sale volatili urinoso aceti acidi plene & plusquam saturato & cum oleo copioso tum essentiali, tum crasso accurate permixto. Idem dicendum de Spica quæ iisdem gaudet principiis, imo copiosioribus & penetrantioribus, ut ejus odor testatur, & similibus virtutibus donatur. Quapropter indiscriminatim ad usum medicum usurpantur. Hic vero Lavandula utpote magis familiaris frequentius in usum venit.

Oleum essentiali Spicæ & Lavandulæ Heliotropii tincturam rubore inficit ratione salis acidi contenti.

Lavandula cephalica, nervosa, & uterina censetur. Partibus suis salino-sulphureis, aromaticis, subtilibus; acerbis, nervosas fibras ad oscillationem stimulat, earum tonum nimis laxum & debiliorem restituit, humores spissos in partibus morantes dissolvit & ad motum habiliores reddit, unde sensus & morus vitia emendare solet: ejus usus in catharris, apoplexia, paralyse, spasmo, vertigine, lethargo, artuum tremore plurimum commendatur. In urina cienda, menses & sætu pellendis, & in torminibus flatulentis nonnumquam usurpatur. Pulvis florum vel semina contrusa a ℥j. ad ℥j. præscribuntur. Infusum florum Theæ ad instar præparatur. Aqua distillata simplex vel spirituosâ, tinctura florum cum spiritu vini parata ad ℥ij. trespæ, conserva ex floribus ad ℥ss. & oleum essentiali ad guttas duas, tres, vel sex intus sumuntur. In omnibus fere medicamentis cephalicis & nervinis tum internis tum externis usurpari solent.

Moderatus tamen esse debet Lavandulæ sicut & cæterorum aromatum usus. Nam ex immodico & inopportuno illorum usu sanguis æstuat & accenditur, solidæ partes nimis irritatæ incallescunt & inflammantur. Quæ de re post C. Hoffmannum & Dodonæum S. Paulli prudenter monet. Cl. Hoffmannus l. 2. de Medicamentis officinalibus c. 132. p. 397. §. 10. hæc aromatica & odorata medicamenta laudat ubi debilitas partium ab intemperie frigida oritur aut a frigidis humoribus vias obsidentibus: at vero ubi a caliditate, ait, tale quid est, insignem contra ex illis læsionem oportet expectare. Dodonæi autem hæc sunt verba. „Proinde stillatius Lavandulæ liquor odoratus, & temporibus & fronti illitus, cataplesi leviori, hemiplexia, & subinde comitiali morbo, ac non raro „syncopæ laborantes reficit. Sed ubi humorum copia adest, præsertim sanguini permixtorum, non satis tutus huius est usus, sicuti neque compositionis, quæ ex stillatitio vino, in quo hujusmodi herbæ, flores, semina „& aromata quædam macerata sunt, conficitur; quam plerique temere & „indifferenter exhibent. Nam calidorum hujuscemodi caput implentium „usu, & morbus intenditur, & æger in periculum inducitur: præsertim quando sanguinis missio aut purgatio non præcesserunt. Quod ideo monendum „duximus, quia passim nonnulli Medici indocti & temerarii, audacesque nimium pharmacopœi, alique, & stolidæ mulieres, statim similes compositiones & id genus alia, non modo apoplecticis, sed & carotico cum „febri occupatis infundunt: quibus nihil potest pejor dari, cum plurimum obliunt, & non raro ipsos ægrotantes perimant. „Hactenus Dodonæus.

Simon Paulli immodicum eorundem aromatum usum reformidat, & exemplum affert cujusdam opulenti aromatopolæ horrenda epilepsia correpti quæ ocus in apoplexiam degenerarat, antequam illi auxilium afferri potuisset, ideo quod sibi integerrima gaudenti valetudine, & habitu athletico, sub cincinnata & densa cæsarie cucupha suaveolentissima Cyperum, Iridem, Costum, Storacem, Molchum, Ambram redolente caput operire alluvisset. Eum vero omni motu sensibusque omnibus orbatum, sanguinis missione sexies septiesve intra unius horæ spatium repetita, habito respectu virium, & pulsu ac respiratione ab ea invalescentibus, ab hoc acutissimo morbo vindicavit & vitæ afferuit, intus propinato non Lavendulato vino, sed spiritu cranii humani vitriolato *Crollii*, quem in hisce affectionibus plurimum commendat. Reipsa plurimi vehementem aromatum odorem difficile ferunt: quapropter Medicus ea nonnisi caute tam externe quam interne adhibere debet, & explorata prius non solum morbi indole, sed etiam ægrotantis natura, quomodo ad odoramenta se habeat.

In balbutie & linguæ paralyti spiritu vini Lavendulato os sæpius abluitur. Rulandus in curationibus empyricis, teste Ettmullero, beneficio hujusce spiritus virum 70. annorum aphonia laborantem curavit, cochlear unum pro dosi propinando. In difficili partu semen Lavendulæ est oppido conducibile. Rondeletius pulverem sequentem ad facilitandum partum ut arcantum præstantissimum commendat.

℞. Semin. Lavandulæ ʒss. Semin. Plantag. Endiviæ ana ʒij. Piper. nigr. ʒj. F. pulvis in aquar. Caprifol. Endiv. ana ʒiij. sumendus.

Sequentem pulverem cum laude proponit Simon Paulli in *Quadr. Botanico*.

℞. Semin. Lavandulæ ʒss. Succin. alb. pp. Borac. ana ʒij. Olei Cinnamon. gutt. ix. Fiat. l. a. pulv. dividendus in tres partes æquales, propinandus in vino Rhenano, aut alio generoso.

Obiter tamen hic notandum est calida hæc acria & vehementiora medicamenta ad partum juvandam non proficere nisi in debilitate virium & partium atonia, quæ quidem minus frequenter occurrit, quam summa partium rigiditas, intumescencia & ardor. Quapropter parturientes a sanguinis missione aut e brachio aut e saphæna, ex infessu ad decoctorum emollientium & temperantium vaporem, ex clysteribus emollientibus plus levaminis sæpius accipiunt, quam ex hisce roborantibus remediis. Ad quod diligenter attendere debent Medici antequam hæc remedia præscribant.

Flores & folia in ore detenta & masticata salivationem potenter excitant. Unde in affectionibus soporosis, catarrhis, linguæ paralyti & in cucuphis ad caput roborandum utiliter usurpantur.

℞. Radicum Ireos Florentin. & Calami aromatici ana ʒij. folior. Betonic. major. Salviz, Rorismarin. Summitatum Lavand. Strachados ana ʒj. Fiat pulvis tenuissimus capillis inspergendus hora somni & mane pectine excutiendus. Vel excipiatur hic pulvis pauco Gossypio, includendo in panno sericeo interpuncto pro cucupha seu calantica (*couvrechef*) in cerebri affectionibus & causa frigida.

Externæ in decoctis cephalicis, & nervinis præscribi solent.

Oleum

Oleum stillatitium Spicæ Lavandulæ in Medicina, & apud artifices plurimos maxime usitatum paratur distillando flores exsiccatos, & semina in magna aquæ quantitate, igne sat vehementi. Hoc oleum in nervorum ac tendinum relaxatione, in paralyticis, & rheumaticis affectionibus plurimum prodest five interne guttæ duæ, tres, sexve saccharo assuæ in vino aut aqua cardiaca aut cephalica quacumque propinentur: five cum spiritu vini oleis aut unguentis quibuscumque convenientibus illinatur.

24. Olei essentialis Spicæ Lavandul. gutt. iij. Affunde sacchari ℥j. Dissolve in vini generosi ℥v. Sumat æger in lecto decubens ad sudorem promovendum in paralyticis, & catarrhosis affectionibus.

25. Olei essentialis Lavandulæ ℥j. Olei Hyperici ℥ij. Olei Lumbricor. terrestr. ℥iij. Balsami Fioravanti ℥ss. M. F. linimentum ad membra paralyti aut rheumatismo affecta perungenda.

Ex eodem essentiali oleo cum sale volatili ex ammoniaco permixto sublimatur sal volatilis oleosus aromaticus Lavandulæ hodie frequentis usus naribus admotus, ad spiritus recreandos in paroxysmis hystericis, lipothymiis, & languoribus hypochondriacis.

Hujus olei odorem fugiunt blattæ, pediculi, & alia insecta. Propterea in his fugandis vel enecandis apprime conducit. Certe si vespere sub introitu lecti charta bibula hoc oleo solo vel cum oleo amygdalarum aut quocumque alio permixto innicta, capiti aliisque locis pilosis applicetur, pediculos mire fugat, & mane interfecti omnes reperiuntur. Etmullerus post Panarollum refert, quemdam contra minores inguinales pediculos fugandos, crebrius Mercurii litu, sed admodum infeliciter usum fuisse, qui continua penis erectione exinde laboraverit. Simul ac vero membrum oleo Spicæ fuit illitum ad pristinum statum est revocatum, & pediculi etiam profus fugati.

Oleum Spicæ Lavandulæ distillatum ex Gallo-provincia, & Gallia Narbonensi, ubi utraque Lavandula uberime crescit, ad nos affertur, sed sæpius adulteratum, & cum spiritu vini aut cum oleo Terebinthinæ permixtum. Mangonium utrumque facile detergitur. Illud enim quod cum spiritu vini admixtum fuit, aquæ communi affundatur, statim spiritus vini cum aqua intime permisceatur, oleum vero supernatat minori quidem quantitate, at genuinum, & sincerum. Si vero cum oleo Terebinthinæ aut alio quocumque permixtum fuerit, deflagratione portionis alicujus in cochleari metallico facile detegitur. Oleum enim Spicæ genuinum flammam tenuem, fumum paucum, nec odore ingratum emittit, at oleum Terebinthinæ fumum copiosum nigrum spargit, odoremque minus gratum.

Apud varios artifices usitatissimum est præsertim ad opera varia vernigine illinienda.

Lavandulæ flores usurpantur in decocto cephalico, syrupo antiepileptico, syrupo de Stæchade, pulvere cephalico odorato Ph. Regiæ, & in pulvere ad cadavera loricanda *ejusdem*.

Oleum Spicæ Lavandulæ usurpatur in balsamo apoplectico *ejusdem*.

LAUREOLA.

L Aureola duplex in officinis usurpatur, scilicet Laureola mas, & Laureola fœmina.

Laureola mas, Laureola semper virens, & Daphnoides, *Off. Thymelæa Lauri folio*, semper virens, seu Laureola mas, *Inst. R. H. 595. Laureola semper virens*, flore viridi, quibusdam Laureola mas, *C. B. P. 462. Laureola semper virens*, flore luteolo, *J. B. 1. 564. Laureola*, *Dod. Pempt. 365. Laureola Gerard. Parkinson, J. R. Hist. 1587. Daphnoides sive Laureola*, *Advers. Lobel. 156. Lugd. 211. vulgo, Laureole.*

Ex radice lignosa, lenta, crassa, longa, & multiplici, multis stipitibus lentis subcinericeo seu albicante cortice vestitis fruticat, ad cubitos duos assurgens, foliis Lauri sed minoribus, ad majoris Myrti folia accedentibus, semper virentibus, nigricantibus, crassis, glabris, nitidis, utrinque acutis plurimis circa ramulorum fastigia. E foliorum sinubus egrediuntur pediculi unciales, crassiusculi, foliolis aliquot concavis velut rotundem squamis vestiti, & in fastigio flores sustinent monopetalos, e luteo virentes, posterius fistulosos, antequam in quatuor lacinias acuminatas divisos, calyce carentes, cum pistillo abeunte in baccam olivæ forma, sed longe minorem, primum viridem, per maturitatem nigram, succi plenam, in qua latet nucleus unicus durus, Cannabis femine paulo longior, medulla interiore candida. Folia, fructus, cortex tam radicis quam ramorum acrimonia sua, & urendi qualitate linguam, & fauces mordicant, & incendunt. Nascitur in sylvis, & montibus umbrosis Gallo-provinciæ, & Galliæ Narbonensis. Folia, baccæ nonnumquam in usum veniunt.

Laureola fœmina, Chamælea, Mezereum, & Mezereon, *Off. Thymelæa Lauri folio deciduo*, sive Laureola fœmina, *Inst. R. H. 595. Thymelæa folio deciduo*, flore purpureo, officinis Laureola fœmina, *C. B. P. 462. Laureola folio deciduo*, sive Mezereon Germanicum, *J. B. 1. 566. Chamælea Germanica*, *Dod. Pempt. 364. Chamædaphne sive Pufilla Laurus*, *Advers. Lobel. Icon. 367. Piper montanum, Gesneri*; Chamælea Germanica sive Mezereum Gerard. *J. R. Hist. 1587. Laureola fœmina*, & Daphnoides erocæ *H. Lugd. vulgo, Bois gentil.*

Multis etiam stipitibus fruticat ad trium cubitorum altitudinem assurgentibus, lentis, teretibus, fractu conrumacibus, cortice duplici, exteriori cinereo tenui, interiore exteriori virente, interiori albicante obductis. Folia e tuberculis plura ab eodem exortu oriuntur, foliis Laureolæ maris minora, tenuiora, molliora, nec ita splendentia. Flores ejusdem formæ, sed purpurei, & longe elegantiores cum staminulis aliquot croceis, odorati. Baccæ pariter purpurascunt ejusdem magnitudinis, & figuræ. Nascitur in frigidioribus sylvis Alpium, & Pyrenæorum. Cortex, folia, & fructus in usum veniunt, sed minus frequentem.

Analyti chymica, ex Foliorum Laureolæ maris recentium ℞v. per retortam distillatis, prodierunt humoris limpidi, odore, & sapore virentem herbam referentis, obscure acidi ꝑxj. ꝑj. gr. liij. humoris primo limpidi, manifeste aci-

di magis ac magis sub finem rufefcentis, intenfe acidi, & austeri liij. ℥vj. gr. xlv. humoris rufi, empyreumatici, intenfe acidi, obfcure fubfalſi ℥j. ℥v. gr. ix. humoris rufi, fale volatili urinoſo copioſo imprægnati ℥ij. ℥iiij. gran. xlv. olei ſpiſſi extracti ad inſtar ℥ij. ℥vij. gran. xlv. Maſſa nigra in retorta reſidua pendebat ℥vij. ℥vij. gran. ix. quæ rite calcinata reliquit cinerum albicantium ℥ij. ℥ij. gran. liij. ex quibus lixivio ſalis fixi mere alcali ℥iiij. gran. ij. extracta ſunt. Partium jactura in diſtillatione fuit ℥iiij. ℥vj. gran. xj. in calcinatione ℥v. ℥iiij. gran. xxvij.

Utriuſque Laureolæ ſemina, folia, & in primis cortices, tum ſtipitum, tum radicem acerrima ſunt, & adeo ſervida, ut maſtlicant ſe os, & fauces adurant, & inflammant, diu multumque durante impreſſione. Folia recentia maſticata aliquantiſper mucilaginofa ſunt: eorum ſuccus chartæ lætulæ rubentem colorem conciliat. Salem eſſentialem obtinent tartareum multo oleo fœtido acri conjunctum, & glutinoſo phlegmate involutum. Totius plantæ viſ acris, adurens, & purgans mihi videtur pendere potius ab oleoſa aut reſinoſa quadam ejus portione in ſemina, foliorum, & corticis cellulis peculiaribus latitante, quam a fale alcali cauſtico cui a plerique tribuitur. Siquidem purgantis fere omnia vehementia hanc vim a ſulphurea aut reſinoſa ſubſtantia obtinent, ut videre eſt in Scammonio, Euphorbio, Gutta Gummi, Helleboro, Jalapa &c. quorum præcipua viſ cathartica in reſinoſis partibus ſita eſt, & in reſinoſis extractis conſervatur.

Omnes utriuſque Laureolæ partes intus ſumptæ ventriculum admodum ſubvertunt, vomitum cient, bilioſos, ſeroſos humores maxime fluidos cum impetu forſum, & deorſum expurgant: partes internas lædunt, rodunt, inflammant: viſcera abradunt, & vaſorum ſanguineorum oſcula aperiunt; febres accendunt, cardialgias excitant, & ſuperpurgationes, vires exſolvunt. A nonnullis ad ſeroſos humores evacuandos hydropicis præſcribuntur. Doſis corticis, & foliorum eſt a gran. vj. ad ℥ſſ. Semina vero tria quatuorve integra deglutuntur. Eorum malitia corrigi dicitur macerando horas 24. in aceto, ut Elleborus, & Eſula; ſucco mali Punicæ aut Cydoniæ, Portulacæ, vel mucilagine ſeminis Pſyllii. Alii emendare tentant inſundendo in vino, & iterum exſiccando. Alii triduanam macerationem aceto requirunt, ſingulis diebus novum affundendo, & tandem aqua bene eluendo. Ettmullerus hujus medicamenti maceratione in aceto vim infringi aſſerit, ſed aceti lenta evaporatione Laureolam exſiccandam eſſe contendit, alioquin effœta, & nullius uſus evaderet. Verum utriuſque hujus plantæ folia, cortex, baccæ quomodocumque præparatæ & correctæ ob malignitatem rariffime in uſum veniunt, nec niſi tutiorum medicamentorum inopia, & caſu aliquo deſperato, & robuſtiſſimis tantum exhibendæ ſunt, idque magna conſideratione, monentibus Medicis omnibus prudentioribus, vel iſſis Mauritanis, qui has plantas Terræ Leone, & Plantas viduificas cognominarunt. Quæ quidem ab earum uſu nos deterere merito debent.

Externe radix Mezerei loco ſetacei utiliter adhibetur in oculorum affectionibus. Hujus radicis particula longa, & rotunda ad inſtar Turundæ, in aceto aut lixivio acri macerata auriculæ perforatæ inferitur, quæ copioſiſſimum ſe-

tum inde educit. Sic oculorum inflammationes sedantur, & imminens suffusio nonnunquam præcavetur.

Nonnulli Laureolæ baccas fuisse grana Cnidia, apud Hippocratem, & veteres græcos sæpius usitata existimant. Quod quidem prorsus incertum est: alii enim fructus cujusdam Thymelææ fuisse contendunt. Quidquid sit, hæc vehementiora medicamenta apud nos fere obsoleverunt ob eorum malitiam, & eo magis quod ab hisce præcis Medicinæ temporibus medicamenta emetica, & purgantia mitiora, tutiora, & nostræ naturæ magis convenientia detecta sint.

L A U R U S.

Lauri species duæ seu potius varietates in officinis usitatæ sunt, *Laurus vulgaris*, & *Laurus Regia*.

Laurus vulgaris, *Off. Laurus vulgaris*, C. B. P. 460. & I. R. H. 597. *Laurus*, J. R. 1. 409. *Laurus mas*, & *fœmina*, *Tabern. Icon.* 950. *Laurus tenuifolia*, *Matthioli* 125. vulgo, *Laurier franc.*

Laurus Regia, *Off. Laurus latifolia*, *Plumetier* p. Dioscoridis, C. B. P. 460. *Inst. R. H.* 597. *Laurus latifolia mas*, *fœmina*. *Tabern. Icon.* 951. vulgo, *Laurier Royal.*

Laurus utraque tam tenuifolia quam latifolia plerumque multis stolonibus luxuriat, non raro mediocris arboris altitudinem assequitur, præsertim in regionibus calidioribus, ramola, caudice enodi, cortice tenui, materia rara, nec multum valida; radices habet crassas, inæquales, & obliquoas. Folia ei oblonga, dura, utrinque acuminata, sed mucrone alias latiore, alias obtusiore, in uno quidem genere angustiora, sesquiunciam aut duas uncias lata, palmo longiora, in altero ampliora ut ad mali Medicæ folia accedant, quæ secundum longitudinem percurrit costa recta, obliquoas in margines nullo ordine nervos exporrigens, non decidua, perpetui viroris, nitidi in junioribus, in adultioribus saturatioris, odoratissima, sapore acris aromatica, nonnihil amaricantia, ramis viridantibus brevi pediculo adhærentia. Flores secundum ramos exeunt conferti, monopetali, pelvisiformes, in quatuor vel quinque partes divisi, e luteo albicantes, cum multis in medio apicibus, & pistillo, quod abit in fructum seu baccam Cerasis minoribus parem, in aliis ovatam, in aliis oblongam, gracilem, colore primum viridi, ubi maturuerit, nigro, quæ sub cortice tenui testam continet unicapularem, callosam, duram, semine fœtam ejusdem pene formæ, e rufo subnigricante, in duas partes fissili, odorato, acris, subamaricantæ, pingui. Sponte nascitur *Laurus* calidioribus in regionibus, Hispania, Italia, necnon Gallo-provincia, in sylvis, locis præsertim maritimis, ac etiam in montibus, & collibus apricis quæ lacus, & maria respiciunt. Apud nos in hortis colitur, & hyeme a frigore arceri debet. Baccæ, & folia usitata sunt.

Analysi chymica, ex foliorum Lauri recentium lbvj. per retortam distillatis, prodierunt humoris limpidi, foliorum odorem, & saporem apprimè referentis obscure acidi, cum olci essentialis portione mediocri, lbij. ʒix. ʒvj. gran. xxvj. humoris manifestè acidi, subausteri, subadstringentis ʒv gr. xl.

gr. xl. humoris impense acidi, subfalsi, austeri, leviter empyreumatici, cum olei essentialis guttis aliquot ℥vj. gr. xlvij. humoris rufi, acidi, austeri, empyreumatici, fale volatili urinofo imprægnati ℥iij. ℥vj. olei empyreumatici, fulci & adiposi ℥iij. ℥vj. gr. xxiiij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥vij. ℥vj. gr. xxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥v. gr. lxiiij. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥v. gr. iij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥iij. ℥ij. gr. xlij. in calcinatione ℥vj. gr. xliij.

Lauri folia odorata sunt, saporem obrinent acrem, aromaticum, subadstringentem cum quodam amaro. In aqua per aliquot horas macerata & postea distillata oleum essenziale fundunt odoratissimum. Salem essentialem obtinent tartareum cum multo oleo tum tenui, tum crasso & pauca terra adstringente conjunctum. Baccæ vero plus odoris & saporis habent. Oleum duplex fundunt, alterum tenuius, odoratissimum, essenziale ut ajunt, & limpidum, quod contusæ & in aqua uberrima maceratæ ac postea distillatæ suppeditant: alterum crassius quod sola expressione ex baccis contusis extrahitur, vel coctione earumdem in aquæ communis q. s. Supernatat enim decocto ebullienti, quo refrigerato in butyri consistentiam figitur & facile colligitur.

Laurus apud antiquos arbor fuit celebratissima. Triumphantes coronam Lauream gestabant, vel Lauri ramum dextra tenebant. Victoriæ nuncia erat. Nam tabernacula, naves, fasces, militum jacula, lanceæ, pilla Lauro in eam significationem ornabantur. Apollini sacram inde fabulantur Poetæ quod virgo Daphne quam deperibat in hanc arborem conversa sit. Musas in Laurinis montis Parnassi sylvis sedere sinxerunt. Eadem coronabantur Poetæ. Necnon adhuc quibusdam in locis novi Medicinæ Doctores Lauro coronantur: inde fortasse Laureandi & Laureati dicuntur. Laureum fulmine non percuti veteribus persuasum fuit. Hinc Tiberius Imperator, qui tonitru prætermodum expavit & exhorruit, tonante cælo, contra fulminum ictus, nunquam non Lauream coronam capite gestavit. Verum quam hoc falsum & superstitiosa credulitate fundatum, experientiam quam affert Lacuna, elegantissimæ Lauri Romæ in palatio ducis de Castro fulmine ictæ, & plurima alia exempla ab aliis allata luculenter ostendunt. Eadem superstitione nititur observatio illa de crepitu quem fœlia & virgæ Lauri inter urendum edunt. Nam si crepissent abunde ac sonantius, haud dubie portendi felicem eventum rebantur: quod si tacita deflagrassent, tristem & inauspicatum.

Laurus apud veteres Medicos magnum habuit in Medicina usum, & veluti panacea æstimata fuit: folia, baccæ, & cortex radicum frequenter usurpabantur. Hodie vero baccæ & folia solum & minus usitata, cortice radicum prorsus neglecto, in Officinas inferuntur.

Folia urpote aromatica amaricantia cum nonnulla adstrictione, calefaciunt, digerunt, resolvunt, ventriculum roborant, ciborum concoctionem juvant, flatus discutiunt: hinc a recentioribus non raro cum nonnullis cibariis, præsertim piscibus coquantur, suillæque pernas coquant. Et tantum abest ut ventriculum subvertant, ut nonnulli opinantur, quin potius nauseabundum corroborent. Ad ventriculum roborandum, colicos dolores flatulentos discutiendos eorumdem infusum

Theæ ad instar præscribitur, aut pulvis ad ℥j. ingeritur. Eorundem decoctum in enematis ad colicam abigendam utiliter usurpatur. Idem in Matronarum infessus, & balnea additur, & vulvæ sordes, vel prægnanti, tuto eluere, uteri ac vesicæ vitiis medere dicitur.

Baccæ magis quam folia calefaciunt: a veteribus adversus phthisim, orthopnoeam, & omnes circa thoracem defluxiones sive rheumatismos commendantur: nostra ætate ad ventriculi, jecoris, lienis, & vesicæ affectus usurpantur. Concoctionem crudorum humorum promovere, succos lentos, ac viscidos dividunt, & resolvunt, languentem appetentiam excitant; cibi fastidium pellunt, jecoris, & lienis obstructions aperiant; urinas cient, menses movent, & ad secundinarum expulsionem faciunt.

In baccis oleum essentialiale tenue, & actuosum oleo crasso admodum a-nodyno involvitur. Unde interne ad sedandos dolores utiliter exhibetur: sed externe potenter resolvunt, & roborant. In cataplasmatibus, unguentis vel emplastris apprime conducunt ad dolores mitigandos, tumores resolvendos, partes sufficienti tono destitutas roborandas.

Oleum in Officinis quadruplex ex baccis Lauri conficitur. Scilicet 1. oleum essentialiale, quod ex baccis confusis, aqua maceratis, & postea sat forti igne cum eadem aqua distillatis: oleum prodit limpidum, subtile, valde odoratum, aquæ supernatans, quod virtutibus cum cæteris oleis aromaticis convenit. Laudatur in primis interne ad status discutiendos, colicos dolores sedandos, passionem hysterica compescendam, & in doloribus post partum. Verum in calidis, & biliosis temperaturis, & in inflammatoriis affectionibus ab eo abstinendum. Dosis a guttis iij. ad vj. Sacchari frusto affusus, & postea cum liquore conveniente mixtus. Adversus colicos dolores carminativis clysteribus additur. Externe illitum nervorum affectibus a frigore ortis conducit: in paralyti, & ischiadidis doloribus prodest. Pubi quoque, & pectini muliebri illinitur contra passiones hystericas, colicos dolores post partum, & mensium suppressionem a causa frigida.

2. Aliud oleum e baccis in aqua fervente bullitis elicitur. Integræ vel etiam tritæ baccæ, lebeti commissæ, in aquæ sufficienti quantitate per semihoram bulliunt, colantur, & fortiter exprimuntur. Refrigeratumque oleum pinguedinis subviridis instar aquæ supernatans colligitur. Hoc oleum oleo essentiali minus odoratum est, crassius, & viribus debilius. Oleum enim essentialiale hoc in concreto adiposo cum oleo pingui in Amygdalino baccarum nucleo contento permiscetur, & inietitur.

3. Aliud oleum ex baccis optime tritis, & torculari fortiter expressis extrahitur priori adhuc minus penetrans, cum scilicet oleum crassius in baccarum nucleis contentum fere solum exprimatur, parum vero olei essentialis in cellulis corticum reconditi eliciatur, nisi igni adhibeatur. Hæc ambo olea cum essentiali oleo viribus conveniunt, sed longe debilioribus. Interne ad grana decem vel duodecim præscribuntur. Sed si nimia quantitate exhibeantur, nauseam excitant. Externe frequentius usurpantur illita solitaria vel emplastris admixta.

4. Tandem oleum Laurinum paratur ex baccis & foliis Lauri tritis & in oleo

omphacino maceratis & decoctis, quod prioribus longe debilius est, & raro usurpatur. Hæc olea adversus scabiem commendantur, sed nihil profunt nisi admixto sulphure, cujus ingratum odorem emendant.

℥. Baccar. Lauri ℥j. Corticis exsiccati Aurantior. maior. ℥ij. Infunde in vini generosi ℥iij. Infusum cum Saccharo propinetur in ventriculi imbecillitate, colica flatulenta, mensum remora.

℥. Florum Chamæmel. M. ij. Baccar. Lauri contular. ℥ij. Bulliant leviter in aq. q. s. Colaturæ adde olei Laurini expressi ℥j. Fiat clyster in colica flatulenta.

℥. Olei Laurini expressi ℥j. Ung. martiati ℥ij. Castor. pulver. ℥j. F. linimentum quo ventriculi regio illinatur in stomachi inflatione, membra paralytica, vel rheumaticis doloribus correpta inungantur, regio pubis infantum in urinæ suppressione.

Ex Lauri baccis electuarius de baccis Lauri vulgo dictum conficitur ad colicos affectus & uteri morbos commendatum, & Emplastrum de Baccis Lauri *Mesue*. Eadem usurpantur in antidoto Orvietano, *Pb. Reg. Aurea Alexandrina*, Theriaca diatessarum *Mesue*, & confusione *Anacardina ejusdem*. Folia usurpantur in Ung. Martiato, Empl. de Betonica. Oleum Laurinum vero usurpatur in Empl. Manus Dei, Empl. *Paracelsi*. Empl. de Ranis, & Empl. Styptico *Pb. Reg.*

L E N S.

Lemis duplex genus in Officinis, arvensis & palustris: arvensis vero species duæ distinguuntur, scilicet minor & major.

Lens arvensis minor, Lens vulgaris, *Off. vulgaris*, semine sobrufo; *C. B. P.* 346. *Inf. R. H.* 390. Lens, *J. B.* 2. 317. *J. R. Hist.* 904. Lens minor, *Dod.* 526. Lens vulgaris, sive agrestis, & Lenticulæ primum genus, *Tragi* 626. vulgo, *Petite Lentille*.

Planta est annua radice tenui, alba, paucis fibris donata. Caulis ei satis crassus pro plantulæ modo, dodrantalis, hirsutus, angulosus, infirmus, & procumbens, nisi in propinquo sit quod scandat, a radice statim ramosus. Folia e quorum sinibus ramuli exeunt alternatim posita, ut in reliquis fere leguminibus, quinque aut sex pinnularum mediz costæ adnexarum conjugationibus composita, costa media in claviculam abeunte. Singulæ autem pinnulæ oblongæ, angustæ, hirsutæ in acutos apices desinunt. Ex alis foliorum exeunt surculi tenues, oblongi, duos aut tres flores gestantes papilionaceos, parvos, albescentes: superius tamen folium quod vexillum, alii clypeum appellant, cæruleis intus lineolis striatum est. Ex floribus calyce surgit pistillum, quod deinde abit in siliquam brevem, latam, compressam, glabram, duobus vel tribus seminibus scetam, quam pro plantulæ modo majoribus, orbiculatis, compressis, utrinque convexis, hoc est ad centrum crassioribus quam ad marginem, duris, glabris, per maturitatem flavicantibus, in aliis speciebus rubentibus: aut nigricantibus.

Lens arvensis major, *Off. Lens major*, *C. B. P.* 346. *Inf. R. H.* 390. *Groffrey Tom. II.*

A a 3

J. B.

J. B. 2. 317. R. H. 904. Lens, Dod. Pempt. 126. Lens Italica, Camerarij vulgo, *Grande Lentille*.

Lente vulgari omnibus partibus speciosior est & major, herba, foliis, flore albo, siliquis ut A semine quod Lentis vulgari duo aut tria grana facile æquat. Utraque in arvis copiose feritur. Semina ad culinarium usum quam ad medicum sæpius advocantur.

Analyti chymica, ex Lentium lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris rufescentis, subausteri & obscure alcalini ℥x. humoris rufi, obscuri, acris, turbidi, tum acidi austeri, tum alcali urinofi ℥vj. ℥ij. humoris rufi, obscuri, empyreumatici, acerrimi, alcali urinofi & sale volatili urinoso copioso imprægnati ℔j. ℥iiij. olei ℥vij. ℥iiij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℔j. ℥v. ℥vij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥vij. ex quibus lixivio sunt extractæ salis fixi mere alcali ℥v. Partium jactura in distillatione fuit ℥xiiij. ℥ij. in calcinatione ℔j. ℥iiij.

Lentes salem essentialem obtinere videntur vitriolico-ammoniacalem cum multo oleo crasso & spisso conjunctam.

Lentes in cibo summe olim placuisse Philosophis, priscorum monumentis constat, atque etiam apud Græcos eximiam auctoritatem habuisse reperio. Ait enim Athenæus L. 4. c. 18. Stoicum dogma esse, sapientem omnia recte agere, & Lentem prudenter condire. Causa forsan fuit, quod Philosophi rerum contemplationi addicti, de cupediis, scitamentis, & ganeatis ciborum deliciis minime fuerint solliciti. Ut enim ornatum & luxum virabant in vestitu, sic apicianas gulæ voluptates respuebant: simplici tenuique victu, qui vitam conservaret contenti. Lentes vescientes æquanimitem sibi conciliari asseverabant. At verisimile est priscos hanc opinionem, non tam ex hujus cibi natura hausisse, quam ex sobrietate eorum qui tam vili & parum sapido cibo vesciebantur. De Lentibus enim aliter sentit tota peritiorum Medicorum schola: quæ docet crebram & assiduam dyspepsiam turbare caput, spiritus inquinare, visum obtundere, terroculamenta invehere nocturna, affectus melancholicos gignere, viscera oppilare, cancerum, lepram, scabiem, scirrhos hepatis ac lienis, calculum, & quartanas efficere, ventrem inflare atque sistere, stomachum male afficere, naturales menses & hæmorrhoidum vacuationes impedire. Uno verbo Lens apud Medicos fere omnes habetur flatulenta, concoctu difficilis, & succi pravi, crassi, terreni, & melancholici. In Lente autem duplex substantia distinguitur, membranosa seu cortex, & medullaris quæ illius caro seu pulpa dicitur, diversarum facultatum. Cortex juxta Galenum L. 1. de Al. Fac. c. 18. austeræ qualitaris particeps adstringit. Pulpa austeri habet exiguum, sed succi est crassi atque terreni. Cortex alimenti est peioris: pulpa melioris. Jus primum, in quo Lens elixa fuit, ventrem solvere Galenus asserit: ideoque magis si vel sale, vel oleo, vel garo fuerit conditum. Oleum enim emollit & laxat: sal vero & garum abstergant, & expultricem ad deiciendum irritant. Jus Lentium secundo cocturum, inquit idem Galenus, juri primo contrarium est. Ut enim hoc alvum movet, sic illud eandem suppressit: ideoque accommodatum iis qui diarrhæa, dysenteria & cæliaca laborant, quoniam & stomachum

phum & intestina & ventrem totum corroborat. Lens verò decorticata, seu puls ex ea expressa, ut illam adstringendi vehementiam, & ea quæ illam consequuntur, amittit, sic magis nutrit quam Lens quæ cortice ipsa non est; verum succum crassum ac prævum gignit, tardeque descendit, non tamen alvi fluxus deficiat sicut Lens cui cortex non est ademptus. Nostres pelli maxime Lentis vitia portant, si cum optimis carnibus excocta assumatur. Rarius in mentas nobiliorum venit apud nos. Rura in quibuidam tractibus Gallie eam in usu frequentiori habent. Ex his panis aut rarissime, aut nunquam tentatus, propter ariditatem & quia est summe friabilis.

In variolis & morbillis curandis cum decoctum Lentium passim apud Medicos Arabes maxime commendatum, etiam apud multos in usum veniat, & ab aliis non imperitis Medicis damnetur, non abs re esse crediti, quid de earum usu his in ægritudinibus sentiendum sit hic differere. Inter eos qui Lentium usum in cura variolarum & morbillorum rationibus quibuidam stabilunt; cum primis elucet Avicenna quæ L. 4. *sect. 1. Traç. 4. cap. 10.* Lentem excorticatas una cum aliis quibuidam simplicibus, Lacca, Caricis, Tragacantho, & in principio statim, cum ebullitio & effervescencia sanguinis adhuc viger, & in progressu quando materia ad cutem abire incipit, usurpat. Avicennam sequuntur ex neotericis plurimi; Mercurialis L. 1. *de Morbis Pueror. c. 2.* Augenius L. 10. *de Febribus, c. 9.* Antonius Potus L. 4. *de Variolis ac Morbillis, c. 22.* Lazarus Riverius *Prax. Med. de Variolis & Morbill.* Liddelius L. 3. *de Febribus, c. 9.* Paræus L. 19. *c. 2.* Camphilongus L. 1. *De Variolis, c. 45.* alique multi: qui tamen in Lentium præparatione & exhibendi tempore inter se discordant. Etenim quidam eas offerunt in principio tantum, priusquam variolæ ac morbilli erumpant; alii in augmento, ut erupcionem juvent; nonnulli decoctum dumtaxat propinant; aliqui etiam substantiam cum decocto porrigunt; rursus quidam coctas cum cortice; alii cortice exutas præbent.

Commendant autem Lentes ob varias causas. Mercurialis eas dat, cum corpora laborant cachexia aquosa; motus monito Galeni, quod habetur L. 1. *de Alimentor. facultatibus, c. 18.* ubi dicitur, Lentem in cibo utiliter iis solum offerri, quibus aquea in carnibus est cachexia; nimirum ut excrementitia humiditas consumatur. At variolas & morbillos ab ichore aquoso provenire Mercurialis asseverat. Verum acrum illis admiscet ut crassities Lentium incidatur atque attenuetur. Liddelius Lentes præbet ut intestina defendant; Camphilongus ut materia expellatur ad cutem; Augenius non solum ut materia abeat ad cutem, sed ut viscera roborentur, calor febrilis mitigetur, alvus subducatur; Paræus vires Lentibus, ut fauces, laryngem, aliaque interanea a postulis & alvi fluxu defendant; Antonius Potus & Lazarus Riverius *Prax. Med. de Variol. & Morbill.* Lentes offerunt, ut sanguinis ebullitio primis diebus minuat, interiora corroborentur, materia ad cutem protrudatur. Alii plerumque præfici de Lentibus in variolarum curatione ne mentionem quidem faciunt, ut Vidius L. 6. *de Curatione generatim, cap. 6.* Fuchsius L. 5. *de Med. Morbill. c. 9.* Casp. Hoffmann. L. *de Med. Offic. S. Paulli Quadr. Botan.*

At alii, ut Cardanus, L. 2. *De tuend. sanit. c. 12.* Amatus Lusitanus,

in L. 2. *Dioscorid. enarration.* 101. Joann. Bapt. Sylvaticus *Contreterf. Med.* 92. Ranchinus *Tract. de Morb. Pueror. Lib. 2. Cap. 1.* Ludov. Septalius *Animadversion. & caution. medicar. Lib. 5. de Febris.* Melchior Sebizi *De Alimentis* a Lentibus plane abhorrent! Eas neque ut alimenta, neque ut medicamenta in variolis & morbillis, neque in pestilentibus morbis convenire pronuntiant. Non ut alimenta, quoniam ut supra ostendimus, stomachum gravant, ægre concoquuntur, prævum sanguinem generant, uno verbo naturæ molestæ sunt, eandemque in expellenda variolarum materia faciunt tardiores. Non etiam ut medicamenta conducunt; quia sanguinem incrassando, vialque per quas ad cutim meare tenetur, oppilando, variolarum & morbillorum eruptionem impediunt; quæ tamen omnibus modis promovenda est, jubente Avicenna, aut saltem non inhibenda; juxta Hippocratis *Aphor.* 20. S. 1. „Quæ judicantur & judicata sunt perfectæ, neque movere oportet, neque innovare, sive purgantibus, sive aliis irritamentis, sed sincere. Et *Aphor.* 21. S. 1. Quæ ducere oportet, quo maxime vergant, educenda, per loca convenientia. Frustra vero proferunt Lentium defensores, eas adstrictione sua viscera roborare, & proinde expulsionem materię morbificæ ad emundatorium universale totius corporis, cutim nempe juvare. His respondemus, quod si aliquando viscera adstrictione & roboratione indigent, illud non efficiendum Lentibus, edulius pravis & naturam gravantibus, sed aliis quæ meliora & naturæ magis amica sunt & id citra noxam præstare possunt, ut sunt radices Tormentiellæ, Bistortæ, Pentaphylli, Contrayervæ, Rosæ rubræ, Corallia, &c.

Externe Lentes in cataplasmatibus ad multa adhiberi solebant a veteribus. Hodie rarius adhibentur. Discutiunt & resolvunt. Lentium decoctum primum nonnullis variolarum pustulis adhibetur ad cutim laxandam, emolliendam, & pustularum suppurationem promovendam, earum ardorem & dolorem compescendum.

Lens palustris & Lenticula palustris, *Off.* Lenticula palustris vulgaris, C. B. P. 362. Lens palustris, J. B. 3. 784. J. Raii *Hist.* 117. Lens lacustris *Dod. Pempt.* 587. vulgo, *Lentille de eau ou de marais.*

Stagnantium aquarum incola eisdem innatat, veluti muscus quidam viridis, totam earum superficiem densissimo solorum minimo-rum, inferne nigricantium, superne virentium, nitidorum, orbicularum, Lentisque modo compressorum, stipatu obtegens, quæ inter se capillamentis tenuissimis, & alba arte revinciuntur, indemque ceu radicibus e limo adhærescente alimentum hauriunt. In lacubus, urbium fossis & aliis stagnantibus aquis innatans & late sæpe earum superficiem occupans reperitur. Flores & fructus, quibus carere videtur, nondum detecti sunt.

Analysi chymica, ex Lenticulæ palustris recentis ℥v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, sapore & odore herbam virentem referentis, obscure subfalsi ℥vij. ℥ij. gr. xxxvj. humoris limpidi, sapore herba-ceo, subfalsi ℔j. ℥xij. gr. xxiiij. humoris limpidi, subfalsi & leviter alcali urinosi ℔ij. ℥vj. gr. xij. humoris fuscii, empyreumatici, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥vij. salis volatilis urinosi concreti gr. xij. olei spissi syrupi ad instar ℥vj. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥ij. ℥v. quæ

rite

rite calcinata reliquit cinerum cærulescentium ℥ij. ℥iv. gr. xxxvj. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥v. gr. xlvij. extracta sunt. Partim Jactura in distillatione fuit ℥j. ℥ij. gr. ix. in calcinatione ℥j. gr. xxxvj.

Lenticula palustris salem essentialem obtinet niroso ammoniacalem cum oleo & multo phlegmate conjunctum.

Externe tantum ulsurpatur, incidit, resolvit, refrigerat, & dolores demulcet. Unde inflammationibus podagræ a causa calida, & ignibus sacris convenit sub forma cataplasmati imposita. Ad hæmorrhoidum dolorem compescendum Lenticulæ palustris duo manipuli cum Myrt hæ pulveratæ semuncia simul permixti in sacculo lineo includuntur, & liquore ex eodem sacculo stillante hæmorrhoides dolentes foveantur.

J. Rajus pro secreto ad icterum infusionem Lentis palustris in vino albo per novem dies quotidie mane ad ℥vj. pro dosi haustum proponit.

Lenticula palustris hernias intestinorum in pueris admota agglutinare dicitur. Ea vescuntur anates magna cum voluptate.

LEPIDIUM.

Lepidium duplex in Officinis usitatum, Lepidium vulgare, & Lepidium hortense sive Iberis.

Lepidium vulgare, *Off. Lepidium latifolium*; C. B. P. 97. *Inst. R. H.* 216. *J. Raii Hist.* 828. Lepidium Paulli, *J. B.* 2. 940. Lepidium Plinii, *Dodon. Pempt.* 716. Piperitis sive Lepidium vulgare, *Parkinson. Raphanus sylvestris Officinarum, Advers. Lobel. Icon.* 308. Raphanus sylvestris Officinarum, Lepidium Ægineæ Lobelio, *Gerard. vulgo, Passerage.*

Radix digitali crassitudine & major, alba, gustu acri, & calido, sed qui subito evanescit, sub terra reptat. Caules emittit plures, bicubitales, teretes, læves, medulla saccos, ramosos, minimo digito minores, glauco quodam polline, qui facile deergi potest obductos. Folia longa, lata, insecutum definitia, mali Citriæ similia, sed sæpius majora, molliora, glabra, pingua, obscurius virentia, per margines serrata, alternatim adnata; quæ e radice exeunt & in imo caule sunt pediculis longis suffulta. Flores in summis caulibus & ramulis pro plantæ proportionem minimi, cruciformes, quatuor petalis candidis constantes, conferti & copiosi, pediculis tenuissimis insident: ex quorum calyce surgit pistillum, quod deinde abit in fructum minutissimum, compressum, lanceiformem, apicem acuto, & apertio intermedio, cui valvæ adhærescunt, in duo loculamenta divisum, seminibusque fortum exiguis, oblongis, rufis. Tota planta acri sapore donatur. In fluminis Matronæ insulis uberrime crescit: Radices & folia in usum veniunt.

Analysi chymica, ex totius plantæ florecentis, deumptis radicibus, the. per vaporariam distillatis prodierunt humoris limpidi, sapore leviter acri pungente; obscure salis ℥ij. ℥viij. humoris limpidi, obscure acidi ℥ij. ℥vj. ℥v. Massa residua per retortam distillata præbuit humoris rufescentis, leviter empyreumatici, tum subacidi, intense austeri, tum salis ℥ij. ℥iv. humoris rufi, alcali urinosi, & sale volatili urinoso copioso imprægnati, cum salis volatilis concreti granis aliquot ℥j. ℥viij. olei adiposi ℥ij.

℥ij. ℥v. gr. xvij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥vj. ℥v. quæ per horas octo in crucibulo calcinata reliquit cinerum ℥ij. ℥iij. ex quibus salis fixi salis ℥j. gr. xxiv. cum pauca terra talcosa, lixivio sunt extracta. Partium iactura in distillatione fuit ℥ij. ℥iv. gran. liv. in calcinatione ℥iv. ℥iij.

Lepidii succus chartam cæruleam rubro colore tingit. Tota planta sapore donatur acri aromatico ad Piperis, & Sinapeos saporem accedente. C. Tournesortius salem ejus essentialem terræ foliæ tartari haud dissimilem arbitratur. Hunc ego vitriolico-ammoniacalem censo, cum oleo tenui acri & oleo crasso conjunctum.

Hæc planta viscidos corporis succos potenter incidit, hepatis & splenis obstructions aperit & ab Ettmullero inter primaria antiscorbutica medicamenta numeratur, ejus folia pro acuendis aquis, spiritibus, & essentiis antiscorbuticis cæteris plantis antiscorbuticis adjungunt. Cum spiritu vini ejus folia distillantur & essentialem præbent antiscorbuticam insignem. Præterea stomachicum est medicamentum egregium, quatenus pituitam viscidam ventriculi parietibus adhærentem incidit ac dividit. Folia jejuno ventriculo masticata languentem appetitum excitant, & ciborum concoctionem juvant. Hypochondriacis medetur affectionibus, quæ ab humoribus lentis ac viscidis in primis viis latitantibus dependent, eos incidendo, & abstergendo.

Coqui apud Danos, narrante S. Pauli Lepidii succum expressum aceto miscere solent vel ejus folia minutim concisa aceto inspergunt, ad intus carniū assatarum ex iis parandos.

Lepidii folia exsiccata, & pulverata ad ℥ss. ex vino sumpta quotidie mane jejuno ventriculo, urinas mire provocant & hydropicis conducunt.

Externe folia vel radices recentia cum butyro vel axungia trita ischiadicum dolorem levant. Inter rubefaciencia medicamenta recensetur; cutim enim irritando & vellicando, sanguinem, spiritus & humores e profundo ad cutis superficiem potenter attrahit.

Lepidium hortense, Iberis, Off. Lepidium gramineo folio, sive Iberis, *Inst. R. H.* 216. Iberioris latiore folio, C. B. P. 97. *Parkins. & Gerard. Emaculat. Iberis*, f. B. 2918. *Dod. Pempt.* 714. *Lepidium hortense*, *Anguillar. Iberis cardamentica*, *Advers. Lobel. vulgo*, *Passerage sauvage*, *Cresson. sauvage*.

Statim radice alba, lignosa, mediocriter crassa, paucis fibris donata plures proferre caules, didrantes & altiores, duros, frequentibus alis concavos. Folia quidem prima longis pediculis appensa semunciam lata, duas tresve uncias longa, per extremum serrata: superiora vero, & quæ in caulibus ramisque, Linarum foliis paria, angusta, acuta, nullo pediculo donata, nec crena ulla incisa. Flores extremis ramulis coarctati hærent candidi, tetrapetali, cruciformes, prioris Lepidii similes: sicut & fructus seminaque, Sapor omnibus plantæ partibus fervidus Nasturii. In incultis ruderalis & secus vias in meridionalibus Galliæ regionibus frequens nascitur. Hic in hortis colitur.

Iisdem principiis, virtutibusque cum priori convenit, & in ejus locum substitui potest. Commendatur potissimum ad dolorem ischiadicum. Radix recens contusa magna copia cum modica axungia, adhibetur toti cruri, & ma-

& maxime toxendici: sinitur per quatuor horas, deinde aufertur, & crus in balneo ponitur post inungendum ex oleo & vino, ac demum tersa pinguedine & sudore, tegendum molli lana ut æger ambulet.

LEVISTICUM.

Levisticum, Ligusticum foliis Apii, *Off.* Angelica montana perennis; Paludapii folio, *Inst. R. H.* 313. Ligusticum vulgare, an Libanosis fertilis Theophrasti, *C. B. P.* 137. Ligusticum vulgare, foliis Apii, *J. B.* 3. *P.* 2. 122. Levisticum vulgare *Dod. Pempt.* 311. *Gerrard. Parkins. J. Raii Hist.* 437. Laserpitium, *Ang.* Hippolelinum Matthioli, *Lug.* 703. Smitnium, *Lacur.* Laserpitium Germanicum, *Lobel. Icon.* 703. vulgo, *Li-vesche ou Acbe de montagne.*

Ab una radice grandi, torosa seu carnosa, restibili, foris nigricante, intus alba, plures non raro assurgunt ad hominis altitudinem proceri ac geniculati caules, crassi, interius inanes, striati, in ramulos nonnullos subinde divisi. Frondes pedales & ampliores, ex pluribus foliorum alis rursus divisorum constant, quorum extremæ divisiones ad folia Apii palustris aliquatenus accedunt, sed longe majores, marginibus incisæ, læves admodum ac resplendentes, obscure virentes, odore valido. Rami ut & summi caulis umbellas gerunt amplas florum rosaceorum, quinque petalis luteis ut plurimum constantium, in orbem positis, & insidentibus calyci qui deinde abit in fructum ex duobus seminibus compositum oblongis, crassiusculis, Apii semine majoribus, hinc gibbis, & striatis, inde vero planis, sordidi coloris. Tota stirps odorem sortem aromaticum, & medicamentololum spirat, sed semen graveolentius est. In hortis colitur. Tota planta in usum venit, sed præsertim semen & radix.

Analysi chymica Levistici radices, & semina plurimum olei tum tenuis essentialis, tum crassioris empyreumatici, humorem tum acidum, tum alcali urinofum, perparum salis volatilis urinofus concreti, & parum terræ præbuerunt. Saporem obtinent acrem aromaticum, subdulcem, odorem fragrantem non inoffensivum. Salem continet ammoniacalem multo oleo tenui & acri implicitum.

Levisticum alexipharmacum est, carminativum, diureticum, uterinum & vulnerarium. Nonnulli jubent radicem in aceto macerari, & masticari contra aerem infectum. Ventriculum roborat, ciborum concoctionem juvat, flatus discutit, viscidos humores attenuat, colicos dolores sedat; asthma subvenit, hepatis & lienis obstructions refert, in ictero specificè laudatur, præprimis quando a bile viscidiorè ortum habet. Constantibus a partu lochiis medetur sætum mortuum & placentam retentam ejicit. Radix pulverata ad ʒß. vel ʒj. exhibetur. Semen sisdem posset virtutibus, & a ʒj. ad ʒß. præscribitur. Forestus pro secreto habuit succum foliorum Levistici recentium in secundinis retentis: ad ʒij. solum vel cum aqua Artemisiæ propinabat. Hyeme vero semen in aqua Artemisiæ ad ʒß. confusum & aliquantisper ebullitum præscribit, & colaturam propinat. Foliorum Levisti vires luculento exemplo a Gabelchovero comprobantur. Honestissima quædam matrona, cum ex terrore filii in venatione interfecti men-

Si menses subito sisterentur, folia tantum pauca Levistici comedit. Unde, cum antea insigni dolore lumborum & uteri torqueretur, statim dolor omnis fuit mitigatus. Inde quoties menstruæ purgationes sibi fuerunt suppressæ, iidem via est cum felici successu.

24. Semin. Levistic. contus. ʒß. Contunde in folior. Levistici succi recenter expressi q. s. vel ʒiij. Macerentur per noctem. Fiat colatura mane propinanda ad reverentia lochia.

24. Rad. Levistici. ʒß. Rad. Mei, Zedoariæ, Zingiberis ana ʒij. Cinnamon. ʒiij. folior. Absinth. Meliss. ana M. j. cortic. Aurantior. Citrior. ana ʒß. Affonde vini generosi q. s. ad eminentiam trium transvers. digitor. Digerantur per novem dies. Fiat colatura bis in die propinanda ad ʒiij. in iustero a bile viticiore.

Extrinsecus ejus usus est in balneis, cataplasmatibus utero, & ureteribus dicatis, in emplastris vulnerariis.

Semen, narrante Ettmullero, intro sumptum, vel solum vel cum aliis medicamentis mixtum urinam nigro colore tingere dicunt.

Radix usurpatur in syrupo de Artemisia *Fernellii*. Folia in Emplastro Diabotano D. Blondel. *Collect. pharm.*

L I C H E N.

DUæ sunt plantæ sub Lichenis nomine in officinis usitatæ. Lichen Petræus dictus sive Hepatica fontana, de quo sub nomine Hepaticæ jam actum est; & Lichen arboreus seu Pulmonaria arborea, de qua sermo est.

Lichen arboreus, Pulmonaria arborea, *Off.* Licheo arboreus sive Pulmonaria arborea, *J. B.* 3. 759. Mucus Pulmonarius, *C. B. P.* 361. *Lobel. Icon.* 248. *J. Raii Hist.* 116. Pulmonaria, *Dod. Pempt.* 474. *Tragi* 324. Pulmonaria fungosa, *Lugd. vulgo*, *Pulmonaire de Chene.*

Annosis Quercuum, Fagorum, Abietum, aliarumque sylvestrium arborum caudicibus innascuntur in opacis ac densis sylvis, Hepaticæ fontanæ similis, sed major per omnia, squamato foliorum sibi invicem multipliciter implicatorum incubitu, ineffabili lacinarum variatione, profundiorum quam in Hepatica, aridior, asperior, corii fere modo densus lentusque, tota forma pulmonem exsiccatum aliquo modo referens, qua arborum cortici hæret albicans, altera vero parte vires, sapore amaricante non sine adstrictione. Flores ejus fructusque nondum innoruerunt. Observatur etiam adhærens saxi coacervatis in umbrosis jacenibus. Qui Quercubus adhæret, vulgo colligitur, nonnulli tamen eum qui Abietibus annosis adnascitur, Quercino anteponunt, ob resinosas quasdam paries quas a matre sua mutuari credunt. In sylvis San Germaniacis, & Fontis, bellaquei reperitur. Analysis chymica, ex Pulmonariæ quercinæ lbv. per vaporarium distillata prodierunt humoris limpidi, odore & sapore ingrato fungorum odorem referentis, obscure salis ʒxiij. gr. xlviii. Massa superstes per retortam distillata præbuit humorem rufescentem leviter empyreumaticum, obscure subalium, obscure subacidum & austerum ʒx. ʒi. humoris empyreumatici, rufi, obscure subalsi, obscuro-

obscure acidi, impense austeri ꝑ. xxiij. gr. xxvij. humoris empyreumatici, rufescentis, urinosis, sale volatili urinoso copioso imprægnati ꝑ. Zvj. gr. xxxvj. olei fluidi ꝑ. vij. ꝑ. gr. lx. Massa nigra in retorta residua pendebat lbj. ꝑ. v. Zvij. Rara erat, levis & ignariam fungosam materiam referebat qua ad ignem excitandum utuntur, vulgo „*Amadou*“, dictam. Hæc massa pruna candente accensa paulatim (intra 10. horarum spatium) in cineres fusclos redacta fuit, qui ꝑ. pendebant. Cineres illi iterum in crucibulo per sex horas calcinati leucophæi facti sunt & ꝑ. Zij. ꝑ. xliij. gr. xlvij. pondus reliquerunt; ex his salis fixi salis ꝑ. gr. xl. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ꝑ. xij. ꝑ. gr. xliij. in calcinatione lbj. ꝑ. xij. gr. xxiij.

Lichen sapore amaro adstringente donatur. Salem essentialem obtinet vitriolico ammoniacalem multo oleo crasso & terra implicitum.

Siccatur & adstringit: unde sanguinem profluentem compescit, vulnera recentia glutinat, alvum ac menses sistit. Dodonæus refert pastores & Mulo Medicos quosdam hujus pulverem, addito sale, utiliter ovis & aliis pecoribus tussientibus & difficiliter respirantibus exhibere. Prodesse hinc & hominibus posse crediderunt. Ad pulmonis ulcera sanguinisque spurationem perquam utilis deprehenditur. Pulvis exhibetur ad ꝑ. Decoctum vel infusum ad ꝑ. vi. Angli, narrante J. Raio, ad phthisim & tabem eo utuntur non sine successu, confecto ex eo pulvere, syrupo, aut aqua distillata.

Lichenem qui Quercui innascitur in ictero omnium Medicorum solertiam eludente efficacem remedium esse Jacobus Breynius scribit multis experimentis comprobatum, *In Ephemeridibus Germanicis ann. III. observat. 290.* & potissimum curatione cujusdam matronæ Andree Golii mæcaris uxoris ictero pene biennium consistatæ. Corpore prius purgato de hoc musco accepit manipulum unum cum libra una cerevisiæ secundariæ. Hæc simul in olla rite oclusa ad dimidium decoxit: postea tredecim cochlearia tepida mane atque vespere hausit, & intra quinque aut sex dierum spatium curata fuit.

ꝑ. Pulmonar. arboreæ, folior. Tussilag. ana M. j. Liquir. ras. & confus. ꝑ. Coq. & bulliant in aq. comm. lbj. ad lbj. Colaturæ adde syrupo de Hedera terrestri ꝑ. Dividatur in quatuor doses quarta quaque hora propinandas. In hæmoptoe aut pulmonum exulceratione.

Externe Lichen exsiccatus & pulveratus vulneribus inspersus sanguinem sistit.

L I G U S T I C U M.

Sub Ligustici nomine duæ plantæ in officinis occurrunt, Ligusticum vulgare foliis Apii seu Levisticum de quo jamjam egimus, & Ligusticum quod Sefeli, *Off. de quo nunc agemus.*

Ligusticum, Sefeli & Siler montanum, *Off. Ligusticum quod Sefeli officinarum, C. B. P. 162. Sefeli sive Siler montanum, vulgare, f. B. 3. P. 2. 168. Siler montanum, Dod. Pempt. 310. Siler montanum officinarum, Lobel. Gerard. J. Raii Hist. 439. vulgo, Lrvesche, Sefeli commun, Sermontaint.*

Radix magna comæ infimum caulem ornat, rugosa, digitali crassitudine, albi-

albida, odorata, in altum descendens. Caulis tenuis, geniculatus, ramifusus, humanam superat altitudinem, caulem ramosoſque frondium pediculi palmares aut ſequipalmares amplectuntur, in alas oppoſitas diviſi, quorum ſegmenta extrema, terna ſere ſemper ab uno pediculo cohærent, Triſolii aut Meliloti foliorum inſtar, oblonga, latiſcula, mucrone leviter obruſo, nonnihil, ſi conſciſcentur, odorata, umbellæ latæ, amplæ flores roſaceos proferunt quinque petalis conſtantes candidis, in orbem poſitis & inſidentibus calyci qui abit in fructum oblongum ut Fœniculi ſed longiorẽ & craſſiorem, compoſitum ex duobus ſeminibus oblongis, hinc gibbis & ſulcatis cum liſis (a) veluti foliaceis, inde vero planis, ſapore acri ſubamaro, aromatico veluti ex corticibus Aurantiorum & Cymino mixto. In meridionalibus Galliæ regionibus ſponte naſcitur. Illic colitur in hortis. Semen in uſum venit.

Analysi chymica, Ligustici ſemen præter humorem tum acidum tum alcali urinoſum, non mediocrem olei eſſentialis tenuis acris & olei craſſi empyreumatici portionem præbet.

Humores craſſos ac viſcidos dividit, ciborum concoctionem juvat, ſtatus diſſipat, urinam & menſes promover, doloribus poſt partum medetur, nephriticis ſubvenit, arenulas pellit. Pulvis ad Ꝟß. exhibetur, vel inſuſum in vino. Dauci & Seſeleos Maſſilienſis ſeminibus ſubſtituitur quibuſcum viribus convenit, ſed inferioribus, utpote acrius & minus fragrans.

Ligustici ſemen uſurpatur in Eleſtuar. de baccis Lauri.

L I G U S T R U M.

Ligustrum, Off. Ligustrum, J. B. 1. 528. Inſt. R. H. 596. & J. Raii Hiſt. flor. 1603. Ligustrum Germanicum, C. B. P. 475. Phillyrea, Dod. Pempt. 775. vulgo, Troefne.

Frutex eſt arboreſcens, radices hinc inde per obliquum ſpargens, crebris virgis lentis & in ramos diviſis conſtans, cortice cinereo obſectis, materie albida, dura. Folia bina adverſo ſitu ex intervallis oriuntur, oblonga, anguſta, figura ad Salicis folia quodammodo accedentia, ſed breviora craſſioraque, atrovirentia, lævia, nitentia, guſtu acri & ſubamaro non ſine aſtrictione. Flores in ramorum ſummis proſert, racematim congeſtos, monopetalos, infundibuliſformes, in quatuor, quinque vel ſex partes diviſos, candidos, ſuaviter olentes, quorum in medio ſurgunt apices ex luteo herbidi & piſtillum viride, quod abit in fructum ſeu baccam mollem, ſere globolaſam, Juniperinis æqualem, lævem, initio virentem, per maturitatem nigricantem, ſucci plenam amari ac injucundi, quamvis nonnullis aliquid dulcedinis habere videatur, ſeminibuſque ſcetam ut plurimum quaternis hinc gibbis, inde compreſſis, cortice ſpadiceo, carne exalbida, digitorum levi preſſu fragilem. In ſylvis, vepretis & ſepibus frequens naſcitur. Frutex propter lenta & flexibilia vimina, ſurculoſque denſos, & ſolia hilare virentia ad topiarias ſcenas expetitur, quas non inelegantes conſeſcit. Folia, flores, & fructus in uſum medicum veniunt.

Analysi chymica, ex Ligustri ſorum ꝑiij. Ꝟv. per vaporarium diſtillatis pro
dic-

(a) Lira Sillon, cruce ou arrete.

dierunt humoris primum odorari, obscure subacidi, deinde inodori, manifeste acidi, & subausteri, ℞ij. ℞x. ℞ij. per retortam vero humoris tum acidi, subausteri, tum salis & alcali urinosi ℞vij. ℞v. olei spissi ad instar syrupi ℞iij. ℞vj. gr. xxxj. Massa nigra in retorta residua pendebat ℞vij. ℞ij. quæ per 25. horas calcinata reliquit cinerum ℞j. ℞ij. gr. xij. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℞ij. extractæ sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℞v. ℞v. gr. xlj. in calcinatione ℞vij. gr. lx.

Ex Ligustri summis ramulis foliosis virentibus & recentibus ad ℞v. per retortam distillatis prodierunt humoris primo limpidi inodori & insipidi, deinde subrufescentis & subacidi ℞j. ℞xij. ℞v. gr. lxxvj. humoris rufi, empyreumatici, impense austeri ℞j. ℞vij. gr. xxxvj. humoris rufi tum impenie acidi, austeri, tum salis, alcali urinosi, ℞xij. olei spissi, aqua gravioris ℞ij. ℞ij. gr. xxxvj. Massa nigra in retorta residua pendebat ℞ix. ℞ij. gr. xlij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℞ij. gr. xxx. ex quibus salis fixi mere alcali gr. xlij. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℞vij. ℞ij. gr. xxxv. in calcinatione ℞vij. ℞vij. gr. xij.

Ligustri folia amara sunt & styptica, chartam cæruleam subrubram efficiunt: flores vero & fructus eandem magis rubram reddunt. Salem essentialem tartareo-aluminosum obtinent multo oleo implicitum. Idem sal in floribus magis evolutus est & magis ad ammoniacum vergit, plus enim humoris urinosi præbent: unde folia magis adstringunt, flores vero magis abstergunt.

Inteine vix aut rarissime in usum veniunt. Succus tamen florum & foliorum ad ℞iij. aut eorundem decoctum ad ℞vj. vel octo commendantur a nonnullis adversus hæmorrhoidism, hæmorrhagias quascumque & album mulierum fluorem.

Externe utiliter usurpantur in oris exulceratione, inflammatione & excoriatione faucium & uvulæ, uti contra ejus laxationem & procidentiam, item in aphthis exulceratis faucium & ulceribus gingivarum sub gargarismatis forma. In scorbutica gingivarum laxitate decoctum foliorum & florum cum aqua ferrariorum cum tantillo aluminis in ore detentum admodum juvat, necnon in pudendorum excoriationibus & ulciculis. Etmulterus ad faucium excoriationes & ulcera, foliorum & florum decocto Rob nucum diluit. vel tincturam Bellidis & rosarum addit. Simon Paulli ad narium ulcicula sequens medicamentum commendat.

℞. Aquar. stillatitiar. Ligustri, Solani ana ℞j. Sacchar. candi ℞ss. Sacchar. saturni ℞j. Caphuræ gr. vij. Misce. Abluatul ulceris.

℞. Decoct. folior. & flor. Ligustr. ℞vij. Mellis rosati ℞j. sp. Vitrioli guttas xx. Fiat gargarisma in faucium exulcerationibus, & aphthis.

In Ephemeridibus German. ann. 4. append. p. 31. referunt mulierem quandam oleum parare ex floribus Ligustri in vitro soli expositis cum olei olivarum tantillo, qui colliquati in balsamum verrebantur, quo in Italia magna fama utebatur ad scrophulas & ulcera quævis putrida.

L I L I U M.

Lilium candidum, *Off.* Lilium album, vulgare, *J. B.* 2. 685. *Infl. R. H.* 369. Lilium album, flore erecto & vulgare, *C. B. P.* 76. Lilium candidum, *Dodon. Tempt.* 197. Lilium album Gerardi, *J. Raii Hister.* 1109. Ambrosia sive Lilium album Nicandri, *Anguillar* : vulgo, *Lis blanc.*

Ex radice bulbosa, ex plurimis squamis carnosissimis simul unitis & axi affixis constante, & subius fibris quibusdam donata, caulem surrigit rectum cubitalem & sesquicubitalem, singularem, teretem : cui ab imo ad summum adnata folia nullo pedicelo, oblonga, & latiuscula, carnosa, lævia in herbaceo & diluto virore splendentia, versus summum caulem sensim minora & angustiora, odore carnem Vervecinam elixam, si digitis fricentur, quodammodo referentia. Flores in scapo serie quadam plures, non eodem tempore panduntur pulcri, candidi, odorati, seris, pinguibus repandis foliis campanam vel calathum quodammodo imitantes, quorum medietatem occupat pistillum longiusculum, trifidum, ex albo viridans & stamina, foliis numero & colore paria, quibus apices insident crocei. Pistillum abit deinde in fructum oblongum, trigonum, in tria loculamenta divisum, seminibusque sætum subruis, quasi marginatis, gemina serie sibi incumbentibus. Succo lento & glutinoso folia, caules & bulbi redundant. Ad hortorum ornamentum, ob elegantiam formæ & suavitatem odoris eximiam apud nos colitur. In Syria sponte nasci dicitur. Flores & bulbi ad medicos usus adhibentur.

Analysi chymica, ex bulbis præter phlegma primo insipidum & inodorum, deinde subsalsum, empyreumaticum, tum acidum, tum alcali urinosum, nonnihil salis volatilissimum urinosis concretis, parum vero olei, salis fixi & terræ extractum fuit.

Ex floribus vero humor primum odoratus, deinde acidus & nonnihil subsalsus & urinosus subausterus extractus fuit : parum vero olei & salis fixi mere alcali.

Liliorum bulbi succo mucoso abundant : salem obtinent ammoniacalem multo phlegmate dilutum, & cum mediocri conjunctum portione olei quocumque sal ille mucaginem constituit blandam, a qua vis eorum præcipua pendet. In floribus tenuior est mucosa illa substantia.

Liliorum floribus vis anodyna. Externe tantum, rarissime interne usurpantur. Dolores demulcent, digerunt & maturant ; unde in cataplasmatibus emollientibus, demulcentibus, maturantibus & suppurantibus nonnumquam adhibentur, necnon etiam in decoctis emollientibus pro clysteribus. Oleum in officinis ex floribus per insolationem paratum servatur. Dicitur oleum Liliorum vel Lirium, crinimum & lulinum. Cavendum ne diutius flores in oleo relinquantur : cum enim tota planta turgeat succo mucagineo, facile putrescunt, & oleum jam redolet non Lilia, quæ prima bonitatis nota est, sed grave & foetidum quid. Sufficit igitur triiduum, quo exacto, alii imponantur flores, tum denique iterum alii. Sufficit enim tertium repetiisse. Illud oleum frequentissimi est usus in doloribus & tumoribus quibuscumque. Tensa remittit, dura emollit, dolores sedat

sedat. Speciatim ad uteri duritiem emolliendam commendatur. Digerit etiam, & maturat; unde in cataplasmatibus emollientibus, aut maturantibus adjicitur ad confidentiam ipsi conciliandam, vel pars affecta hoc oleo prius inungitur quam cataplasma admoveatur.

Ex Liliorum floribus aqua odora per baln. mariz distillatur. A nonnullis ad partum juvandum, & secundinas pellendas commendatur intus sumpta. Ab aliis in pulmonum affectibus, asthmate, & tussi præscribitur. Sed frequentioris est usus externi ad virguncularum faciei nitorem conciliandum, & maculas ejus detergendas. Ad id enim utilis est, si præsertim salis tartari cantillum in ea dissolvatur.

Bulborum usus internus nullus est, aut rarissimus, externus frequentissimus cum sit ex primariis emollientibus, maturantibus, & suppurantibus. Hic nullum fere cataplasma ad abcessuum maturationem, & suppurationem promovendam conficitur cui recentes Liliorum alborum bulbi cocti non admisceantur.

℥. Bulbos Lilior. albor. n. iiii. Radicum Althææ minutim incisar. ℥ij. Folior. Malvæ, Althææ, Senecionis, violariæ, Parietar. & Brancæ ursinæ ana M. j. Coquantur ex arte in aq. comm. q. l. ad putrilaginem usque; deinde contundantur in mortario marmoreo, & per cistrum trajiciantur. Pulpa secreta cum sarinæ Lini, Fœnu Græci, & olei Liliorum ana ℥ij. coq. igne lentio assidue agitando ad debitam spissitudinem pro cataplasmate emolliente, & maturo ante.

℥. Bulbos Lilior. albor. sub cineribus coctos, & confusos n. ij. Folior. Oxalidis M. ij. cum axunginæ porcine q. l. coctos ad debitam spissitudinem. Misceantur pro cataplasmate suppurante.

Nonnulli ad ambusta commendant cataplasma ex bulbis Liliorum sub cinerem coctis, confusis, & cum oleo nucum mixtis.

Guillelmus Goderus Elisabethæ Reginæ Chirurgus, referente Gerardo multis hydropes laborantes sanavit bulborum Liliorum alborum succo cum farina hordacea mixta; pane scilicet ex istiusmodi massa confecto, ægro per mensem aut sex hebdomadas continuas exhibitio: quo solo, & non alio pane per totum id tempus vesceretur.

Antheræ seu flavi staminum apices a nonnullis laudantur ad menses provocandos, ad partum accelerandum, sætum mortuum rejiciendum & secundinas pellendas. Pulveratæ propinantur cum croco, & aliis in aqua Verbenæ. Artemisiz aut quocumque alio vehiculo idoneo. De qua tamen efficacia Etmullerus valde dubitat.

Oleum Liliorum usurpatur in emplastro de mucaginibus, & emplastro de Ranis cum Mercurio Ph. Reg.

LILIUM CONVALLIUM.

Lilium convallium, Off. Lilium convallium album, C. B. P. 304. *Inf.* R. H. 77. Lilium convallium vulgo, J. B. 3. 531. Lilium convallium. *Dodon. Pempt.* 205. *Oerard. J. R. Hist.* 667. Lilium convallium flore albo, *Parkins*: Lilium convallium vel vernum Theophrasti, *Adv. Lobel*: Ephemerum non letale, *Fuchs*: Gallionymus Chamæcitinus, *Gesneri*: vulgo, *Muguet ou Lys des vallées*.

Grosses Tom. II.

Bb

Ra;

Radice tenui, alba, fibrata reperit summam tenui inhaerens: folia proferturina ternave, ex oblonga forma in acumen ducta apiculipalmaria, duas uncias lata, nitida, late virentia, nervosa, quæ sub basi convoluta sese excipiunt. Hæc inter caulis affurgit spithameus, gracilis, angulosus, nudus; a cujus medio ad summum longa serie flores per intervalla nascuntur in unam fere partem vergentes, brevibus pediculis pendulis, & nuntantes, monopetali, campaniformes, candidi, odorem suavissimum spirantes, & in quinque vel sex segmenta divisi, cum totidem fluminibus ex herbido, luteis, fundo adnatis, & pistillo triquetris, quod ab his fructum sphericum, mollem, rubrum, pulpa plenum, & seminibus sætum duris, quasi corneis, & amaricanibus. Nascuntur sepibus, & dumeris umbrosis, & fruticosis. Flores in usum veniunt, rarissime radices.

Analysi chymica, ex floribus recentibus lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, odorem florum referentis, obscure subfalsi, obscure alcali, & obicure subacidi lbj, ℥xij. ℥vij. gr. xx. humoris limpidi, manifeste acidi magis ac magis impense, austeri lbj. ℥vi. ℥v. gr. lvij. humoris rufi, empyreumatici, impense acidi; subfalsi, alcalini, & vinosi, & impense austeri ℥j. ℥vi. gr. l. humoris rufi, expyreumatici, & sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥i. gr. xvij. salis volatilis urinosi concreti ℥j. gr. x. olei adiposi ℥ij. ℥iij. gr. iij. Massa nigra in retorta superstes pendebat ℥iij. ℥iij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥j. gr. xvj. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥v. extractum sunt. Partium iactura in distillatione fuit ℥vj. ℥vj. gr. lvij. in calcinatione ℥iij. ℥ij. gr. lvj.

Flores Lilii convallium odorem fragrantem, & suavissimum spirant; saporem referunt amaricantem: exsiccati vero, pulverati, & naribus immixti pituitariam membranam adeo stimulant ut sternutamenta plurima excitent. Licet flores illi valde odorati sint, Ettmullerus observat, odorem eorum particulas in oleum essenziale nulla arte redigi posse. Observat insuper flores simpliciter distillatione absque prævia fermentatione phlegma præbere minus odorem quam si prius fermentati fuerint. Nam post fermentationem spirituosum liquorem fundunt subtilem, fragrantem. Quin etiam odorem suum magis expandunt, eodem norante, si recentior collecti in spiritu vini rectificatissimo macerentur, & distillantur. Ex his, & ex analysi instituta concludendum est hos flores saltem essentialem vitriolicam-ammoniacalem obtinere cum multo oleo acris, & spisso conjunctum: sed præterea inesse magnam copiam olei tenuioris, fragrantis, & summe volatilis, quod quidem in simplici distillatione pro majori parte avolat, & phlegmate coerceri nequit, quod contra cum spiritu vini facillime coadunatur, aut quod cum oleosis crassioribus eorundem florum partibus fermentatione evoluit, & attenuatis consociatum remanet, & cum iisdem spiritum ardentem constituit odoratissimum.

Lilii convallium flores inter cephalica medicamenta, & nervina primas tenent. In apoplexia, epilepsia, vertigine, convulsionibus, paralyti, catharris & aliis frigidis capitis morbis utiles habentur. Nerveas enim fibras laxas nimis, & flaccidas firmant ac roborant, earum oscillationes blanda vellicatione vividiores reddunt, & cerebri tonum restituunt, spirituumque motum tardiores aut interruptum suscitant, cum interne,

Al. ment. & spiritum

eum externe adhiberi, florum pulvis ad ℥i. aut conditum ad ℥ss. exhibetur. Vel ex his distillata aqua simplex, & spirituosæ præparantur. Aqua simplex distillata ex floribus recentibus, & rose matutino adhuc madidis per vaporarium extrahitur, & novis affunditur floribus ac distillatur, quod toties repeti debet, donec aqua obtineatur fragrantissima, quæ servatur pro vehiculo medicamentorum cephalicorum, & debilioris est efficacæ. Spiritus vero plurimum commendatur adversus easdem affectiones quibus flores conveniant. Duplici modo conficitur. Flores recentem collecti in spiritu vini immerguntur, & in vaporario blando calore distillantur. Spiritus inde distillatus novis floribus affunditur, & iterum distillatur, idque ter quaterve reiterando, sic obtinetur spiritus valde laudabilis. Alii flores ad fermentandum in vase clauso committunt donec odorem vinorum penetrantem acquirant, & spirituosum liquorem inde distillant novis floribus affundendum, & abique fermentatione distillandum. Aqua distillata ad ℥iij. spiritura ad ℥j. exhibentur. Cum eodem spiritu Ambrae griseæ affuso sit tinctura vis essentialis Ambrae quæ in omnibus virium deflectionibus, subitaneis cerebri affectibus plurimum commendatur: necnon inter aphrodisiaca præstantiora recensetur.

S. Paulli commendat tincturam Castorei cum spiritu Liliorum convallium pararam adversus paralysem, si ea spina dorsa nucha ad coccygis os usque inungatur, necnon etiam enormes cessasse puerorum epilepsias asserit spinæ admois linteis hac tinctura madentibus.

Idem Simon Paulli monet in affectionibus cerebri inflammatoriis ab horum spirituum usu interno abstinendum esse, ne, ut ait, camino infundi oleum videatur.

Camerarius floribus vas vitreum angustæ orificii replet, & rite obturatum in æcerum formicarum per mensem recondit. Putrefactione colliquefunt. Liquorem inde collectum instar olei sedandis doloribus podagricis ischiadicis, & similibus affectibus exterius adhibitum perutilem asserit.

In Germania alicubi conficiunt ex floribus per æstatem siccatis vinum vindemiarum tempore, ipsos calcatis uvis admiscentes, quo postea utuntur ad eosdem affectus quibus aqua, & spiritus conveniunt.

Externe flores exsiccati, & pulverati inter errhina, & sternutatoria blanda adhibentur. Fit quoque ex radice pulverata blandum sternutatorium sed minus usitatum.

24. Flor. Cyani ℥iij. Florum Consolidæ regalis specierum colore diversarum, florum Pæoniæ, Balusticorum, & Rosar. ana ℥iij. Flor. Calendulæ, Anthon. Rosar. ana ℥ij. Florum Lilior. convallium radic. Calami aromar. Florum Caryoph. hortens. ana ℥j. Omnia rite in umbra exsiccata, & minutissime concisa misceantur, & fiat pulvis sternutatorius colorum varietate elegantissimus.

25. Flor. Lilior. convall. exsiccat. folior. Betonic. Majoranæ exsiccat. ana ℥j. Rad. Irid. Florentin. ℥ss. Caryophyllor. aromaticor. ℥ss. M. F. pulvis crustulosus pro errhino summis digitis per vices naribus attrahendo. Cui addi possunt Nicotian. pulv. ℥j. Hellebori alb. & Zingiber. ana ℥ss. si cerebrum potentius succutiendum sit in apoplecticis, & soporosis affectionibus.

24. Pulver. de Guttera ʒj. Syrup. Stœchad. & sp. Lilior. convall. ana ʒj. Aquar. Flor. Lilior. convall. & flor. Tiliæ arbor. ana ʒiij. Tinctur. Castor. gutt. xx. Spiritus cornu cerv. Succinati ʒj. M. F. porio cochlearum sumenda in convulsionibus spasmodicis, & hystericiis affectionibus.

24. Conserv. flor. Lilior. convall. flor. Salv. & Roris-marin. ana ʒ6. Pulver. Millep. & Viperar. ana ʒij. Rad. Valerian. sylvestr. & Seminis Eruc. pulv. ana ʒij. Syrup. de Hyssop. q. s. M. F. electuar. Dosis ʒj. bis in die, in paralyti incipiente.

Flores Lili convall. usurpantur in pulvere antiepileptico Pb. Reg. in pulvere sternutatorio, & cephalico ejusdem.

L I N A R I A.

Linaria, & Linaria lutea vulgaris; *Off.* Linaria vulgaris, lutea, flore majore, C. B. P. 212. *Inst. R. H.* 170. Linaria lutea vulgaris, J. B. 3. 456. J. Raii *Hist.* 752. vulgaris nostras *Parkins*: Linaria prima, *Dodon. Tempt.* 183. Ocyris, *Matthiol. Fuchs*: Ocyris major, *Tabern. Icon.* 826. vulgo, *Linare* ou *Lin sauvage*.

Radibus albis, duris, lignosis, sub terra reptando immensam se propagat, si locus suppetat. Caules ex eadem radice plures surrigit pedales aut cubitales, rotundos, glabros, glaucos, summa parte ramulos, foliis vestitis crebris, nullo ordine positis, angustis, acutis, Pityusæ similibus, adeo ut nisi lac deesset, difficile foret distinguere, antequam floreat planta. Flores in seminis caulibus, & ramulis velut in spicas aut thyrsos digesti, singuli pediculis brevibus e foliorum alis egressis insident monopetali, anomali, personati, lutei, posterius in caudam seu calcar aut corniculum oblongum, acutum *Consolidæ regalis* in modum producti, quo ab *Antithini* floribus differunt, quibus alias per similes sunt, antequam in duo labia divisi, quorum superius in duas velut auriculas dividitur, inferius vero tritariam secatur. Ex calyce autem parvo, & quinquepartito surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum, quod deinde abit in fructum bicapsularem, seu testam subrotundam, septo intermedio in duo loculamenta divisam, & per maturitatem in duas carinas dehiscens, seminibusque foetam compressis, orbiculatis, marginatis, nigris. Sapor plantæ amariusculus, & subæris. In arvis, ad agros margins, & in pascuis sterilioribus frequens occurrit. Herba integra in usum venit.

Analysi chymica, ex Linariæ floridæ ℥v. per vaporarium distillatis prodierunt humoris limpidi, saporis herbacei, obscure subacidi ℔j. ʒij. ʒvj. humoris limpidi, manifeste acidi, obscure subausteri ℔ij. ʒij. ʒvij. residua massa per retortam distillata præbuit humoris empyreumatici, tum acidi austeri, tum leviter alcali urinosi ʒv. ʒij. gran. xiiij. humoris rufi, sale volatili urinoso imprægnati ʒv. gran. l. olei adiposi ʒij. ʒiij. gran. xliij. Massa nigra in retorta residua pendebat ʒvij. ʒiij. gran. xij. quæ per 18. horas calcinata reliquit cinerum ʒj. ʒvj. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ʒij. gran. xij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ʒvij. ʒij. xxiiij. in calcinatione ʒv. ʒvj. gr. xij.

Li-

Linaria herbaceum, subsalsum, amariusculem saporē refert: inter digitos contrita Sambuci odorem spirat, charta cœrulea a foliorum succo non mutatur, verum a florum humore rubens efficitur. Salem falsum tartareum nonnihil vitriolicum obtinet mediocri terræ portione implicatum & cum oleo crasso oleorum scætidorum distillatorum simili & copioso conjunctum & involutum. Sal ille magis explicitus est in floribus quam in foliis.

Hæc planta ratione olei sui potenter resolvit, emollit, ac demulcet. Sanguinem, lympham aut alios succos intra tenuiora vasa concretos, vel inter partium fibras effusos, stagnantes & inspissatos dividit, eorum acrimoniam demulcet, salina eorum spicula involvendo, nimis tenfas partium fibras laxando dolores sedat.

Ad internum usum raro usurpatur. Alvi turbatrix est, auctore Trago. Urinam tam potenter pellit, ut inde *Hærnkranz* Germanis, Botanicis quibusdam urinæ & urinaria dicatur. Aquæ ex *Linaria* distillatæ haustum cum ℥i. corticis Ebuli exsiccati & in pulverem tenuissimum redacti, idem Tragus potentissime urinam pellere asserit, usque adeo ut solis hydropicis sit propinandum. Eadem aqua distillata ac pota alvum laxat, sudores movet, secur obstructionibus liberat, morbum discutit regium, adverius quem herbæ decoctum ex vino paratum in primis facit, notante eodem auctore. Nonnulli, referente Simone Pauli, ad dissolvendum illorum sanguinem, qui ex alto deciderunt, illius decoctum propinant.

Externe *Linaria* insigne est anodynum medicamentum, quo vix præstantius ad hæmorrhoidum cæcarum dolores mitigandos datur & ab omnibus laudatur quocumque modo adhibita: nimirum si *Linaria* integra, vel flores ejus, vel sola, vel cum Camomilla aut Verbasco floribus coquatur in lacte quo pars dolens foveatur, vel si recentes hæ plantæ contendantur & cataplasmatibus in modum applicentur.

Magnopere celebratur unguentum vel linimentum de *Linaria* in hæmorrhoidibus dolentibus, si e *Linaria* recenti florida cum axungia porcina aut butyro non salito, in mortario plumbeo contusis & cum pauca camphora fiat cataplasma vel unguentum. Alii *Linariam* virentem cum floribus cum adipe porcino decoquunt, quousque adeps valde vire scat, fiatque unguentum, cui expresso & refrigerato applicationis tempore vitellus ovi admisceatur. A nonnullis hoc unguentum præstantius habetur, si prius in adipe suillo alicui aut scarabæi decoquantur.

Linaria, succus ejus aut aqua distillata quævis ulcera mundant, cujusmodi sunt cancer aut fistulæ, & erysipelatis medentur, limbeculis impostæ, aut si aqua aut succo loci affecti colluantur.

Idem succus maculas & vitia faciei emendat; quare a mulierculis quibusdam experitur. Aqua distillata oculis indita eorum ruborem & inflammationem tollit.

Sunt qui herbam hanc intra calceos plantis pedum supponunt ad febrem quarianam abigendam.

LINGUA CERVINA.

Lingua cervina, Phyllitis, Scolopendrium vulgare, Scolopendria vulgaris, Off. Lingua cervina officinarum, C. B. P. 353. & Inst. R. H. 544. Phyllitis sive Lingua cervina vulgi, J. B. 3. 756. Phyllitis vulgaris, Clus. Hist. 213. Phyllitis Gerardi, J. Raii Hist. 134. Scolopendrium Brunfelsi; Scolopendria vulgaris, Tragi 549. vulgo, *Langue de Cerf* ou *Scolopendré vulgaire*.

E capillaribus radicibus nigricantibus, numerosis, implicitis, cum foliorum vestigiis connexis, folia fundit dodrantalia aut sesquidodrantalia, duas uncias lata, in principio aurita, acuminata in extremo, late virentia, glabra, & pediculo palmari insidentia in costam mediam abeuntia. Floribus carere videtur; at capsulas plurimas; prosert in fœcis semineuncialibus aut majoribus foliaceis qui occurrunt in foliorum dorso primum virentes, per maturitatem rufi, dum nempe rumpuntur & capsulae membranaceæ rufæ sese exerunt. Minutissimæ quidem sunt hæ capsulae: sed ope microscopii facile percipiuntur. Singulae annulo elastica vi donato muniuntur, cujus contractione vel exsiccatione rumpuntur, semenque pulverulentum & copiosum quod continent hac illac ejaculant. Nascitur in puteis & fontibus inter lapidum commissuras; & in rupibus udis ac umbrosis. Herba integra usitata est.

Analysi chymica, ex foliorum recentium Linguae cervinae lbv. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, fere inodori, sapore subacri, obscure subacidi lbj. ℥vij. gr. lx. humoris magis, ac magis acidi manifeste, deinde magis ac magis austeri lbij. ℥ij. gr. xxxv. humoris rufescentis, tum acidi/austeri, tum sale volatili urinoso imprægnati ℥ij. ℥vj. olei adiposi ℥j. ℥vj. gr. xij. Massa nigra residua pendebat ℥vij. ℥v. gr. xxxv. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥vj. gr. xlvij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥j. gr. liij. lixivio sunt extracta. Pantium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥ij. in calcinatione ℥v. ℥vj. gr. xxiii.

Planta sapore acerbissimo donatur & odorem nonnihil graveolentem herbarum spirat. Salem essentialem obinet vitriolico tartareum ac salem mirabilem Glanberi accedentem cum multo oleo spisso bituminoso & pauca terra adstringente conjunctum.

Lingua cervina siccatur & adstringit. Adstrictione sua viscerum tonum firmat & roborat; unde in eorum obstructionibus plurimum commendatur; & lieni tumido potissimum dicatur, cujus intumescantiam minuire dicunt. Insuper sale suo salso digestivo spissos humores & concretos dissolvit, obstructions referat, & oleo bituminoso non solum sulphurea concreta discutit, sed humorum acrimoniam nonnihil demulcet, salium spicula irriterendo. In morbis chronicis & affectionibus hypochondriacis admodum utilis est. Alvi profluvia sistit; sanguinis exspuitioni medetur; necnon etiam thoracis quibusdam affectionibus succurrit; laxiorem pulmonis tonum firmando, & ejus glandularum infarctum discutendo. Extrinsecus vulnera & ulcera mundificat & exsiccatur. Cum aliis plantis Capillaribus confociari solet, quæ sunt Polytrichum seu Trichomanes, Capillus veneris, Adiantum vulgare, Salvia vitæ seu Ruta muraria, Asplenium seu Ceterach. In decoctis & jusculis aperientibus, thoracis & vul-

vulnerariis usurpatur. In Germania, referente S. Paulli, cerevisia Phylitide condita 1010 anno omni die usurpatur ad tamidos lienes & hypochondriacos affectus.

In incipientibus hepatis & lienis obstructionibus, vel etiam in pulmone infarctu hujus plantæ infusum in aqua tepida utiliter pro potu solito præcibitur. Ad obstructiones potentius discutendas & resolvendas sales digestivi ut Tartarum vitriolæum, Tartarum solubile, Nitrum &c. ipsi confociantur: & præstantius adhuc ejus decoctum vel infusum censetur quod cum aqua ferrariorum præparatur, seu in aqua ferrum candens sæpius extinctum fuit.

24. Radic. Polypod. & Cichor. Sylvestr. ana ʒj. corticem Capparidis & Tamaricis ana ʒss. Coq. in aq. comm. ℥iij. ad ℥ij. Tum adde solior. Scolopend. Asplen. seu Ceterach, Agrimon. Hepaticæ & Taraxaci ana M. j. florum Calendulæ & Keiri ana pug. ij. Coquantur per quadrantem horæ. Colatura dissolve Tartar. vitriolati ʒij. Syrup. de ʒ. rad. apert. ʒij. F. apozema in sex doses distribuendum in viscerum obstructionibus.

Pulvis herbæ exsiccatae ad ʒj. aut alteram exhibetur: in hepatis obstructionibus, in palpitacione cordis, in suffocatione uterina, in motibus convulsivis mira præstat, affirmante J. Rajo, si in cerevisia tenui, aut Zythogalo seu liquore Posseti Anglis dicto, modica ejus quantitas propinetur. Potest & e foliis virentibus conserva cum saccharo ad hos usus parari.

L I N U M.

Linum duplex ad usum medicum usurpatur, scilicet Linum sativum & Linum catharticum.

Linum, Linum sativum, Linum vulgare, Off. Linum sativum, C. B. P. 214. Infr. R. H. 339. Gerard. Emaculati J. Raii Hist. 1072. Linum, J. B. 3. 450. Linum sativum vulgare cæruleum, Lobel. Icon. 413. vulgo; Lin.

Tenui radícula nititur, paucis fibris donata: caule tereti assurgit, ut plerumque simplici, rari, tenui, glabro, cubitum aut sesquicubitum alto, alis circa summum ramoso, qui contritus in plurima abit filamenta: folia proferre acuminata, culmum lata, uncias duas plus minus longa, alternatim aut potius nullo ordine cauli apposita, mollia, glabra. Flores in summis virgis nascuntur speciosi, cærulei, pediculis tenuibus longiusculis insidentes, admodum caduci, caryophyllæi, quinque peralis constantes, extremo subrotundis, striatis, ex calycibus pentaphyllis & quasi tubularis emergentibus. Pistillum ex eodem calyce surgit, abitque deinde in fructum fere globosum, leviter acuminatum, Ciceris magnitudine, ex pluribus capsulis compositum introrsum dehiscens, semine foetis depresso, fere ovato, hinc obtuso, inde vero acuto, levi, glabro, splendens, ex fulvo colore punicante. In agris seritur. Semen potissimum in medicum usum venit: sed planta ad innumeros usus mechanicos præparatur & usurpatur.

Analyſi chymica, ex ſeminum Lini ℥v. per retortam diſtillatis prodierunt humoris limpidi, ſapore fere inſipido, obſcure ſubſalti, & aliquantiſper alcali ℥iij. ꝑv. humoris limpidi, obſcure ſubacidi ℥iij. ꝑv. gr. xxxvj. humoris limpidi, ſubacidi, auſteri ℥iij. ℥ij. gr. xxxvj. humoris limpidi, ruſi, empyreumatici, tum alcali urinoſi, tum impenſe acidi auſteri ℥xj. ꝑv. olei fluidi, ruſi ℔j. ꝑv. ℥vi. gr. xxxvj. Maſſa nigra in retorta reſidua pendebat ℔j. ℥iij. ℥ij. gr. xxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥iij. ꝑv. gr. xxxvj. ex quibus ſalis fixi ſalti talcoſi ℥j. lixivio extracta ſuit. Partium jactura in diſtillatione ſuit ℔j. ℥j. in calcinatione ℥iij. ℥iij.

Lini ſemen in aqua maceratum plurimum mucaginis præbet. Salem obtinet eſſentialem vitriolico-ammoniacalem cum multa terra & oleo copioſo conjunctum, quibuſcum blandam conſtituit mucaginem, a qua præcipua ejus vis demulcens & emolliens pender.

Lini ſemen ruſum, melli adjectum, & ſixum ruſticis Aſiaticis in frequentiſſimo cibo ſuit. Quoquo tamen modo apparatus vix ſuave eſt & ſalutare; ſtomacho enim adverſatur, flatuoſum eſt, ægre concoquitur, & pravum ſuccum gignit. Quod paucis abhinc annis Middleburgi in Zelandia, inquit Tragus, animadverti potuit, cum propter frumenti aliarumque frugum inopiam plerique ex civibus pane & cibis ex hoc coctis veſcerentur. Diſſenta enim his valde cito hypochondria fuerunt, & facies, aliæque partes tumidæ factæ: quorum non pauci ſic affecti mortui ſunt. In Gallia eſculentum non eſt, neque his in regionibus ubi laute vivitur.

Semen Lini ob mucilaginem temperatam, anodynam, acrimoniam humorum demulcentem, in piſanis & apozematibus demulcentibus, sæpius præſcribitur, præſertim in urinæ ardore & difficultate; urinæ enim ſales acres muco ſuo involvit & demulcet, veſicæ mucum deficientem reſtituit, ejusque membranas ab urinæ acrimonia defendit. Obſervandum eſt ne nimis glutinoſi ſint & mucoſi potus ex ſemine Lini parati; tunc enim ventriculum gravant & naſeam sæpe movent. Quapropter illud ſemen ebullitioni non committitur, ſed poſt ebullitionem decoctis adhuc calidis infunditur & quidem parva quantitate. Uſurpatur quoque utiliter ſemen Lini in decoctis emollientibus, anodynis & carminantibus pro clyſteribus adverſus ventris tormina, dyſenteriam, tenefmum, & viſcerum inflammationem.

Aqua in qua ſemen Lini per aliquot horas maceratum ſuit, in urinæ ardore, ſuppreſſione, difficultate, nephritide, & adverſus arenulas & calculum utiliter pro potu ſolito præſcribitur.

℥℥. Radic. Gramin. contuſæ & minutim ſectæ M. j. Bulliat. in aq. com. ℔iij. ad ℔iij. Decocto calenti adde ſem. Lini ꝑg. j. Maceretur, donec omnino refrigeratum ſit decoctum tunc percolandum & ſervandum pro potu ſolito. In renum & veſicæ inflammatione, urinæ difficultate, nephritide, calculo, &c. Vel

℥℥. Rad. Nenuphar. ℥j. Gramin. M. j. Liquir. raf. & contuſ. ℥j. Bull. in aq. com. ℔iij. per quadrantem horæ. Decocto ab igne ſemoto & calenti adde rad. Althææ taleolatim ſectæ, ℥℔. ſemin. Lin. ꝑg. j. Decoctum refrigeratum coletur pro potu ſolito.

Fa-

Farina Lini potenter resolvit, emollit & maturat, quare in fomentis, & cataplasmatibus emollientibus, & maturantibus frequenter adhibetur sola vel cum Fœnugræci farina. Ex eo semine mucilago uberrima diuturna ejus maceratione & coctione in aqua, ac forti expressione extrahitur, quæ cataplasmatibus in modum applicata inflammationes compescit, dolores sedat, tumores emollit & resolvit.

Oleum ex semine trito & torculari expresso extrahitur multis affectionibus perutile: Interne quidem temperat, alvum ciet, tussim sedat, relaxat, expectorationem promovere & primario ceu singulare specificum mire commendatur contra pleurisidem, si nempe ad aliquot uncias, duas, tres, quatuorve propinetur, quod quarta vel sexta hora repetitur, donec æger insigne levamen perceperit. Colicos dolores eodem modo exhibitum mire compescit & in contumacissimis alvi obstructionibus, contra volvulum, & passionem iliacam imminens plurimum valet epotum aut ad ℥viij. sub clysteris forma susceptum. In hæmorrhoe utiliter quoque præscribitur: non solum enim tussim sedat, sed vi sua balsamica & emplastica partes affectas consolidat. Observandum est, ut hoc oleum recens sit & duleis saporis. Inveteratum enim, ingratum est propterrancorem, & nauseam excitat. Si recens obtineri nequeat, ejus rancor & sapor ingratus tollitur illud cum aqua tepida in ampulla vitrea diu conquassando & aquam identidem mutando donec nullus sapor, & odor ingratus supersit.

Externe illitum dolores demulcet, durities emollit, nervorum tensiones contractionesque laxat. Ad hæmorrhoides dolentes a nonnullis valde prædicatur. Cataplasmatibus & linimentis emollientibus & resolventibus utiliter admiscetur.

℥℥. Rad. Althææ, bulbor. Lilior. ana ℥ij. fol. Althææ, Malv. Violar. Parietar. ana M. j. femin. Lini & Fœnugr. contusor. ana ℥j. Caricas ping. n. xij. flor. Camomill. & Meliloti ana p. ij. F. decoctum ad putrilagineum cum aq. q. s. Omnibus contusis & per setaceum trajectis ad unguenti de Althæa ℥ij. olei Lini ℥j. Fiat cataplasma emolliens, resolvens, & maturans.

℥℥. Rad. Alth. Brion. Sigill. Salomon. & Lilior albor. ana ℥j. folior. Malv. Parietar. ana M. j. femin. Lin. & Fœnugr. ana ℥℥. flor. Melilot. M. j. Coquantur in q. s. aq. Colatura servetur pro fotu emolliente instituendo calide cum linteis quadruplicatis vel pannis laneis dicto liquore imbutis, leviter expressis & mutatis, quoties frigescere incipient.

℥℥. Farin. sem. Lin. ℥viij. Fœnugr. & Cymîn. ana ℥iiij. Mell. ℥ij. ol. Lin. q. s. M. F. cataplasma lateri dolenti calens applicandum in pleuride & lateris dolore punctorio: potenter resolvit & discutit.

℥℥. Vitellos ovor. recentium n. ij. Sacch. albi ℥j. olei Lini q. s. M. diligenter agitando. Fiat linimentum quo hæmorrhoides dolentes inungantur.

℥℥. Vitellos ovi ad duritiem coctos n. iv. olei Succini ℥ij. Theriaces Androm. ℥℥. olei Lini q. s. Fiat cataplasma hæmorrhoidale.

Nonnulli oleum hoc Lini cum calce viva mixtum ex retorta distillant, & oleum obtinent subtilissimum & penetrantissimum quod paralyli medetur.

Semen Lini usurpatur in syrupo de Præssio Mesue, in lohoch sano & experto ejusdem, Unguento de Althæa Nicol. Alexandr. Mundificativo de

Re-

Resina *Jouberti*, Emplastro Diachylo magno, & Emplastro de mucaginibus.

Oleum Lini expressum ad multos usus mechanicos, a pictoribus, & aliis artificibus expetitur.

Cœterum mirum est ex tam parvo semine nasci avenam adeo gracilem & pusillam, quæ tufa præparata, & in molliem lanæ coacta in filamenta producit, in telas textitur, & in chartas compingitur usus immensis, unicuique notum nec satis mirandi.

Linum catharticum, *Off.* Linum pratense, floribus exiguis, *C. B. P.* 214. *Inf.* *R. H.* 340. Alfine verna, glabra, stoliculis albis vel potius Linum minimum, *J. B.* 3. 455. Linum sylvestre catharticum *Gerar. Emac. J. Raii Hstor* 1076. Chamœlinum Clusii flore albo, sive Linum sylvestre catharticum, *Parkins. vulgo, Lin sauvage purgatif.*

E radícula tenui, alba, lignosa, fibrillis aliquot donata, cauliculos emittit nonnihil reptantes, mox humo ad palmum & altius se attolentes, tenues, rotundos, rubentes, fastigio sursum ramoso, nutante. Folia infima mucrone obtuso & subrotunda sunt, superiora, quæ in caulibus hina opposita, crebra, exigua, semiunciam longa, culmum lata, glabra, absque pediculis adnata. Flores pediculis longis, tenuibus insistenti albi, Caryophyllæzi, pentapetali, petalis acutis, minime bifidis, cum apicibus totidem in medio luteis, e calyce pentaphyllo. Capitula seminalia succedunt Lini similes, parvæ, canaliculatæ, in quibus semen lucidum, lubricum, compressum & oblongum Lini simile. Sapor totius plantæ amarus, & nauseosus. In agro Parisiensis sponte nascitur. Herba integra in usum venit.

Analysi chymica, ex Lini cathartici floridi *Bv.* per vaporarium distillatis, prodierunt humoris limpidi, primum odoris & saporis fatui, obscure subasii, deinde obscure subacidi, ac tandem manifeste subacidi *Bij.* *ʒvj.* *ʒij.* gr. *xij.* Massa superstes per retortam distillata præbuit humoris rufescentis, leviter empyreumatici, tum acidi austeri, tum leviter alcali urinosis *ʒij.* *ʒvj.* gr. *lx* humoris rufi, empyreumatici, sale volatili alcali urinoso imprægnati *ʒij.* *ʒliij.* gr. *lx.* olei fere adiposi *ʒij.* *ʒvij.* gr. *xxxiv.* Massa nigra in retorta residua pendebat *ʒvij.* *ʒvj.* gr. *xxxvj.* quæ rite calcinata per 15. horas reliquit cinerum *ʒj.* *ʒv.* gr. *xxiv.* ex quibus lixivio salis fixi alcali *ʒij.* gr. *xliv.* extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit *ʒviij.* *ʒiv.* gr. *xiv.* in calcinatione *ʒvj.* *ʒj.* gr. *xij.*

Linum catharticum sapore amaro, ingrato, nauseoso donatur. Salem essentialem obtinere videtur tartareo-vitriolicum cum multo oleo fetido conjunctum.

Frequentior est apud Anglos hujus plantæ usus quam apud nos. Herba integra, narrante *J. Rajo*, cum caulibus & capitulis vino albo per noctem super cineres calidos ad manipulum unum infusa serofos humores purgat satis valide, & nonnumquam vomitum excitat.

Folia recentia contusa ad *ʒi.* aut alteram sub forma boli aggeruntur, vel herbæ exsiccatæ pulvis ad *ʒi.* cum tantillo cremoris tartari & seminis Anisi intus sumitur & purgat sine molestia. In hydropisi incipienter utiliter præscribitur, & ad febres intermittentes fugandas.

L I T H O S P E R M U M.

Lithospermi species tres occurrunt in officinis, scilicet Lithospermum erectum, Lithospermum repens, & Lithospermum arundinaceum.

Lithospermum erectum, *Off.* Lithospermum majus; erectum C. B. P. 248. *Inst. R. H.* 137. Lithospermum sive Milium folis, *J. B.* 3. 590. *J. Raii Hist.* 503. Lithospermum minus, *Dodon. Pempt.* 83. & *Gerard.* Lithospermum vulgare minus, *Parkinsf.* Saxifraga tertia, *Brunfelsi*: Anchusæ tertiae similis altera, *Casalpin.* 435. Milium Soler Mauritanis, quod in montibus Soler frequens nascitur, *Serapionis*: vulgo, *Gremil* ou *Herbe aux perles*.

Radice nititur pollicem trassa lignosa & fibrosa: quæ caules multos edit cubitales aut sesquicubitales, erectos, rigidos, teretes, asperos, ramosos, & foliis crebris alternatim donatos duas tresve uncias longis, acutis & asperis, sine pediculis adnatis, & e virore nigricantibus. Quæ in summis caulibus sunt, folia latiora sunt & breviora promagnitudinis ratione & saturatius viridia. Flores in summitatibus caulis, & ramorum, ex singulis foliorum alis singuli nascuntur, brevibus peculis insidentes, monopetali, candidi seu ex herbaceo albidii, infundibuliformes, in quinque obtusa segmenta partiti, cum calyce hirsuto, in quinque angustas, hirsutas laciniâs ab basim ulque secto, & pistillo viridi quatuor veluti stipato embryonibus, qui deinde abeunt in toridem semina subrotunda, dura, expolita nitida; leucophæa, (*gris de perle*,) & exiguis margaritis similia, quæ in calyce ipso satis ampliato raro quaterna, sæpius bina aut terna tantum perficiuntur & maturescunt. In agro Parisiensi sponte nascitur. Semen in usum venit.

Analysi chymica, ex seminis Milii solis ℥v. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, inodori, saporis fatui, obscure subfalsi ℥viij. ℥vij. humoris limpidi, fere inodori & insipidi, obscure subfalsi & obicure acidi ℥vij gr. lx. humoris rufescentis, empyreumatici, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥vij. ℥iv. salis volatilis urinosi concreti ℥ij. gr. xxxvj. olei syrupi ad instar spissi ℥viij. ℥v. Massa nigra in retorta residua pendebat ℔ij. ℥xiv. ℥iv. quæ per 16. horas calcinata reliquit cinerum nigrorum, saporis expertum ℔ij. ℥iij. gr. xxxvj. ex quibus lixivio terræ rufescentis levis aliquantisper falsæ gr. lxij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥vij. ℥j. gr. xlviij. in calcinatione ℥xj. ℥iij. gr. xxxvj.

Lithospermi femina sapore donantur farinaceo, glutinoso, nonnihil adstringente. Salem obtinent essentialem ammoniacalem cum oleo copioso, & uberrima terra adstringente conjunctum semen hoc cum acidis effervesceat, observante Nehemia Grevv *Experiment. 22. de Mixture corporum*.

Milii solis semen pro insigni diuretico habetur, & blando anodyno. Specificæ ad ciendam urinam, vesicam & renes blandè stimulandos calculum, & arenulas pellendas commendatur. Renes a mucilagine viscida calculorum siccæ & nutritæ optime abstergit, has partes ab acrimonia urinæ optime defendit, si pulveratum ad ℥j. propinetur in vehiculo idoneo. Nonnulli ad arenulas pellendas tritum semen cum vino Malvatico propinatum proficuum experti sunt, referente Ettmullero. Alii emulsionem ex hoc semine parant ad eundem effectum.

24. Sc.

24. Semin. Milii solis ꝯß. Contund. in aq. stillatitz Alkekeng. ꝯxij. Colatura dissolve syrup. de ꝯ. Rad. aper. ꝯß. Fiat emulsio in duas doses distribuenda. Sumat æger intra unius horæ intervallum in urinæ difficultate, ad mucum in urinariis viis inhærentem resolvendum, & arenulas expellendas.

Quidam hoc semine calculum renum, & vesicæ comminui, & frangi asserunt. Qua de re Cl. Hoffmannus, & J. Bauhinus valde dubitant, & quidem merito. Ego quidem cum J. Rajo existimo neque hoc semen, neque ullum aliud remedium calculum jam concretum frangere posse. Illud saltem lithonripticum, siquid sit, nondum novimus. Equidem puiuram, & crassos humores, arenulas, aut calculos glutinantes dissolvi, & pelli medicamentis idoneis vel etiam hoc semine concedimus.

Matthiolus, & Freitagius in sua *Aurora Medica*, in gonorrhæa cohibenda hoc commendant semen, & ex eo sequentem pulverem parant.

R. Seminis Milii solis ꝯß. Pulver. Linguz Cervinæ exsiccatæ ꝯß. Succini albi pp. ꝯij. M. F. pulvis, cujus ꝯi. vel ꝯß. pro dosi singulis diebus mane jejuno ventriculo exhibeatur cum succo Plantaginis, aut Lactucæ.

Idem semen Matthiolus, & alii ad ꝯij. propinant ceu certum & expertum medicamentum partu difficili laborantibus, uri & in secundinæ retentione, quod tamen Ettmullerus ulteriori experientia indigere censet. Idem auctor refert, hoc semen ad ꝯi. adversus quotidianas febres ante paroxysmum per aliquot dies a nonnullis exhiberi.

Semen Lithospermi usurpatur in Benedicta laxativa, Electuario lithonriptico & pilulis arthriticis Nicolai Alexandrini, in decocto hepatico apiente & syrupo antinephritico Pb. Reg.

Huic semini semen alterius Lithospermi sequentis sæpe substituitur.

Lithospermum repens, Off. Lithospermum minus repens larifolium, C. B. P. 258. *Inst. R. H.* 137. Lithospermum majus Dodonæi, flore purpureo, semine Anchusæ, J. B. 3. 572. J. Raii *Hist.* 503. Lithospermum majus, Dod. *Tempt.* 83.

Radice est longa, crassa, lignescens, tortuosa, nigra: ex qua multi exsiliunt graciles, tenues, nigricantes, longi, alperi, & hirsuti surculi, humi plurima parte procumbentes, subinde fibras agentes: quos folia vestiunt uncias duas circiter longa, semiunciam lata, in acumen desinentia, ex saturo virore nigricantia, hirsuta, aspera. Flores extremis hærent ramulis conferti, violacei, quibus succedunt semina Ervi magnitudine dura candida. Caulis qui flores sustinet, erigitur, & foliis longioribus, pallidius virentibus amictus.

Iisdem principiis donatur, iisdemque virtutibus pollet.

Lithospermum arundinaceum, Lachryma Job, Offic. Lachryma Job, *Clas. Hist.* 216. *Inst. R. H.* 532. Lachryma Job multis sive Milium arundinaceum J. B. 2. 449. J. Raii *Hist.* 1252. Lithospermum arundinaceum forte Dioscoridis, & Plinii C. B. P. 255. Lachryma Jobi, Gerard. & Parkins. Lachryma Christi, Quorundam: vulgo *Larme de Job*.

Radice est multiplici, in fibras multas divisa: culmis cubitum unum aut alterum

alterum altis, geniculatis : foliis Turcici frumenti similibus, cubito subinde longioribus, uncias duas latis, quibus minora sunt illa, quæ in ramis nascuntur. Ex horum foliorum alis petioli emergunt, quibus sustinentur grana seu nodi singuli, rarius bini, quæ fructus embryones continent. Ex his nodis prodit glumarum spica mutica, (*sans barbe*) quæ flores apetalos continet plurimis staminibus ex uno calyce surgentibus constans & steriles. Embryones enim in nodis a floribus sejunctis nascuntur, abeuntque in semina in singulis singula, lævioris politissimi, nitida, ante maturitatem flavescientia, matura, rubentia, duritie lapidea, cicer æquantia, superiore parte turbinata, & composita ex amygdala & testa dura, lignea, & membrana tenui obvoluta. In horris colitur. In orientalibus plagis sponte nascitur. Semen tantum nonnumquam, at rarissime ad medicos usus usurpatur.

Eædem ipsi tribuuntur vires quæ Milii solis semini. Lobelius illud ad calculum renum, & vesicæ saburram expellendam pulvere aut decocto, ut præsidium vulgatum commendat.

Mulierculæ & moniales feminibus istis lycio seu filo transmissis pro sphaerulis precatoriis subinde utuntur, carenulas inde facientes.

L O T U S.

Lotus hortensis odora & Trifolium odoratum ; *Off.* Melilotus major, odorata, violacea, *Moriss. Hist. Oxon. part. 2. 161. Inf. R. H. 407.* Lotus hortensis odora, *C. B. P. 331.* Lotus sativa, odorata, annua flore cæruleo, *J. B. 2. 368.* Trifolium odoratum, alterum, sive Lotus sativa. *Dod. Pempt. 571.* Melilotus vera, *Tabern. Icon. 510.* Lotus hortorum odora, *Label. Icon. T. 2. p. 41.* Trifolium odoratum *Parkins. Gerard. J. Raii Histon. 950.* vulgo, *Lotier odorant, Tresse musque ou faux Baume du Perou.*

Radix ei gracilis, simplex, alba, lignosa, fibris aliquot donata. Caulis cubitalis & altior, rectus, gracilis, striatus & nonnihil angulosus, glaber, inanis, ab imo statim ramosus. Folia cauli alternatim adnascuntur in pediculis longis terna simul, pallide viridia, glabra, circumoras serrata, inferiora in caule breviora, obtusiora & rotundiora, superiora longiora & acutiora, ut in aliis Trifoliis fere sit. E foliorum superiorum alis longis pediculis nixæ egrediuntur spicæ seu globuli floribus exiguis, papilionaceis, dilute cæruleis, odorem aromaticum cum quadam gravitate gratum & durabilem etiam in decerptis & arida planta spirantibus compositi. Ex singuli floribus calyce surgens pistillum abit in capsulam nudam, hoc est in calyce non reconditam ut in Trifolio, asperam, duo aut tria semina fulva, odorata, subrotunda continentem. Seminibus ad maturitatem perductis quotannis perit. In hortis seitur. Folia & flores in usum veniunt.

Hæc planta sale donatur essentiali ammoniacali cum multo oleo tum essentiali, tum crasso copioso conjuncto.

Abstergit, digerit, dolores demulcet, sanguinem effusum & concretum resolvit, vulnera consolidat, a nonnullis etiam inter alexipharmaca recensetur.

censetur. Porionibus vulnerariis admiscetur cum cæteris plantis vulnerariis. Summitatum floridarum ad ℥j. in vino vel aqua multa decoctum pleuritidi medetur sudorem pellendo : mentes & urinam pellit. Tradunt ideum decoctum vel ejus semen tustum ad ℥j. ex vino propinatum adversus venenum, si quis eo se infectum suspicetur, utiliter exhiberi.

Externe in decoctis & fotibus vulnerariis usurpatur. Oleum fit ex floridis summitatibus in oleo communi maceratis, quod ad vulnera glutinanda, & ab inflammatione defendenda, hernias puerorum sanandas, tumoresque molliendos & maturandos plurimum commendatur.

Interponitur herba arida vestimentis, quæ, ne a tineis rodantur, defendere putatur.

Aqua distillata vulneraria censetur & ophtalmica.

L U J U L A.

L Ujula, Alleluia, Acetofella, Oxys, Trifolium acetosum, Oxytriphyl-lum & Panis Cuculi, *Off.* Oxys flore albo, *Inf.* R. H. 88. Oxys sive Trifolium acidum flore albo, *J. B.* 2. 187. Trifolium acetosum, vulgare, flore lacteo, *C. B. P.* 330. *J. Raii Hist.* 1098. Trifolium acetosum, *Dod. Tempt.* 578. Alleluia, *Lacuna*, *Lonicæ* : Lujula, *Fraxiflor* : vulgo, *Alleluia* ou *Pain a Coucou*.

Humilis herba est Lujula; ex crassiuscula, squamata, alba vel ex albo rubente ejus radícula longæ & crebræ pendens fibræ albicantes, indidemque emergunt pediculi infirmi, tenues, rotundi, palmares & longiores, terna gerentes folia uni pediculo insidentia, tenuia, latiora, quam longiora cordata, pallide virentia, glabra, sæpe deorsum nutantia, sapore acida. Inter hæc alii surgunt pediculi, florem singuli sustinentes unicum, monoperalum, campaniformem, patentem, quinquepartitum, albidum, pel-lucidum cum calyce quinquifido & pistillo floris infimæ parti ad instar clavi-infixo, abeunte in fructum cylindraceum, pentagonum, in quinque loculamenta divisum extrorsum a basi ad apicem dehiscencia, in quibus, semina continentur nitida, rufescentia, huc illuc tempore maturitatis cum impetu dissilientia propter vim elasticam calyptræ qua singula solent involvi. Agri Parisiensis incola opacis plurimum provenit locis, in sylvis & ad sepes. Folia usitata sunt.

Analysi chymica, ex Oxytriphyllo floridi ℔v. absque radicibus, distillatis, prodierunt humoris limpidi, sapore & odore herbaceo, nonnihil salis urinosi ℥j. ℥xij. gr. xxiiij. humoris limpidi, odore & sapore herbam virentem referentis, non amplius urinosi, primo obscure subacidi, deinde acidi magis ac magis impense ℔ij. ℥xij. ℥j. gr. xij. humoris rufi, alcali urinosi, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥vij. gr. xxiiij. salis volatilis urinosi gr. xlvij. olei adiposi ℥j. ℥j. gr. liij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥ij. ℥liij. gr. xij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥ij. gr. xlvj. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥ij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥vij. gr. xliij. in calcinatione ℥j. ℥j. gr. xlvj.

Oxytriphyllo folia sapore acido grato donantur. Eorum succus chartam cæruleam rubro colore tingit : cum oleo tartari mixtus effervesceat & odorem

rem emittit urinosum. Exsiccata folia prunis candentibus imposita fulminationem quandam excitant. Saleem igitur essentialem obtinet hæc planta nitroio-ammoniacaali similem cum oleo & terra conjunctum.

Lujula lapore & viribus cum Acetosa convenit. Sitim sedat, ventriculi ardores extinguit, æstum febrilem mitigat, sanguinis fervorem compescit, bilis æstum temperat & coercet, sanguinem viscidiores & spissiores emendat, nimis dissolutum ab acerbis salibus exsuperantibus emendat, hos sases irretiendo. Ideo jecur refrigerare & cor roborare dicitur, & inter cardiaca, aperientia & antiscorbutica medicamenta recensetur. In febribus acutis, ardentibus, malignis & pestilentialibus, necnon in scorbuticis affectionibus utiliter usurpatur. Ex ea parantur decocta, succus, syrupus, conserva, aqua distillata & extractum.

In jusculis & apozematibus refrigerantibus folia ad M. j. præscribuntur: præsertim ubi adest vehementior humorum æstus; cerebri inflammatio, delirium adfuit aut imminet; linguæ & faucium ariditas & nigredo percipiuntur, hæmorrhagiæ superveniunt: tuncque ejus vis temperans & sedativa tantillo nitri plurimum augetur. Succus defæcatus ad ℥j. aut alteram solus vel cum succis plantarum aperientium & refrigerantium, vel plantarum antiscorbuticarum utiliter iisdem in affectionibus propinatur, vel jusculis & apozematibus admiscetur. Syrupus ad ℥j. & aqua distillata ad ℥vj. in julapiis & potionibus cardiacis, temperantibus, aut antiscorbuticis: Conserva ℥j. ad ℥ij. Extractum a ℥ss. ad ℥j. in electuar. & bolis præscribuntur.

24. Succor. defæcator. Lujulæ, Acetosæ rotundæ, Fumariz, Beccabung. Nasturtii aquatic. Cochlear. Absinth. Trisol. fibrin. ℔j. Syrup. Oxytriphyll. ℥j. M. F. julapium cochlearium fumendum. In cachecticis & scorbuticis affectionibus. Vel

24. Extractor. earundem plantar. ℥ss. Vitrioli martis ℥j. Gentian. subtilissime pulver. ℥j. Fiant pilulæ. Dosis ℥j. vel ℥ij.

24. Folior. Lujulæ M. j. Nasturt. aquatic. & Cochlear. ana M. ij. Pomæ citri recentis una cum corticibus minutim concisis n. ij. Contund. accurate in mortar. marmor. cum tantillo Sacchar. Fiat electuar. antiscorbuticum.

24. Rad. Graminis, Fragar. ana ℥j. Cuscutæ ℥ss. Coquantur in aq. comm. ℔ij. ad ℔ij. Sub finem coction. adde folior. Agrimon. Trisol. acetosi ana M. ij. Fiat decoctum per cyathos tertia vel quarta quaque hora propinandum infantibus febre lenta cum tumore abdominis cachectico laborantibus, quod a G. Baglivio laudatur si identidem adjiciatur tinctur. Rhabbarbari ℥ss. & Syrupi rosar. Solutiv. ℥j. pro decocti ℥vj.

Externe Oxytriphylli succus vel aqua distillata aluminis momento temperata erysipelatis & inflammationibus incipientibus utiliter admoveatur pro foru, & iisdem os sæpius colluitur ad aphthas & alia oris vitia emendanda.

LUPINUM.

Lupinus, *Off.* Lupinus sativus, flore albo, C. B. P. 347. *Inst.* R. H. 392. Lupinus vulgaris, semine & flore albo, sativus, J. B. 2. 288. Lupinus sativus, *Dod. Pempt.* 529. *Gerard. J. Raii Hist.* 906. *Tragi* 622. vulgo, *Lupin*.

E radice fere singulari, lignosa & multis capillamentis fibrata, caulis emergit cubitalis & sesquicubitalis, mediocriter crassus, erectus, teres, aliquantulum tomentosus, cavus & medulla farctus, e quo postquam flores in ejus fastigio eminentes maridi facti sunt, alii tres ramuli infra spicam florum prodeunt, quorum singuli non raro & alios quoque modo binos, alios ternos eodem proferunt modo: præsertim si tempestive satus Lupinus, ætatem calidam diurnamque nactus fuerit. Folia nullo aut alterno ordine posita pediculis duas treleve uncias longis innituntur, ex septem plerumque segmentis oblongis, angustis, e pediculi fastigio eodem puncto enatis, Pentaphyllorum in modum composita, non inepte flabelliformia dicta, seu digitatim pediculo innascentia, e glauco obscure virentia, ad margines æqualia, subtus hirsuta lanugine incana, & quasi argentea ad margines præcipue. Horum segmentorum latera sub vespere circa solis occasum contrahuntur, ipsaque insuper segmenta ad pediculum terram versus reflexa dependent. Flores in summo cauliculorum spicatim digesti, papilionacei, candidi sunt, pediculis brevibus. Ex eorum calyce surgit pistillum quod abit in siliquam crassam, latam, compressam, tres uncias circiter longam, erectam, sabaceis minorem, pulposam, subflavam, foris tenuiter hirsutam, intus vero glabram, quinque vel sex semina continentem majuscula, orbiculata, & non-nihil angulosa, compressa, quæ & germinationis principium haud obscurum, & qua parie siliquæ adhærent cavitatem quamdam velut umbilicum exiguum habent, foris albidâ, intus sublutea, & perquam amara. In calidioribus Galliæ regionibus in agris feritur. Semen usitatum est.

Lupini semina plurimum salis volatilis urinosi cum oleo crasso copioso, & terra non pauca conjunctum obtinent. Saporem leguminosum, amarum, ingratum referunt.

Lupinorum usus inter edulia frequens erat tempore Galeni, qui apud nos hodie nullus est. In aqua dulci calida macerati amaritudinem deponunt, & gustui grati redduntur. Galenus elixos cum garo, & oxygano, vel etiam sine his sale mediocri conditos mandi scribit, & fieri tunc nutrimentum succi crassi, & tarde descendere. At ubi nativa etiamnum amaritudo manet, extergendi digerendique vim obtinent.

Tradunt auctores Lupinorum succum seu pulpam lumbricos interficere tum illicum, tum addito melle linctum, tum in posca potum. Sed C. Hofmannus L. 2. de Medicamentis Officialibus, Cap. 135. §. 10. nos monet cautiore esse in Lupinorum usu interno, quandoquidem Aver-

rhoe

rhodes 51. Coll. 39. hoc semen occidere scribit. Quare non oportet intus dare, sed foris tantum farinam umbiculo imponere cum iis, quæ deducere valeant, inquit C. Hoffmannus. Quod quidem monuit Simonis Pauli observatione confirmatur, qui narrat se vidisse puerum octo vel decem annorum cui mater Lupinorum pulveratorum 3j. circiter in haustulo hydromelli propinaverat adversus lumbricos iussu anus cuiusdam edentulæ, paulo post de improvviso exquisitissimis abdominis doloribus correptum, cum ventris intumescencia, respiratione difficili, voce tremula, & oculorum obscuritate fere ad cæcitatem. Unde hausti veneni suspicio parentes occupabat. Hæc cum advocatus S. Pauli vidisset, nullamque suam urgentem, nullam faucium inflammationem perciperet, statim clysterem lacteum Saccharo insigniter edulcoratum præscripsit, quo injecto, pusio liberaliter alvum graveolentissimam dejecit, qua una exercebatur lumbricorum vivorum, mortuorum, integrorum, corruptorum ingens copia, & supra recensita sympromata illico sedata sunt. At vero si tanta sit Lupinorum malitia, qui fieri potuit, ut Græcis pro alimento fuerint: ita ut Galenus cibum polychrestum eos nominet? & Plinius referat, Protogenem quemdam insignem pictorem madidis Lupinis vixisse, dum nobilem tabulam pingeret, quoniam famem ac sitim sustineret eo legumine, ne sensus nimia dulcedine obstrueret. Vel hanc malitiam cum suo amaro in aqua calida macerari, & costli deponunt: vel symptomata adeo gravia huiusce pueri non tam a Lupinorum pulvere amaro quam a vermium motu vehementiori per hoc medicamentum excitato oriebantur.

Lupini foris impositi ex emplasticorum genere sunt. Eorum decoctum in foru alphas, achoras, scabies, psoras, & ulcera maligna curat, partim digerendo, partim extergendo, & citra mordacitatem siccando. Farina in cataplasmatibus usurpatur, & inter farinas quatuor resolventes, a nonnullis recensetur, Hordei nempe, Fabarum, Orobi, & Lupinorum: quibus tamen pro lubricu substituantur Frumenti, Secalis, Lentium, Fænuçræci, & Linî farinæ. Strumas, & parotidas Lupini in aceto costli discutiant.

Lupini usurpantur in Trochiscis de Mischæ Rhasæ, & in Unguento ad vermes Renodai.

L U P U L U S.

Lupulus, Lupus, & Lupulus salictarius; Off. Lupulus mas, & femina, C. B. P. 298. Inst. R. H. 535. J. B. 2. 151. J. Raii Hist. 156. Cumerar. Epir. 933. Lupulus, Dodon. Tempt. 409. Lupus salictarius, Gerardi? Lupulus 1. sive sativus, 2. sive sylvestris, Parkinson. Lupulus salictarius, spontaneus, & vitis septentrionalium, Lobel. Icon. 629. Convolvulus perennis heteroclitus, floribus
Geoffroy Tom. II. Cc

bus herbaceis, capsulis foliaceis, strobili instar, *Morison*; vulgo;
Heublou.

Ex radicibus tenuibus, & sibi invicem varie implicatis *Lupulus* infirmus, & humo se tollere vix potis cauliculos prœmit longissimos, tortiles, asperos, angulosos, hirtulos, concavos, purpurascētes, capreolis destitutos, peticas, & alia adminicula fricte, & tenaciter complectentes, & scandentes: folia e geniculis bina, adversa, pediculis palmaribus asperis, & interdum rubentibus adnexa, modo *Mori* folia imitata, integra in mucronem abeunt, plerumque trifariam aut quinquifariam divisa, totidem mucrones ostentantia, tum hic tum illic per ambitum serrata. Quæ species flores habet, seminibus destituitur. Quæ vero semina gerit, staminibus caret. Flores in mare dicto e foliorum alis, racemosi, cannabacei, colore herbido palleſcentes, staminei, apicali, plurimis staminibus, & calyce pentaphyllo constantes, nullo sequente fructu evanescentes. Fructus in semina, strobilorum instar squamosi, ex plurimis squamis compositi membranaceis, laxi, colore pallido seu ex viridi luteo axi communi affixis, in quarum alis nascuntur semina exigua, compressa, rasa. Alium redolentia, amara, calyptra obvoluta. In sepibus, & pratis regionum tum frigidarum tum calidarum vulgarissimus est. In Anglia, & in Germania *Lupuli*, Vitium instar, in *Lupuleis* seruntur, & coluntur magna cura nec minore impensa, depactis prælongis peticis, quas sarmenta concidunt atque etiam superant. Solo gaudent humidiorē, lætiorē, & pinguiore, bene stercoreato. Tota planta culta lætior multo evadit, florum thyrſis foliaceis, & squamosis grandioribus, semine etiam paulo majore.

Folliculosi strobili, qui flores non raro sed improprie appellantur, Augusto, & Septembri colliguntur, in farno ad id præparato exsiccantur, in saccos deinde congeruntur, & ad cœreviſiæ usum reponuntur. Turiones vero novo erumpentes eſtantur. Folis, & radices quoque in usum medicum veniunt.

Analysi chymica, ex *Lupuli* foliorum, & summitatum cum fructibus ꝑv. per B. V. distillatis prodierunt humoris limpidi, saporem herbaceum dulcem referentis, primo obscure subalsi, deinde obscure subacidi ac tandem obscure acidi ℥iij. ℥iij. ℥ij. Massa superflua per retortam distillata præbuit humoris rufescentis, tum acidi austeri, tum alcali urinosi ℥iij. gran. liij. humoris, rufi, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥vj. olei spissi, fere adiposi ℥iij. ℥v. salis volatilis urinosi concreti ℥i gran. xxxij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥vj. ℥ij. quæ rite calcinata, in crucibulo per undecim horas reliquit cinerum albicantium ℥ij. ℥ij. gran. xxx. ex quibus salis fixi mere alcali ℥iij. gran. lxxvj. extracta sunt. Parium jactura in distillatione fuit ℥iij. in calcinatione, ℥iij. ℥vij. gran. xliij.

Lupuli folia amara sunt. Eorum succus chartæ cæruleæ colorem non mutat. Fructus seu strobili recentes odore non ingrato præditi sunt, & pinguedinem vel resinam aromaticam continent nonnihil viscidam, a qua odor, & sapor amaricans potissimum oriri videntur. Salem obti-

neut

ment essentialem ammoniacalem, aliquantisper nitrosum cum oleo copioso, tum tenui, tum aromatico & amaricante casto conjunctum: unde sic ut Angelus Sala ex Lupulo sale essentialem crystallinum seu, ut vocat, tartarum extrahere non potuerit; ammoniacalis enim sal, si præsertim cum multo oleo consocietur, nun in crystallos solidas concrevit, sed in arenulam lutosam, exsiccatus abiit.

Lupuluriones seu cauliculi vere erumpentes Asparagorum modo coquantur in aqua, & ex oleo, sale & aceto suaviter eduntur, quin & ex butyro & aliis modis parati. Alvum blande laxant, viscerum obstructionibus ac præsertim hepatis & lienis infarctibus conducunt. Sanguinem fluidiorem efficiunt, hujus laticis defecationem promovent, atque adeo scabiei & aliis cutis vitiiis mederi consuetur. Vulgus prima Sambuci germina seu gemmas turionibus Lupuli nonnumquam addit, ad purgationem promovendam, quod tamen interdum periculo non caret, notante Conrado Bartholdo Behrens in *Selectis Dieteticis*, & choleras sæpe periculosissimas cum deliquis animi, sincerique sanguinis effluxu inducit.

Fructuum seu strobilorum Lupuli usus notissimus est toti orbi, ad condiendam nimirum cerevisiam, ne cito acefcat aut corrumpatur, & ut sale suo volatili & oleo aromatico eandem a situ conservent, farinaceum ac lentum gluten attenuent, perque vias urinarias deducant. Insignem amarorem ei communicant, qui tamen ætate paulatim evanescit, cerevisia interim vinosum saporem vetustate contrahens.

Ejusmodi cerevisia Lupulata salubrior existimatur & sapilior: viscerum obstructiones aperit, urinas pellit & menses. Cito tamen caput afficit, inebriat, ac somnolentiam, imo incubum inducit, eoque certius quo cerevisia majori quantitate Lupuli repleta, amariorque est, & Lupulus ipse constanter fuerit. C. B. Behrens enim observat in *Selectis Dieteticis*, Lupulum juxta diversa loca variare, circa Itenæum in Thuringia crescere excellentis amaritiei secus ac Brunsvicensem qui suavior est.

An vero Lupulata cerevisia calculo renum & vesicæ atterendo & expellendo conducatur, an contra ad ejus generationem & concretionem faciat, a nonnullis ambigitur. Qui adversus calculum eam commendant, eo argumento nuntur, quod Lupulus diureticus sit & calidus. Qui usum ejus in calculo damnant, sententiam suam experientia suffulciunt, qua teste cerevisia Lupulata, quæ apud Anglos Biera dicitur, usu, calculolorum parvisimi exacerbantur: qui contra Alæ, seu cerevisiæ cui Lupulus non fuit incoctus, potu leniuntur & mitigantur præterea ex quo Lupuli in cerevisia usus apud Anglos introductus est, calculum apud eos epidemicum factum esse, multoque plures quam olim infestasse clamitant. Joannes Raius illis potius assentitur qui usum ejus in cerevisia probent & commendant. Inde enim salubriorem fieri, ventriculo gratiorem & cibo concoquendo utiliorem asserit. Nec obstat, inquit,

Cc 2

quod

quod cerevisiæ Lupulæ potus calculosis interdicatur, Alæ vero præscribatur a Medicis. Illud enim fit ad paroxysmos leniendos, cui usui Ala ob lenitatem & lubricitatem seu lævorem suum conducit, non vero ad morbum eradicandum, ejusve causam tollendam. Falluntur autem, pergit idem auctor, qui calculum epidemicum factum, ex quo Lupuli in cerevisia usos introductus est, existimant. Nam quamvis Lupulus frequentioris hodie usus sit in urbe Londino quam umquam antehac fuerit, pauciores tamen inibi nunc dierum quam superiore sæculo, calculo laborant, ut ex accuratis D. Graunt observationibus patet. Quod ad calculum attinet, putamus liquores illos fermentatos spirituosos generationem ejus in corpore humano promovere, lympham seu sanguinis serum inspissando & ad lapideam usque duritiem coagulando. Quod experientia unicuique patebit, si sanguinis serum in spiritum vini aut ardentem cerevisiæ spiritum infundatur, quod statim concrescit sicut albumen ovi ignis calore coctum, ac tandem prorsus indurecit. Insuper observare licet eos, qui vino indulgent & merum assidue bibunt, persæpe calculo & podagra vexari, quorum morborum eadem causa, eadem materia esse videtur, ideoque non raro in se mutuo transmutantur. Unde & aquæ potatores huic morbo minus obnoxios esse arbitramur: & ad calculum præcavendum plurimum conducere opinamur, si jejuno stomacho largior sit aquæ potus, quo renes & uretères inundentur & promoveantur: ita enim & meatus omnes urinarii dilatantur, & arenulæ una eluuntur.

Lupuli folia sicut turiones & strobili aperiant, abstergant, & roborant, ciborum concoctionem juvant, viscerum obstructions lienis præsertim tollunt, urinas pellunt & alvum laxant. In malo hypochondriaco, scorbuto, adversus diurnas febres, scabiem & alia cutis vitia, in sero lactis aut jusculis alterantibus cum vel sine Fumaria incocta commendantur. Succus adhuc valentior est & bilem ac pituitam per alvum educere dicitur.

℥ Carnis vitulinæ ℥ss. Radic. Lapathi sylvestris & Bardan. major. lotar. & taleolatum sectar. ana ℥j. Coque in ℔iij. tum adde turionum vel conor. & summitatum Lupul. Fumar. ana M. ij. Bull. per horæ quadrantem pro duobus jusculis mane & sero hauriendis. adversus serpignes, herpes & alia cutis vitia.

Externe insignis est Lupuli usus, observante S. Pauli in sedandis & mitigandis partium externarum doloribus, in subluxationibus & tumoribus œdematosis, itemque contusionibus membrorum: necnon in podagricis paroxysmis quos sœtu cum Cerevisia coctus sedat.

Robertus Boyle *De utilitate Philosophiæ Experimentalis*, sequens pericarpium ad febrem quotidianam sugandam commendat.

℥ Salis marini, turionum Lupuli recentium ana M. ij. Uvar. co. rinthiacar. ℥iij. Probe confusa mixta, & in massam redacta carpi applicentur.

Semen Lupuli ℥ss. pondere pulveratum vermes enecare dicitur.

Radi-

Radicibus Lupuli vis aperiens & sudorifera tribuitur. Carolus Clusius auctor est *Lib. 1. varior. Plantar. Hist. cap. ultimo, pag. 126.* vulgum & vetulas Salmanticenses Medicinam Empiricam facitare solitas, ad curandam alopeciam a lue venerea ortam hac ratione Lupuli radicibus uti.

Ejus radices pondere libræ unius probe lotas & a sordibus repurgatas per noctem in aquæ libris octo macerabant: postmodum in illa ipsa lento igne ad tertiam partis consumptionem coquebant, vel etiam ad mediam partem, si vehemens esset alopecia. Decoctionem servabant in usum. Ejus 3viii mane ægris jejunis propinabant, deinde stragulis injectis sudorem provocabant. Addebant interdum Apii sive Selini hortensis duas aut tres uncias, & Graminis aliquot radices, & passas uvas a gigartidis mundatas.

Lupuli turiones vel summitates usurpantur in syrupo de Lupulo dicto, in syrupo de Cichor. comp. *Pb. Regia Charas*, & in syrupo Byzantino simplic. *Mesuei*.

M A J O R A N A.

Majorana duplex in Officinis nostris usurpatur, Majorana vulgaris & Majorana nobilis.

Majorana, Majorana vulgaris seu major, *Off. Majorana vulgaris, C. B. P. 224. Infr. R. Hist. 199. J. Raii Hist. 338.* Majorana majori folio ex semine nata *J. B. 3. pag. 2. 24t.* Majorana sive Marum, *Ded. Tempt. 270. Amaracus; Matthioli. Fuchs. Lugdun. Sampsucus sive Amaracus, Latinis Majorana, Cordi: Majorana vulgaris æstiva, Parkins. vulgo, Mariolaine.*

Ex radicibus tenuibus assurgit humilis & fruticosa hæc stirps palmaris aut etiam dodrantem alta, cauleculis sive surculis tenuibus, lignosis, plerumque quadratis, subhirsutis & tantillum rubentibus, in plures alas divisis, circa quas folia nascuntur ex adverso posita, Origanii vulgaris forma, sed longe minora, incana lanugine obdusa, odore fragrantem, sapore acrisculo, subamaro, aromatico & grato. Circa caulium ramorumque fastigium ex foliorum alis imbricatæ spicæ oriuntur seu capitula quam in Origano rotundiora, densiora, breviora, ex quaternis foliorum squamarum positorum ordine conflata. Ex earum hisutarum squamarum sinu prodeunt perpallidi flores albicantes, monopetali, labiati, quorum labium superius surrectum est, subrotundum, bifidum, inferius vero tripartitum. Ex calyce autem surgit pistillum posticæ floris parti infixum & quatuor veluti embryonibus stipatum, qui deinde abeunt in toridem semina minuta, subrotunda, rufa, in capsula quæ calyx floris fuit recondita. In calidis Galliæ provinciis sponte nascitur. Hic in horris politur.

Majorana nobilis, Majorana gentilis, Majorana tenuifolia, *Officin. Geoffroy Tom. II.*

C c 3

Major.

Majorana tenuifolia, C. B. P. 224. *Inf.* R. H. 200. J. R. H. 538. Majorana tenuior & lignosior, J. B. 3. P. 2. 241.

Hæc a vulgari in eo tantum differt, quod sit foliis tenuioribus & fragrantioribus. In hortis colitur. Utriusque Majoranæ folia & summitates floridæ in usum veniunt.

Analysi chymica, ex plantæ floridæ, demptis radicibus, ℞v. per vaporarium distillans prodieunt humoris primo turbidi, lactescentis ob olei essentialis portionem aliquam cum phlegmate conjunctam, odore & sapore plantam virentem grate referentis, obicure salis, & obicure acidi, deinde inodori, manifeste acidi magis ac magis impense ℞ij. ℞xv. ℞iij. Massa residua per retortam distillata præbuit humoris rufescentis empyreumatici, manifeste & impense acidi, austeri & subsalsi ℞j. ℞vj. humoris rufi, alcali urinofi, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℞j. ℞v. gran. xxxvj. salis volatilis urinofi concreti ℞j. gran. lxxij. olei tum essentialis fluidi, tum crassi sætidi & adiposi ℞j. ℞vij. gran. lxx. Massa nigra superstes pendebat ℞v. ℞vj. quæ per horas 16. in crucibulo calcinata reliquit cinerum ℞ij. ℞ij. gran. xxiiij. ex quibus salis fixi mere alcali ℞ij. gran. xxij. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℞v. gran. lvij. in calcinatione ℞ij. ℞ij. gran. xlvij.

Majorana salem essentialem obtinet ammoniacalem cum multo oleo tum tenui aromatico odoratissimo, tum spisso empyreumatico crasso conjunctum.

Partibus tenuibus, salinis, oleosis, aromaticis & activis pollet. Cibus non solum pro gratia concilianda additur, sed etiam ad eorum flauulentiam emendandam, aut eorum concoctionem faciliorem efficiendam, iis præsertim qui status generant ut Pisis, Fabis, Phaseolis & piscibus. Humores crassos & vitcidos digerit & attenuat, Partium fibras torpidas & languide oscillantes excitat, merrium spirituum distributionem juvat, sanguinis motum fermentativum vividiorum efficit. Cerebri nervorumque meatus flaccidos & laxè subsidentes restituere & aperit. Auxiliatur cerebri & capitis frigidis morbis quovis modo assumpta. Valet ad pectoris vitia: stomacho utilis est: & ad veri flatuos cæterosque ejusdem frigidos morbos confert. Urinas & aquosos humores ducit, menses provocat. Jecinosos & lienosos juvare dicitur. Cum cæteris aromaticis usurpatur in affectibus capitis & nervorum, palsy, apoplexia, vertigine, artuum tremore, spasmus & atonia fibrarum nervæarum, ac speciatim in catarrhis. Præ cæteris commendatur in coryza & in olfactus læsionibus. Hartmannus in *Praxi Chymiatrica*, pag. 111. asserit in Majorana delinere perfectum arcanum pro olfactu abolito.

Ejus pulvis ad ℞j. aut ℞ß. cum marmelada florum Aurantium quotidiè mane jejuno ventriculo tanquam experitissimum in epilepsia remedium a nonnullis exhibetur, teste Roderico a Fonseca *Tom. 2. Conflior. Medic.* 80. Aqua distillata Majoranæ inter aquas cephalicas & nervinas recensetur, & aquas & spiritus cephalicos & nervinos, tum interne, tum externe adhibendos ingreditur.

Enter-

Externe contusa vel pulverizata erhinum est optimæ notæ. Quin & ejus folia recensia inter digitos parum irita & naribus immissa fuerunt, mutamenta excitant, & caput ita purgant. Idem præstant ejus aqua distillata, vel insulum naribus attracta. Nicolaus Chesneau Medicus Massiliensis sequens erhinum a se sæpius expertum in cephalalgia commendat.

24. Radic. Hellebori albi 3ß. folior. Majoranæ pug. ij. Decoquantur in aq. 3vj. ad consumptionem tertię partis; ore aqua pleno utere, naribus attrahendo, ex decocto parum calido in vola manus posito: in dolore atroci, levem enim exasperat.

Aqua Majoranæ distillata catarrho plurimum confert, affirmante S. Paulli, si loco erhini, quæ prius simplici aqua vel vino repleto, vola seu cavæ manui infusa, compressa alterutra nare, altera exhauriatur: quo errhino summa cum laude Fabricius locet ejus in principe VValensteinio usus fuerat.

Ex eadem heiba exsiccata cucuphæ adversus catarrhos & frigidas capitis affectiones cum cæteris cephalicis pulveribus parantur.

25. Folior. Majoranæ, Salvie, Rosimarini, Beionicæ, summitatum Lavandulæ & Stœchados, Radic. Iridis Florent. & Calam. aromatic. ana q. l. Fiat pulvis, ex quo fiat cucupha interpuncta, excipiendo hunc pulverem paucis Gossypio & includendo in panno sericeo, qui pileo affui potest vel in forma calantricæ gestari, præsertim hyeme.

De horum cephalicorum medicamentorum utilitate in capitis affectionibus nonnulli dubitant. Verum sæpius capitis dolores & affectiones ex pericranio tantummodo affecto pendent: tuncque cephalica hæc externa maxime juvant. Nec minores sunt utilitatis eadem medicamenta in illis affectionibus, quæ a causa interna pendent. Si enim attendamus ad vasorum sanguineorum communicationes, nullus dubitationis erit locus, quin cum sanguine tenaciores horum medicamentorum partes tandem ad interiora cerebri pervenire possint, ibique obstructions referare & prolapsum fibrarum tonum restituere valeant.

Ex Majorana exsiccata oleum essenziale distillatur fragrantissimum, quod si nova distillatione rectificetur, multum adhuc resinosæ sæcis post se relinquit, observante Frederico Hoffmanno Professore Hallensi. Hoc oleum maxime conducit in affectionibus paralyticis & nervinis, tum interne ad guttam unam aut alteram exhibendo cum Saccharo mixtum sub elcosacchari forma, tum externe eo nucham & spinam dorsi inungendo. Vertici quoque capitis illius restaurare olfactum amissum Eismullerus scribit. Familiare est malum infantibus ut nares obstruantur, difficulter respirent, & in lacte sugendo impediuntur: cui incommode oleum Majoranæ, narrante Eismullero, externe naribus illitum, pro resolvendo muco egregie succurrit vel solum ubi mitius; vel mixtum cum oleo Irino & infuso Nicotianæ, ubi valentius operari debet. Interne autem tuto non attrahi aut immitti debet propter acrimoniam. Balsamum Majoranæ paratur ex Majorana

na viridi in axungia porcina sæpius infusa & ex ejusdem olei essentialis guttis aliquot instillatis. Hoc a S. Paulli plurimum commendatur in catarrho & coryzâ, si eo, pinnæ narium & *modo viri* inungantur. Eodem quoque nucha temporaque cum in modo dicto affectu, tum in aliis frigidis capitis affectibus utiliter inungi solent. Oleum essentielle Majoranæ in balsamorum apoplecticorum præparatione usurpatur.

℞. Olei nuc. moschat. ℥ss. oleor. essential. Majoranæ, Lavandulæ, Rutæ, Thymiana gutt. iij. olei Cinnamom. gutt. vj. olei Succin. gutt. x. M. F. balsamum.

Majorana usurpatur in pulvere cephalico, pulvere sternutatorio, decocto cephalico, syrupo de Artemisia, & in aqua apoplectica Pharmacop. Regiæ Charas.

M A L V A.

Inter plures Malvarum species tres potissimum in officinis usitatæ sunt; scilicet, Malva vulgaris flore majore, Malva vulgaris flore minore, quæ indiscriminatim usurpantur, & Malva rosea.

Malva vulgaris, Malva vulgaris flore majore, Off. Malva vulgaris, flore majore, folio sinuato, J. B. 2. 949. Inf. R. H. 95. Malva sylvestris, folio sinuato, C. B. P. 314. Malva sylvestris, major, Tabern. Bon. 768. Malva erratica 2. vel Malva equina, Bruseles: Malva vulgaris, Parkins. J. Raii Hist. 599. Malva sylvestris, Gerardi, Omnimorbiana nonnullis: vulgo, *Mauve*.

Radix ei simplex est, alba, paucis fibris capillata, alte in terram descendens, sapore dulci & viscido prædita: caules sesquicubitales & altiores, ex eadem radice plures, teretes, hirsuti, medulla sarcti, ramosi, minimi interdum digiti crassitudine fere. Folia singulatim per intervalla cautes vestiunt, pediculis prælongis insidentia, subrotunda, ima, nonnihil laciniosa, in caulibus magis laciniata, brevi & vix conspicua lanugine hirsuta, atrovirentia, in ambitu crenata. Flores ex alis foliorum exeunt plures simul, pediculis longis, tenuibus, hirsutis innixi, ampli, monopetalæ, campaniformes, patentes, in quinque segmenta cordata ad imum fere usque divisi, purpurei, saturatioribus lineis striati, & nonnunquam colore albo variantes. Ex floribus fundo emergit tubus pyramidatus flaminibus purpurascensibus onustus: calyce sustinetur duplici. Interior quinque partibus arte connivet & quinque lineas eminentes ostendit. Exterior tripartitus est. Ex calycis fundo surgit pistillum infimæ floris parti ruboque infusum, quod deinde abit in fructum planum, orbiculatum, placentæ umbilicatæ seu caseoli formam referentem, calyce involutum, constantem ex plurimis seminibus reniformibus, singulis capsula sua membra-

branacea peculiari cinctis axi fungoso, & striato ita coherente ut singulæ hujus axis striæ capsulam suam quasi articulatione quadam excipiant. Juxta sepes, semiras & in locis incultis & ruderalis sponte crescit. Folia, flores & semina usitatissima sunt.

Malva vulgaris flore minore, *Off. Malva vulgaris*, flore minore, folio rotundo, *J. B. 2. 949. Inst. R. H. 95. Malva sylvestris*, folio rotundo, *C. B. P. 314. Malva sylvestris minor Tabern. Icon. 769. Parkinson. J. Raii Hissor. 599. Malva sylvestris repens pumila, Lobel. Icon. 651. vulgo, Petite Mauve.*

Hæc omnibus suis partibus præcedente minor est. Radix non minus alte in terram descendit, ita ut difficulter extirpetur. Caules tenuiores, infirmiores, & in terram reclinati, hirsutiores etiam, verum lanugine breviori: medius tamen non raro erigitur. Folia minima, rotundiora, quæque in summis caulibus sunt minus laciniata præterea nigricant magis, & canitiem quamdam ostendunt. Verum præcipua differentia est in floribus, qui multo minores sunt, & ex pallida purpura albicantes, purpureis lineis striati. Non minus frequens est præcedente, & in eisdem locis proveniens. Indiscriminatim cum præcedente ad usum medicum legitur. Earum radices, folia, flores, semina usitata sunt.

Analysi chymica, ex foliorum & radicum Malvæ vulgaris recentium. ℞. per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, fere insipidi, & inodori, obscure acidi ℞i. ℥i. gran. lx. humoris limpidi, manifeste acidi, obscure subausteri ℞ij. ℥xij. ℥vij. gran. xxxvj. humoris rufi empyreumatici, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥i. ℥iij. gran. xxvj. salis volatilis urinosi concreti gran. xlvij. olei ℥ij. gr. xliij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℥iij. & densa erat: quæ rite calcinata reliquit cinerum leucophæorum (*gris de souris*) & densiorum ℥i. ℥vij. gran. xxvj. ex quibus lixivio salis fixi mere alcali ℥vj. gran. lxij. extracta sunt. Partium jactura in distillatione fuit ℥ij. ℥i. gran. lxxvj. in calcinatione ℥ij. gr. xlvj.

Malvæ succos chartam cæruleam non mutat, nonnihil glutinosus est, & saporem herbaceum satium tantummodo refert. Salem essentialem obtinet ammoniacalem cum oleo copioso, & uberiori phlegmate ita conjunctum ut mucaginem simul constituent, quæ igne in analysi destruitur. Attamen ab ea mucosa substantia Malvæ præcipua virtus pendet.

Malvæ in re alimentaria frequens olim fuit usus, & primum pene locum in mensis obtinuit, quæ hodie evuluit, culinis exulat, & ad Pharmacopœorum officinas prorsus relegatur. Pythagoras dixit Malvæ folium sanctissimum, referente Eliano *varia historia lib. 4. c. 17.* Apud veteres in quotidiano pene usu erat, ut exonerarent ventrem, qua de causa & græcis *μαλὰν ἀπὲ τῆς μελίσσης* ab emolliendo. Unde Martialis L. 10.

Exoneratur ventrem, mibi villica Malva

Atulit, & varias quas habet tortus opes.

Galenus scribit nutrire Malvam mediocriter; & si trium istorum olerum Be-

Betæ Lactucæ, & Malvæ succus comparatur, deprehendi ait, Betæ quidem tenujum esse partium, & abstergerendi virtute donatum: Malvæ autem crassum magis & lentum: Lactucæ inter utrumque medium. Priscæ non tantum coctam comedeant Malvam, sed etiam crudam in acetariis cum Lactuca: & adhuc apud nos nonnulli vere novo. cymas, & cauliculos Malvæ, Asparagorum more, ex oleo, & aceto prima mensa manducant, ne venter fluidus evadat, sed caveant, ne sicut Cicero ab illis decipiantur. Scribit enim *lib. 7. Epistolar. Epistola ad Gellum*, se a Malva deceptum, quoniam ejus usus alvi perusionem concitasset.

Utraque Malva indiscriminatim usurpatur; humectat, emolliat, lenit dolores, urinæ acrimoniam mitigat, & alvum blande laxat. Inter quatuor herbas, emollientes communes primum locum tenet: suntque Malva, Althæa, Viola nigra, & Acanthus seu Branca ursina: quibus adhuc aliz quatuor minoris famæ nonnumquam adjunguntur, Mercurialis nempe, Parietaria, Siela, vulgo Beta, & Arripex. Omnium siquidem usus, æque celebratur in decoctis enematum & cataplasmatum, emollientium parandis. Galenus observavit Malvam minus, quam Lactuca refrigerare, quod observare licet, inquit, si ex amobus vicissim oleribus cataplasma ad calidum quempiam affectum, quale est erysipelas, componas; id quod scititare consueverunt, mollicula folia perquam diligenter tendentes, donec ad lævorem exactissimum redacta sint. Tum, namque cognosces Lactucam manifesto refrigerare, Malvam vero modicum, & quasi tepidam quemdam calorem obtinere. Res ipsa analysi in Lactuca sal essentialis nitrosus deprehenditur, in Malva vero ammoniacalis.

Malvæ succus ad ℥vj. vel ℥viij. utiliter exhibetur in viscerum inflammationibus, melancholicis, maniacis, & mulieribus ægre parturientibus, teste Matthiolo. Foliorum decoctum vel aqua distillata assidue posita in interitis febrium, ardoribus, peripneumonia, pleuritide, plurimum conferunt, dysenteriam mitigant, in renum, vesicæ, & matricis inflammationibus, & abscessibus, dysuria, stranguria, utilia sunt. Grullingius in *praxi* decoctum vel aquam foliorum Malvæ ad ℥ij. cum Syrupi violacei ℥ss. urinæ ardorem & acrimoniam mitigare, & resistere illico prima dosi asserit. Quo remedio Forestus semetipsum dysuria, laborantem curasse testatur. Florum Malvæ infusum in aqua, Theæ ad instar, quotidie mane ad ℔j. epotum a. D. Chomel in *plantar. usul. hist.* tanquam expertum remedium in dysuria inveterata proponitur. Conserva ex Malvæ floribus parata ab Amato Lusitano *cap. 6. curation. 58.* & ab Hochstetero in *decad. 6. cap. 2. Scholio* in stranguria, dysuria, & aliis affectibus urinaris, uti & pectoris aggritudinibus plurimum laudatur. Foliorum, & radicem cum Fœniculo, & Anero decoctum lactuantibus copiam lactis affert. Folia, flores, & radices in jusculis & apozematibus temperantibus, & emollientibus, utiliter præscribuntur. Syrupus e succo foliorum Malvæ, & conserva ex floribus præparata ad verius calculosorum dolores commendantur.

Linac

Mal-

Malvæ radicem vel seminum decoctum ex aqua aut lacte per aliquot dies potum calidam tussim tollit, pulmōis exulcerationi medetur, & adversus phthisim commendatur. In clysteribus adeo frequens est Malvæ usus ut vix ac ne vix quidem ventrem emolliens ac dolores intestinorum renū, vesicæ, uteri mitigans clyster præscribatur, in quo Malva primas non occupet.

Parantur quoque ex ejusdem foliis fotus, & cataplasmata externis partibus imponenda, ad dolores sedandos, inflammationes compescendas, humores acres temperandos, exasperata lubricanda, tumores duros discutiendos, emolliendos, resolvendos, & abscessus maturandos, & ad suppurationem perducendos. Coquantur ex aqua vel lacte. Sæpe adeps purissimus vel olea cum foliorum expressa pulpa consociantur.

℞. Radic. Althææ minutim sectar. ℥ij. Folior. Malvæ, Bismalv. Violar. & Acanth. ana M. ij. Seminum Lini & Fœnu-Græci ana ℥j. Flor. Chamæmel. & Melilot. ana M. j. Decoquantur in aq. comm. q. s. Decocto effuso, cætera contundantur, & pulpa per setaceum trajiciatur. Unicuique hujus pulpæ libræ addi potest axungie porcine vel unguenti de Althæa ℥ij. vel olei Lilior. aut Chamæmel. ℥j. & coquendum iterum ad cataplasmatitis consistentiam.

In tinea, & ulceribus capitis, sicca crusta, decoctum Malvæ pro lotionis capitis singulariter commendatur. Ettmullerus hoc decoctum fieri jubet in aqua paululum acuata cum lixivio acri, aut urina sana. Si vero tinea sit humida, & achores sint manantes, tum coquitur Malva cum Pisis in aqua simplici vel cerevisia. Alii unguentum seu linimentum parant ex Malva ejusque radice subacta cum butyro majali non salito, & addita pauca camphora, & sit elegans linimentum, asserente eodem Ettmullero ad loca tinea, & achoribus affecta detergenda.

Malvæ folia usurpantur in syrupo de Althæa Ph. Regiæ Charas: semina in syrupo de Hytopo Mesua, Jujubino ejusdem, Trochiscis Gordani, Looch sano Pharmacop. Reg. Charas.

Malva rosea & Off. Malva rosea, folio subrotundo, C. B. P. 315. Malva rosea sive hortensis, J. B. 2. 951. J. Raii Hist. 600. Malva arborea sive hortensis, Taber. Icon. 756. Malva hortensis, flore simplici, Eschætz: Hastula regia, Gesner. borti cui & Malva Romana: vulgo, Rose d'Ourremer ou Tremier.

Ex radice longa, alba, lentum mucorem remittente, non alium quam Malvæ sylvestris saporem referente, assurgit ad arbusculæ magnitudinem, stipite crasso, solido, hirsuto, ramis aliquot brachiatis. Folia alternatim longis mediocriter & lanuginosis pediculis ex caule oriuntur, singula, lata infima & primum erumpentia rotunda, superiora in caule angulosa, quinque fere aut septem interdum divisuris insecta, in ambitu crenata, supra obscurius virentia, infra albidiora, utrinque pilosa, superne tamen in nonnullis adeo brevi lanugine, ut vix discerni possit: ex quorum alis flores emicant, nunc singuli, nunc bini, terni,

nive, pediculis brevibus, successive plures, rosæ vulgaris magnitudine; monopetali, campaniformes, patentes, & in quinque partes profunde usque ad imum fere divisi, colore vel rubro, vel puniceo, vel saturo sanguineo, vel carneo vel albo, interdum luteo, iique modo simplices, medium occupante cono apiculis subluteis, & purpurascensibus prædito: modo multiplici petalorum sætu luxuriantes. Insident autem hi calyci geminato, cana lanugine pubescenti. Fructum post se reliquunt in pistilli formam compressum, & Malvæ sylvestris similem, sed majorem. In hortis seritur. Flores ustati sunt.

Ip̃a planta, inquit Ettmullerus, minus temperata est, quam ejus flores rubri præsertim, qui blande sunt adstrictorii, & ob hanc causam a Paracello inter vulneraria relati. Gargarisma ex his floribus cum lacte paratum a S. Paulli commendatur pro tonsillis male habentibus, ut magnæ efficaciz remedium. Et ab Ettmullero laudatur hoc gargarisma anodynum in inflammationibus tonsillarum, angina, & faucium exulceratione. Quinetiam iidem flores exsiccati, pulverizati, & cum melle despumato, & aluminis tantillo mixti, ac gingivis illiti efficacissimum præbent remedium, affirmantibus iisdem S. Paulli, & Ettmullero, adversus oris gingivarumque corrosionem & laxitatem scorbuticam.

M A L U S.

MAlorum nomine fructus omnes molli tunica vestiti intelliguntur, ex quibus Poma præcipue commendantur. Quin & Pomum etiam generale nomen est, cujus significatio latius patet quam Mali: nonnulli enim nucem etiam hoc nomine complectuntur. Alii tamen nucem a Pomo ita distinguunt, ut Pomum sit quicquid foris habet quod edendo est, durum intus includit: nux quicquid foris duriore corio tegitur, intus habet quod edendo est.

Malus autem sive Pomus vulgo *Pommier* arbor est notissima, cujus duo genera distinguuntur, sativum unum, & agreste. Malus sativa iterum in duo genera dividitur, majorem nempe, & minorem. Major ad arboris mediocris magnitudinem assurgit, minor vero vix arbutulæ altitudinem superat. Eorum fructus Malum sive Pomum dicuntur.

Malus sativa, vulgo *Pommier cultive*, arbor est magis patula plerumque quam alta: cortice scabro, sæpe muscolo obiecta, foris cinereo, intus flavo ac lævi potius quam aspero, materie alba vel candicante, fragili, mediocriter dura, & variis utensilibus paravis atque ad torni artubium haud incommoda: radice non valde multa, nec admodum profunda, sed in summo fere terræ obhærente. Folia ex rotundooblonga, vel obtusa vel acuminata, inferne villosa magis quam superne, præsertim nova, in ambitu crenata, alternatim posita. Flores simul multi, ex brevibus tomentosis pedi-

pediculis, suaveolentes, rosacei, singuli quinque petalis candidis vel purpurascenibus, in orbem positis constantes, apicibus in medio subflavis, & calyce viridi quinquepartito, qui deinde abit in fructum carnosum, fere globosum, plerumque utrinque umbilicatum, in quinque loculamenta divisum, seminibusque fortum callosis & oblongis. Hic fructus Malum dicitur, magnitudine & figura varius: quippe alius rotundus, alius turbinatus, quidam angulosus. Sunt etiam qui ad pugni gemini magnitudinem accedunt, sunt & parvi, & mediocres, tunica omnes contehti vel pallida, vel flavescente, interdum rubra aut ex toto aut ex parte, rarius subcinerea, aut ad glaucum vergente, cui caro seu pulpa subest mitis, odorata in maturis, in immaturis & sylvestribus durior: sapore vel dulci, vel subacido aut vinoso, vel acido dulci: in sylvestri, austero atque acerbo. Pediculo suo unusquisque adhæret, eo ipso longitudine & crassitudine diverso, e parte inferna, atque ut plurimum cavata, rarius prominente emerso, in cuius opposito, parte nimirum superna, est id quod *αμφύτεια* quidam vocant ex Posluce, alii *ομφαλος* umbilicus seu cavitas quædam, cui inutile floris residuum insidet. In ipso fructus medittullio, seu volva Scribonio dicta, semina latent oblonga, altera parte obtusa, altera acuta, qua petiolum spectant, intus latentia, per maturitatem nigra, membranis quibusdam cartilagineis, seu parietibus intergerimis sejuncta, ita ut singula in singulis latent cellulis, interdum etiam gemina, quorum medulla candida, sapore subdulci.

Mali unam dumtaxat speciem J. Raius agnoscit. Infinitas quæ feruntur species, varietates tantum esse existimat, accidentibus quibusdam, magnitudine, figura, maturescendi tempore, differentes, quæ sationi originem suam debent: cum ex seminibus suis novæ in dies exoriantur. Nonnihil varietatis quoque ex insitione emergit, quæ nempe succus ex acerbo aut acido in mitem mutatur.

Amat quævis fere loca Malus, si ferventiora excipias, sed maxime temperata aut etiam humidiora, non tamen frigidissima. Rara est in interiore Italia & Gallo-provincia ob cæli fervorem. A Normannis ob potum quem ex ejus fructo parant, præcipue celebratur & feritur diligenter.

Mala seu Poma apud nos secundas mensas toto fere anno instrunt. Eorum, ut diximus, plures sunt differentie, quas hic recensere operosissimum & inutile foret. Quasdam tantum apud nos usitatores indicabo.

Mala Paradisiaca *Ruellii de natura stirp.* 251. Poma seu mala præcocia, *Tabern. Icon.* 998. vulgo, *Pommes de Paradis*: præparva sunt, mellea dulcedine, præcoci celeritate quasi verna, & omnium fere Pomorum fugacissima. Alia fructu sunt candido, alia fructu rubro.

Poma Rambura *Ruell. de n. stirp.* 251. vulgo, *Pommes de Rambour*: prægrandia, rotunda, callo fragili, tenero, mira & suavitate gustu & teneritudine, ita ut in ore frusta liquecant, sed ut fugientia diu servari non possunt. Facile ad prunas assantur, & ægris potissimum destinantur.

Poma

Poma Capendua, *Ruell. de n. stirp.* 251. Poma Capenduta, *Curtipendia* sive *Curtipenda*, *Carol. Steph. Præd. rustic.* 147. Mala Cestiana quibusdam, *Lugd.* 286. Mala Curtipendula dicta, *J. B.* 1. 21. vulgo, *Pommes de Courpendu* ou de *Capendu* ou *Pommes de Bardin*. Sic dicta sive quod brevi pendeant pediculo, sive *Carpendula* *απο το κειμεν* a fructu ut vult *Lud. Durerus*, quod inter fructus primas teneant: magnitudine media, colore alia griseo, alia rubro, alia rufa, alia dura, odoratu suavia, saporis grati, minime fugacia.

Renetea, Mala Prasomila, *C. B. P.* 433. Poma Renetia, *Caroli Steph. Præd. rustic.* 147. acido dulcia sunt & vulgarissima, quorum plures distinguuntur species; alia enim e viridi pallescunt, *Renettes vertes*; alia albicant, *Renettes blanches*; alia flavescent, *Renettes rouges*; alia e viridi ferrugineo colore distinguuntur quæ *Renettes grises*, & inter cetera plurimum commendantur.

Rosea Mala *Petri: Gontier de sanitate tuenda* 196. & Poma Appiana *eiusdem*: Mala Apiola & Milerosa *Martbiol.* quorum species duæ, majora & minora sunt: colore albo & roseo elegantissima, inodora, sed propter coloris gratiam, & propter aquæ deliciosæ ubertatem, qua os mandentium abluunt & sitim restinguunt, a principibus, & feminis aut aliis delicatulis plurimum expetita.

Passipoma seu Calvilæa, *Petri de Gontier sanitate tuenda* 196. Passipoma, *Ruell. de n. stirp.* 251. mediocri sunt magnitudine, turbinatiore figura, carne suavi, dulci, prætenera, gustu perquam jucundo, semine per maturitatem in utero sonante. Eorum tria sunt genera, alba & inodora, *Calvilles blanches*; rubra, foris & intus rubro colore tincta, & odore quasi violaceo fragrantia, *Erythromelon* magnum, *Parisiacum*, *J. B.* 1. 14. *Calvilles rouges* ou *Calvilles d'autonne*: dilute rubentia, *Calville clair*. Saporis gratia omnibus aliis, ut mihi videtur, antecellunt, potissimum si nimis non maturuerint, quo tempore farinacea gustu percipiuntur. Sed ut mire placeant, ita cito fugiunt.

Poma Castinia, *Ruell. de n. stirp.* 252. *Pommes de Chataignier* ou de *Martrange*: sunt oblonga, dura, mediocri magnitudine, sapore austriore quasi castaneæ.

Roma Francetura, *Ruell. de n. stirp.* 252. *Pommes de francatu*. Rotundo habitu & amplo, colore partim rubro, partim luteo, grata acerbitate, quæ tandem in dulcedinem degeneret. Diu servari possunt & annicula sæpe reperiuntur.

Poma Fœniculata oblonga sunt, mediocri magnitudine, colore e cinereo ferrugineo, sapore grato, dulci, saccharato, ad Anisi vel Fœniculi fere saporem accedente. Ideo *Fœniculistes* ou *Pommes d'anis*.

Harum & aliarum fere innumerarum Malorum specierum non eadem est temperatura. Errant igitur, qui de Pomorum qualitatibus iudicium ferunt nulla adhibita distinctione. Ratione saporis quem Medicus primario respicit, alia sunt dulcia & fragrantia ut nostra Calvilæa, & acido-dulcia ut Renetea quæ per tempus omnino dulcescunt, quæ

quæ utpote temperata saluberrima censentur, frigidis aut debilioribus stomachis conveniunt, reficiunt, ac nutriunt, & egregium præbent alimentum medicamentosum. Alia sunt acida, ut sunt ea quæ dicuntur apud nos *Pommes cossinates*, quæ refrigerant, conducentque ventriculo crasso ac viscido humore repleto, utpote quem acida huiusmodi incidunt ac detergunt. Flatus tamen, & alvi obstructions pariunt: & si cruda frequentius comedantur, nervis nocent. Quædam sunt aquosa, & satui saporis, quæ cum facillime in ventriculo corrumpantur, nullius fere usus sunt. Quædam austera sunt, ut *Poma Castanea*, quæ crassioris sunt substantiæ, tardius per alvum descendunt, eamque tistunt, constriungunt, & roborant. Immoderate comesta colicos dolores pariunt.

Rejicienda omnis generis *Poma*, antequam in arboribus maturuerint, decerpta. Concoctu enim difficilia sunt, tarde permeant, pravi sunt succi, & eximie nocent: unde variis, & gravibus morbis tenentur pueri sceminaque, ingluviem *Malis* vix dum inchoatæ maturitatis explentes. Cruda omnia, recens lecta flatulenta sunt, in debilibus ventriculis difficile coquantur, colicos dolores pariunt, & a nonnullis dicuntur nervosis partibus insensa. Optima sunt *Reneia* nostra, quæ in hyemem, & ad proximum ver usque asservantur, ceu non ita cruda, humida, & flatulenta: ita enim maturitatem quam non plenam a sole acceperant, ab ætate nanciscuntur.

In repositione *Poma* caduca bene separanda, ne putredine sua cætera inficiant. Cælo sereno collecta super asseribus collocentur, vel super palea triticea in loco frigido reponantur spectantibus fenestris ad aquilonem, vel in hordei æervo sepeliantur. Ab aliis per seriem in dolio, substrata, & superimposita palea, reconduntur; sic extructis variis *Pomorum*, & paleæ areis aut stratis, donec implerum sit dolium, illud ita accurate operiunt, ut aerem non admittat. Sic in vernum usque tempus durant, ac magna copia huc ex *Arvernâ* nobis quotannis afferri solent. Verum ne a frigore nimio congelentur, diligenter cavendum est: ideoque eum gelu vehementer ingruit, vel stragulis superjectis, vel telis cannabinis aqua madidis vel copioso stramine præferti avenaceo, contegenda sunt, vel in cellam subterraneam profundiorē recondenda, ubi a gelu etiam vehementissimo tuta, & illæsa latitant. Quod si incuria semel congelata fuerint, non igni admovenda ut restituantur, sed in aquam frigidissimam conjicienda, ut pristinam naturam recuperent: gelu scilicet ab interioribus ad externam *Malorum* superficiem, quæ glacie paulo post cooperta reperitur, reverte: quod equidem mirum. In ovīs congelatis non modo idem evenit, sed etiam in omnibus corporis humani partibus quæ gelu rigent; quare talis perniciōnis afflicti idem præstuisse auxilio fuerit.

Cossione, & assatione omnium malicia emendatur, & flatulenta tollitur. Coquendi autem varia est ratio. Assantur, elixantur, fringuntur, variis modis condiuntur cum saccharo, cum butyro, aut aromatis quibusdam. Ex iis placentæ conficiuntur, opera dulciaria diversa fabricantur.

cantur, passæ gelatinæ parantur. Secta per medias, seminibus membra-
nisque purgata in furno siccantur.

Licet Poma sint cuilibet genti gratissima, quibus ob salubritatem,
& suavitatem odoris saporisque nec ulla mensa caret nec officina phar-
maceutica, quæ eorum succis utitur ad confectiois Kermeticæ, &
syrupi Regis Sapor condituram, ut etiam ipsorum carne ad unguenti
Pomati confecturam, nihilominus Arabes de illis sinistre admodum senti-
unt. Averrhoes *V. colligit cap. XL.* sic loquitur. „ Poma generant
„ grossam ventositatem in secunda, & tertia digestionem, & possunt
„ inducere phthisim, & hæticam: quia status ab illis elevatus habet
„ proprietatem ad erodendas arterias pulmonis. „ S. Sethi illa pro-
prietate quadam nervis obesse scribit. Rhasis *ad Almanzorem*, im-
plere Poma viscosis humoribus stomachum: in *Aphorismis* vero Poma
acria oblivionem inducere asserit. Hippocrates quoque *Lib. 5. Epidemior. sect. 7.* docet oculis noxam asserre Lentem, Poma dulcia, &
olera: Idem *Lib. 3. de Dieta IX. 4.* inquit: „ At Poma fortiora sunt,
„ quam pro humana natura. Melius est igitur a Pomis abstinere.
„ Si vero quis cum cibus utatur, minime deliquerit. „ Caspar Hoff-
mannus Pomorum crudorum malitiam comprobat motus exemplo cujus-
dam Jurisconsulti Scipionis Gentilis dicti. Hic laborabat vertigine,
quam duo maximi Medici frustra tractabant. „ Relata re, inquit,
„ ad Matthæum patrem, qui tum in Anglia vivebat, responsum
„ venit. Tu nimis caperis crudis Pomis post prandium, & cœnam,
„ quæ indicibiliter corrumpuntur. Abdica, & viceris. Factum fuit ut
„ dictum est. „ Nec magis Pomis favet S. Pauli in *quadr. Bolarico*,
qui sexagesimum tertium ætatis annum agens narrat se ab anno qua-
dragesimo cordis palpitatione per longa mensium intervallo, & ple-
rumque sub autumnum infestari, quæ quidem a Pomorum crudorum
esû augebatur. Hæc autem sunt illius verba. „ Laudabant igitur alii,
„ quanto velint opere, usum Pomorum adversus gravissima cordis sym-
„ ptomata, per me licet: ego vero, qui antehac numquam esum
„ mitiorum sed crudorum Pomorum a prandio, & cœna averfatus sum,
„ manifeste adverti, me non quidem vertigine, instar Scipionis Gen-
„ tilis, corripui, sed persacile ab illorum esû cordis palpitacione infe-
„ stari, camque pertinacius mihi molestam fuisse, nisi sub autumnum
„ venam brachii tero incidendam curarim; ab iis crudis, licet mitibus
„ jam abstinere aut rarenter iis vesci sum solitus: præsertim cum semel
„ atque iterum incubum ea nocte sim passus, quâ a cœna suavitate
„ Pomorum crudorum captus, ad satietatem usque ea esitavi. „
Galenus *de cibis 8.* scribit Poma, & Pyra medicamentum potius esse
quam alimentum. Idem succi Malorum pravitatem arguit ex eo quod
expressus succus facile acefcat, & ebulliat statim ut mustum. Quod de
crudis Pomis intelligendum. Cocta autem minus nocere idem Galenus
lib. de visu atten. 2. concedit. Schola Salernitana *cap. 111. de vitandis*
cibis sic canit:

Per-

Perfica, Poma, Pyra, & Lac, Castus, & caro salsa:

Et caro cervina & leporina, bovina, caprina:

Atta hæc bile nocent, sumque infirmis inimica.

Dicuntur & calculum illis generare, qui ad satietatem utuntur; inquit Arnaldus Villanovanus, in commentariis in Scholam Salernitanam.

J. Bauhinus se vel suo periculo didicisse scribit fungosam Pomorum substantiam ventriculo frigidiori atque intestinis haud esse commodam. Nam præterquamquod diu in ventriculo obhærescit, status excitat atque dolores: adeo ut ab illis, & coctis, & crudis abstinere cogere-
retur. Pyra vero sive cruda sive cocta facilius ferebat, meliusque digerebat. Anasarcam ab iisdem nimia quantitate ingestis ortam aliquando fuisse, particularis Ridlini observatio est in *Actis Lips. ann. 1709. p. 317.*

Verumenimvero quidquid dicant Pomorum accusatores, Poma sanis alimentum præbent familiarium, & quamplurimis saluberrimum, ægrotantibus quibusdam non solum innocuum, sed etiam utile, in primis melancholicis, si eis in prandio, & cæna vescantur, aquam tantummodo pro potu bibentes. Sic enim facile digeruntur: ægre vere concoquantur in ventriculo, si vino consocientur. Constatendum est tamen ea non omnibus naturis convenire, non nimia quantitate devorari debere: nec nisi bene matura comedenda, sæpius cocta crudis anteponenda; nec sola, sed cum cibis, & præsertim cum pane esitanda, & diversa Malorum genera diversis naturis, aut affectionibus esse accommodanda. Ipse Galenus nos docet quodlibet genus Mali in suo genere non spernendas dotes obtinere, nec a mensarum honore repellenda. Austeris Pomis utendum, cum in ventriculos vel propter calidam intemperiem, vel copiosam humiditatem imbecillus fuerit; acidis vero; quando crassus succus, qui non magnopere frigidus fuerit, in stomacho collectus fuerit: alvum quidem humectant, & dejectiones movent, incidendo crassos humores, qui in ventriculo sunt; quod si vero ventriculum purum, & pravi humoris expertem invenerint, ventrem magis sistunt. Dulcia autem Mala cum ad calidam qualitatem vergant, frigido ventriculo conveniunt, ventrem solvunt, minimeque inflationes movent, ac saluberrima habentur. Calvilæa, & Renæta cæteris antepono: hæc acido-dulcia sunt ac per aliquod tempus asservata prorsus dulcia evadunt: illa prorsus dulcia sunt. Utrique gustu sapido grato, odore fragranti. Unde non immerito inter cardiacæ recensentur, nempe ratione tenuium partium, quibus donantur.

Analysi chymica, ex Renæteorum Malorum Bv. semotis semini-
bus, membranæ cartilagineis, & pellicula, per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, fere inodori, & insipidi, obscure acidi Bj. ℥ix. ℥ij. gr. lx. humoris manifeste acidi magis ac magis impense, deinde magis ac magis austeri Bjj. ℥ix. ℥vj. gr. xxxvj. humoris rufi empyreumatici, impense acidi, & maxime austeri ℥ij. ℥vij. gr. xlij. olei spissi ad instar extracti ℥ij. gr. xxx. Massa nigra in retorta residua pendebat

Groffray Tom. II.

D d

3v.

℥v. quæ per sex horas rite calcinata reliquit cinerum ℥ij. gran. xxiii. ex quibus lixivio salis fixi mere-alkali ℥i. gr. xxxvj. fuerunt extracta. Parium jactura in distillatione fuit ℥iij. ℥iij. gr. xlvij. in calcinatione ℥iij. ℥v. gr. xlvij.

Calvillæ mala humores præbuerunt minus austeros, paulo minus acidos, oleum minus crassum.

Utraque Mala contusa, & expressa succum præbent sapore dulcem, nonnihil mucosum, musto fere similem, qui per fermentationem vinosus fit, ac tandem acescit. Succus fermentatus, & vinosus non parum spiritus ardentis distillatione fundit. Mala, & eorum succus odorem fragrantissimum, & sæpe sua vehementia molestum spargunt. Salem essentialem obtinent tartareum, sed tenuiorem quam in uvarum succo, qui quidem sal fermentatione vel leviori volatilis fit, & in auras dissipatur. Tenuibus hisce partibus salino-acidis cum sulphureis aut mucosis nonnullis etiam tenuibus intermixtis, & consociatis. Mala, & eorum succus plurimum pollent adversus melancholiam hypochondriacam, & alias melancholicas affectiones, spissiores sanguinis, & humorum crasim dividendo, attenuando, blandam in sanguinem fermentationem suscitando, obstructions resolvendo; cordis palpirationi, spasmodicis moribus sæpe medentur, & hac ratione inter cardiaca medicamenta recensentur. Alvum blande laxant, & pertinaces alvi melancholicorum constipationes solvant. Bilem subtilem, & acriorem temperant, & involvunt, atque in febribus ardentibus plurimum conducunt: sitim sedant, & eorum decoctum pro potu vel iulapia ex his parata febricitantibus utiliter exhibentur. Profunt etiam in ictero, in hepatis, & glandularum mesenterii infarctu. Cocta Mala, tenuioribus partibus exhalatis, succo suo mucoso tartareo abstergentem, emollientem, involventem, temperantem & orgastices sanguinis commotiones compescentem qualitatem offerunt, rursim leniunt, expectorationem promoyent: & in decoctis bechicis usurpantur. Hæcicis, phthisicis utile præbent medicamento sum alimentum. Serum lactis in quo Renetæa aut acida Mala decocta fuerunt, æstuantia viscera temperat, humorum effervescentiam compescit, ardore & acrimoniam demulcet, obstructions aperit, & alvum blande emollit, & laxat.

℥i. Seri latis ope coaguli vitulini separati ℥ij. Poma Renetæa redolentia taleolatum secta n. ij. Coquantur per semiquadrantem horæ. Fiat colatura, qua dissolve syrup. de Pomis simpl. aut alterum pro indicatione. Hauriat æger per vices vel mane jejuno ventriculo, vel tertia, aut quarta quaque hora, ad ℥v. vel ℥vj. pro singula dosi.

℥i. Radic. Cichor. Fragr. ana ℥j. cortic. Tamarisci, & Cappar. ana ℥ss. Coquantur in aq. communis ℥iij. ad ℥iijss. Tum adde Malum Renetæum taleolatum sectum, & folior. Agrimon. Hepatic. Ling. cervin. & Ceterach. ana M. j. Summitatum Lupul. M. ss. Coquantur per semiquadrantem horæ. Fiat colatura pro apozemate aperiente, in quo dissolve syrup. de Pomis vel Violar. ℥iij. Dividatur in sex doses.

℥i. Hor-

4. Hordei perlati, & Orizæ ana ꝑß. Radic. Gramin; M. j. Coquantur in aq; comm. ℥iiij. ad ℥iij. Tum adde Liquiritiæ ratæ, & contusæ ʒj. Passular. excacinarar. ʒß. Ficus, & Dactylos ana n. iij. Coquantur per horæ quadrantem. Sub finem adde Pomum Renetærum ad ignem tostum. Fiat colatura, pro decocto pectorali.

Gesnerus in vitiis pulmonis, & dyspnœa Pomum assum excavatum, & drachma thuris repletum felici cum successu comedendum dedit. Idem remedium adversus pleuritidem plurimum commendatur. Sudorem nonnunquam movendo sanat. Quidam cum succo Pomorum acidorum limaturæ martis affuso tincturam seu extractum martis præparant in viscerum obstructionibus utile. Alii salem martis cum syrupo de Pomis simplici vel purgante consociant ad puerorum, & infantium cachexiam debellandam, necnon etiam ad rachitidem incipientem arcendam.

4. Salis martis ʒij. Solve in infusi Gentianæ ʒj. Adde syrup. de Pomis simplici. ʒix. Misce Dosis ʒß. ad ʒj. bis in die.

Externe cataplasma ex carne Pomorum igne assorum, vel in aqua aut lacte coctorum pulmenti ad instar in ophthalmia, & inflammationibus aut doloribus oculorum, necnon etiam ad oculos ex percussione, & contusione vulneratos plurimum commendatur. Nec minori commodo Poma putrida oculorum inflammationibus aut tumoribus quibuscumque imponuntur. Memorabile est experimentum, quod S. Pauli refert in *quadr. Botanico*. „Recordor, inquit, honestissimam matronam mihi, saliam, sibi a Lithotomo quodam Stralsundensi, femur gangræna correptum, omnino restitutum esse, postquam illius sualu Poma putrida contusa, & sine ullius liquoris affusione cocta, cataplasmatibus, formæ semel atque iterum applicuisset. “ Ab Ettmullero aqua ex Pomis putridis per alambicem distillata magnopere laudatur in quibusvis inflammationibus, & contra gangrænam; non secus ac adversus fluxus sanguineos vulnere, atque ulcera maligna putrida antiqua ex quacumque causa orta, ut & in ambustis. „ In hac aqua, inquit idem, si solvatur Mercurius dulcis, vel saccharum saturni, fit egregia ad ulcera phagadênica, telephia, & cacoethæ, quæ experia est a quamplurimis, & arcana esse dicitur nonnullis: item in cancro putrido, & corrosivo prodest, si scilicet linteam quadruplicatum hac aqua humectatum imponatur, & quidem hoc non in cancro solum, sed etiam in ulceribus corrosivis verum esse experientia Chirurgorum constat. “ Hæsternus Ettmullerus, qui etiam eandem aquam cum saccharo saturni mixtam, & cum linteis impostam egregiam dicit in ambustis.

11. Sucrus Pomorum usurpatur in confectioe Alkermes Ph. Reg. *Charras*, in syrupo de Pomis laxativo *Regis Sapor*, & in syrupo de Pomis comp. D. Blondell. In collect. *Pharmac. Penicher*. Poma Renetæ usurpantur in unguento pomato officinali *P. Reg.*

Inter omnes ex fructibus paratos potus post vinum, Pomaceum præstat. Hoc utuntur præsertim inferioris Neustriæ sive Normanniæ populi, vocantque vernacula lingua *du Cidre*. In Vascitania, necnon

in quibusdam Hispaniæ regionibus, ubi ob cœli inclementiam exiguus est vini proventus, familiaris etiam ejus est usus. Sic fere conficitur.

Poma leguntur carnis solidiusculæ, & multi succi; medio circiter Septembre, cœlo sereno. Hæc in acervum congeruntur, & soli per dies triginta exponuntur, ut qui in iis redundat aquosus humor, consumatur. Hæc sinuntur, donec maturitatem fere adepta sint, quo scilicet tempore gratum exhalant odorem. Si enim nimis maturentur, Pomaceum fiet aquosum debile: quare debent esse in primo maturitatis gradu. Deinde molis versatilibus, & trusalitibus contunduntur, prælo committuntur, tum in cupas deferuntur, ubi vini in modum fervent. Quod si Mala sint asperioris saporis, solidæ carnis, & pauci succi, modicum aquæ vel in cupas vel in prælum aspergitur, ut facilius comminuantur, & Pomaceum non pinguescat. Qui primus succus exprimitur, Pomis vi præli non conculcatis, sed mola tantum erassiuscule contusis, cæteris omnibus dulcior meliorque existit, & seorsim in doliis potest recondi. Poma vero in tinis residua post sufficientem fermentationem, & ebullitionem prælo committuntur, ut denuo conculcatus succus eliciatur, qui vinosior dici potest, & priori potentior seu acutior. Hic doliis inclusus de novo ferverescit, fermentatione purgatur, ac tandem in vasis rite occlusis, partibus heterogeneis secretis clarus evadit. Secundarium Pomaceum fit, cum magma Pomacei conteritur secundo, & comminuitur, tum multa aqua affunditur, maceratur ac tandem ferverescit. Hoc longe debilius famulatio debetur.

Est alter Pomacei parandi modus, sed hoc priore longe inferior: cum scilicet ipsa Poma confusa, & contrita in dolium injiciuntur, quod aqua postmodum repletur, maceratur, fermentatur, despumatur, donec aqua Pomorum virtute sit imbuta, & succo vinoso saporata: hinc usui asseratur.

Varie autem sunt Pomacei differentie, a colore, sapore, & parandi modo petite. Aliud enim coloris est rubelli, ut quod fit ex Pomis foris intusve rubescentibus: aliud flavescit, & est coloris Citrii, unde Citrum, & corrupte Cidrum nominari nonnulli contendunt. Licet aliæ hoc nomen derivent a Sicera, antiquissima voce, quæ licet Hebræa, tamen latinum sonat, & omnem significabat potionem quæ extra vinum inebriare potest. Aliud ut aqua limpida clarescit.

Paratur delicatissimum Pomaceum ex Pomis dulcibus, & fragrantibus, quod gustu dulce acutum deprehenditur. Mediocriter calefacit, satis nutrit, & omnibus stomachum frigidum habentibus utile. Dum recens est, status generat.

Ex acidiusculis Pomis quod concinnatur, acidiusculum quidem est, sed ætate magis clarescit, minus calefacit, sitim extinguit, sed frigidius, & crudius existit, difficilius digeritur, atque modicum nutrit. Acidum autem Pomaceum, sive hoc habeat a Pomis acidis, sive acorem tempore contraxerit, facile permeat, jecori, & stomacho æstuantibus apprimè utile est, bilem obtundit, vomitus, & fluxus biliosos sistit.

2 ON 605411

Quod

Quod si dulcibus acida Poma miscantur, citius acefcit, sed non omnino illaudandum.

Ex Pomis sylvestribus quod fit, diutius servatur, sed non æque jucundum: asperum est & sanitati minus proficuum; nonnisi post longum tempus assumendum.

Recens paratum, nondum defœcatum insalubre est, obstructions facit, cephalæas parit, stomachum lædit, at vero ex Pomis suo tempore collectis, bene maturis, nec diutius asservatis paratum, si bene defœcatum fuerit, & media ætate bibatur, omnium saluberrimum. Tunc quippe vim vires prope æmulatur, humectat & nutrit, caput non ferit, viscera non calefacit, a morbo se recolligentibus, phthisicis & præsertim melancholicis apprimè utile censetur. Vetus quod existit non ita laudandum.

Malus agrestis, *Pommier sauvage*. Minus fere procera est quam sativa, tortuosior, ramosior, frigosior, materie, ut putatur, duriore firmioreque. Multiplex ramorum & surculorum incondita divisura agrestem & incultum habitum facile ostendit. Folia quam sativæ magna ex parte minora, constrictiora. Flores sativis similes, sed fere minores, egregie odorati, interdum subrubelli. In fructu differentia præcipua; qui parvus & raro Juglandem æquans, magnitudine fere Mespili, sed figura rotundior, longiusculo, ac tenui pendet pediculo, cortice seu cute viridi, tandem & flavescente, quorundam etiam pulchre rubente. Sed nec substantiæ molliæ, nec saporis convenientia unquam ad sativa accedunt, ac ne quidem ad infimæ naturæ acidissima vel austera. Tanta pollent adstringendi facultate, tantaque acerbitate, ut esui plane inepta, nec unquam coctura aut alio modo fiant apta. Malorum agrestium non minus quam hortensium & cultorum plures habentur species, quorum enumeratio inutilis foret. In sylvis & sepibus frequenter occurrunt.

Fructus vehementer austerus est, acidus & adstringens; nec minus succus e contusis & prælo expressus, cujus usus est apud quosdam, & agrestia a nonnullis dicitur. Pisces in eo coctos firmiores fieri & sapidiore afferunt.

Succus ille cum flore Cerevisiæ mixtus & impositus utilis dicitur adversus ignem sacrum, scabiem, inflammationes quasdam, potenter enim repercutit; Oculis instillatus eorum inflammationes sedat. J. Rajus illum ad scrophulas commendat.

24. *Inquit*, succi Pomorum sylvestrium quæ l. eoque calefacto diligenter detergantur ulcera strumosa. Deinde lana nigra oleo e pedibus bovinis prius humectata tepide imponatur; quæ per aliquod tempus continuata strumas sanant.

MALUS GRANATA sive PUNICA.

Granatæ seu Punicæ Mali genera duo in officinis distinguuntur, Punicæ sativæ & sylvestris. Hæc Balaustrum a nonnullis dicitur; illa vero in plures adhuc species dividitur ratione magnitudinis fructuum, saporis aut coloris, ut mox dicemus.

Observandum est Mali Punicæ flores & fructus diversa nomina sortitos fuisse apud veteres. Flores sativæ Punicæ Κύτιον dicuntur Dioscoridi L. 1. cap. 152. & Galeno 6. simplic. At Galeno 6. secundum loca, cytinus fructus rudimentum est, quod deciduo flore primum apparet & formatur: & Plinio L. 23. cap. 6. „Primus hujus Pomi partus florere incipit, pientis cytinus, vocatur græcis: & in hoc ipso cytino flosculi sunt, antequam scilicet malum ipsum prodeat, erumpentes, quæ Balaustrum, vocari diximus.“ Hæc Plinius. Verum Βαλυστρίον sylvestris Punicæ flos est Dioscoridi L. 1. c. 154. Officinæ Plinium sequuntur, & Punicæ tam sativæ quam sylvestris flores citra distinctionem Balaustrum vocant, quibus cytinorum appellatio de sativis ignota est. Cytinus Theophrasto calyx est floris, quo flos continetur: adeo ut cytini significatio apud græcos ambigua sit.

Mali Punici putamen, quod tanquam corium sit, Pomorum cute durius, nucis involucro tenerius, malicorium vocant, nonnulli pfdium, quod græcis Σίδιον Dioscoride monente, nunc τὸ τῆς ροῦς λίμμα κ'τὲ τὸ λίπτον, id est decorticare dicitur. Plinius loco citato, sic loquitur: „Vulgus ex Punicis acerbis coria perficere novit, ob id Malicorium appellant Medici. Cicus vel cicum Varroni membrana est tenuis, acinos in malo Punico discriminans.

Granata sive Punica Malus sativa, Off. Punica quæ Malum Granatum fert, Casp. pin. 141. I. R. H. 636. Malus Punica sativa, C. B. P. 438. Malus Ponica, J. B. 1. 76. Raii Hist. 1462. Malus Granata sive Punica, Tabern. Icon. 1033. vulgo, Grenadier Domestique & fructus Granatum sive Punicum Malum, Grenade.

Humilis arbor vel potius frutex est, quamvis interdum culta, stolonibus abscissis in justam etiam arborem excrescat, ramis tenuibus angulosis brachiatis, quos armant spinæ rigidae aliquot, oblongæ, subrectæ, cortex obducit rubescens. In his folia incondita, Myrti vulgaris vel Oleæ æmula, non ita acuta, nitide virentia, pediculis annexa rubentibus, rubrisque intercurfantibus venulis prædita, adversa parte nervosa, odore gravi, præsertim si manibus contractata natibus admoveantur, canum halitum feliumque urinæ graveolentiam aliquo modo referentia. Ex ramorum lateribus flores emicant rosacei, pentapetali, punicei, quorum medium occupant complura stamina cum suis apicibus, quorum cytinus seu calyx, Puniceo etiam colore

ful-

fulget, uncia longior, coriaceus, campaniformis; in quinque lacinias mucronatas divisus, quæ postea Pomii succedentis umbilicum coronant. Calyx abit deinde in fructum fere globosum, hinc inde nonnihil compressum, variae magnitudinis, maximis Malis fere æqualis. Cortex mediocriter crassus veluti coriaceus, duriusculus tamen & fragilis, ante maturitatem viridis, ac lævis, post puniceus & rugosus, qui tandem etiam ad spadiceum accedit, intus luteus, gustu adstringens, numerosis acinis plenus, in varia loculamenta dispositis, in aliis colore intense rubro, in aliis amethystino, succo vinoso abundanti repletis, dulci alias, alias acido, interdum medio, favorum modo dispositis, carnosis membranaceisque dissipationis ceu parietibus integerrimis circumscriptis, amaris, modo candidis, modo purpurascens, cum placenta in medio sita. Singuli acini semen seu granum continent unicum, oblongum, gargarum vitis simile, constans ligneo cortice & nucleo amaro, non tamen sine adfusione. Repetur singulare quoddam hujus Mali genus quod nullum in acinis semen continet, verum hoc accidentarium est & ex lusu quodam naturæ. In Gallia Narbonensi, Gallo provincia, Italia & Hispania sponte nascitur. In frigidioribus Gallie provinciis in hortis colitur, & hyeme curiose contegitur aut in cellis reponitur: alioquin a frigore læditur. Flores, fructum acini, succus, nuclei, & cortex in usum veniunt.

Mali Puniceæ fructus ratione saporis in tres species distinguuntur: in officinis, alii saporis sunt acidi & magis usati, alii sapore dulci, alii vero sapore medio inter acidum & dulcem, seu, ut ajunt, vinoso: ut sapore, ita viribus nonnihil inter se differunt. Succus acidus ex acinis Mali Punici acidis expressus distillatione phlegma primo saporis expers fundit, deinde humorem acidum, parum olei & mediocre terræ portionem relinquit. Si succus ille expressus & defœcatus in cellis reponatur in vase clauso, saltem essentiali præbet copiosum & sapore acidum. Succus vero ex vinosis & dulcibus, minus acidi humoris in distillatione suppeditat, paulo plus olei; minorem quoque salis essentialis quantitatem deponit, si in loco frigido reponatur. Horum tum acidorum, tum dulcium, tum vinosorum succus, si tempore calido sibi ipsi relinquatur, fermentescit, & vinosus fit. Si vero diutius deselerat, in acrum convertitur. Ex hoc succo debite fermentato & vino facto spiritus ardens extrahi posset, veluti ex fructibus omnibus fermentatis fieri solet.

Acinorum nuclei seu semina humores distillatione præbuerunt acidos, intense austeros cum alcali vinosi liquoris tantillo, olei non mediocre portionem. At massa nigra superstes & copiosa per 16. horas calcinata pro majori parte in fumum & flammam abiit & residuum portio exigua nigredinem suam nondum deposuerat: paululum salis fixi more alcali ex ea fuit extractum.

Malicorium vero seu Granatorum cortex eisdem propemodum liquoribus distillatione fudit: ubiorem adhuc carbonis seu massæ nigre quantitatem relinquit: & hæc massa per horas triginta calcinata fumos emisit, & residuum colorem fuscum semper retinuit, ex quo salis fixi tunc alcali

quantitas haud exigua extracta fuit : & multo major terræ copia quam ex nucleis remansit . Sed hæc terra fusca mihi videtur esse oleosa portio admodum concentrata & valde fixa , ita ut ignis vi resistere valeat : & stypticitas rerum acerbarum & austerarum non tam a terra quadam porosa & adstringente pendere mihi videtur , quam ab acido quodam tale adeo fixo ut difficile admodum ignis vehementia elevari queat . Sal ille acido vitriolico vulgo comparatur , nec immerito ; quoniam quidem vitriolicus sal acidus omnium fixissimus est , ut quotidie experimur in olei vitrioli distillatione . Nec illa fixitas , ut ita dicam , maris aut venæ terræ adstringenti tribuenda est , cum in tartaro vitriolato , in sale mirabili Glauberi & in alumine sal ille adhuc fixior sit , ubi cum sale alcali fixo , terra abscondente salis marini , & terra calcarea conjungitur , a quibus vi ignis separari nequit : insuper acidus sal vitriolicus , si cum oleis confocietur , vel etiam cum spiritu vini , per tempus & diuturniori digestionem adeo stricte uniantur : ut in resinam abeant massam , cujus major pars ignis tortura in terram nigram fixissimam saporis & odoris expertem convertitur . Sapor igitur acerbus & austerus mihi videtur præcipue pendere ab illo hujus acidi cum oleo consortio , sed de his alibi . Nunc ad Mala Punica redeamus .

Punicorum omnium Malorum acini seu grana censentur boni succi , & ventriculo convenientia , sed pauci nutritivi : niliter usurpantur ubi adstringere , densare , & corroborare opus est . Acida potentius refrigerant , & adstringunt . Acidorum grana succulenta in hæmorrhoidibus nimium fluentibus frequenter mallicata velut certum remedium Thomas Bartholinus in *advis Hafniensibus* vol. 1. obs. 51. Lentiliis in *miscellaneis curiosis* Dec. 2. ann. 9. obs. 124. & Conrad. Barthold. Behrens in *selektis diæticis* commendant . Eorum succi , & syrupi ex eo parati usus est ad febricitantium sitim leniendam , ventriculi ardorem æstumque temperandum . In febribus ardentibus , biliosis præsertim conducunt , & ubi humor quispiam acris os ventriculi occupavit : In cardialgia a turgente bilioso humore Jacobus Fabricius , annotante S. Paulli , syrupum granorum granatorum acidorum pro specifico habebat , & adversus vomitum & singultum eo frequenter utebatur : Jamdin Hippocrates in eodem affectu Punici succum valiter adhibuerat : „ Mu-
„ lier , inquit L. 2. *Epidemior.* cardialgia torquebatur , nec prius ma-
„ lum est sedatum , quam polenta succo Punici mali aspersa semel die
„ uteretur , reliquis cibis abstinens . “ Idem succus ventriculum corro-
borat & cor mirifice reficit ; ab eodem S. Paulli malignorum morborum Alexipharmacum nuncupatur , & in malignis febribus , variolis & morbillis , necnon in dysenteria commendatur . In vitioso gravidarum appetitu seu pica ab Etemultero laudatur & in hæmorrhagiis quibuscumque a sanguinis æstu oriundis . Pulmonibus vero debilioribus & male affectis aut ruffientibus adversatur . Dulcia grana stomacho roborando utiliora dicuntur : at in febribus minus proficua sunt , quod stomacho calorem aliquem inducant , inflationes & effervescentias pariant . Vinosa seu acido-dulcia media sunt naturæ inter dulcia ,
& aci-

& acida : cardiaca habentur , & cephalica , a nullis in syncope , vertigine commendantur . In julapiis , & apoxematibus succus , & syrupus ad ℥j. aut alteram præscribuntur .

℥j. Confectio. Alkermes ℥j. succi Granator. desecati , aquar. Borragin. & Oxytriphyll. ana ℥ij. Syrup. Granator. ℥j. M. F. potio cochleatim fumenda in febribus malignis , & variolis .

Grana seu semina quæ in acinis continentur , variis nominibus in officinis designantur . Appellantur enim Officula , Nuclei , Semina , Vinacea , Gigarta , & Arilli quasi ariduli . Saporem amarum adstringentem referunt : & commendantur in alvi profluviiis , & ad ea conducunt , quibus adstrictione opus est . Matthioli pulverem conficit ex eorumdem officulorum exsiccatorum ℥j. & ℥j. Thuris in tenuissimum pulverem contritorum , cujus ℥j. aut ℥ij. mulieribus albis uteri profluviiis laborantibus quotidie exhibet .

Malicorium . Psidium vel Sidium ; Off. seu cortex Mali granati sapore amaranctico , austero donatur : valide adstringit , & utilis est vice corticis quercini ad coria præparanda , & vice gallarum ad atramentum cum vitriolo conficiendum , nam solutionem vitrioli viridis nigro colore tingit . Conducit in diarrhæa , dysenteria , & alvi profluviiis quibuscumque ; in hæmorrhagiis , albo mulierum fluxu , & gonorrhæa , modo tamen caute exhibeatur nec præmature . Partium tonum potenter corroborat , unde non raro contrarios effectus obtinuit . Observat enim Thomas Bartholinus mulierem quandam a menſum suppressione , usu corticis Granatorum liberatam fuisse . Eisdem contrarios , & aperiendi , & adstringendi effectus in martialium medicamentorum usu jam observavimus . Constantinus scribit , malicorium vino decoctum , & potum omnes ventris tinea necare , maxime eas , quas ascaridas vocant . Malicorium pulveratum a ℥ß. ad ℥j. pro dosi præscribitur ; in decoctis ad ℥ß. adhibetur .

Externe in decoctis , gargarismatis , & clysteribus adstringentibus usurpatur .

Balaustia , Off. sunt flores cujuscumque Mali Punice cum calycibus indiscriminatim uturpati . Ut plurimum tamen ex Italia , & Gallo-Provincia Balaustiorum nomine mittuntur flores cujusdam Mali Punice flore pleno quæ dicitur Punica flore pleno maiore , I. R. H. 636. Malus Punica flore pleno , Hort. Reg. Paris. Balaustia Hispanica , J. B. 1. 82. Balaustium , Tabern. Icon. 1033. Balaustia flore pleno maiore , C. B. P. 438. Malus punica sylvestris major , sive Balaustum majus , Parkinson. J. Raii Hist. 1463. vulgo in Gallo-provincia Balaustier , & Paparoi . Flores sunt amplius , densissimo petalorum purpurascensium sæctu stipati , non cytino oblongo ut in sativa pomifera Punica seu simplici seu multiplici flore , qualis nonnunquam reperitur , sed compresso , & lævo suffulti , cui color ex flavo purpurascens , corium durum , lignosum , & in plures quoque lacinias divisum . Adeo multiplici petalo interdum constant , ut Rosæ censifolice videantur colore saturato . Hæc Balaustia in Gallo-provincia pharmaceuticis officinis , teste Petto, Garidel in Historia plantarum in agro Aquilensiensi ;

nascentium, ut præstantiora cæteris floribus anteponiuntur: nec viribus sunt inferiora.

Balaustia adstringunt, paulo minus tamen, quam Malicorium, inspissant, exsiccant. Unde creberrimus est eorum usus in omni generis fluxibus, v. g. diarrhæa, dysenteria, fluxu uterino tum cruento, tum albo, tum etiam in sanguine vulnenum cohibendo, gingivarum laxitate emendanda, in hernia curanda, &c. Interne pulverata ad ℥j. aut ad ʒss. in decocto præscribuntur, & in opiatīs, decoctis, potionibus, aut injectionibus, & lotionibus adstringentibus usurpantur, necnon in colyriis ad præcavendum, ne oculi a variolis, & morbillis lædantur.

℥j. Balaustior. pulverator. ʒss. Boli Armen. Terr. sigill. Corall. rubr. & Terræ japon. ana ʒij. syr. Cydonior. vel e Rosis siccis q. s. M. F. opiata absorbens, & adstringens in alvi profluviiis, præmissis præmitendis. Dosis ʒj. bis terve in die.

℥j. Flor. Balaustior. ʒij. Malicor. Sanguin. draconis, lapid. hæmætitid. pp. & Alum. crystall. ana ʒi. conserv. Rosar. rubr. veteris ʒss. syr. de Symp. quant. suff. M. F. op. Dosis ʒj. in alvi profluviiis, & hæmorrhagiis.

℥j. Folior. Plantag. M. j. Balaustior. & Rosar. rubr. ana M. ʒ. Coq. in aq. ferrarior. ℥ij. ad ℥ij. In colatura dissolve alumin. rop. ʒss. Syrup. Granator aut Biberis ʒj. F. decoctum adstringens pro gargasmo, vel injectionibus adstringentibus.

℥j. Balaustior. M. ʒ. Malicorii contusi ʒij. Infundantur in aq. Rosar. & Plantag. ana ʒvj. repide per aliquot horas, deinde leviter ebulliant, & per chartam bibulam transeolentur. In colatura tere Croci Oriental. subtilissime pulver. gr. vj. vel Caphuræ gr. ij. F. collyrium quod identidem oculi a variolis præservandi foveantur.

Balaustia usurpantur in syro Myrtino, Pulvere dysenterico, Eleovar. Micleta. Troch. de Karabe ung. Styptico. Malicorium in ung. Styptico.

MALUS PERSICA.

MAlorum Persicarum multæ species seu varietates tum a veteribus tum a recentioribus memorantur. Differentiæ autem sumuntur vel a loco natali, vel a figura, vel a consistentia seu soliditate carnis, quo respectu alia duracina dicuntur, alia præmolliā, vel a sapore, vel a colore pulpæ, vel a celeritate aut tarditate provieniendi, & maturascendi. Duracina, auctore Plinio, quem sequuntur multi e recentioribus, caro firmiter adhæret ossi, nec facile avelli, aut separari potest. At vero rem ipsam inveniunt, inquit Joann. Bauhinus, contrarium ut plurimumprehendimus. Enim vero sane hæcenus in Gallia, Italia, & Germania observavimus, magna ex parte Persica, quibus pulpa hæret ossibus, cæteris sæpe esse mol-

molliora, ac interdum penitus mucosa & succulenta; firmiore vero pulpa cui non adhæret: quod & J. Rajus propria experientia confirmat. Commodissima autem divisio Persicorum, auctore J. Rajo, est primo in ea quorum corpus pertinaciter ligno adhæret, & ea in quibus facile, & sponte a ligno abscedit; utrumque autem genus vel magnitudinis, vel coloris, vel figuræ, vel superficiei respectu in plures species subdividi potest, quibus non immorabor. Horum plures species Cl. Tournefortius in *Inff. R. H.* recensuit, quas ibi videre licet. Nunc de Persica Malo vulgari cuius flores in usum medicum veniunt.

Malus Persica vulgaris, Persica molli carne, & vulgaris, viridis, & alba, C. B. P. 440. Malus Persica, J. B. 1. 157. *Dodon. Pempt. 796. J. Raii Hist. 1515.* Arbor est plurimis Galliarum regionibus notissima, & frequentissima, qua scilicet omnia pene vineta consistunt. In mediocrem proceritatem assurgit, caudice satis crasso, ramis brachiata fragilibus, cortice rubente & subsusco, materie rufa, & circa media fere punicea, satis firma. Folia profert rara, oblonga, acuminata, crenata, amygdalinis, quibus persimilia majora, sapore amaro qualis Persicorum nucleis, ingratiore tamen, & aroma utcumque redolentia. Flores ineunte vere ante folia prodeunt sine pediculis ramorum tuberculis adnati, pulchri, rosacei, e quinque petalis latis dilute rubescentibus, odoris exigui, in orbem positis constantes, quorum medium occupant stamina multa, longiuscula, purpurantia aut alba, cum parvis magnitudinis pistillo, quod ex calyce rubente in quinque segmenta acuta divisio, surgit, & deinde abut in fructum fere globosum, altera parte nonnihil depressum, & per longitudinem sulcatum, densa, molli, & albida lanugine in plurimis speciebus obductum, in nonnullis glabrum, ex luteo herbaceum, alias pulchre flavum, alias punicea area decoratum, carne succosa, alba vel pallida, interdum flava, rarius rubente, penitus aut sanguineis guttis cruentata, esculenta, sapore dulci nonnihil vinoso, ossiculo lignoso foetum, oblongo, ovato, nonnihil compresso, binis valvis nonnumquam per maturitatem dehiscentibus constante, profundis excavato scrobiculis, & sulcis, quibus pulpa passim se insinuat, & in quibusdam speciebus percinaciter adhæret, licet in alis facile separabilis sit. Est autem ossiculo crassities insignis, durities fere invicta, externa facies rugosa, & sulcis profundis nullo ordine canaliculata, interne levis, & polita, in quo nucleus callolus, amygdalini æmulus, oblongus, exacutus, albus, flavescente cuticula vestitus, amarus, non tamen gustu insuavis. Ex arboris cortice vulnera o, vel sponte disructo gummi profluit initio liquidum, quod successu temporis siccius ac durius redditur, pellucidum quale ex Amygdalis, Cerasis, & aliis arboribus, quarum fructus lignosum nucleum ferunt, prodire solet. Hæc arbor non multam ætatem acquirit: ut enim cito & prompte adolescit, & ad frugem pervenit, ita non multis annis post senescens tendit ad interitum. In hortis ac vinetis seritur & plantatur. Folia, flores, fructus, nucleis & gummi in usum veniunt.

Ana-

Analyſi chymica, ex foliorum Mali Perſicæ recentium ℔v. per retortam diſtillatis prodierunt humoris limpidi, odore & ſapore nucleos Perſicos referentis, obſcure acidi ℔j. ꝑijj. ꝑvj. gran. xvij. humoris limpidi, manifeſte, & magis ac magis acidi, ſubauſteri, ac tandem auſteri ℔ij. ꝑix. ꝑj. gran. liij. humoris ſubruſi, leviter empyreumatici, impenſe acidi, aliquantiſper acris, pungentis, ſubſali, & impenſe auſteri ꝑj. ꝑijj. gran. liij. humoris ruſi, ſale volatili urinoſo copioſo imprægnati ꝑj. ꝑj. gran. xxxvj. ſalis volatilis concreti ꝑj. gran. lvj. olei ſpiſſi ad inſtar extracti ꝑj. ꝑijj. gran. xxiiij. Maſſa nigra in retorta reſidua pendebat ꝑvij. ꝑijj. gran. xxxvj. quæ rite calcinata reliquit cinerum ꝑj. ꝑj. gran. xxxvj. ex quibus ſalis fixi mere alcali ꝑv. gran. xxx. lixivio extracta ſunt. Partium jactura in diſtillatione fuit ꝑijj. ꝑvj. gran. x. in calcinatione ꝑx. ꝑijj.

Folia Mali Perſicæ guſtu amara ſunt, nonnihil auſtera, & nucleorum Perſicorum odorem referentia dum digitis conteruntur. Saleſſum eſſentialem obtinere videntur tartareo vitriolicum ammoniacalem cum oleo tum tenui tum craſſo ſat copioſo conjunctum.

Ex Mali Perſicæ florum recentium ℔v. per retortam diſtillatis prodierunt humoris limpidi odore, & ſapore amaro nucleos Perſicos contritoſos referentis, & obſcure acidi ℔ijj. ꝑx. ꝑijj. gr. xxj. humoris manifeſte acidi ꝑvj. ꝑj. gr. lx. humoris ruſi, odore & ſapore leviter empyreumatico, manifeſte acidi, ſubſali ꝑij. ꝑijj. gran. xij. humoris ruſcentis, ſale volatili urinoſo copioſo imprægnati ꝑj. ꝑj. gran. lxvi. ſalis volatilis urinoſi concreti ꝑj. gran. iij. olei ſpiſſi extracti ad inſtar ꝑj. ꝑvij. gran. xiiij. Maſſa nigra in retorta ſuperſtes pendebat ꝑijj. ꝑvj. gran. j. quæ rite calcinata reliquit cinerum ꝑj. gran. lxix. ex quibus lixivio ſalis fixi mere alcali ꝑijj. gr. ix. extracta ſunt. Partium jactura diſtillatione fuit ꝑij. ꝑvj. gran. xxxix. in calcinatione ꝑij. ꝑvj. gran. iijj.

Flores amarorem quemdam aromaticum non ingratum obtinent. Saleſſum continent eſſentialem tartareo-ammoniacalem cum multo oleo tum tenui, acri, parco, tum craſſo copioſo conjunctum.

Amarities florum, & foliorum a tenui illa ſulphurea portione oriri mihi videtur, quæ cum phlegmate primo elevatur, & odorem ſaporemque ipſi conciliat. Nec omnino diſſimile eſt ab acri illo ſulphure ſubtili quod in quibuſdam purgantibus deprehenditur, ut in Helleboro reperiri diximus; & fortaſſe a tenui illo ſpiritu ſulphureo vis purgans præcipue pendet.

Ex Malorum Perſicorum carnis ſucculentæ, remotis offiſculis, & cuticula, ℔v. per retortam diſtillatis prodierunt humoris limpidi, odoris, & ſaporis dulcis, & grati, aliquantiſper vinoſi, obſcure ſubſali ꝑxij. ꝑv. humoris limpidi, obſcure acidi ℔ij. ꝑxij. ꝑvj. gran. lx. humoris magis ac magis manifeſte acidi, cum quadam auſteritate ꝑxv. gran. xxxvj. humoris ruſcentis, nonnihil empyreumatici, tum ſubacidi, auſteri, tum ſali, & alcali urinoſi ꝑj. ꝑj. iij. olei fluidi gran. xxxvj. Maſſa nigra in retorta ſuperſtes pendebat ꝑijj. ꝑj. iij. quæ per tredecim horas igne reverberii vehementi cal-

calcinata nigredinem suam deponere nequivit, sed reliquit cinerum nigrorum ℥i. 3v. gr. xxiiij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥i. gr. ij. extracta sunt. Partium æctura in distillatione fuit ℥i. ℥iiij. gran. xij. in calcinatione ℥i. 3v. gr. xlviij.

2. Persica Mala sapore donantur dulci, vinoso, grato cum quadam levi austeritate. Salem essentialem obtinent parcum quasi Melleum aut Saccharinum tartareum, & nonnihil vitriolicum cum mediocri olei crassi, & exigua tenuioris, & quasi spirituosius portione conjunctum, multoque phlegmate dilutum.

Vulgaris opinio multis sæculis inveterata est, Mala Persica in Perside, unde primum advenisse ferunt, venenosa fuisse, sed in Ægypto soli benignitate mitigata: quod Junius Columella eleganti carmine expressit

Stipantur Calashi pomis, quæ barbâra Persis

Miserat, ut fama est patriis armata venenis;

At nunc expositis parvo discrimine leti,

Ambrosios præbent succos oblita nocendi.

Plinius Lib. XV. Cap. xij. hanc opinionem refellit his verbis: „Falsum est Persica venenata cum cruciatu in Persis gigni, & poenarum „causa a Regibus translata in Ægyptum, terra mitigata. Id enim de „Persica diligentiores tradunt, quæ in totum alia est. „Galenus, & Paulus Ægineta Persicorum omne genus damnant, ut pravi succi, & quæ noxam ventriculo inferant: addit Paulus ea lædere nervos proprietate quadam, & eos, qui crebrius iis ad satietatem vescuntur, febre corripi. Suadent itaque ut initio refectuum ante alios cibos sumantur, & ne aqua superbibatur, sed vinum meracum. Hoc præceptum in omnibus quæ sunt pravi succi, & humida simul ac lubrica, ita ut subduci facile queant, plurimi communiter tenendum existimant. Sic enim fiet ut citius egerantur, & aliis cibis viam præbeant, quæ si sumpta fuerint postrema, una secum alia quoque corrumpant. Contra nonnulli suadent, prius cibos boni succi, & qui exsiccant ingerere, ut alimenti benignitate, & siccitate fructus malitia retundatur, & superflua ejus humiditas absumatur. Nec de vino ad Persicorum noxam emendandam magis inter se consentiunt. Alii Persica cuticula lanuginosa spoliata, & in vino per aliquod tempus macerata, ut suave, & salubre edulium commendant hoc versiculo:

Bo Petre, quid est Pesca? Cum vino nobilis asca.

quibus altero versiculo contradicunt alii:

Petre, quid est vinum? Cum Pesca dulcis venenum.

Contendunt enim, succum crudum, & malignum Persicorum a vino per omnes venas, imo & in capillares deduci, ibique obstructions parere: unde purredo, & febres putridæ arque malignæ. Quod devitate tentant nonnulli vinum, in quod maduerint, rejiciendo, & aliud vinum modice dilutum, & quidem parce, superbibendo; nonnulli vinum prorsus rejiciendo, quo mollis, & facile dissolubilis Persicorum caro indurefcit, & in ventriculo difficiliter concoquitur, effervescit, & fla-

& flarus producit, aquam limpidam & puram: comestis. Persicis superbi-
bunt. Sic facilius dissolvuntur in ventriculo & citius permeant ac de-
scendunt, flarus aut ventris inflationes producant. Sic conveniunt
Persica Mala cholericis & calidis naturis, alvi duritie & constipatione
laborantibus, mane præsertim jejuno ventriculo sumpta. Si cum aliis
cibis comedantur sive ante, sive post pastum, æstuosam ciborum di-
gestionem compescunt, ardorem ventriculi & intestinorum temperant.
Non immerito igitur Dioscorides & Plinius affirmant, ea ventriculo
utilia esse, alvum bonam præstare, nec alium eis innocentiores ci-
bum. Reipsa non verisimile est, fructum adeo lapidum & delica-
tum, qui nostro quidem palato præ omnibus fugacibus aridet, ita
ut a natura ipsa nobis ad edendum commendatus videatur, noxium
prorsus & insalubrem esse. Oportet tamen ut delectus Malorum ha-
beat, & ut modus in eis ingerendis fervetur. Eligantur odorata,
bene colorata, sapido succo prædita, & bene nec nimis matura;
non enim aliud Pomum fugacius, & facile corrumpitur. Si eorum
immoderatus sit usus, crudos gignunt succos, colicam, diarrhæam
& dysenteriam procreant, aut febres putridas accendunt. Phlegma-
ticis, & quibus stomachus debilis est & frigidus, nocent. Si quæ
sit in hisce Malis noxa, igne & saccharo nonnulli emendare con-
tendunt, scque gratam & salubrem escam parant. Brassavola sub
cineribus coctum unum aut alterum Persicum ægrotantibus suis of-
ferebat. Cibum vero delicatissimum & ægris perquam gratum ac
utilem Amatus affirmat. J. Bauhinus condiendi modum hunc præ-
scribit: rite lecta manu decorticataque & officinalis exemptis o-
ptime purgata Persica cum aqua & saccharo decoquantur ad con-
sistentiam syrupi debitam: qui modus hodie adhuc usitatissimus,
vulgo *Pecche en compote*. Sic & sanis & ægrotantibus mirifice
placent, præsertim si & linguæ ariditate vexatis, refrigerando
corroborant. Hodie mos invaluit hos fructus aqua vitæ aut
spiritu vini condire cum tantillo Sacchari, qui quidem exitiosus
est. Illorum enim caro laxa & porosa spiritu vini facile imbui-
tur, unde revera sapidior fit, firmior, ac durior, sed in ven-
triculo concoctum difficilis admodum. Unde post alios cibos inge-
sti eorum concoctionem cohibent, ventriculum gravant, æstum
in ipso & in intestinis accendunt, succum crassum, viscidum,
male concoctum pariunt, qui varias in visceribus obstructions postea
gignit.

Persicorum nuclei seu amygdalæ subamari sunt, diuretici habentur (a) & anthelmintici. Pulvis eorum pondere ℥i. in vino al-
bo tenui spatio novem dierum ab Ettmullero commendatur velut
remedium longa experientia probatum adversus renum calculum. A.
Solenandro, L. 1. *Consil.* 15. commendantur decem vel duodecim
numero assumpti mane jejuno ventriculo præservationis gratia a cal-
culo. Ad eundem scopum emulsiones parantur ex illis cum aquis
diureticis, Saxifragiæ, v. g. Linariæ, Alkekengi, Parietariz, Ono-
nidis,

(a) Exemptis Vermes.

midis, Herniariæ &c. Idem nuclei adversus hepatis & lienis obstructions conducunt. Præterea vis anodyna ipsis tribuitur: unde in cephalalgis & agrypniis ad somnum conciliandum & dolorem compescendum a nonnullis præscribuntur eorum emulsiones cum aquis cephalicis aut aliis paratæ. Aquam e nucleis Persicorum n. 50. Ceraforum 100. Florum Sambuci manipulo uno in vini Cretici ℥ij. maceratis in fiftili per decem dies in fimo sepulto, distillatam mirum in modum calculos pellere quatuor unciarum pondere jejuno ventriculo quotidie potam scribit Andr. Matthiolus.

Ex hisce nucleis oleum per expressionem elicitur, quod singulare arcanum habetur in aurium affectibus, in primis ad vermes aurium eliciendos, item in surditate, tinnitu & dolore aurium; idque magis si misceatur cum oleo Colocythidos per decoctionem præparato. Idem oleum etiam temporibus illitum admodum conducti in agrypniis & doloribus capitis. Langius oleum ex nucleis & floribus compositum frequenter in usu habuit ad omnes aurium affectus, surditatem in primis, obstructionem & dolorem aurium; quod sequenti modo paravit. Oleo ex Persicorum nucleis expresso infundatur florum Persicorum recentium q. s. Macerentur in loco calido per aliquod tempus. Postea per linereum colentur: colatura reponatur aliquamdiu, donec fœces secedant, Oleum clarum a fœcibus separatim servetur ad usum.

Lignosa nucleorum officula ad urinas ciendas utilia dicuntur, non secus ac lapilli Dactylorum & Mespilorum. Ex his spiritus acidus & oleum empyreumaticum distillantur igne aperto, quæ spiritui & oleo lignorum similia sunt, & rectificata egregie calculum pellere dicuntur.

Flores ratione salis essentialis & olei tenuis & acris alvum laxant, renes ad serosos humores educunt; unde inter hydragoga recensentur. Recentes a nonnullis comeduntur mane jejuno ventriculo, aut in acetariis miscentur. Non tamen absque molestia & labore purgant: & si nimia copia ingerantur, vomitiones excitant. Alii eos infundunt in vinum aut serum lactis, & infuso isto pro purgante tempore vernali commode uruntur. Hydropicis conducunt. Lumbricos etiam enecant & potenter expellunt, unde infantibus verminosis exhiberi solent. Succus florum Persicorum expressus & defœcatus ad eadem valet: ab ℥ss. ad ℥ij. propinatur. Eadem etiam præstat conserva ex hisce floribus cum Saccharo parata quæ ad ℥ss. vel ℥j. exhiberi potest; cui si Mercurii dulcis tantillum adjiciatur, egregium habetur pellendis lumbricis remedium. Syrupus ex multiplici florum infusione præparatur in officinis usitatus. Alvum blande purgat, vermes enecat, & obstructions referat. Serosos humores uberrime evacuat, unde in catarrhis, rheumatismo, apoplexia, paralyti, & morbis cerebri a sero redundante utiliter exhibetur, ab ℥ss. ad ℥ij. tresve in potionibus laxantibus aut apocematis.

Mali Persicæ folia alvum subducunt, intestinorum lumbricos enecant, & expellunt, in jusculis alterantibus, lacte aut cerevisia ad M. j. de-

decocta. Quin etiam externe trita cum felle tauri, & umbilico imposta cataplasmatis forma ad vermes intestinorum ejiciendos a nonnullis commendantur.

Gummi ex arbore exsudans humorum acrimoniam demulcet, tussentibus prodest, & commendatur ad alvi fluxum, tumorem faucium, asperitatem arteriarum, sputum sanguinis, & diureticum habetur vel etiam lithontripicum; si quod sit.

M A N D R A G O R A.

Mandragoræ duæ traduntur differentiae: una dicitur mas seu candida; altera vero femina seu nigra.

Mandragora mas seu candida, *Off. Mandragora fructu rotundo, C. B. P. 169. I. R. H. 76. J. Raii Hist. 668. Mandragoras mas J. B. 3. 617. Mandragoras, Dod. Pempt. 457. Mandragoras mas vulgarior, Parkinson. Mandragoras albus seu Masculus Cord. Histor. Antropomorphos Pithagoræ, Quorundam: Terræ Malum, Terrestris Malus, & Canina Malus, Nonnullorum: vulgo, Mandragore male.*

Radicem profert crassam, longam, interdum simplicem, & indivisam sæpe bifidam, incoxantem hominem, ut sibi persuadet vulgus, referentem, interdum etiam trifidam aut quadrifidam, externe candicantem, aut ex cinereo ferrugineam, interne pallidam. Ex eius capite absque caule folia exeunt circiter cubitalia, sesquipalmum fere lata, utrinque acuminata, atroviorentia, fœtida. Inter hæc a radice quoque pediculi assurgunt crebri, sesquiunciales aut palmares etiam, florem singuli sustinentes monopetalum, campaniformem, quinquepartitum, modice hirsutum, sordide candicantem ac nonnihil purpurascentem, fœrentem, cum calyce villosa viridi in quinque lacinias diviso; ex quo surgit pistillum quod infimam floris partem perfodit, & abit deinde in fructum parvi pomi effigie, & magnitudine, primum viridem, deinde subluteum, carnosum, mollem, odoris gravis virosi, & in cujus pulpa femina continentur alba; subrotunda, compressa, & quasi reniformia.

Mandragora femina seu nigra, *Off. Mandragora flore subcæruleo purpurascente, C. B. P. 169. Inst. R. H. 76. Mandragora femina J. B. 618. Clus. Histor. 87. Gerard. & J. Raii Hist. 669. Mandragoras femineus, Parkinson. vulgo, Mandragore femelle.*

Ejus folia mari similia sunt sed angustiora, minora, nigrioraque. Flores coloris ex cæruleo purpurascentis; fructus pallidiores, minores, turbinati; Sorbi aut Pyri effigie, sed non minus odorati. Semina minora, & nigriora. Radix quoque proluxa, foris amplius nigricans, interior albidior. Utraque in calidioribus regionibus, Italia, Hispania, sponte crescit, in sylvis, & umbrosis, necnon prope ripas fluviorum. Hic nonnisi in hortis facta oritur. Utriusque folia, & radices vel potius radicum cortex usitata sunt.

Analysi chymica, ex Mandragoræ foliorum recentium ℞v. per retortam di-

distillatis prodierunt humoris limpidi, odorem & saporem ingratum virosum referentis, primo obscure subasali & subacidi, deinde acidi, ℥j. ℥xij. ℥iij. gran. xxvij. humoris limpidi, manifeste acidi, deinde rufi, ac tandem fusci, empyreumatici, austeri ℥ij. ℥xij. ℥iij. gran. lx. humoris fusci, empyreumatici, obscure acidi, subasali; obscure alcali urinosi ℥ij. gran. xvij. humoris fusci, alcali urinosi & sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥ij. gran. xlvij. salis volatilil urinosi concreti ℥ij. gran. x. olei spissi ad instar extracti ℥j. ℥ij. Massa nigra residua pendebat ℥ij. ℥vj. gran. lx. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥iij. gran. xxxvj. ex quibus lixivio sunt extractæ salis fixi mere alcali ℥ij. gr. viij. Partium factura in distillatione fuit ℥v. gr. lxx. in calcinatione ℥j. ℥ij. gr. xxiiij.

Radicum pedaliū & sesquipedaliū, brachii humani crassitiem æquantium, & recens effossarum ℥v. præbuerunt humoris limpidi, foetentis, & virosi, odoris, & saporis ad Cicutam accedentis, obscure subasali, & obscure acidi ℥ij. ℥j. gran. xxxvj. humoris limpidi, primo manifeste acidi, deinde minus acidi, & austeri ℥ij. ℥xiiij. ℥j. gran. l. humoris primo limpidi, subasali, & subacidi, deinde rufi, & fusci, empyreumatici, tum impense acidi, tum acris austeri, & aliquantisper salis urinosi ℥ij. ℥iij. humoris fusci alcali urinosi, & sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥ij. ℥ij. salis volatilil urinosi concreti gran. x. olei spissi ad instar extracti ℥j. ℥ij. gran. iij. Massa nigra residua pendebat ℥v. ℥j. quæ rite calcinata reliquit cinerem ℥j. ℥j. gran. xlij. ex quibus salis fixi mere alcali ℥ij. gran. xxvj. lixivio extracta sunt. Partium factura in distillatione fuit ℥ij. gran. xliij. in calcinatione ℥ij. ℥viij. gran. xxx.

Folia, & radices odorem virosum, ingratum, & caput ferientem exhalant. Radices cortices exsiccati saporem acrem amaricantem nauseosum cum quodam lentore, & in recessu stypticitatem referunt. Salem essentialem obtinent ammoniacalem multo oleo viroso, & narcotico crasso implicitum.

De Mandragora varia sœuntur veterum recentiorumque relationibus nobilitata, nempe humana similitudine egregios effectus producere, felicitatem possessori, & fecunditatem sterilibus forminis adferre. Exhibet vero sæpe Mandragoræ radix bifurcato ramo deorsum protenso rudem hominis formam illiusque crura duo, sed superior truncus homini similis non est. Magonio tamen non solum Mandragoræ radices, sed & aliæ plures adornantur humanum corpus, artus, caput, faciemque apprimè referentes. In radicibus arundinam, Bryoniæ aut aliarum plantarum adhuc virentibus sculptunt impostores tam virorum quam mulierum formas, infixis Hordei, Avenæ, aut Milii granis, iis in locis, ubi pilos effingere volunt: deinde facta in terra scrobe recondunt, tenui sabulo obruunt, ibique relinquunt quousque semina illa radices emittant. Tunc eruant eas, & adnatas e granis radices acutissimo cultello in tenuissima filamenta scindunt, aptantque ita ut capillos, barbam, & cæteros corporis pilos referant. Varia insuper narrant de hujus radices ortu, effodiendi modo, & periculis.

Ferunt, has præstantissimas radices ex urina suspensi hominis sub patibulo morientis irrigatas tales efformari, & ideo adeo raras esse, eandem non sine vitæ periculo manu effodi, quapropter eas primum circumfoliendas esse, ita ut minimum ex radice terra sit conditum, deinde ab ea religandum canem, a quo postea fugiente radix extrahitur & sequitur, sed non adeo longe, quandoquidem statim atque effossa est, canis moritur: nullum postea accipientibus amplius metum esse, imo summe proficuas esse, maleficia & infortunia quæcumque averiando, & felicitates quascumque desiderabiles afferendo. Anilium illarum nugarum auctor fuisse videtur Flavius Joseph, qui *L. 7. cap. 25. de Bello Judaico*, de quadam radice *Baaras* dicta in valle ejusdem nominis nascente prope Jerosolymam fere similia narrat. Sed de his nugis & fabulis satis.

Mandragora inter narcotica & soporifera medicamenta recenseri solet, quod colligitur ex odore ingrato viroso caput feriente. Quod an de radice verum sit, J. Rajus dubitat. Cortex ille ad nos aliunde, potissimum ex Italia affertur: rari usus est intrinsecus: Schroderus soporiferam virtutem ipsi tribuit, & præterea vix potenter discutiendi & resolvendi externe adhibetur. Paulus Hermannus in *Cynsura materie Medicæ Henningeri*, in radice Mandragoræ duplicem novat virtutem 1. Purgantem tam per superiora quam inferiora, cum violentia & virum etiam prostratione & aliquando convulsionibus subsequentibus, unde per se non datur nisi dosi minima ad ℥ss, aut ℥j. & in infuso ad ℥j. 2. Narcotitam seu soporiferam & stupefacientem Opii virtuti non dissimilem. Inde forsitan est, quod in epilepsia & moribus convulsivis quibusdam commendata sit. Circumforanei nonnulli hoc cortice in quartanis & aliis febribus intermittentibus utuntur pro emetico, sed minus toto. Specificum uterinum ab eodem P. Hermanno dicitur: sed caute adhibendum. Si enim nimia in quantitate exhibeatur, dira inde sequuntur symptomata ut spasmi, &c. Uterum valde movet & abortum causat: quapropter gravidis nunquam exhiberi debet.

A veteribus vinum in quo Mandragoræ radix infusa fuerat, propinabatur ægris quibus membrum aliquod refecandum erat ad narcosim inducendam. Cum vero narcosis hæc admodum periculosa sit, modus hic narcosim inducendi apud nos exploditur: & interius rarissime & fere nunquam hæc radix adhibetur. Externe radice cortex adhibitus ab Ettmullero laudatur ad tumores duros schirrosos & strumosos emolliendos & resolvendos, & hac virtute Cicutam & Nicotianam superaret dicitur. Faber in *Myrothecio Spagyrico lib. 4. c. 1.* ex his radicibus oleum Mandragoræ per descensum distillat quod valdopere commendat externe illitum, pro emolliendis duris tumoribus & doloribus leniendis.

Mandragoræ folia potenter discutiunt, attenuant & resolvunt, dolores mitigant & inflammationes sedant. Unde una cum radicibus in laete cocta utiliter sub cataplasmatibus erysipelatibus, tumoribus inflammatoriis, duris aut schirrosis admoventur. Com-Hyosciamo, Cicuta, Nicotiana optime consociantur. Ex succo Mandragoræ cum succo Cicu-

Cicuta vel Nicotianæ & Gummi ammoniaco coctis in unguenti vel emplastri consistentiam Ertmullerus utile medicamentum conficit ad tumores splenis dueros resolvendos. Fernelius *Method. Medend. lib. 5. cap. 17.* ad ardentium febrium æstus compescendos, capitis dolores & deliria sedanda, & ad somnum conciliandum commendat Mandragoræ folia radiceve trita inductaque ex oleo fronti atque temporibus.

Mandragoræ fructui veteres non solum comesto sed etiam nasibus tantum admoto soporem inducendi stuporemque virtutem tribuebant. Casp. Hoffmannus *L. de Medicamentis Officialibus*, an quisquam pomum ipsum Mandragoræ cum vel sine cortice impune possit eatre se valde ignorare scribit. Etius omnem malitiam ejus videtur rejicere in semen, quasi illo dempto caro sit indemnis, nisi nimis copiose ingeratur. At fructus, certe immerito, suspectus est. Pulpam enim cum semine innoxie eatari posse docuit J. Faber Lynceus Romæ Simplieum Professor. Id, teste Joanne Terrentio *Notis in Hernandez de Plantis Mexicanis, lib. 8. cap. 28.* coram suis auditoribus magnum Mandragoræ pomum una cum seminibus jejunos absumpsit, sine ullo vel somni vel alterius mali signo minimo, & ut experimentum-esser certius, jejunos usque ad prandium, per aliquot nempe horas, permansit, & a vino, ac vis pharmacii debilitaretur, abstinuit. Idem experimentum se quoque persequi testasse testatur J. Terrentius.

Mandragoræ folia in unguento populeo usurpantur. Cortex radicum in Reque *Myrsi*, Aurea Alexandrina *Nicolai Alexandrini*, & Tryphera magna *Ejusdem*.

MARRUBIUM.

Plares inter plantas quæ Marrubii nomine apud Botanicos insigniantur, duo potissimum genera hoc nomine in Officinis speciatim designantur, scilicet Marrubium album seu Prassium album, & Marrubium nigrum, seu Prassium nigrum & Ballote.

Marrubium, Prassium, Prasium, Marrubium album, Prassium album, *Offinarum*, Marrubium album vulgare, *C. B. P. 330. Inst. R. H. 192. Marrubium album, J. B. 3. 316. Raii Hist. 556. Marrubium sive Prassium album Tabern. Icon. 539. Prasium, Anguillar: vulgo, Marrube blanc.*

Radice nititur simplici, lignosa, plurimas fibras emittente. Caules inde eurgent plures, pedales & altiorem, lanuginosi, quadrati, ramosi, foliis vestiti ad singula genicula ex adverso binis, subrotundis, incanis, circum oras crenatis, rugosis, pediculis satis longis suffultis. Flores ad genicula in verticillos densos coacti caules ambiunt, brevibus aut

nullis pediculis ; e calycibus nascentes hirsutis , striatis , quorum singulæ stiracis in spinulas terminantur ; perexigui , albescentes , monoperali , labiati , quorum labium superius surrectum est , & bicornis , inferius vero tripartitum . Ex calyce surgit pistillum posticæ floris parti ad instar clavi infixum , & quatuor veluti embryonibus stipatum , qui deinde abeunt in toridem semina oblonga , in capsula quæ calyx floris fuit recondita . Florum verticilli , quamvis caules undique amplecti videantur , egrediuntur tamen e foliorum alis . Odor totius plantæ vehemens & nonnihil gravis . Ad vias publicas , agrorum margines , in locis neglectis & ruderatis sponte & frequens nascitur . Tota planta usitata .

Analysî chymica , ex foliorum a stipitibus mundatorum & summitatum floridarum ℞v. per retortam distillatis prodierant humoris limpidi , odorati , aliquantisper aromatici , sapore herbaceo amaricante , obscure acidi ℞ix. ℞iij. gran. xvij. humoris limpidi ; odorem eundem , eundemque laporem referentis , & magis , ac magis acidi ; & amari subausteri , ac tandem impentis austeri ℞iij. ℞v. gran. lxx. humoris obscure rufescentis , leviter empyreumatici , impentis acidi , salis ; & impentis austeri ℞iij. gran. xlvij. humoris fuscæ alcali urinosi , & sale volatili urinoso copioso imprægnati ℞ij. ℞iij. gran. xxxvj. salis volatiliss. urinosis concreti gran. xx. olei spissi ad instar extracti ℞iij. gran. xij. Massa nigra in retorta residua pendebat ℞ix. ℞vij. gran. liij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℞iij. ℞v. gran. xxij. ex quibus salis fixi mere alcali ℞i. ℞iij. gran. xv. lixivio sunt extracta . Parrium jactura in distillatione fuit ℞v. ℞vj. gran. xl. in calcinatione ℞v. ℞ij. gran. xxx.

Marrubii albi folia chartæ cœruleæ colorem non mutant ; maxime amara sunt , cum quadam adstrictione , odore vehementi , ac subtili donantur , ad moschum nonnunquam accedente , teste Dodonæo qui de Marrubio albo in Flandria nascente hoc asserit . Salem essentialem obtinent quem Tournefortius comparat sali naturali terræ , constanti nempe sale marino , nitro & sale ammoniaco , mixtum cum multo sulphure tum tenui , tum crasso , terra copiosa & phlegmate .

Marrubium album aperit , & viscidos humores potenter dissolvit . Primarium est remedium in asthma humorali , & in morbis chronicis a muco spisso , viscido ac tenaci oriundis . Viscerum obstructions a muco inspissato oriundas referat . Succus expressus cum melle ad ℞ij. tresve , aut syrupus de Prasso compositus in officinis asservatus ad ℞j. aut alteram asthmaticis , tussientibus & tabidis opitulatur . „ Innumeris comprobavi experimentis , inquit Borellus *Observat. Medic. pag. 289.* Marrubii albi „ summitates , vino albo infusas & triduo epotas mire ad menstrua „ provocanda , stomachum roborandum , cachexiam & sædos virginum colores arcendos valere , & fortius cum Chamædrye & Cœntaurio minore mixtas .

Simon Paulli observat eas non tantum menses accelerare , sed remorantes secundinas quoque præcipitare . Ad M. β. vel M. j. præscribuntur Pal-

vis foliorum valere dicitur in partu difficili lochiisque recentis. Insuper interancorum vermes necat, notante J. Raio. Ad ℥j. aut alteram exhibeatur. Marrubii albi succus, vel infusum ex vino, vel decoctum ex aqua a Foresto, Freitagio, Zacuto Lusitano, & Hartmanno, in hepatis obstructionibus vel etiam schirrhosis, in ictero, in hydrope histerum subsequente commendantur. Joan. Baptista Chomel D. M. P. observat duos ægrotantes a schirro hepatis liberatos fuisse ab infuso foliorum Marrubii alb. M. j. in vini albi ℥viii. quotidie mane per aliquot menses epoto. Conserva florum Marrubii cum melle parata, & per 40. dies exhibita in dosi ℥j. nobilem quemdam schirro hepatis jam diu laborantem integræ sanitati restituit, aliis medicamentis Chalybeatis frustra tentatis, annotante Zacuto Lib. 2. *Prax. admir. Observat.* 48. Superbibobat autem singulis matutinis parum aquæ stillatitæ ejusdem Marrubii cum radice. Mixturam sequentem Joan. Raio commendat velut medicamentum, ad icterum nulli secundum.

℥. Syrup. de Præssio ℥ij. Olei Tartari p. deliq. ℥j. Misce. Sumat æger per intervalla frequentia ad mensuram unius cochlearis.

Stöckerus Marrubii folior. virentium decoctum ex vino, vel exsiccatum infusum in ictero commendat.

℥. Marrubii folior. virentium ℔j. Contunde, & coquantur in vini albi ℔vij. ad ℔v. Colaturæ capiat æger ℥iij. mane jejunos, & ℥iij. ante cœnam. Sed satius est folia in vino calide macerari tantum, non concoqui. Vinum enim ebullitione diuturniori acidum fit, & ingratum. Macerentur itaque folia in vini ℔v. per 24. horas.

℥. Folior. Marrubii exsiccat & contusor. q. v. Affunde vini albi q. s. ad supereminentiam 4. vel 5. digitor. transversor. Frigide macerentur in vase probe obturato, quotidie agitando, donec extrahatur tinctura. Dosis ℥iij. bis in die.

Ejusdem decoctum cum Argentina ab Ettmüllero, & Freitagio commendatur in ictero flavo ex infarctu ductus cystici. Externe in eodem affectu cataplasma proponit plantis pedum applicandum ex Marrubio, & Argentina simul in vino coctis. In jusculis aperientibus ad menses suppressos promovendos præferibuntur Marrubii albi summitates floridæ ad M. ℔. cum Tartaro chalybeato vel floribus sal. ammoniaci martialibus.

℥. Carnis vitulin. ℔℔. Coquatur in aq. comm. ℔ij. ad ℔ij. Tum adde folior. Agrimon. Argent. ana M. j. Centaur. min. Chamædr. Summatum floridar. Præss. alb. ana pug. ij. Post levem ebullitionem fiat colatura pro duobus jusculis. Unicuique adde Tartar. martial. solubil. ℥ss. vel flor. amm. martial. gr. xx. Sumatur mane, & sero in mens. suppressione, ictero, & viscer. obstructionibus.

R. Syrup. de Præssio ℥j. Tinctur. martis aper. ℥j. Aq. de Artemisia, flor. Aurantior. ana ℥ij. Fiat julap. quotidie mane sumendum in mensum suppressione.

Geoffroy Tom. II.

Ec 3

Fo.

Foreſtus aſſerit, nonnullos ſtumis affectos diuturno uſu ſyrupi de Praſſio ſimplici ſeu ex ſucco recenti cum Saccharo parati perianatos fuiſſe, multis aliis remediis antea fruſtra tentatis.

Marrubium veſicæ, & ſenibus nocere ſcribit Dioſcorides: quo frequen- ti uſu exulcerat. Multo minus igitur, inquit C. Hoffmannus, urendum in iis, in quibus jam ulceratæ ſunt partes illæ. Syſyupus de Praſſio *Mefue*, annotante eodem, valde calidus eſt, & qui ſenibus potius quam juveni- bus, frigidis potius quam calidis adhibendus ſit.

Marrubii albi folia, ſummitates floridæ uſurpantur in ſyrupo de Praſſio *Mefue*, in pilulis de Agarico *Pb. Reg. Chama*, Theriaca *Andromachi*, Hiera Diacolocynthidos, Pulvere Diapraſſii *Nicolas Alexan- drini*.

Marrubium nigrum, Praſſium nigrum & Ballote, *Off. Ballote*, *Mat- thiol.* 825. *Inſt. R. H.* 185. Marrubium nigrum, ſordidum, Ballote Dioſco- ridis, *C. B. P.* 230. Marrubium nigrum ſive Ballote, *J. B.* 3. 318. Mar- rubium nigrum, *Gerard. Emacul. f. Raii Hiſt.* 581. Marrubiaſtrum, *Ta- bern. Icon.* 540. vulgo, *Marrube noir*.

Caules cubitales, & interdum bicubitales, plures ex eadem radice li- gnosa, perenni, fibrata exeunt brevi lanugine hirsuti, quadrati, inanes, ramiſi, rubentes, foliis veſtiti ad ſingula genicula, ex adverſo binis, Meliſſæ aut potius Lamii rubri, rotundioribus, & nigrioribus, hirsutis & ad tactum mollibus, rugoſis. Flores verticillati caulibus adnaſcuntur, in eodem communi pediculo, e folij ſinu egreſſo plures, mono- petali, labiati, quorum labium ſuperius cochlearis inſtar eſt excavatum, inferius vero in tres partes diviſum, media ampliori, & cordiformi, pallide purpurei, ſaturatioribus lineis intus ſtriati: calyce ſtriati; ob- longi, in quinque acuta ſegmenta partiti. Ex unoquoque calyce ſur- git piſtillum poſticæ ſloris parti infixum, & quatuor veluti embryo- nibus ſtipatum, qui deinde abeunt in totidem ſemina parva, oblon- ga, per maturitatem nigricantia, in capsula tubulata, pentagona, & quinquepartita, quæ ſloris calyx fuit recondita. Odores ſordido La- minum reſert. In ruderatis, & ad ſepes naſcitur. Herba integra in uſum venit.

Analysi chymica, ex ſummitatum floridarum Marrubii nigri ℥vj. per retortam diſtillatis prodierunt humoris limpidi aliquantisper ruſceſcen- tis, plantæ ſaporem, & odorem referentis ℥x. humoris minus lim- pidi, eundem odorem ſaporemque referentis, acidi magis ac magis ℔j. ℥ix. ℥v. gran. xxxvj. humoris primum limpidi, acidi, auſteri, deinde ſuſci, impenſe auſteri, ac tandem nigricantis, qui per tempus pulviculum nigrum depoſuit, & limpidior factus eſt ℔j. ℥viij. ℥vj. gran. xxxvj. humoris turbidi, ſuſci, nigricantis, ſali, & alcali urinoſi, qui pulverem nigrum ad imum dimiſit ℥v. recipiens pulvere nigro, & ſuli- ginoloſo conſperſum repositum fuit: ſalis volatilis urinoſi concreti ℥ij. olei ſpiſſi nigri ℥ij. Maſſa nigra in retorta reſidua pendeat ℥xv. quæ rite calcinata reliquit cinereum ℥viij. ℥vj. ex quibus lixivio ſalis ſui ℥j. ℥viij. ex- tractæ ſunt. Partium jactura in diſtillatione fuit ℥viij. ℥j. in calcinatione ℥vij. ℥ij.

Mar-

Marrubii nigri folia amara sunt, & odorem gravem foetidum referunt: chartæ cœruleæ tincturam non mutant. Salemi essentialem obri-nent mixtum, sali qui ex terræ lotionibus extrahitur æmulum, ammo-niacalem nempe, tartareum, falsum, & multo oleo crasso fœtido impli-entum.

Marrubium nigrum tumores resolvit, dolores sedat, ulcera detergit, & sanat, externe admotum: rarius intus sumitur ob foetorem, & ingra-vum saporem. J. Rajus illud velut præstantissimum remedium in hypo-chondriacis, & hystericiis affectionibus commendat. Cl. Tournefortius refert, quosdam ad arthritidem sanandam aut saltem ejus paroxysmos minus frequentes, & mitiores efficiendos hoc uti remedio.

24. Folior. Marrubii nigri, Marrub. albi, & Beton. ana M. j. Infunde in aq. ferventis ℥vj. Igne remoto macerentur, donec aqua refrige-rata sit. Fiat colatura, cujus cyathos tres quatuorve in die sumat æger.

Ferventi cinere flaccescunt ejus folia ut condylomata reprimant. Cum melle trita sordida ulcera purgant. Eorum decoctum ad omnes malas scabies, serpignes, porrignes ac papulas sanandas plurimum valet. Quapropter a Trago ad manantia capitis ulcera pueris familiaria com-mendatur. Tabernæmontanus asserit, ejus folia sub cinere cocta, & cum melle contrusa hæmorrhoidas sanare.

M A R U M.

Mari nomen duobus plantarum generibus tribuitur, quorum unum Marum verum seu Cortusi dicitur, alterum Marum Mastich.

Marum verum, Marum Cortusi, *Off.* Chamædryos maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis, *Inst. R. H.* 205. Marum Cortusi, *J. B.* 3. 242. *J. Raii Hist.* 127. Tragoriganum latifolium, *C. B. P.* Tragoriganum latifolium sive Marum Cortusi Matthiolo, *Parkins.* Tragoriganum Lobelii, *Gerard.*

Planta est pedalis magnitudinis, radice fibrosa, quæ differt a Chamædryos speciebus, stipitibus frutescentibus incanis, tomentosis, foliis hastæ ferro similibus, quatuor lineas longis, duas latis, dilute virentibus, subtus incanis, sapore acri, & amaro, odore vehementi, & aromatico-grato, qui subito cerebrum perit, & sternutationes movet. Flores qui ad Chamædryos flores plane accedunt, in foliorum alis nascuntur mono-petali, purpurei, labiati, quorum stamina labii superioris locum occu-pant: labium vero inferius in quinque partes divisum est, media am-pliori cochlearis instar excavata. Ex calyce autem Chamædryos quoque pari, villosa, incano surgit pistillum posticæ floris parti infixum, & quatuor veluti embryonibus stipatum, qui deinde abeunt in totidem semina subrotunda, Chamædryos similia, in capsula quæ calyx floris fuit recondita. Frequens est in Stœcadum (Terres) una quæ vocatur

Pomponia, Gallis *Portecroz*. Hic in hortis colitur. Folia & summitates floridæ in usum veniunt.

Analysi chymica, ex foliorum, & summitatum floridarum Mari lbj . & Zij . per retortam distillatis prodierunt humoris limpidi, sub finem aliquantisper rufescens, odore, & sapore aromatico pergrato, primum obscure acidi; deinde manifeste magis ac magis, atque magis ac magis austeri lbj . Zvij . Zj . gran. xxxvj . humoris empyreumatici, rufescens, sapore aliquantisper acri pungente, impense acidi, impense austeri, & falsi Zvj . gran. xxxvj . humoris rufi, tum acidi tum alcali urinosi, & sale volatili urinoso imprægnati Zj . Zj . olei tum tenuis essentialis, tum crassi, spissi ad instar extracti Zj . Zij . Massa nigra residua pendebat Zij . quæ rite calcinata reliquit cinerum albicantium Zj . Zj . gr. xij . ex quibus salis fixi mere alcali Zij . gran. xxij . lixivio extracta sunt. Partium iactura in distillatione fuit Zij . Zij . in calcinatione Zij . Zvj . gran. lx .

Maii veri folia chartam cæruleam rubram efficiunt. Inter digitos consita odorem spirant aromaticum, penetrantem, subtilem, pungentem, qui sternutationes movet; saporem referunt acrem aromaticum amarum. Exsiccata, & cum multa aqua distillata, ut cœteræ plantæ aromaticæ, multum olei essentialis subtilis, & penetrantissimi fundunt. Salem essentialem tartareum obtinent: sed insuper abundant sale tum acido, tenui, volatili, copioso, tum alcali urinoso mediocri, cum multo oleo essentiali, acri, aromatico conjuncto. Unde compositum exsurgit haud dissimile mixturæ ex spiritu acido dulcificato & spiritu volatili urinoso aromatico conflatæ. Mari odor felibus gratissimus est: & eos undequaque allicit ad hortos ubi colitur, eos veluti insanos, & venereo cæstro furentes reddit; ita ut plantam mordicent, supra eam se voluent, copiosa saliva eam proluant, & nonnumquam suo spermate polluant. Inde fit ut in hortis difficillime asseruari possit, nisi intra cancellos ex ferro textili confectos includatur.

Rarus est Mari usus in officinis. Attamen inter plantas aromaticas non infimum locum occupat: Raymundus Mindererus in suo *Alcedario Marcescino*, & Georgius Vvolffgangus Vvedelius peculiaribus dissertationibus hanc plantam nobilitarunt, & magnopere commendarunt. Virtutem incidendi, attenuandi, aperiendi, digerendi illi tribuit Vvedelius, lentorem ac torporem pituitæ corrigendi, bilis inertiam emendandi, sanguinis & spirituum motum augendi, speciatim affectibus frigidis, & humidis medendi. Ab eodem habetur velut insigne diureticum, potens diaphoreticum, & carminativum, summum antiscorbuticum in scorbuto frigido, valens emmenagogum, præstantissimum cephalicum, pectorale, & antiasthmaticum, cardiacum, stomachicum, hepaticum, & splenicum, uterinum, antispasmodicum, aphrodisiacum, anihelminthicum, uno verbo polychrestum; verum latius fortasse quam par est, celeberrimus ille Medicus Mari odore allectus ejus facultates extendit: & virtutes omnes quæ in singulis plantis aromaticisprehenduntur, illi nimis facile applicat. Expectan-

Standum est donec ejus vires usu diuturniori comprobatae sint. Ettmullerus Marum cephalalgiae, & nervinis affectibus conducere scribit, & illud in apoplexia, & catharris velut medicamentum egregium commendat. Folia pulverata ad ℥ss. praescribuntur, nec immerito Majoranae anteponuntur.

Externe idem pulvis habetur pro errhino insigni, sive solus, sive cum Tabaco confociatus. Cerebrum expurgare, & roborare dicitur, & amissum odorem restituere. Joannes Quincy Medicus Londinensis in sua *Pharmacopoea Officiali*, in *extemporanea seu completo Anglico dispensatorio* parat ex foliis Mari sal volatile oleum aromaticum gratissimum, & cephalicum praestantissimum.

Mari salia usurpantur in Trochiscis *Hediebroi* quae Theriacae compositione subeunt, & in pilulis Marocostinis *Mindereri*.

Oleum essenziale ex foliis Mari extrahitur odore pergratum, quod cephalicum dicitur, uterinum, & antiparalyticum, & a Batavia maxime expetitum.

Marum Mastich, *Off. Thymbra Hispanica*, Majoranae folio, *Inst. R. H.* 197. Sampfuchus sive Marum Mastichen redolens, *C. B. P.* 224. Clinopodium quibusdam, Mastichina Gallorum, *J. B. 3. Part. 2.* 241. Marum vulgare, Clinopodium, *Dodon. Pempt.* 271. Marum Gerard. *J. Raii Hist.* 520. Marum vulgare, *Parkins.* Marum Mastich, Gallorum, & Anglorum, *Advers. Lobel.* vulgo, *Marum Mastich*.

Frutex est pusillus, lignosus, multis ramis tenuibus brachiatus, radicibus tenuibus, lignosis, foliis Serpilli, sed incanis, odoratis, Mastichen quodammodo referentibus, & sapore acri praeditis. In extremis turculis capitula lanuginosa, & paulo etiam inferius ambientes similes verticillos obtinet, e quibus perpussilli flores albi, & Thymo similes, monopetalii, labiati, labio superiore surrecto, & bifido, inferiore tripartito. Odor totius plantae gratus, sed paulo vehementior. In Hispania, & aliis calidis regionibus sponte crescit. Hic in hortis colitur.

Eadem vires ipsi, quae Maro Costosi, tribuuntur: sed rarioris est usus. Deodatus, notante J. Rajo post Dolzum, in desperato mensium fluxu ultimum, & praesentissimum remedium ducit pulverem corticis Mari ad ℥j. cum vino aastro, singulis matutinis horis propinatum.

M A T R I C A R I A.

Matricaria, & Parthenium, *Offic.* Matricaria vulgaris seu sativa, *C. B. P.* 133. *Inst. R. H.* 493. Matricaria vulgo minus Parthenium, *J. B. 3.* 129. Matricaria, Gerard. *J. Raii Hist.* 357. Artemisia tenuifolia, *Tabern. Icon.* 8. Matricaria vulgaris, *Parkins.* Amaracus, *Galeno*, & *Aethera*: Crispula, *Quorundam*: Matricaria Parthenii: prima species, *Brussels*: vulgo, *Matricaire* ou *Espargoutte*.

E radice alba, plurimis fibris emissis terram apprehendente, caules exsurgunt plures, sesquicubicales, rigidi, striati, glabri, satis crassi, me-

medulla fungosa referti, foliis crebris, dilute virentibus, graveolentibus; amaris, nullo ordine positis vestiti; folia velut alata ex duabus tribusve pinnularum mediz costæ adnexarum conjugationibus componuntur: pinnulæ hæc latæ sunt, & in alias minores circa margines dentatas subdividuntur. Caulium summitates versus, ex alis foliorum exeunt ramuli, in quibus ut & in summis caulibus nascuntur flores pediculis oblongis, plures velut in umbella, radiati, non admodum ampli, quorum discus ex plurimis flosculis luteis, coronæ vero ex semiflosculis brevibus candidi componuntur, seminum embryonibus insidentibus, & calyce semisphærico & squamoso comprehensis. Semiflosculis coronæ marcescentibus discus medius extumescit, & embryones abeunt in semina oblonga, exigua, striata, thalamo affixa in calycis fundo, pappo carentia. Tota planta odorem gravem ac vehementem spirat, In hortis colitur. Folia sæpius comæ floridæ in usum veniunt.

Analysi chymica, ex foliorum & summitatum viridum & recentium Matricariæ ℞v. per retortam distillatis prædierunt humoris limpidi, plantæ odorem & saporem referentis, obscure subfalsi, & obscure subacidi, ℞j. ℞vij. ℞ij. gr. xxiiij. humoris manifeste acidi magis ac magis, deinde austeri magis ac magis impenso ℞ij. ℞xij. ℞ij. gr. xxiiij. humoris rufi, empyreumatici, & alcali urinofi ℞j. gr. lx. humoris rufi, sale volatili urinolo copioso imprægnati ℞j. ℞j. salis volatilis urinofi, conereti ℞j. gr. xliij. olei adiposi ℞j. ℞vj. gr. lx. Massa nigra residua pendebat ℞ij. ℞vj. gr. xxiiij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℞ij. ℞ij. ex quibus salis fixi mere alcali ℞j. ℞j. gr. xlv. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℞ij. gr. xij. in calcinatione ℞ij. ℞ij. gr. xxiiij.

Ex florum capitulis quorum semina jam ad maturitatem pervenerant distillatis, eadem principia extracta sunt cum olei essentialis quantitate non mediocri.

Succus foliorum Matricariæ colorem subrubrum chartæ eazuleæ affert. Salem essentialem obtinet hæc planta ammoniacalem cum multo oleo tum tenui essentiali, tum crasso fortente consociatum.

Inter plantas hystericas insignem locum occupat Matricaria. Ad uterinos affectus plurimum conducit, vel pulverata à ℞ss. ad ℞ij. vel ejus succus expressus & defæcatus ad ℞j. vel alteram, sicut infusum aut decoctum ad ℞vj. Menfes, lochia & secundinas remorantes pellit, urinam suffocationem compescit, dolores post partum sedat. Simon Pauli eam plurimum commendat. „ Mihi, inquit, frequenti in „ usu est, si lochia post partum negotium ficeffant mulierculis; Pa- „ rare enim ex ea & floribus Chamomillæ, cum tantillo Artemisiæ „ decoctum consuevi, a cujus usu hysterica symptomata illico cessare, „ & lochia abunde fluere, sæpe comperi. Quod medicamentum licet „ non jucundum aliis, hystericis tamen correptis passionibus, veluti „ Sesamo ac Papavere sparsum apparet; quæ ab illius usu ex lethargo „ excitatæ, in vitam, Deo benedicente, veluti redire conspici so- „ lent. “ Hæc S. Pauli. Quæcumque amara possunt, & car- minant.

insanantia, Matricaria utiliter præstat, flatus dissipat, stomachum roborat & ciborum concoctionem juvat. Ventris tineas expellit vel herba ipsa, vel succus ejus expressus, non secus ac Centaurium & Absinthium. Eam febrifugam prædicat C. Hoffmannus de Med. officinali, præcipue in malis uteri. Idem auctor pituitam & atram bilem purgandi vim ipsius succo tribuit post Brassavolam, si convenienti dosi exhibeatur, quam ad ℥iij. statuit. In clysteribus ejus decoctum utiliter usurpatur, potissimum in morbis uteri, & cum cæteris plantis carminantibus sæpe consociatur, in colicis affectionibus ab muco viscido tenaci, acri oriundis. Externe præscribitur in fomentis cum Chamomilla vulgari vel Romana in aqua vel vino decocta in uteri inflatione & doloribus post partum, lochiorum remora, mensiumque fluxu doloroso quarundam mulierum. S. Pauli refert Matricariam contusam impositam capitis vertici sæpe ejus dolores mitigare. Ad hemicraniam Chesneau eandem contusam & in tartagine calefactam capiti admovent.

24. Comarum Matricar. exsiccatar. & pulveratar. ℥j. Nitri defæcati gr. x. Syrup. de Artemisia q. s. F. bolus in mensium & lochiorum remora.

24. Comar. Matricar. & Chamomillæ Roman. ana M. j. summitatum Arthemisiæ p. j. Bulliant leviter in aq. comm. ℔ij. Colatura dilue syrup. de s. rad. aper. ℥j. Nitri ℥j. Propinetur per cyathos quarta quaque hora.

24. Folior. & summitat. Matricar. & Tanacet. ana ℥j. Infunde per noctem in vini albi ℥vj. Colatura propinetur mane in mensium remora, lochiorum suppressione, aut ad vermes intestinorum necandos.

24. Folior. Malvæ, folior. & flor. Matricariæ Artemisiæ & Tanacet. ana M. j. F. decoctum cum k q. aq. comm. pro enemate, in cujus ℔j. dissolve crystall. mineral. ℥j. mellis cucumer. asinini seu elaterii ℥j. In hysterica passione, lochior. suppress.

24. Radic. Bryon. alb. ℥iij. Aristoloch. rotund. ℥ij. Zedoar. Baccar. Laur. ana ℥j. Folior. & comar. Matricar. Artemisiæ, Chamæmel. Tanacet. summitat. Sabin. ana M. ij. Coq. in aq. ℔viii. ad ℔vj. addo aq. vitæ ℔j. pro foru calidissimo abdominis & pubis regioni adhibendo, ad lochia suppressa promovenda.

Cavendum tamen, monente Junckero post celebres Medicos, ne in mensium suppressione aut lochiorum remora hæc emmenagoga medicamenta stimulantia & pellentia incaute adhibeantur, ex grat. in habitu insigniter plethorico, quando primæ viæ non satis expurgatæ sunt, nec sanguis debite dilutus & attenuatus, aut partes æstuantes & ad phlogosum tendentes: tunc enim hæc medicamenta non solum non profunt sed ut plurimum graviter nocent, & inducere solent majores obstructions, summas angustias præcordiorum, non raro insolitas per aliena loca sanguinis eruptiones, febres lentas, hecticas, phthisicas, cephalalgiam, difficilam respirationem, spasticas

tticas & convulsivas affectiones, in corporibus laxioribus & spongiosis cachexiam & œdemata. In lochiorum suppressione plenaria si præsertim jam ab aliquot diebus constet, minime expedit, monente eodem, hunc fluxum directe & per hæc stimulantia uterina ut aloetica, myrrhata, &c. intus sumpta revocare. Tunc satius est ad causas hujus suppressionis respicere, partium tensionem, phlogosim minuere & extinguere, orgasmum sanguinis compescere, exæstuationes febriles sedare. Quæ felicius abolvuntur remediis diluentibus, temperantibus, emollientibus, necnon etiam absorbentibus, tum interne, tum externe adhibitis, non neglecto Nitri usu his in ægritudinibus præstantissimo. At in lochiorum sola immutatione aut remora nondum pettinaci, hæc uterina leniter stimulantia moderatissimis dosibus adhiberi possunt, præmissis aut intermixtis laxantibus, emollientibus, temperantibus & diluentibus & potissimum nitrosis. Nunc ad Matricariam redeamus.

Palam est apes, inquit S. Paulli, ferre non posse odorem Matricariæ: quare plethorici, quas præ aliis pungunt apes ac culices, in hortis ambulaturi, optime sibi consulunt, si ferta ex Matricaria parent, ac secum circumferant; sic enim apes graveolentia horum offensæ, quasi manu abactæ, illis non nocent. Eundem effectum expectare a Goutula foetida possumus.

Ex Matricaria aqua distillata, extractum & oleum essentielle in officinis præparantur & servantur ad eadem, quibus Matricaria utilia.

Matricariæ folia usurpantur in syrupo de Arthemisia & in syrupo aperiente Cachectico Ph. Reg. *Chazar* & in emplastro de Ranis *Joann. de Vigo*.

M A Y S.

MAys, Mayz, Maizium, Frumentum Turcicum, Triticum Indicum; Off. Mays, *Inst. R. H.* 531. Frumentum Indicum, Mays dictum, *C. B. P.* 25. Triticum Indicum, *J. B.* 2. 453. *J. Raii Hist.* 1249. Frumentum Turcicum, *Dod. Pempt.* 509. Frumentum Turcicum & Indicum, *Gerardi*: Milium Indicum maximum Mays dictum, seu frumentum Indicum, *Parkins.* Mays *Acoffe*: Maïsum, *Monardi*: vulgo, *Blé de Turquie*.

Radicibus nititur numerosis, duris, fibrosis, albis, sed minime crassis: culmo afforgit arundinaceo, rigido, solido; fungosa, candida & saporis, dum viridis est & succulentus, dulcis, Saccharini, medulla sacro, ac multis articulis geniculato, quinque senuve pedum proceritate, pollicari crassitudine, inferiore parte crasso, ac subinde purpureo, superiore paulatim extenuato. Folia profert arundinacea, cubito plerumque longiora, tres aut quatuor uncias lata, venosa, marginibus aliquantum aspera. Panícula in summo caule gerit dodrantes, graciles, raras, jubæ modo multiplices, aliquando in 15. 20. vel etiam 30. spicas procumbentes divisas, floriferas, junctundas, a semine seu fructu remotas. Flores his, in paniculis nascuntur;

tur, Seeculis floribus similes, apetalis, nonnullis staminibus cum apicibus annexis nutantibus, & calyce constantes, nunc candidi, nunc lutei, nunc purpurei coloris, prout videlicet fructus, seu frugiferæ spicæ coloratæ erunt: at nullum semen exarescentes post se reliquunt. Fructus a floribus sejuncti, veluti spicæ ex culmi geniculis exeunt, atque ab uno culmo tres quatuorve, alterno ordine, longæ, crassæ, rotundæ, cylindraceæ, multis foliaceis, ac membranosis tunicis, veluti vagina quadam arcte obvolutæ, e quarum summo arcte convoluto longi tenuisque capilli prominent, singulis seminum embryonibus adhærentes, eodem cum granis colore. Semina magna sunt, pili magnitudine, nuda, nullo folliculo inclusa, lævia, superficie subrotunda, angulata ea parte, quæ palæ axis adhæret, numerosa, quæ sæpe apud Indos in una spica 700. coacervata reperiuntur, ac arctissime junctæ, & in ordines ac versus octo, aut decem nonnumquam duodecim in longitudinem rectis fere lineis digesta, quæ ratione coloris variant, modo candida, interdum lutea, modo purpurea, nonnumquam fusca aut rubra, medulla tamen farinacea, candida, & sapore cæteris frumentaceis dulciori ac suaviori. Frumentum hoc Americæ indigena in omnibus fere ejus regionibus reperitur, & inde in Africam, Asiam, & Europam delatum fuit. Seminum seu granorum Mays farina quæ a surfuribus probe reputata candoris est eximii, edulis est, nec solum apud Americanos, sed apud nos in panificia subinde cogitur.

Analysi chymica, Grana Mays præter phlegma tum acidum, austerum copiosum, tum falsum, & urinolum, plurimum olei spissi crassi mediocrem terræ, & salis alcali fixi falsi portionem præbuerunt.

Ex hisce granis contusis, & aqua maceratis vinosus liquor paratur veluti ex Hordeo cerevisia, inebrians & ex quo spiritus ardens extrahitur. Multum salis essentialis Tartarei obtinent cum sulphure crasso copioso, aliqua salis ammoniacalis portione & terra pauca conjuncti. Principiis & viribus cum Hordeo convenire videntur.

Franciscus Hernandez frumentum hoc valde gelebrat. Temperatum est, inquit, aut ad caliditatem humiditatemque paulisper declive, substantia mediocri, concocta facili, præcipue his, qui eo victu uti consuevere, non crassa, aut, veluti quidam opinatur, obstructi, & viscosa, quod vel Indis ipsis, qui ex eo pane in placentulas formato, vivunt nec tamen obstructi, aut decolores conspiciuntur, periclitari licet; iisdem affirmantibus nullam in ventriculo gravitatem sentire post epulas, imo post paucas horas rursus, ac si nihil ingestissent esurire, & magna aviditate, si adsit copia, repetere nutrimentum, nec vel de nomine solo ad adventum usque Hispanorum lithiasim novisse: quin quod nullus est apud Mexicanos celebrior ægritudinum acutarum & commodior victus, qui etiam prisana præterter, quod mille experimentis comprobatum, confirmatumque est: celeriter utique ajunt coctum descendere, corpora quantum sat est nutrire, nullum inferre gravitatis sensum, mollire ventrem, & pectus, calorem febrilem demulcere, (præsertim si pulvis ejus ex aqua

aqua permittatur brumali tempore gelare,) urinam evocare, viasque omnes extergere. Quin imo Mexicani Medici, posthabita hordeacea prafana,) agrotantibus pulvis & placentulas ex Mayzio offerunt, huic genti consuetas & gratas, & quæ citra ullam noxam, suavem saluberrimamque alimoniam præbeant.

C. Bauhinus in *Teatro Botanico*, nescia a quo edoctus, scribit, Indos, si nimium utantur hoc frumento in cibis, tumidos, & scabiosos reddi. Imo inquit, pueri Guineensium, qui hoc frumento sæpe panis loco utuntur, videlicet granis e spicis excussis, iisque nonnihil tostis, & prætustis, si paulo frequentius utuntur a scabie sese vindicare non possunt, cum sanguinem nimis calidum & quasi adustum gignat.

Frumentum illud cum Hordeo plurimum convenire mihi videtur. Paves, qui ex eo conficiuntur, sicci sunt, duri, concoctu difficiles, flavolenti, alvum cohibent: accommodati tantum illis, qui vitam agunt laboriosam. Farina etiam cum lacte, & carniun jusculis in pulmenta formatur, quæ panibus magis nutriunt. Non sunt res stomachi debilitati, sed ferula rusticorum, nautarum, bajulorum. Frumentum istud pecori majori minorique est gratissimum: ejusque usu mire gliscit sagina. Columbis edulium præbet jucundum valde, Bruyerinus asserit Bellojocenses Lugdunensibus vicinos illud ferere feliciter, eoque panificia sua augere. Idem facilitatum apud alios populos premente aliarum frugum caritate summa.

Ex hisce granis varii apud Americanos liquores fermentari spirituosii & inebriantes conficiuntur, quorum præparationes apud C. Bauhinum in *suo Teatro Botanico* videre licet.

Nullius aut rarissimi est usus in Medicina. Ejus farina in Hordei farinæ locum substitui potest. Ad cataplasmata emollientia, & suppurantia a nonnullis adhibetur: nam suo lentore cutis poros obstruens, apostematibus suppurandis peridonea est. Foliorum recentium succus, narrante J. Rajo, refrigerandi facultatem obtinet, & erysipelatibus, si panni intincti applicentur, conducit.

MELILOTUS.

Melilotus vulgaris, Off. Melilotus officinar. Germaniæ, C. B. P. 337. *Inf. R. H.* 407. Trifolium odoratum seu Melilotus vulgaris, flore luteo J. B. 2. 370. Melilotus Germanica, *Lobel. Icon.* 43. Melilotus vulgaris Parkinsoni, *J. Raii Hist.* 951. Melilotus Germanica *Gerard. Emaculat. Descript.* Lotus urbana, *Matthioli*: Trifolium caballinum, *Camerrarii*. & *Italer.* Loti sive Trifolii species Cordi: vulgo, *Melilot* ou *Mirlot*.

Radice alba, tenui, lenta, fibrillis brevibus capillata, alte in terram descendente firmatur: caules emittit plures, interdum unicum, capitales, sesquicubiales, & altiores, glabros, teretes, striatos tamen, infirmos, innanes parva intus cavitate, ramosos foliis ad intervalla alternatim nascen-

tibus

ribus vestitis, ternis in eodem pediculo tenuj, sequiunciali, oblongis, denticulatis, & plerumque circumrosis, glabris, obscure virentibus. Flores in spicis longis ex alis foliorum exeuntibus, rarius siti, papilionacei, trapezali exigui, flavi, pediculis brevibus tenuibus penduli: quibus succedunt capsulæ siliquosæ, brevissimæ, simplices, pendulæ, rugosæ, nudæ, hoc est in calyce non reconditæ, ut in Trifolio, per maturitatem nigra, semina singula aut bina subrotunda, flavicantia, continentes, sapore leguminoso. Herba virens nullum fere odorem habet, sed cum aruerit, fragrantissimum spirat. Ad sepes, in vepretis, & inter segetes copiose nascitur. Herba florida in usum venit.

Analysi chymica, ex Meliloti floridi, demptis radicibus, per retortam distillatis lbv. prodierunt humoris limpidi, odorati, sapore amaro, acri, oeculte acidi, subsalsi ℥iv. humoris limpidi, amari, acrioris, manifeste acidi, magis ac magis austeri ℥iij. ℥iij. ℥vij. humoris rufi, sale volatili urinoso copioso imprægnati ℥j. ℥vj. salis volatilis urinosi concreti gran. xxxvj. olei ℥j. ℥vij. gr. liiii. Massa nigra residua pendebat ℥v. ℥ij. quæ rite calcinata reliquit cinerum ℥j. ℥vj. gr. lx. ex quibus salis fixi mere alcali ℥ij. gr. xlv. lixivio sunt extracta. Partium jactura in distillatione fuit ℥iij. gr. xvij. in calcinatione ℥iij. ℥ij. gr. xij.

Meliloti folia chartam cæruleam rubro colore vix tingunt. Odora sunt, acris, amara, nonnihil styptica, & si diu masscentur, nauseosa. Salem essentialem obtinent tartareo-vitriolicum ammoniacalem cum multo oleum tum tenuj, tum crasso conjunctum, & terræ portione non mediocri.

Leniter resolvit, digerit, emollit, dolores sedat. Rarius ad usum internum adhibetur. A nonnullis tamen ejus summitatum floridarum ad M. j. decoctum ex aq. comm. ℥ij. cum florum Chamæmeli pari quantitate præscribitur in abdominis inflammationibus, doloribus nephriticis, & rheumaticis. Johannes Michaelis in *notis in Schroderum* decoctum florum Meliloti eorum singulariter commendat in albo mulierum fluore.

Externe creberrimi est usus propter vim emollientem, anodynam & resolventem, in qua cum Malva & Althæa convenit: cum sit partium tenuiorum & magis volatiliū, magis etiam resolvit. In clysteribus emollientibus, carminantibus & demulcentibus, in cataplasmatibus, fomentis, balneis, emplastris emollientibus digerentibus, resolventibus, necnon concomitantibus utiliter admiscetur folia & flores; sæpe etiam cum Chamæmeli floribus confociantur.

24. Florum Meliloti & Chamæmel. fol. Malv. ana M. ij. Coq. in decocti omasi q. s. pro enemate emollientem, anodyno, & terminativo.

In inflammatione uteri, scroti, ani, & viscerum, fons ex decocto Meliloti ab Ettmullero commendatur, in primis si ipsi Agrimonia & Chamæmelum addantur, quæ in vino vel aqua decocta inflammationem sistunt. S. Paulli in *Quadr. Botanico* ad uteri dolores post partum & inflammationes forum commendat ex summitatibus Meliloti floridis, & semine Fœnu Græci paratum ut summe proficuum. Idem ad pleuritidem mitigandum alium forum proponit sic præparatum.

B. Her-

24. Herbæ Meliloti floridæ , Parietariz ana M. ij. Betonicæ M. j. Bismalvæ Mjß. Flor. Chamæmeli Mß. Mixta & decocta in aqua sæpe pectori superponantur.

24. Pulpæ ex Lilior. & Althææ radicibus, foliis Cicutæ & Hyoscyami paratæ , & per setaceum trajectæ Bß. Flor. Melilot. Camomillæ , & Absinthii Pontic. exsiccator. & pulverator. ana Zijj. Olei rosati q. ʒ. M. F. cataplasma ad testium tumores resolvendos.

Succus flor. Meliloti aut eorum infusum oculorum dolores sedant : si præsertim aliquantulum spiritus vini camphorati infilletur.

Aqua florum Meliloti odorata servatur in officinis , sed rarioris est usus. Ad odora menta sæpius usurpatur : cæterorum odoramentorum fragrantiam tenuitate sua evehit & expandit. Paratur in officinis emplastrum de Meliloti *Mesue*, quod quidem pituitam viscidam egregie discutit, resolvit, & dolores apprime sedat. Tumores emollit, & nonnumquam maturat.

F I N I S.